




SL 126-2-c-2

615.1









Digitized by the Internet Archive  
in 2015



THE BIBLE

AND

THE HISTORY OF THE

ISRAELITES

FROM THE FIRST  
TO THE LAST

OF THE  
JEWISH NATION  
BY  
J. H. W. L.

THE

NEW  
EDITION  
OF THE  
BIBLE

AND  
THE HISTORY OF THE

ISRAELITES

# PEDANII DIOSCORIDIS

ANAZARBEI

TOMUS SECUNDUS.

---

L I B R I

ΠΕΡΙ ΔΗΛΗΤΗΡΙΩΝ, ΙΟΒΟΛΩΝ ΚΑΙ  
ΕΥΠΟΙΣΤΩΝ SPURII.

---

EDIDIT, INTERPRETATUS EST,  
COMMENTARIIS IN OMNES DIOSCORIDI  
ADSCRIPTOS LIBROS INDICIBUSQUE  
NECESSARIIS AUXIT

CURTIUS SPRENGEL,

MED. ET PHILOS. DOCTOR,  
ILLIUS ET REI HERBARIAE PROF. IN UNIVERSIT. HALENSI,  
REGIORUM ORDINUM AQUILAE RUBRAE,  
STELLAE POLARIS ET LEONIS BELGICI EQUES ETC.

---

LIPSIAE

PROSTAT IN OFFICINA LIBRARIA CAR. CNOBLOCHII

1830.



74.c.3


MEDICORVM GRAECORVM  
O P E R A  
QVAE EXSTANT.

---

EDITIONEM CURAVIT  
D. CAROLVS GOTTLOB KÜHN  
PROFESSOR PHYSIOLOGIAE ET PATHOLOGIAE IN  
LITERARUM VNIVERSITATE LIPSIENSI PVBLICVS  
ORDINARIVS ETC.

---

VOLVMEN XXVI  
CONTINENS  
PEDANIVM DIOSCORIDEM ANAZARBEUM.  
TOM. II.



---

LIPSIAE  
PROSTAT IN OFFICINA LIBRARIA CAR. CNOBLOCHII  
1830.

ROYAL COLLEGE OF PHYSICIANS LIBRARY	
CLASS	615
ACCN.	3686
SOURCE	
DATE	



---

[ΠΕΔΑΝΙΟΥ ΔΙΟΣΚΟΡΙΔΟΥ]  
ΠΕΡΙ ΔΗΛΗΤΗΡΙΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ  
ΤΗΣ ΑΥΤΩΝ ΠΡΟΦΥΛΑΚΗΣ ΚΑΙ  
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ.

---

Τ Ο Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Ν .

[*Ἀποδόντες ἐν τοῖς προγραφείοις βιβλίοις, φίλτατε Ἄρειε, τὸν περὶ ἀρωμάτων καὶ ἐλαίων καὶ μύρων καὶ δένδρων καὶ τῶν ἐξ αὐτῶν καρπῶν καὶ δακρύων, ἔτι τε ζώων καὶ μέλιτος καὶ γάλακτος καὶ στέατος καὶ τῶν λεγομένων σιτηρῶν καὶ λαχάνων, ἔτι τε τὸν σύμπαντα περὶ ῥιζῶν καὶ βοτανῶν καὶ χυλισμάτων καὶ οἶνων καὶ μεταλλικῶν λόγον· ἐν τούτῳ, τελευταίῳ ὑπάρχοντι τῆς ὅλης πραγματείας, καταλεξόμεθα περὶ τῆς τῶν ὠφελεῖν ἡμᾶς ἢ βλάπτειν δυναμένων φαρμάκων ἐνεργ-*

---

[PEDANII DIOSCORIDIS]  
LIBER DE VENENIS EORUMQUE PRAECAU-  
TIONE ET MEDICATIONE.

---

P R A E F A T I O .

[*Postquam superioribus libris, amicissime Aree, praecepimus de aromatibus, oleis, unguentis, arboribus, ac earumdem fructibus lacrimisque, insuper de animalibus, melle, lacte, sebo, de frugibus, oleribus, radicibus, herbis, succis, denique de vinorum metallicorumque generibus; in hoc operis totius ultimo de viribus medicamentorum noxiorum eorumque, quae contra prodesse possunt,*

DIOSCORIDES II. Α

γείας. Παραιτησάμενοι οὖν τὴν πολυλογίαν ἐπάνημεν ἐπὶ τὸ προκείμενον.] <sup>1</sup>

Μερίζομένου δὲ τοῦ τοιούτου διχῇ· εἷς τε προφυλακὴν τοῦ μηδὲ τὴν ἀρχὴν λαθεῖν<sup>2</sup>, ἢ εἰ καὶ ποτε λάθοι<sup>3</sup> διδόμενα, ἀνενέργητα γενέσθαι, καὶ εἰς τὸ βοηθηματικὸν τῶν πεπωκότων<sup>4</sup>, πρῶτον δίδεμι περὶ τοῦ προφυλακτικοῦ τρόπου, δυσχεροῦς ὄντος, ὡς οἱ ἀρχαῖοι ὑπέλαβον, διὰ τὸ τοὺς λάθρα διδόντας οὕτω μηχανᾶσθαι, ὡς καὶ τοὺς ἐμπειροτάτους<sup>5</sup> ἐξαπατᾶν· τὰς μὲν γὰρ πικρίας ἐξαιροῦνται τῶν φθαρτικῶν φαρμάκων ταῖς μινυμέναις γλυκύτησι· τὰς δὲ δυσωδίας ταῖς τῶν ἀρωμάτων καταμίξουσιν ἢ ταῖς τῶν ὑλῶν ἐπ' ὠφελείᾳ δοκουσῶν προσφέρεσθαι, μάλιστα δ' ἐν ταῖς ἀσθενείαις, ὡς ἀψινθίῳ, ἢ τραγοριγάνῳ, ἢ ὑσσώπῳ, ἢ θύμβρᾳ, θύμῳ τε καὶ ὀριγάνῳ, ἢ ἀβροτόνῳ, ἢ ἰριδι, ἢ καστορίῳ,

1) Totus hic introitus adeo suspectus est, ut merito spurius habeatur. Namque praeterquam quod Diosc. supra iam quintum dicat esse ultimum librum, quod hic de hoc perhibetur, inepta est repetitio eorum, quae in prioribus libris praecepta sint, ut et de lacte et adipe sermonem fuisse dicatur; inepta est loquacitatis deprecatio.

2) Sic Ald. et Marcell.; λαβεῖν cod. Paris. apud Goup.; λαμβάνειν vulgo.

3) Cod. X. λήθῃ.

4) Sic lego loco vulg. πεπτωκότων.

5) Cod. X. πονηροτάτους.

disseremus. Vitata igitur sermonis prolixitate, opus institutum aggrediamur.]

Huiusmodi autem tractatus cum bipartito distribuitur: et in praecautioem, ne lateant nos a principio venena, aut si forte clam data fuerint, ne noceant; et in doctrinam de auxiliis iis, qui voraverint, afferendis: protinus praecipiam de praecavendi modo, quem quidem esse difficilem prisci rati sunt, propterea quod, qui venenis clam insidiantur, tam dolose ea praeparant, ut peritissimum quemque decipere possint. Siquidem exitialia venena permistis dulcibus amaritudine sua spoliunt, et graveolentiam mixtura aromatum eximunt, aut remediis, quae utiliter adhiberi, praesertim in adversa valetudine, creduntur, exemplis absinthii, tragorigani, hyssopi, satureiae, thymi quoque et origani, abrotani, iridis aut ca-



καὶ εἴ τι δοκεῖ κατάλληλον τοῖς κακουργομένοις <sup>6</sup> φαρμάκοις ἔχειν ποιότητα· ἐπὶ δὲ τῶν <sup>7</sup> πινομένων ἐν <sup>8</sup> οὔνοις σκληροῖς, ἢ ἐν ζυμοῖς, ἢ ἐν γλυκεῖ, ἢ ἐν μελικράτῳ, ἢ ἐν γλεύκει, ἢ ἐν χυλοῖς, ἢ ἐν φακῶ, ἢ ἐν ἀλφίτοις <sup>9</sup>, ἢ ἐν ἄλλοις τισὶ τῶν προσφερομένων συσσιτοποιοῦντες· ὅθεν τὸν ὑποπτεύοντα δεῖ παραιτεῖσθαι τὰ κατηρτυμένα <sup>10</sup> τῶν ἐδεσμάτων καὶ πᾶσαν ἐπιτεταμένην ποιότητα γεύσεων, ὅσαι εἰσὶ διὰ τῶν γλυκῶν ἢ ἀλυκῶν ἢ ὀξέων διαφυλάττεσθαι· καὶ τοὺς δεδιψηκότας ἢ πεινῶντας δι' ἐπιτάσειος μὴ ἀθρόως πίνειν ἢ ἐσθίειν, προσέχοντας τῇ ποιότητι τούτων, μάλιστα δὲ ψυχρὸν ὕδωρ προλαμβάνειν πίνοντας· ἀποπληρωθείσης γὰρ τῆς ὀρέξεως, εὐκατάλεπτοι <sup>11</sup> γίνονται τὸ λοιπὸν αἱ ποιότητες· καὶ ἐπὶ μὲν τῶν ἀσθενούντων, καλῶς παραιτούμεθα τὰς τῶν δοκούντων <sup>12</sup> ἐπ' ὠφελείᾳ δίδοσθαι φαρμάκων πόσεις, ἃς εἰσφέρουσιν οἱ κακουργοῦντες τὰ δηλητήρια· ὥστε διὰ τοῦ-

6) Sic Lacuna; καταργουμένοις vulgo; καθαριστικοῖς Marcell.

7) Cornar. add. ἐσθιομένων καί.

8) Cornar. add. σιτίοις ἢ.

9) Quod vulgo interponitur, ἢ ἐν φαρμάκοις, nec in cod. X., nec a priscis interpretibus recipitur, neque huius loci esse videtur.

10) Optime sic e Paulo Cornar., ut Lucian. de conscrib. histor. p. 206. τοὺς κατηρτυμένους τῶν ζυμῶν iuscula dicit nimis condimentis referta. Vulg. κατηρτισμένα non quadrat.

11) Sic e Paulo 5, 27., qui haec omnia transscripsit, legendum esse Sarac. suasit. Vulg. ἀπεπτότατοι. Cornar. ἀτρεπτότατοι.

12) Inserui, hortante Sarac., δοκούντων, et omisi παρὰ (τῶν) vulg., cuius loco cod. X. περι.

storei et, si quid aliud malefica vi praeditis medicamentis congruum videatur. Vel ea potulentis inserunt, uti vinis asperis, iusculis, passo, aquae mulsae, musto aut variis succorum generibus, vel ipsi lenticulae polentaeve aut aliis, quae edulii specie offeruntur, immiscent. Quamobrem suspiciosi vitare debent fercula nimis aromatis condita, omnique intenso sapore dulcium, salsorum aut acidorum abstinere. Quin neque sitibundi affatim bibere, neque famelici avidius vorare debent, sed circumspicere eorum indolem, maxime vero potu frigidam aquam praesumere. Satiato enim appetitu, qualitates (nocivae) facile deprehenduntur. Quod ad aegros vero spectat, honeste recusamus potiones auxilii praetextu dari solitas, quas offerunt improbi veneficiorum artifices; quo fit, ut aegro-

το δυσεπιχειρήτους γίνεσθαι τοὺς νοσοῦντας· καὶ ἡ μὲν πρὸς τὸ μὴ εὐχερῶς ἀλίσκεσθαι πλανωμένους ἔφοδος αὕτη. Ἑτέρα δὲ ἐστὶν ἀνυσιμωτέρα<sup>13</sup>. δεῖ τοὺς ὑποπτεύοντάς τι τοιοῦτον προλαμβάνειν τι, καὶ ἀδύνατα κατασκευάζειν τὰ φάρμακα· ὥστε τὰς ἰσχάδας μασσωμένους μετὰ βασιλικῶν καρῶν, καὶ τὰ καλούμενα κεδρόμηλα, βουνιάδος τε σπέρματος ὀλκὴν μετ' οἴνου ἢ καλαμίνθης τῶν φύλλων ὁμοίως, ἢ μίλτου τῆς καλουμένης λημνίας σφραγίδος τὸ αὐτὸ πλῆθος σὺν οἴνῳ· ἢ πηγάνου φύλλα καὶ καρῶν βασιλικῶν τὸ ἐντός· ἢ ἁλῶν χόνδρον καὶ ἰσχάδας δύο νήστες προσφερέσθωσαν, καὶ ὑπ' οὐδενὸς ὀτιοῦν βλαβήσονται φαρμάκου. Καὶ ἀντίδοτα δὲ προσλαμβανόμενα μετ' οἴνου τὸ αὐτὸ ποιοῦσιν· ὧν ἐστὶ ἡ διὰ τοῦ σκίγκου, καὶ ἡ διὰ τῶν αἱμάτων, καὶ ἡ καλουμένη μιθριδάτειος.

Ἀντιπάσχουσι δὲ πολλάκις καὶ ἰδιοσυγκρίσεις σωμάτων, αἱ προδιαθέσεις<sup>14</sup> διὰ τινος βρωμάτων ἢ πομάτων ποιότη-

<sup>13</sup>) Sic Ald.; ἀνυτικωτέρα Asul.; προφυλακτικὴ δυνατωτέρα Paull. Omisi autem ἥ τις inter δὲ et ἐστίν.

<sup>14</sup>) Vulg. προδιαθέσεις.

tantes audientium infurtis minus pateant. Et haec quidem, ne facile incauti homines capiantur dolis veneficorum, ratio est. Altera vero est efficacior, ut suspiciosi aliquid praesumant, quod venenorum vires hebetet ac irritas reddat: cuiusmodi caricae sunt cum nucibus iuglandibus comminudatae, et quae citria mala vocantur, seminisque buniadis drachma una cum vino; itidemque folia calaminthae, aut rubrica, quae sigillum lemnium appellatur, pari pondere cum vino: aut rutae folia, nucis iuglandis nucleus: aut salis grami et caricae duae ieiunis offerantur, quo facto nullo veneni genere offenduntur. Quin et antidota ex vino praesumta eundem praebent effectum: ex quorum numero sunt, quod e scinco paratur, quod e sanguinibus temperatur, et quod Mithridatii nomen obtinet.

Adversantur saepe etiam peculiares corporum constitutiones, praedispositiones nimirum, per variam ciborum

τας, ἢ πλῆθος οἴνου· <sup>15</sup> ἐκλύουσι γὰρ τὰς ἐνεργείας τῶν ἐπαισαγομένων φαρμάκων, καὶ τὴν ἀνάδοσιν αὐτῶν κωλύουσι, προπεπληρωμένων τῶν πόρων ὑπὸ <sup>16</sup> προληφθείσης τροφῆς.

Ἐπειδὴ δὲ καὶ περιστάσεις τινὲς ἐν ἀποδημίᾳ δίχα ἐπιβουλῆς πολλάκις ἐπιφέρουσιν ὁμοίους κινδύνους, ἀναγκαῖον ὑπολαμβάνω καὶ περὶ τούτου διαλαβεῖν· δεήσει γὰρ πρῶτον μὲν ἐν ὑπαίθροις τόποις, ὡς δυνατόν, εἶπαι, καὶ ἐτοιμάζειν τὰ πρὸς βρωσίν καὶ πόσιν· δεύτερον δ' ἐν ὑποστέγῳ ἐπιμελῶς καταμανθάνειν τὰς ὁροφάς· πολλάκις γὰρ ἐκ τῶν ὑπερκειμένων πίπτει ζωύφια φθοροποιὰ, ὥσπερ φαλάγγια καὶ ἄλλα τινὰ ἐρπετὰ, καὶ ὁ καλούμενος ἀσκαλαβώτης. Καὶ τοῖς ἐπιχέουσι <sup>17</sup> τὸν οἶνον, ἀγγείοις ἐναρχῶς καὶ ἐπιμελῶς προσέχειν δεῖ· ἔλκεται γὰρ ὑπὸ <sup>18</sup> τῆς ὁσμῆς τοῦ οἴνου τὰ ἐρπετὰ, ἅτινα πολλάκις πίνοντα μὲν τὸν ἰὸν ἀπήμεσαν, ἐμπεσόντα δὲ ἀπέθανον, καὶ ἀπωλείας ἐγένοντο αἷτια τοῖς προς-

15) Sambuc. praeposuit οὐκ, sicut cod. X. οὐκ ἐκχέουσι.

16) Sic Ald., Cornar., Goupyl. et Sarac.; δίχα Asulan.

17) Sic Ald., Asulan., Marc., Cornar.; παραχέουσι Goupyl. et Sarac.

18) Cod. X. ἀπό.

potuumve indolem ac vini copiam inductae. Siquidem venenorum post ingestorum vires exsolvunt, eorumque distributionem per corpus impediunt, impletis ante sumto alimento poris.

Quandoquidem autem in peregrinatione absque insidiis saepius incommodi casus similia invehunt pericula, necessarium duco et hac de re agere. Oportebit igitur primum in loco subdiali, quoad eius fieri poterit, coquinari et apparare cibo potuique necessaria: deinde, sub tecto, solerter circumspicere laquearia. Etenim saepius e superiacentibus decidunt noxia animalcula, uti phalangia, alia quaedam reptilia et stellio dictus. Sed et vino infundendo occupatum vasa diligenter et ad lucem intueri oportet: attrahuntur enim reptilia vini odore, quae nonnunquam sorbendo virus eructarunt, interdum illapsa perierunt, iisque, quibus (id vinum) offerebatur, exitii cau-



ενεγκαμένοις. Πρὸς μὲν τὸ ἀνεπιβούλευτον εἶναι καὶ προφυλάσσεσθαι ταῦτα εἰρήσθω.

Εἰ δέ τινες ἐκουσίᾳ γνώμῃ προσενέγκοιντο, ἥ καὶ ἐξ ἐπιβουλῆς τινων λάβοιεν, δεήσει μηδὲν ἀναβαλλομένους βοηθεῖν· εἰς γὰρ τὸ περιμένειν τὰ παρακολουθοῦντα σημεῖα ἐκάστου τῶν φαρμάκων, ἀνιάτόν ἐστι <sup>19</sup>, δυσβοηθήτων αὐτῶν διὰ τὸν χρόνον γινομένων. Ἐὰν μὲν οὖν οἱ προσενεγκάμενοι <sup>20</sup> νοήσαντες ὁμολογήσωσι τὸ ποθὲν φάρμακον, ἢ τινες τῶν συμπαρόντων, παραγοῖμα ἐλθόντες ἐπὶ τὰ κατάλληλα βοηθήματα, ῥαδίως εἰς τὸ κατὰ φύσιν καὶ οἰκεῖον αὖξομεν αὐτοὺς κατάστημα· οὐ συγκατατιθέμενοι <sup>21</sup> τοῖς λέγουσιν ἐπ' αὐτῶν κατὰ πᾶν <sup>22</sup> ἀθεράπευτα γίνεσθαι. Πῶς γὰρ τὰ μὲν ἐπὶ τῶν ἐν τῷ σώματι γινομένων αἰτίων <sup>23</sup> πάθη θεραπείαν ἐπιδέχεται, τὰ δὲ ὑπὸ <sup>24</sup> τῶν ἔξωθεν συμπίπτοντα <sup>25</sup> φαρμάκων ἀθεράπευτα τυγχάνει; ὁμοίως γὰρ πάντα τὰ περὶ τὰ σώματα γινόμενα νοσήματα θεράπευτά τε καὶ ἀθεράπευτα,

19) Cod. X. ἀνιάτον γάρ.

20) Cod. X. Ἔως ἂν οἱ προσενέγκαντες.

21) Sic Ald.; συγκατατιθέμεθα Asulan. et sequ.

22) Cod. X. πάντα.

23) Asul. αὐτῶν.

24) Cod. X. ἐπὶ.

25) Cod. X. συμπτώματα.

sam attulere. Et haec quidem de insidiis vitandis praecavendisque hactenus dicta sunt.

At, si qui seu ultro seu ex aliorum insidiis venenum hauserint, iis, nulla interposita mora, auxilium afferendum erit. Siquidem, dum signa, quae singula comitari venena solent, exspectantur, immedicabile fit malum, dum propter temporis dilationem aegre adminicula valent. Quare, si qui venenum se hausisse intelligunt et confitentur, aut qui iis affluere, protinus accedentes ad idonea praesidia, illos facile ad naturalem et propriam constitutionem reducturi sumus. Neque vero iis assentimur, qui prorsus insanabilia haec esse contendunt. Quo enim modo morbi, quorum causa corporibus inhaerent, medicaminibus curabuntur, quae vero extrinsecus incurrunt venena, medicinam haud admissura sunt? Aequae vero omnes corporibus accidentes morbi pro caussarum ingruentium magni-

κατὰ τὰ μεγέθη τῶν προσπιπτόντων αἰτίων καὶ τὰς προδιαθέσεις καὶ ἐπιτηδειότητας τῶν σωμάτων· εἰ δέ τινες αὐτῶν καταληφθέντες ἀφωνίαις ἢ παρανοίαις <sup>26</sup> ἢ ἄλλῳ <sup>27</sup>, διὰ τὸ μὴ βούλεσθαι ἐξάγειν αὐτὸ, ἀσυμφανές ἡμῖν ποιοῦσι τὸ φάρμακον, τότε δεῖ ταχέως ἔρχεσθαι ἐπὶ τὰ κοινῶς ἀρμόττοντα τοῖς οἰονδήποτε φάρμακον πεπωκόσιν· οὐδὲν δὲ δύναται κοινότερον βοήθημα δίδοσθαι, τοῦ τὸ δοθὲν φάρμακον, πρὸ τοῦ ἐνισχύσαι, διὰ τοῦ ἔγγιστα τόπου κενοῦν εἰς τὸ ἐκτός· ὅθεν μὴδὲν ἀναβαλλομένους προσφέρειν δεῖ ἔλαιον θερμὸν, ἢ κατ' ἰδίαν, ἢ μεθ' ὕδατος ἐμείν ἀναγκάζοντας· εἰ δὲ μὴ παρείη ἔλαιον, τῶν τόπων μὴ φερόντων, βούτυρον ἀντὶ ἐλαίου μεθ' ὕδατος θερμοῦ ἢ μαλάχης, ἢ λινοσπέρμου, ἢ τράγου, ἢ τήλεως, ἢ κνίδης σπέρματος, ἢ χόνδρου ἀφειψήματος· οὐ μόνον γὰρ κενώσει ταῦτα διὰ τῶν ἐμέτων, χαλασμὸν εὐχερῶς καὶ ναυτίαν ἐμποιοῦντα, ἀλλὰ καὶ ὑπάξει τὴν κοιλίαν, καὶ ἐναντιωθήσεται τῇ κακίᾳ τῶν φαρμάκων <sup>28</sup>, ἀμβλυτικὰ τῶν δρι-

26) Sic suasit iam Marcell. et post eum Cornar. Vulgo *παρονίαις*. X. *παρανίαις*.

27) Sic omnes, scil. *παθήματι* s. *νοσήματι*. Sarac. solus ἄλλως.

28) E Paulo sic emend. vulg. *τῇ κενώσει τῶν σωμάτων*. Lacun. *τῇ ἐλκώσει τῶν σωμάτων*.

tudine, proque praedispositionibus ac opportunitatibus corporum, vel medicabiles sunt, vel omnia eludunt artis praesidia. Si eorum aliquis vocis interceptione, vel mentis alienatione, vel alio affectu correptus, aut nolens veneno liberari, nullam eius intelligentiam nobis praebuerit, tum protinus ad ea veniendum est remedia, quae in commune idonea sunt epotis quibusvis venenis. Atqui nullum communius auxilium dari potest, quam quod exhibitum venenum per proximum locum foras pellit, priusquam ipsum inualecat. Quamobrem illis sine mora calidum oleum, seu per se, seu ex aqua, ut ad vomitum cogantur, exhibere convenit. Quodsi oleum natura loci negat, eius vice butyrum cum aqua calida, aut malvae, vel seminis lini, vel tragi (cerealís), vel foeni graeci, vel seminis urticae, vel alicae decocto potest administrari. Haec enim non modo venenum vomitionibus exigent, laxando facile subvertendoque ventriculum, sed et alvum subducent, et simul adversabuntur malignitati venenorum,



μυτήτων καθιεστώτα<sup>29</sup>. ἔστι δὲ ἐναργῶς καταλαβέσθαι τοῦτο· εἰ γάρ τις ἐλκῶσαι προαιρούμενος δι' ἀσβέστου, ἢ τρυγός, ἢ κανθαρίδος, ἢ τινος ἄλλου δριμύως, τὸ σῶμα ὑποχρίσει ἐλαίῳ, οὐχὶ ἐλκωθήσεται ὑπὸ τούτου· καὶ μὴν οὐδ' εἴ τις στύψαι θελήσει ἰσχυρῶς ἢ ψύξει, δύναται προλιπαίνων· ἔτι μὴν καὶ ἔμετος οὐ μόνον καθ' ὃ κenoῖ καὶ ἐκκρίνει<sup>30</sup> τὸ βλάπτον ὠφελεῖ, ἀλλ' ὅτι καὶ δείκνυσι τὸ ληφθὲν ἐνίοτε, ἐκ τε ὀσμῆς, ἢ θρόμβων, ἢ χρώματός τινος<sup>31</sup>. ἐκ μὲν γὰρ τῆς ὀσμῆς καὶ πικρίας μηκώνιον· ἐκ δὲ χροῶς ψιμύθιον ἢ γύψον· ἀπὸ δὲ θρόμβου γάλα ἢ τὸ νεοσφαχὲς αἷμα· ἀπὸ δὲ βρώμου καὶ ποιότητος τοῦ ἐμουμένου καὶ ὀσμῆς, λαγῶν θαλάττιον καὶ φρῶνον· ὥς διὰ τοῦτο μᾶλλον ἢ δι' ἕτερον ἐνίοις<sup>32</sup> δύνασθαι βοηθεῖν, ἐρχομένους ἐπὶ τὰ ἐκάστω ἀρμόζοντα βοηθήματα· παραμίγνυται δὲ τῷ ἐλαίῳ μαλάχης ἀφέψημα, ἢ γλαύκιον<sup>33</sup>, ἢ στέαρ χήνιον, ἢ ζωμὸς ἐκ λι-

29) Paull. add. καὶ μάλιστα τοῦλαιον.

30) Sic cod. X.; ἀποκρίνει vulgo.

31) Cod. X. ἢ θρομβώματος ἢ ἑτέρου τινός.

32) Sequor Sarac. sic emendantem vulg. ὥς διὰ τοῦτο ἢ δι' ἕτερον ἔνιαι. Paull. ὥστε διὰ τούτων ἐπὶ τὰ ἐκάστω ἀρμόζοντα ἔνιαι φάρμακα.

33) Γλαύκιον hic redundare arbitrati sunt Cornar. et Sarac.

cum obtundendi acrimonias facultate polleant. Evidenter vero hoc probari potest. Nam si quispiam viva calce, faece (vini usta), aut cantharidibus, aut alio quovis acri corpus exulcerari contendat, id si prius oleo leniter oblitum fuerit, in eo ulcus excitari minime poterit. Imo vero si quis voluerit, (venena) violenter astringere aut refrigerare, hoc etiam, praesumta pinguedine, impeditur. Vomitus praeterea non ob id modo, quod evacuet ac virus noxium excernat, utilis est, sed et quod haustum venenum nonnunquam odore, concretis grumis aut colore prodatur: quippe cum odore et amaritudine papaveris succum, colore cerussam gypsumve, grumis lac aut sanguinem animalis recens mactati ostendat. Sic quoque eorum, quae vomitu eiecta fuerint, qualitate et odore leporis marini et rubetae veneficia facile est deprehendere, ut hac potius ratione, quam alia quapiam, opem quibusdam afferre nobis in promptu sit, ad propria singulisque venenis accommodata auxilia transeuntibus. Admiscetur autem oleo malvae

παρῶν κρεῶν γεγρονῶς, ἢ κονία ἢ διὰ τῶν ξύλων. Κομισά-  
μενοι <sup>34</sup> δὲ διὰ τῶν ἐμέτων ἐπιμελῶς, διὰ τὸ μηδὲν ὑπολεί-  
πεσθαι ἐν τῇ κοιλίᾳ, τὸ ἐμμεῖναν ἐν τοῖς ἐντέροις κλύσματα  
δριμύϊ κομιούμεθα. Ποιεῖ δὲ καὶ τὸ νίτρον λείον σὺν ὕδρο-  
μέλιτι παραλαμβανόμενον, καὶ οἶνοι πολλοὶ καὶ παλαιοὶ πι-  
νόμενοι, καὶ ζωμοὶ ὀρνίθιοι, ἰχθύες λιπαροὶ, καὶ κρέα πα-  
λαιὰ καὶ λιπαρὰ, καὶ τὰ διὰ στέατος ἢ βουτύρου προσφά-  
του· ὑπάγοντα γὰρ τὴν κοιλίαν, ὥσπερ εἶπον, καὶ τὸν στό-  
μαχον ἀναλύοντα, ἐτοιμότερον κατασκευάζει τὸν στόμαχον  
πρὸς τὸν ἐμετον· ἀμβλύνει τε τὴν δριμύτητα αὐτῶν, καὶ  
παρεμπλάσσομενα τοῖς πόροις, κωλύει τὴν ὀξύτητα τῆς τῶν  
φαρμάκων δυνάμεως. Δίδονται δὲ καὶ ἀρμόζοντα φάρμακα  
κοινῶς· ὧν ἔστιν ἡ ληνία μίλτος, ἀγαρικόν, ἀβρότονον, ἐρύ-  
σιμον, ἡρυγγίου ῥίζα, σταφυλίνου σπέρμα καὶ καλαμίνθης,  
νάρδος κελτικῇ, καστόριον, νάρθηκος χλωροῦ ἐντεριώνη, νη-  
ρίου τοῦ καλουμένου ῥοδοδένδρου ἄνθος, <sup>35</sup> πρασίου <sup>35</sup> χυλός,

34) Ald., Asul., Cornar. κομισάμενος; Goupyl. et Sarac. κομισα-  
μένους. Nostra lectio vindicatur Paulli textu, lib. 5. cap. 29.  
pag. 168.

35) Aët. et Paull. πράσσου.

decoctum, aut glaucium, adeps anserinus etiam, aut pin-  
guum carniū iusculum, aut lixivium cineris lignorum.  
Postquam vero vomitum diligenter civimus, ne quid in  
ventre relinquatur, quae intestinis inhaeserint reliquias  
acri clysmate devocabimus. Faciunt et ad hoc ipsum ni-  
trum tritum cum hydromelite assumptum et vina vetera  
liberalius pota, iura itidem gallinacea, pisces opimi et  
carnes adultae pinguesque, et quae adipe aut butyro re-  
centi condita sunt. Alvum enim subducunt, uti diximus,  
ac ventriculū resolvunt, proniorem ipsum ad vomitio-  
nem reddunt: hebetant et venenorum acrimoniam, at-  
que, dum poros obstruunt, prohibent celeritatem venenā-  
tae facultatis. Quin etiam medicamenta exhibentur, quae  
communi dote prosunt: e quorum numero est rubrica le-  
mnia, agaricum, abrotanum, erysimum, eryngii radix, se-  
men dauci et calaminthae, nardus celtica, castoreum et  
ferulae virentis medulla, flos nerii, quod rhododendron



σίλφιον, καὶ ὁ ἐπὶ αὐτοῦ, καὶ ἡ ῥίζα, ἣν καὶ μαγύδαριν ἐκάλεσαν <sup>36</sup>, σαγάπηρον, ὀποπάναξ, πευκεδάνον ὀπός, ἀριστολοχία μακρὰ, πηγάνου ἀγρίου σπέρμα, κέστρου, τῆς βετονικῆς καλουμένης, τὰ φύλλα. Δίδεται δὲ ἕναστος σὺν οἶνω < α' πληθος· ποιεῖ καὶ πολίου ἀφέψημα [καὶ σέσελι] <sup>37</sup> καὶ πίσσα ὕγρα <sup>38</sup> ἐκλειχόμενη· γενναιότατα δὲ βοηθοῦσι καὶ ἀντίδοτοι, ὧν τὰς σκευασίας ἐπὶ τέλει ἀναγράφομεν· κοινῶς δὲ βοηθητέον τούτοις τὸν τρόπον τοῦτον.

Δυνατὸν δὲ καὶ ἐκ τῶν παρακολουθούντων συμπτωμάτων κοινὰ καὶ τὰ βοηθήματα συμπαραλαμβάνεσθαι. Σχεδὸν γὰρ αἱ τῶν πλείστων φαρμάκων δυνάμεις εἰς ὁμοιοτρόπους περιάγουσι τὸ σῶμα διαθέσεις· δι' ἣν αἰτίαν ἐπὶ τῶν πλείστων τὰ κοινὰ βοηθήματα ἀνύει, ποικίλα μὲν γὰρ τὰ δηλητήρια φάρμακα, κοινὰ δὲ καὶ οὐ πολλὰ αἱ ἐξ αὐτῶν γινόμεναι διαθέσεις· ἀδύνατον γὰρ πάντα τὰ συμπτώματα ἐνὶ παρακολουθῆσαι· εἰ γὰρ ἦν τοῦτο, παρεῖλκεν ἂν ἡ καθ'

56) Disiuncta haec vulgo leguntur. Cod. X. non habet radicem.

57) Deest in Paulo et cod. Par. apud Goup. Sed Marcell. omnino agnoscit.

58) Interpositum vulgo λεῖα nec Marcell. admisit, nec naturae iudoles fert.

appellatur, marrubii succus, silphium, ipsius succus et radix, quam et magydarin vocant, sagapenum, opopanax, peucedani succus, aristolochia longa, rutae sylvestris semen, et cestri, quod et betonica vocatur, folia. Singula vero cum vino drachmae unius pondere exhibentur. Expediunt etiam polii decoctum [et seseli] et liquida pix delincta. Egregie insuper opitulantur antidota, quorum praeparationes in operis calce describemus. Communis igitur ratio praestandi auxilii sic se habet.

Ceterum et ab iis, quae comitantur, symptomatibus communia remedia desumi possunt. Etenim plurimorum venenorum facultates corpus in consimiles affectus deducunt: quam ob causam plerisque communia convenient auxilia. Siquidem varia sunt venenorum genera: communes tamen nec ita multi, qui ex iis existunt, affectus. Enimvero fieri nequit, ut ad unum veneni genus omnia symptomata sequantur. Alioquin supervacanea foret, quae

ἕκαστον φάρμακον διὰ τῶν βοηθημάτων παράδοσις. Τό τε γὰρ ἀλλεῖν στόμαχόν τε καὶ κοιλίαν <sup>39</sup> καὶ ἔντερά, ἤπαρ τε καὶ νεφροὺς καὶ κύστιν, ἔτι δὲ λύζειν καὶ δάκνεσθαι καὶ τρέμειν, ἀφώνους τε εἶναι καὶ περιψύχεσθαι, σπᾶσθαι τε καὶ ἀσφυκτεῖν καὶ δυσπνοεῖν καὶ καταφέρεσθαι καὶ σκοτοῦσθαι καὶ πνίγεσθαι καὶ διψᾶν καὶ αἰμορῶγεῖν, πυρέσσειν τε καὶ δυσουρεῖν καὶ στροφοῦσθαι καὶ ξμεῖν πυκνὰ ἢ ναυτιᾶν, ἐρυθραίνεσθαι <sup>40</sup> καὶ πελιδνοῦσθαι καὶ ὠχοῖαν, παραφρονεῖν τε καὶ ῥέγγειν καὶ παρίεσθαι, καὶ ἄλλα πολλὰ ποιεῖν, καὶ διάφορα πάσχειν· ἐνὶ μόνῳ δύσκολον εὐρεῖν παρεπόμενον <sup>41</sup>, ἕκαστον μερισθὲν εἰς καθολικὰς <sup>42</sup> διαθέσεις ὀλίγων ἀριθμὸν καὶ κοινῶν ὑποδείξαι συμπτωμάτων. Διὸ καὶ ἐφ' ἐνὸς ἑκάστου τῶν προειρημένων οὐκ εὐκόλον τὸ εἰλημμένον φάρμακον γινώσκεσθαι· τὸ γὰρ δάκνεσθαι τὸ στόμα καὶ γλωτταν, φλεγμαίνειν στόμαχον καὶ κοιλίαν τε καὶ νεφροὺς καὶ κύστιν, δυσουρεῖν τε ἰσχυρῶς, ἐνίοτε δὲ καὶ αἷμα δι' οὐ-

39) Cod. X., Marcell. et Ruell. sic; στόμαχόν τε λίαν vulgo.

40) Cod. X. et Sambuc. ὑποδαίνεσθαι.

41) Cod. X. ἐπεὶ ὅλων δύσκολα εἰσὶν εὐρεῖν παρεπόμενα.

42) Sic Ald., Cornar., Goupyl. et Sarac.; ὀλίγας Asulan. et Maro.

traditur singulis venenis propria et accommodata curatio. Neque vero facile reperiatur quisquam, qui ex unius veneni haustu simul vehementi ventriculī, alvi, intestinorum, iecinoris, renum vesicaeque dolore vexetur, insuperque singultiat, rodatur, contremiscat, obmutescat, perfrigeretur, convellatur, pulsu deficiatur, spiritus difficultate, veterno, caligine, suffocatione, siti, sanguinis eruptione, febre, urinae difficultate ac torminibus corripiatur, crebro vomitet, nausea prematur, rubescat, live-scat, expallescat, desipiat, stertat, resolvatur et alia multa ac diversa faciat seu patiat. Singula porro in universales affectiones distincta paucorum eorumque communium symptomatum numerum demonstrant. Quapropter ex uno singulari symptomate eorum, quae ante recensita sunt, non facile fuerit venenum assumptum deprehendere ac internoscere. Nam oris et linguae erosio, stomachi, ventris, renum ac vesicae inflammatio, vehemens urinae difficultas ac interdum etiam cruenta mixtio, dilaceratio-



ρων πορεύεσθαι, καὶ λακιδουῖσθαι, διαπεπορῆσθαι τε πολλὰ μέρη τοῦ σώματος, οὐ μόνον ἐπὶ κανθαρίδων εὐρίσκεται παρακολουθοῦντα, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ πιτυοκάμπης καὶ βουπρήστεως καὶ σαλαμάνδρας· τό τε καταφέρεσθαι, ἢ καροῦσθαι, ἢ ῥέγγειν, πελιοῦσθαι τε καὶ νωθριᾶν καὶ καταψύχεσθαι καὶ ναρκᾶν <sup>43</sup>, ἀναισθητεῖν δὲ ἢ ὁδαξειῖσθαι τὸ ὅλον σῶμα, οὐ μόνον τοῖς τὸ μηχανώειον πεπωκόσι παρέπεται, ἀλλὰ καὶ τοῖς μανδραγόραν ἢ κώνειον προσενεγκαμένοις· τό τε παρὰφρονεῖν οὐ μόνον ὕσχύματος ἐπιφέρει, ἀλλὰ καὶ τὰ τοξικά καλούμενα τῶν φαρμάκων· καὶ ἀκόνιτον δὲ, καὶ τὸ μέλι τὸ γεννώμενον ἐν Ἡρακλείᾳ τῇ ποντικῇ· καὶ τὸ πνίγεσθαι δὲ οὐ μόνον ἐπὶ μυκήτων ὁράται, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ αἵματος ταυρείου καὶ γάλακτος καὶ ἀκονίτου καὶ γύψου καὶ ψιμυθίου· καὶ καθόλου δύσκολον, εἰάν θέλῃς εὑρεῖν σημεῖον δυνάμενόν τι τῶν πινομένων καὶ γενομένων φαρμάκων δηλῶσαι, καὶ μάλιστα ὅτι κοινὰ καὶ τοῖς ἄλλοις ἐπιγινομένοις πάθεσι παρακολουθεῖ ταῦτα· πλὴν ἐπὶ μὲν τῶν ὀξέως ἀναιρούντων ἐστὶ που καὶ

43) Cod. X. ῥιγεῖν s. ῥιγοῦν.

nis et incendii sensus per multas corporis partes, non tantum epotis cantharidibus supervenire comperiuntur, sed et pinorum erucis, bupresti ac salamandra. Ad eundem modum non solum eos, qui meconium hauserunt, veterino ac sopore prehendi, stertere, livescere, elanguescere, perfrigerari ac torpescere, stupescere aut prurigine per totum corpus vexari; sed eos etiam, qui mandragoram aut conium sumserint. Sic mentis alienationem non hyoscyamus tantum infert, verum etiam quae toxica appellantur, itidemque aconitum et mel, quod ad Heracleam ponticam gignitur. Quin et strangulatio non modo a fungis voratis, sed et a sanguine taurino, lacte, aconito, cecurussa gypsoque conspicitur. In summa difficile est, unum uni veneno proprium invenire signum, quod potum gustatumve virus certo prodere possit: maxime cum eiusmodi symptomata alios etiam affectus communiter consequi comitarique soleant. Attamen in iis, quae celeriter enecant, licet aliquo modo signis deprehendere id quod

σημειώσασθαι τὸ βλαπτόμενον <sup>44</sup>, ὥς παραδώσομεν. Ἐπὶ δὲ τῶν χρονίας διαθέσεις παρασκευαζόντων, δύσκολον οὐδὲν πρὸς τὴν θεραπείαν τοῦ περὶ τὴν σημείωσιν δυσχεροῦς βλάπτοντος· ἐκφυγόντα γὰρ τὴν ὀξύτητα τῆς ἐνεργείας τὰ φάρμακα, καὶ μεταληφθέντα εἰς χρονίους, κοινῶς λαμβάνει τοῖς λοιποῖς πάθεσι τὰς κατασκευὰς <sup>45</sup> καὶ τὰς βοηθείας, τῆς ιδιότητος τῶν πινομένων φαρμάκων μηκέτ' ἐνούσης. Διαθέσεως δὲ χρονίου κατεσκευασμένης, ὑπ' αὐτῶν ἡ διάθεσις πάντων εἰς ἓν τι γένος τῶν χρονίων ἐμπίπτει παθῶν, ἐφ' ὧν εὐχερές ἐστι καὶ τὴν θεραπείαν ἀναλαμβάνειν. Καὶ τὰ μὲν κοινῶς βοηθοῦντα ταῦτ' ἐστίν. Οἷς ἀκολούθως ἀναγράψομεν καὶ τὰ ἰδίᾳ ἐκάστοις ἀρμόζοντα, προεκθήμενοι ὑφ' ἐν ὅσα φθαρτικὴν ἢ κακωτικὴν ἔχει δύναμιν, ἐκάστης τάξεως, καὶ ἵνα πεφυλαγμένως εἰς τινὰ <sup>46</sup> τῶν πρὸς ὑγίαν ἀναγεγραμμένων φαρμάκων ἔχοιεν τινὰ τούτων μεμιγμένα ἐχόντων <sup>47</sup>, οἷς χρῶνται οἱ φιλιατροῦντες. Τὸ γὰρ ἀπερίσκεπτον μεγάλας ἐπιφέ-

44) Marcell. suavit sic mutandum esse vulg. βλεπόμενον.

45) Cod. X. σκευασίας.

46) Sic primus Goup.; εἰς τινὰ Ald., Asul., Cornar.

47) Sic Cornar. loco vulg. φάρμακα.

noxam intulit, uti in ulterioribus praecipiemus. Verum in iis, quae diuturnas affectiones invehunt, nulla in curando difficultas est, quantumvis noxium venenum signis internoscere sit perdifficile: quippe cum venena, protinus ut praesentaneam illam vim amiserunt, in longos affectus transmutata, communia reliquorum affectuum remedia compositionesque flagitent, venefica proprietate non amplius illis inhaerente. Proinde diuturna, quae ab iis excitata est, affectio in aliquod chronicorum morborum genus recidit, a quibus facile fuerit medendi rationem petere. Atque de iis quidem, quae generatim auxiliantur, hactenus. Consequenter quae privatim singulis conveniunt auxilia memoriae mandabimus, si prius exposuerimus, quae nam singulorum ordinum (graduum) exitialem aut maleficam vim sortita sint: ut, si qua eorum, quae ad sanitatis usum descripta reperiuntur, aliqua ex illis admixta habeant, iis medicinae studiosi cautius utantur. Inconsiderantia enim magna infert damna, et saepe continuo eo-

ρει βλάβας, καὶ πολλάκις διὰ τὴν συνεχῆ χρῆσιν αὐτῶν ἀπωλείας αἰτία γίνεται· ζῶα μὲν οὖν ἐστὶ φθαρτικὰ τὰδε· κανθαρίς<sup>48</sup>, βούπρηστις, σαλαμάνδρα, πιτυοκάμπη, λαγῶδες θαλάσσιος, φρῦνος, βάτραχος ἑλειος ἄφρωνος<sup>49</sup>, βδέλλαι καταποθεῖσθαι· σπερμάτων δὲ ὑοσκύαμος, κόριον, κώνειον, μέλανθιον, ψύλλιον· ὀπισμάτων δὲ μηκώνειον, ὀποκάρπασον, θαψίας χυλός, ἐλατήριον, μανδραγόρας· ῥιζῶν δὲ χαμαιλέων, ἀκόνιτον, θαψία, ἐλλέβορος, ἰξίας, ἀγαρικὸν τὸ μέλαν, ἐρήμερον, ὃ ἔνιοι κολχικὸν καλοῦσι, διὰ τὸ ἐν Κολχίδι γίνεσθαι ἐργωδῶν δὲ καὶ ποῶν<sup>50</sup> σμίλαξ, ἣν ἔνιοι θύμαλον<sup>51</sup>, ῥωμαῖοι δὲ τάξον<sup>52</sup> καλοῦσι, στρύχνον μανικόν, ὃ καὶ δορύκνιον καλοῦσι, ἥ τε σαρκώνιος<sup>53</sup> πόα, εἶδος οὕσα βατραχείου, μήκων κερατῆτις, φαρικόν<sup>54</sup>, τοξικόν, πήγανον ἄγριον, μύκητες· ἀπὸ ζώων δὲ αἷμα ταύρειον νεαρὸν, καὶ τὸ ἐμπυτιασθὲν γάλα, μέλι τε τὸ ἐν Ἡρακλείᾳ τῇ ποντικῇ γεννώμενον

48) Sic cod. X.; κανταρίδες vulgo.

49) Vulg. φρῦνος ὁ λεῖος, βάτραχος ἑλειος ἄφρωνος. Cf. infra cap. 31.

50) Sic cod. X.; ποῶν δὲ καὶ λαχάνων vulgo.

51) Vulg. τιθύμαλον.

52) Vulg. νάξιον ἢ τάξον.

53) Sic cod. X.; Σαρπηδόνιος vulgo.

54) Sic cod. X.; φθαρικόν vulgo.

rum usu homo in perniciem agitur. Animalia igitur, quae exitiosam vim habent, haec fere sunt: Cantharis, buprestis, salamandra, pinorum eruca, lepus marinus, rubeta, seu rana palustris mutaeque, hirudines devoratae. In seminum vero genere hyoscyamus, coriandrum, conium, melanthium, psyllium: e liquoribus meconium, opocarpasum, thapsiae succus, elaterium, mandragoras: e radicibus chamaeleon, aconitum, thapsia, helleborus, ixias, agaricum nigrum et ephemerum, quod nonnulli colchicon vocant, quia in Colchide nascatur. E fruticibus ramosorum herbarumque cohorte smilax, quam aliqui thymalum, Romani vero taxum appellant, solanum furiosum, quod et dorycnion dicitur, sardoa herba, quae ranunculi species est, papaver corniculatum, pharicum, toxicum, ruta sylvestris ac fungi. Ab animalibus taurinus sanguis recens, lac coagulatum et mel Heracleae ponticae



μεταλλικά δὲ γύψος, ψιμύθιον, τίτανος, ἀρσενικόν, σαρ-  
δαράχαι δύο, λιθάργυρος, ἀδάρκη, μόλυβδος, καὶ ἡ καλου-  
μένη ὑδράργυρος. Τῶν δὲ συμφύλων <sup>55</sup> οἶνος ἀθρόως πο-  
θεῖς πολὺς ἀπὸ βαλανείου <sup>56</sup>, ἢ γλυκὺ, ἢ ψυχρὸν ὕδωρ  
ὁμοίως <sup>57</sup>.

Κεφ. α'. [Περὶ Κανθαριδων.] Τοῖς οὖν κανθαρίδας  
προσενεγκάμενοις παρέπεται χαλεπώτατα σημεῖα· σχεδὸν γὰρ  
ἀπὸ τοῦ στόματος μέχρι κύστεως πάντα δάκνεσθαι δοκεῖ αὐ-  
τοῖς. καὶ κατὰ τὴν γεῦσιν πίσση ἢ κεδρία ὁμοίον τι ἐγγί-  
νεσθαι· φλεγμαίνουσι δὲ τὸ δεξιὸν ὑποχόνδριον καὶ δυσου-  
ροῦσι· πολλάκις δὲ αἷμα προΐενται δι' οὐρῶν· φέρεται δ'  
αὐτοῖς κατὰ κοιλίαν ὅμοια τοῖς ἐπὶ δυσεντερικῶν· λειποθυ-  
μίαις τε καὶ ἄσαις καὶ σκοτοδινίαις περιπίπτουσιν· ἐπὶ τέλει  
δὲ παραφέρουσι τὴν διάνοιαν. Δεῖ οὖν πρὸ τοῦ παρακο-  
λουθῆσαί τι τοιοῦτον ἀναγκάζειν ἐμῆν, διδόντας αὐτοῖς τὸ  
ἐλαιον ἢ ἄλλο τι τῶν προειρημένων, καὶ μετὰ τὸ κομίσασθαι  
τὰ πλείστα διὰ τῶν ἐμέτων ἐνέειναι <sup>58</sup> διὰ κλυστῆρος χυλὸν

55) Sic Marcell. primus interpretatur, dein Cornar., Goupyl. et Sarac.; στεμφύλλων Ald., Asulan.

56) Marcell. add. ἢ δρόμον, ἢ τῶν εὐτόνων γυμνασίων.

57) Sic Cornar.; ἢ γλυκὺς ἢ ψυχρὸς ὁμοίως Ald., Asulan.

58) Ald. ἐνέειναι.

generatum. Inter metallica gypsum, cerussa, calx, arsenicum, sandaracha utraque, lithargyrum, adarce, plumbum atque hydrargyros dicitur. Ex iis, quae naturae cognata sunt, vinum largius a balneo potum, aut passum, aut frigida aqua similiter.

Cap. I. [De cantharidibus.] Quibus exhibitae sunt cantharides, signa eveniunt gravissima: propemodum enim ab ore ad vesicam usque iis omnia rodi videntur, pici aut cedriae simile quiddam in gustu obversatur: in dextro hypochondrio inflammationem sentiunt, urinam aegre reddunt, ac subinde cum lotio sanguinem emittunt: per alvum etiam, qualia in dysentericis, egeruntur: animi defectionibus, angoribus et vertigine tenebricosa corripuntur: tandem vero et mente alienantur. Ergo, antequam tale quid accidat, propinato oleo aut supra dictorum aliquo ad vomitum cogendi sunt. Mox ubi vomitione ple-

χόνδρου, ἢ ὀρύζης, ἢ τράγου, ἢ πτισάνης, ἢ μαλάχης ἀφέψημα, ἢ λινოსπέρμου, ἢ τήλεως, ἢ τῶν ῥιζῶν τῆς ἀλθαίας, ἣν ἱβίσκον ὀνομάζουσι Ῥωμαῖοι· ἐπιδιδόναι τε αὐτοῖς νίτρον σὺν ὑδρομέλιτι πρὸς τὸ καταβιάσαι καὶ ἐκνίψαι <sup>59</sup> τὰ ἔτι παρακείμενα τῷ στομάχῳ καὶ ἐντέροις· καὶ ἐὰν μὴ διακοπῇ, κενοῦν δεῖ, μελίκρατον ἐνιέντας μετὰ νίτρον, καὶ ἐπιδιδόναι οἶνον ἢ γλυκὺ, συντετριμμένων αὐτῷ στροβίλων καὶ σικύων σπέρματος, ἢ γάλακτος, ἢ μελικράτου, ἢ στέαρ χήνειον συντετηκὸς ἐν γλυκεῖ· τὰ δὲ φλεγμαίνοντα μέρη καταπλάσσοντας κριθῶν ἀλεύρῳ ἐψημένῳ μετὰ μελικράτου· καταρχὰς μὲν οὖν παραλαμβανόμενα τὰ καταπλάσματα βλάπτει, διὰ τὸ ὑπὸ τῆς γενομένης θερμασίας κατέχεσθαι τὸ δοθὲν, στηριζόν ἐπὶ τοὺς τόπους ὄντας κυρίους· χρονισθέντων <sup>60</sup> δὲ ὠφελῇ τὰς χαλεπωτάτας φλεγμονὰς <sup>61</sup>, παρηγοροῦντα καὶ παραμυθούμενα τὰς ἀλγηδόνας· ἐν δὲ τούτῳ τῷ καιρῷ ἀρμόζει, προλιπάναντας ἐλαίῳ θερμομαντικῷ τὸ σῶμα, λούειν καθιέντας εἰς

59) Sic Asulan.; ἐκλείξαι Ald.

60) Cod. X. χρονισάντων.

61) X. τὰ χαλῶντα τὰς φλ.

raque reiecerint, alicae aut oryzae, tragi vel ptisanæ cremor, aut decoctum malvæ, vel seminis lini, vel foeni gracci, vel radicum althææ, quam Romani hibiscum appellant, clystere infundatur. Superdandum vero iisdem nitrum ex hydromelite, ut, quæ stomacho adhuc et intestinis adhaerent, eluantur ac deturbentur. Haec nisi sic dirimantur (interpellentur), alvo infusa aqua mulsa cum nitro vacuari debent. Detur dein vinum aut passum, in quo pinei nuclei et cucumeris semina contrita fuerint, aut ex lacte mulsæ, vel anserinus adeps in passo liquidus. Inflammatis autem partibus hordei farina cum mulsa decocta imponatur. Ab initio quidem admota cataplasmata nocent, quod excitatus ab iis calor haustum virus detinet ac principibus partibus impingit: procedente autem dein tempore adhibita molestissimis inflammationibus non mediocriter opitulantur: quippe quæ dolores et leniant et permulceant. Interim, ubi corpus calefaciente oleo praeunctum fuerit, in solium demittendum ibique

ἐμβασιν· ἐκάστω δὲ ἡ ἰατρεία, διὰ τῆς ἐπιφανείας τὰ ἐπι-  
βλαβῇ παρατεθέντα τῷ σώματι ἐκκρίνεσθαι· καὶ καθόλου  
παντοίως δεῖ κινεῖν τὰς ἐκκρίσεις, πρὸς τὸ μὴ ἔμμονον κα-  
τασκευὴν λαμβάνειν τὴν διάθεσιν· διδόναι δὲ καὶ κρέα ὀρνίθια  
καὶ ἄρνια <sup>62</sup>, δελφάκεια καὶ ἐρίφεια, λιπαρὰ δὲ ταῦτα καὶ ἀπα-  
λώτατα καὶ καθεψημένα σὺν λινοσπέρμῳ· εὐκοίλια γάρ ἐστι καὶ  
ἀμβλυγτικά τῶν δριμέων· καὶ οἶνον γλυκὺν καὶ πολύν· ἄρ-  
μόξει δ' ἐπ' αὐτῶν <sup>63</sup> καὶ λιβάνου φλοιὸς, καὶ γῆς τῆς κα-  
λουμένης ἀστέρος, ἐκάστου < δ', μετὰ γλυκέος <sup>64</sup> λαμβανο-  
μένη· γλήχων τε μεθ' ὕδατος τριφθεῖς, καὶ ἴριον ἢ ῥόδιον  
[μύρον] μετὰ πηγάνου ἀφεψήματος <sup>65</sup>, καὶ ἀμπέλου ἀκρέ-  
μονες ἀπαλοὶ λεῖοι μετὰ γλυκέος· δυνατώτατα δὲ πάντων  
βοηθοῦσιν αἱ ἀντιδοτοὶ, πινόμεναι σὺν μελικράτῳ πλήθος  
< δ'.

Κεφ. β'. [Περὶ πιτυοκάμης.] Τοῖς δὲ πιτυοκάμην  
λαβοῦσιν εὐθέως πόνος περὶ τὸ στόμα καὶ τὸν οὐρανίσκον

62) καὶ ἄρν. deest in Ald.

63) Ald. αὐτῶ.

64) Editt. habent mensuram < ἄ, quae nullam habet rationem  
ad massam terrae et turis. Cornarus propterea suasit, κοτύλην ἄ le-  
gendum esse. Posset etiam e Scribonio Largo κύαθοι δ' legi. Sed  
satiùs duco, cum Paullo omnem omittere mensuram, cum fluidi  
mensura fere arbitraria sit.

65) Sic Ald. et Ruell.; ἀφεψόμενον Asul. et rell. Μύρον deest in Ald.

lavandum: singulorum autem medela est, et per cutem  
summam, quae corpori noxia inhaeserint, etiam exclu-  
dantur. Generatim vero omne genus excretionis moliri  
oportet, ne dispositio stabilem acquirat apparatus. Ex-  
hibendae porro carnes gallinaceae et agninae, porculo-  
rum lactentium ac hoedinae, eaeque maxime pingues, te-  
nerrimae, ac cum lini semine coctae: siquidem et alvum  
molliunt et acria hebetant. Vinum quoque liberalius hau-  
riendum est. Sed prodest insuper turis cortex et terra,  
quae aster dicitur, si quaternae singulorum drachmae cum  
passo sumantur. Item pulegium ex aqua tritum et irinum,  
aut rosaceum cum rutae decocto, et vitis palmites teneri  
cum passo triti: omnium autem potentissime auxiliantur  
antidota, cum aqua mulsa drachmis quatuor epota.

Cap. II. [De pinorum erucis.] Iis, qui pinuum  
erucas hauserunt, illico dolor circa os et palatum oboritur,



παρακολουθεῖ· γλώσσης τε φλεγμονή ἰσχυρά καὶ στομάχου καὶ κοιλίας· καὶ ἐντέρων πόνος ἰσχυρὸς μετὰ τοῦ δοκεῖν ὁδὰ· ξεσθαι τὰ ἐντός· πύρωσίς τε καθ' ὅλον τὸ σῶμα, καὶ ἄση 66. Τούτοις βοηθητέον ὁμοίως τοῖς τὰς κανθαρίδας πεπωκόσιν· ἰδίως δ' ἐπ' αὐτῶν παραληψόμεθα ἀντὶ ἐλαίου τοῦ λιτοῦ καὶ ἰσίνου τὸ μήλινον, κατασκευαζόμενον ἐκ μήλων κυδωνίων καὶ ἐλαίου.

Κεφ. γ'. [Περὶ βουπρήσεως.] Τοῖς δὲ βούπρηστιν πεπωκόσι δοκεῖ κατὰ τὴν γεῦσιν ὁμοίον τι βρωμῶδει νίτρον 67· παρακολουθεῖ δὲ ἄλγῃμα στομάχου καὶ κοιλίας σφοδρόν· ὄγκος τε στομάχου καὶ κοιλίας, ὁμοίως 68 ὕδρωπικοῖς· καὶ περιτείνεται αὐτοῖς ἡ ἐπιφάνεια ὅλου τοῦ σώματος 69· τὰ τε οὖρα ἐπέχεται. Βοηθεῖ δὲ αὐτοῖς ὅσα καὶ τοῖς κανθαρίδας πεπωκόσιν· ἰδίως δὲ ὠφελοῦνται μετὰ τὸ τῶν ἐμέτων καὶ τοῦ κλυστιῆρος κενωθῆναι, σῦκα ξηρὰ λαμβάνοντες· καὶ τὸ ἀφέψημα δὲ αὐτῶν σὺν οἶνῳ· παρακμάζοντος δὲ τοῦ κατ' ὀξύτητα κινδύνου, ὠφελοῦνται θηβαϊκὰς βαλάνους ἐσθίοντες, ἢ λελεασμένας σὺν οἶνομέλιτι ἢ γάλακτι πίνοντες, ἢ καὶ

66) Ultimum habet Ald., omisit Asul.

67) Paull. non habet νίτρον.

68) Paull. ὁμοίως. Σφοδρὸς vulg. deest in codd. C. N. et X.

69) X. καθ' ὅλον τὸ σῶμα.

vehemens linguae, stomachi ac ventris inflammatio torquet: intestina quoque ingens dolor excruciat; simul interanea rodi videntur, corporis totius aestus ac angor cum iactatione. His succurrendum est iisdem remediis. Peculiariter tamen pro simplici oleo et irino melinum, quod e cydoniis pomis et oleo temperatur, adhibebimus.

Cap. III. [De buprestis.] Qui buprestin vorarunt, simile quid viroso nitro gustu percipiunt: stomachi vero ventrisque vehemens dolor sequitur cum partium earum tumore, qualis hydropicis contingit: totius corporis superficies tenditur, urina supprimitur. His eadem, quae potius cantharidibus, auxiliantur. Privatim autem post vacuatum corpus, tum vomitionibus, tum clystere, cumtis sicut aridis adiuvantur, itemque harum decocto ex vino. Declinato vero ab acuta indole periculo thebaicarum etiam palmularum cibo, aut earundem tritarum in mulso

ἀπίων ἅπαν τὸ γένος ἐσθίωντες καὶ γάλα γυναικῆιον πίνοντες.

Κεφ. δ'. [Περὶ σαλαμάνδρας.] Τοῖς δὲ σαλαμάνδραν λαβοῦσι παρέπεται γλώσσης φλεγμονή, καὶ διανοίας ἐμποδισμὸς <sup>70</sup>, καὶ τρόμος μετὰ νάρκης ἢ θρίκης τινὸς καὶ ἐκλύσεως <sup>71</sup>. πελιοῦται δέ τινα μέρη κυκλοτερώς αὐτοῖς τοῦ σώματος· ὡς πολλάκις ἐμμείναντος τοῦ φαρμάκου, σηπόμενα ἀπορρεῖν· ἐφ' ὧν πάντα ποιησάμενοι, ὅσα καὶ ἐπὶ κανθαρίδων, ἰδιαίτερον αὐτοῖς προσφέρομεν φάρμακον, ῥητίνην τὴν πιτυίνην, ἢ χαλβάνην σὺν μέλιτι ἀντὶ ἐκλεικτοῦ, καὶ χαμαίπιτυος ἀφέψημα, συνεκλεανθέντων αὐτῷ στροβίλων, ἢ κνίδης φύλλα συνεψηθέντα κρίνοις <sup>72</sup> μετ' ἐλαίου· ποιεῖ δὲ ἐπ' αὐτῶν καὶ θαλασσίας χελώνης ἢ χερσαίας ὡὰ, ὅποια ἂν ἢ ἐψημένα, καὶ βατραχίων ζωμὸς, συγκαθειψηθείσης αὐτοῖς ἡρυγγίου ῥίζης.

70) Antiquitus fuerunt duae lectiones diversae: haec et *λαλῖα* ἐμποδισμός, quam Paullus habet. Avicenna utrique assentitur, lib. 4. pag. 130. *دواب العقل*, intellectus alienatio, et p. 149. *خمس*, blaesitas loquelae.

71) Sic Ald., Cornar., Goup. et Sarac.; *ἐκλώσεως* Asulan.; *ἐκλύσεως* Paull.

72) Sic Gorraeus e Nicandri alex. pag. 565. Antiqua autem est vulgata lectio *κρίνω* s. *κρίνοις*, quam habent et Aëtius et Paullus. Cod. X. *κρίνοις*.

lacteve potio iuvantur. Pyrorum denique omne genus comedere et lac muliebre bibere convenit.

Cap. IV. [De salamandra.] Salamandrae haustum sequitur linguae inflammatio, itemque intellectus (loquelae) impositio, ac tremor cum torpore et horrore quodam ac resolutione. Corporis nonnullae partes circumcirca livore corripuntur, nec non et immorante diutius veneno putrescentes decidunt. His ubi eadem omnia, quae potis cantharidibus, praestiterimus, peculiari remedio exhibemus resinam e pinu aut galbanum ex melle linctum, et chamaepithyos decoctum, in quo pinei nuclei simul contriti fuerint: aut urticae folia cum farina crassiore cocta in oleo. Prosunt etiam ova testudinis marinae aut terrestres, quomodocunque cocta, itemque ranarum ius, cum quibus eryngii radix cocta sit.

Κεφ. ε'. [Περὶ ἐτημέρου <sup>73</sup>.] Τοῖς δὲ τὸ ἐφήμερον λαβοῦσιν, ὃ ἔνιοι κολχικὸν καλοῦσιν ἢ βολβὸν ἄγριον, παρakoλoυθεῖ κνησμὸς καθ' ὅλον τὸ σῶμα <sup>74</sup>, ὡς ὑπὸ σκίλης ἢ κνίδος ἐρεθιζομένοις· τὰ δὲ ἐντὸς ἀναδάκνονται· καυσοῦνται δὲ τὸν στόμαχον μετὰ βάρους ἱκανοῦ· ἐπισχύοντος δὲ τοῦ πάθους, κατὰ κοιλίαν φέρεται αἱματώδης, ξύσμασι μεμιγμένα· οἷς βοηθητέον, καθάπερ καὶ τοῖς σαλαμάνδραν πεπωκόσι, διὰ τε ἐμέτων καὶ κλυσμάτων· πρὸ δὲ τοῦ ἐνσχύσαι τὸ φάρμακον, μεταδοτέον αὐτοῖς δρυὸς τῶν φύλλων ἢ βαλάνων ἢ σιδίων ἀφέψημα· ἢ ἐρπύλλου σὺν γάλακτι πίνειν, ἢ πολυγόνου χυλὸν, ἢ ἀμπέλου ἀκρεμόνων, ἢ βάτου, ἢ νάρθηκος ἀπαλοῦ τῆς ἐντεριώνης, ἢ μύρτου μετ' οἴνου· αὐτὰ δὲ τὰ μύρτα λεῖα κοπέντα καὶ ἀποβραχέντα ἐν ὕδατι βοηθεῖ, τοῦ ἕξ αὐτῶν ὕγρου λαμβανομένου· ποιεῖ δὲ ὡσαύτως καὶ ὁ τῶν σαρδιανῶν <sup>75</sup> βαλάνων ἑμὴν μέσος, ὡμὸς

73) Ordinem, ut confusum, mutare voluit Cornar., antepositis animalibus nocivis, quae sequuntur. Paulli exemplum imitatus esse, qui meliorem ordinem habet, ni et in eodem plura essent taxanda, et codices nostri refragarentur.

74) Στόμα legere maluit C. Hoffm. var. lect. 1, 10., quia et Nicander alex. v. 250. 251. et Scribonius Largus cap. 61. n. 193. ita habent. Sed repugnant codices, Aëtius et Paullus, qui haec ad litteram transcripserunt.

75) Sic legendum esse patet e Diosc. 1, 145.; σαρδόνιων s. σαρδωνίων vulgo; σαρδόνων Paull.

Cap. V. [De ephemero.] Sumto ephemero, quod et colchicum aut bulbum sylvestrem appellant, pruritus per totum corpus excitatur, non secus ac iis, quos scilla aut urtica irritaverit, interiora eroduntur, stomachus cum ingenti gravitate exaestuatur. Ceterum invalescente malo cruenta ramentis mixta per alvum egeruntur. Hos aequae ac eos, qui salamandram hauserunt, vomitionibus ac clystere adjuvare expedit, sed antequam venenum invalescat, dandum iis decoctum frondium quercus aut glandium, aut malicorii, aut serpyllum ex lacte propinandum: item succus polygoni, aut virgultorum vitis vel rubi, aut medullae ferulae tenerae, aut myrti cum vino. Ipsae porro myrti baccae tusae tritaeque et aqua maceratae opem ferunt, dum humor (superfusus) assumatur. Similem effectum et tunica media glandium sardianarum praebet, si



λαμβάνομενος, μετὰ τινος τῶν προειρημένων χυλῶν· ὀρίανός τε σὺν κοιλίᾳ ποθεῖται· ἀκριβῶς δὲ βοηθοῦνται οἱ τὸ ὄνειον ἢ βόειον γάλα θερμὸν πίνοντες καὶ κατέχοντες ἐν τῷ στόματι· ὥστε τοὺς εὐπόρησαντας τούτου, ἄλλου μηδενὸς χρῆζαν βοηθήματος.

Κεφ. ζ'. [Περὶ δορυκνίου.] Δορυκνίου δὲ ποθέντος, ὃ ἔνιοι στρύχνον μαρικὸν ἐκάλεσαν <sup>76</sup>, παρακολουθεῖ ὥσπερ γάλακτος ποιότης ἐν τῇ γεύσει, καὶ λυγμοὶ συνεχεῖς, γλώττης τε ὑγρότης <sup>77</sup>, καὶ αἵματος ἀναγωγή ἀθρόα· κατὰ κοιλίαν δὲ αὐτοῖς μυζώδῃ φέρεται, ὥς ἐπὶ δυσεντερικῶν. Οἷς βοηθεῖ πρὸ τοῦ τούτων τι παρακολουθῆσαι, ἃ καὶ τοῖς προειρημένοις· ὃ τε ἕμετος καὶ τὸ κλύσμα, καὶ ὅσα δύναται τὸ ποθέν ἐκκρίναι φάρμακον· ἰδίως δ' ἐπ' αὐτῶν βοηθεῖ τὸ μελίκρατον, ἢ ὄνειον ἢ αἷγιον γάλα, καὶ γλυκὺς οἶνος γλαρὸς μετ' ἀνίσου πινόμενος, καὶ ἀμύγδαλα πικρὰ, στήθη τε ὀρνίθια καθεψημένα· καὶ πάντα τὰ κογχύλια ἀμὰ καὶ ὀπτὰ

76) Dioscor. 4, 74. 75. utrumque distinguit.

77) Omnium consensu maneat: sola Ald. Paulli habet ξηρότης, sed edit. Basil. et Aët. ὑγρότης.

cruda in aliquo supra dictorum succo ingeratur: origanum quoque cum lixivio epotum. Eximie vero iuvantur lacte asinino aut bubulo calido poto ac in ore retento: quibus copia huius est, alius adminiculi non egent.

Cap. VI. [De dorycnio.] Dorycnion, quod nonnulli solanum furiosum appellarunt, epotum velut lactis saporem, crebros singultus et linguae humorem producit, et sanguinis reiectionem ciet. Per alvum mucosa secedunt, velut in dysenteria. Auxilium his ferendum, antequam eorum symptomatum quiddam secutum fuerit, quale et antecedentibus: vomitio nimirum, clysma et quaecunque bibitum venenum eicere valent. Inprimis vero iis opitulantur aqua mulsa, lac asininum caprinumque, ac dulce vinum, quod quidem tepidum cum aniso bibatur, amygdalae amarae et pectora gallinarum elixa. Quin etiam omnis generis conchyilia, cruda pariter ac tosta, comedere

ἔσθιόμενα, καὶ κάραβοι, καὶ ἄστακοί, καὶ ὁ ἐξ αὐτῶν ζω-  
μὸς πινόμενος.

Κεφ. ζ'. [Περὶ ἀκονίτου.] Τὸ δὲ ἀκόνιτον εὐθέως  
ἅμα τῷ πίνεσθαι γλυκαίνει τὴν γλῶσσαν μετὰ τινος στύψεως,  
καὶ ἀπὸ τοῦ γλυκασμοῦ σκοτοδινίαν, καὶ μάλιστα ἐν τῷ  
ἐξανίστασθαι, καὶ ὑγρότητας ὀφθαλμῶν ἐπιφέρει, βάρος τε  
θώρακος καὶ ὑποχονδρίου, μετὰ τοῦ πολλὰ πνεύματα ἀπο-  
δίδοσθαι· ἐφ' ὧν δι' ἐμέτων ἐκκομισθῆναι δεῖ τὸ φάρμακον,  
ἢ καὶ διὰ κλυστῆρος ὑποβιβασθῆναι <sup>78</sup> τὴν κοιλίαν· χρησό-  
μεθα δὲ προποτισμῷ ὀριγάνῳ, ἢ πηγάνῳ, ἢ πρασίῳ, ἢ  
ἄψινθίου ξίματι μετ' οἴνου ἄψινθιτου, ἢ εὐζώμου <sup>79</sup>, ἢ  
ἄβροτόνου, ἢ χαμελαίας, ἢ χαμαιπίτυος· ἀρμόζει δὲ αὐτοῖς καὶ  
ὀποβαλσάμου ὀληή < α', σὺν μέλιτι καὶ γάλακτι, μετὰ <sup>80</sup>  
καστορίου καὶ πεπέρεως καὶ πηγάνου ἴσης ὀληῆς σὺν οἴνῳ·  
καὶ πυτία ξρίφου, ἢ λαγωῦ ἢ νεβροῦ σὺν ὄξει· καὶ σιδήρου  
σκωρία, ἢ αὐτὸς ὁ σίδηρος, ἢ χρυσός, ἢ ἄργυρος διάπυρος  
ἐν οἴνῳ σβεσθέντα <sup>81</sup>, τοῦ ὑγροῦ λαμβανομένου· κοινὰ τε

78) Sic Ald. et Paull.; καθαρθῆναι Asul. et sequ.

79) Sic cod. Cantacuz. et Paris., Aëtius etiam, Paullus et Hermol.;  
ἀειζώμου editiones.

80) Sic Ald.; σὺν μέλιτι ἢ καὶ καστορ. alii.

81) Paull. σβεσθείς.

salutare est. Conveniunt et locustae marinae et gammari,  
et potum eorum insculum.

Cap. VII. [De aconito.] Aconitum, protinus ut bi-  
bitur, linguam dulci sapore cum quadam astrictione im-  
buit, ac subinde, praesertim cum assurgere conantur, ver-  
tiginem inducit: oculorum humores prolicit et gravitatem  
pectori prae cordiisque affert, cum flatuum multorum eru-  
ptione. Proinde venenum vomitione abigi aut clystere  
per alvum subduci opus est. Praebibenda sorbitione uta-  
mur origani, rutae aut marrubii: absinthii etiam decocto,  
cum vino absinthite, erucae, abrotani, chamaelaeae aut  
chamaepityos. Prodest iis etiamnum opobalsami drachma  
cum melle aut lacte, itemque castorei, piperis ac rutae par  
pondus ex vino: et coagulum hoedi, leporis aut hinnuli  
cum aceto: vinum quoque sumtum, in quo scoria ferri,  
aut ipsum etiam ferrum, vel aurum argentumve candens

σὺν οἴνῳ· καὶ ὄρνιθος καθεψηθείσης <sup>82</sup> ἢ κρεῶν λιπαρῶν βοείων ζωμὸς λαμβανόμενος σὺν οἴνῳ <sup>83</sup>. λέγεται δὲ καὶ ἡ χαμαιπίτυς ἰδίως ἐπ' αὐτῶν ἀρμόζειν <sup>84</sup>.

Κεφ. η'. [Περὶ τοῦ ἐν Ἡρακλείᾳ μέλιτος.] Ὅμοίως δὲ πάσχουσι καὶ οἱ ἐν Ἡρακλείᾳ τῇ ποντικῇ τὸ μέλι γεννώμενον φαγόντες ἢ πίνοντες· ἐφ' ὧν ἀρμόζει τὰ αὐτὰ τῷ ἀκο-νίτῳ· εἰσὶ δὲ εὐβοήθητοι, μάλιστα ὠφελούμενοι ὑπὸ οἶνομέλι-τος, συνεχῶς αὐτὸ πίνοντες, μιννυμένων αὐτῷ πηγάνου φύλλων.

Κεφ. θ'. [Περὶ κορίου.] Τὸ δὲ κόριον λαθεῖν μὲν οὐ δύναται διὰ τὴν ὁσμὴν· ποθὲν δὲ τὴν φωνὴν δασύνει, καὶ μανίαν ἐπιφέρει ὁμοίαν τοῖς διὰ μέθην· λαλοῦσι γοῦν μετ' αἰσχρολογίας <sup>85</sup>. καθ' ὅλου δὲ τοῦ σώματος αὐτῶν ἡ ὁσμὴ διαφαίνεται τοῦ κορίου. Βοηθεῖ δὲ αὐτοῖς μετὰ τὸ ἐξερα-

82) Sic e Paullo emendavit Sarac. *Κονία τε σὺν οἴνῳ ὄρνιθι καθε-ψηθείσα* vulgaris lectio tolerari nequit.

83) Cod. X. et Matthiol. *σὺν ὄξει*.

84) Quae hic Sarac. addidit, omnino et Paullus, licet corrupte, hic collocavit. In Aldina vero et ad Goupyli usque editionem absurde posita sunt in capite proximo. Repetuntur autem synonyma chamaepityos e Diosc. lib. 3. c. 175.

85) E Paullo, cod. Paris. Goupyli, et Hermolao; *λαθοῦσι* Ald.; *διὰ μάχην βλαβεῖσι* Asul.; *διὰ μέθην βλαβεῖσι* Cornar., Goup. et Sarac.

extinctum fuerit. Conferunt et lixivium cum vino, et gallinae elixae aut carnum bubularum pinguium ius cum vino sumtum. Peculiariter vero chamaedrys apta esse ad hos casus dicitur.

Cap. VIII. [De melle in Heraclea.] Qui mel, quod in Heraclea Ponti gignitur, ederint aut biberint, non secus afficiuntur, quam qui aconitum hauserunt, atque adeo iis eadem, quae poto aconito, conveniunt. Facile vero succurritur, quippe cum adiuventur frequenti vini mulsi potu, cui folia rutae admixta sint.

Cap. IX. [De coriandro.] Coriandrum ob odorem latere nequit. Epotum vocis raucitatem facit et insaniam, qualis e vinolentia existit, blaterant enim pudenda. Toto vero corpore coriandri odor sese prodit. His post eva-



θῆναι <sup>86</sup> διὰ τοῦ ἱρίνου ἐλαίου, ὡς προεῖρηται, ἄκρατος σὺν ἀψινθίῳ πινόμενος <sup>87</sup>, καὶ καθ' ἑαυτὸν, ἢ ὡς τε κενωθέντα ἐπὶ τὸ αὐτὸ, καὶ διεθέντα <sup>88</sup> σὺν ἄλμῃ, ῥοφούμενα· καὶ ἄλμη δὲ πινόμενη, καὶ ζωμός ἀλμυρὸς ἐκ τε ὄρνιθος καὶ χηνός· γλυκὺς τε σὺν κονίᾳ παραλαμβανόμενος.

Κεφ. ι'. [Περὶ ψυλλίου.] Καὶ τὸ ψύλλιον δὲ καλούμενον ποθὲν ἐπιφέρει ψύξιν ὅλου τοῦ σώματος καὶ νάρκην μετ' ἐκλύσεως καὶ ἀδημονίας· ὃ βοηθεῖ πάντα ὅσα τοῖς κόριον <sup>89</sup> πεπωκόσι.

Κεφ. ια'. [Περὶ κωνείου.] Κώνειον δὲ ποθὲν ἐπιφέρει σκοτώματα καὶ ἀγλὴν, ὥστε μὴδ' ἐπ' ὀλίγον βλέπειν, λυγμόν τε καὶ διανοίας παραφορὰν, καὶ ψύξιν ἄκρων· ἐπὶ τέλει δὲ σπώμενοι πνίγονται, στάσιν λαμβάνοντος τοῦ κατὰ τὴν ἀρτηρίαν πνεύματος. Καταρχὰς μὲν οὖν, ὡς καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων, διὰ τῶν ἐμέτων αὐτὸ κομιούμεθα· ἔπειτα κε-

85) E Paullo suadet Sarac. loco vulg. ἐξαιρεθῆναι.

87) En genuinam Aldinae lectionem, quam et Paullus et Marcellus (in interpret.) habent, Asulan. et sequ. habent ἐλαίον σὺν ἀψινθίῳ πινόμενον.

88) Est lectio Aldinae; Paull. λειανθέντα; Asulan. et sequ. χλειανθέντα.

89) Cod. X. et Matthiol. κώνειον.

cuationem, oleo irino, ut dictum est, productum merum aut per se aut cum absinthio propinatur, avaque in eo exinanita, cum muria diluta ac sorbta. Sic et epota maria, et ius salsum gallinae auferisque: passum quoque cum lixivio sumtum.

Cap. X. [De psyllio.] Quod psyllium dicitur, opotum corpori toti frigus ac torporem infert cum exsolutione animique moerore. Huic omnia, quae hausto coriandro, auxiliantur.

Cap. XI. [De conio.] Conium epotum vertigines excitat oculorumque caliginem, ut ne tantillum quidem videant: singultus insuper mentisque alienationem et extremorum artuum frigus. Tandem aegri convulsi suffocantur, spiritu in fistula intercepto. Quare inter initia, ut in reliquis, vomitu exentiemus: post deiectionem mo-

νόματι<sup>90</sup> χορησάμενοι τὸ εἰς τὰ ἔντερα παρολισθηκὸς ἐκκρινοῦμεν· καὶ τότε, ὥς ἐπὶ τὸ μέγιστον βοήθημα, ἐπὶ τὴν ἀκρατοποσίαν παραγινόμεθα, διδόντες μεταξὺ διαστήματα<sup>91</sup>, ἐν οἷς πιεῖν διδόμενον βοηθεῖ<sup>92</sup> γάλα ὄνειον ἢ ἀψίνθιον, μετὰ πεπέρεως καὶ οἴνου καὶ καστορίου· καὶ πήγανον καὶ ἡδυόσμον<sup>93</sup> σὺν οἴνῳ· καὶ καρδαμώμου ἢ στύρακος < α' <sup>94</sup> ἢ πεπέρεως μετὰ κνίδης σπέρματος σὺν οἴνῳ· ἢ δάφνης τὰ φύλλα<sup>95</sup>· ὁμοίως τε σιλφίου ὁπὸς σὺν ἐλαίῳ ἢ γλυκεῖ<sup>96</sup>· καὶ ὁ γλυκὺς οἶνος καθ' ἑαυτὸν πινόμενος πολὺς, ἱκανῶς ἀρμόζει.

Κε φ. β'. [Περὶ σμίλακος<sup>97</sup>.] Ἡ δὲ καλουμένη σμίλαξ, ὑπ' ἐνίων δὲ θύμιον, παρὰ δὲ Ῥωμαίοις τάξος, ποθεῖσα ἐπιφέρει ψύξιν καθ' ὅλου τοῦ σώματος, καὶ πνιγμὸν, ὅξύν τε θάνατον· οἷς βοηθεῖ πάντα ἅ καὶ τοῖς τὸ κώνειον πεπωκόσι.

90) Cod. X. κενώμασι.

91) Sie Paull.; διάστημα, ἐν οἷς vulgo.

92) Cod. P. apud. Goup. ἐν οἷς δίδομεν πιεῖν.

93) E Paullo; καὶ πηγάνου καὶ ἡδυόσμου vulgo.

94) Indidem. Οὐγγ. α' Ald. Nulla mensura in Asul. et sequ.

95) Cod. X. σπέρματα.

96) Paull. σιλφιον ἢ ὁπὸν αὐτοῦ σὺν οἴνῳ καὶ γλυκεῖ.

97) In cod. X. deest id capitulum.

liemur, ut, quod ad intestina deiectum fuerit, excernamus. Tum vero, tanquam ad expeditissimum remedium, ad meri potionem deveniendum est: idque interiectis intervallis, in quibus proderit lac asininum potui datum, aut absinthium cum pipere et vino et castoreo: ruta etiam et mentha cum vino: cardamomi dein et styracis drachma una, aut piperis tantum cum urticae semine et vino, aut lauri folia: praeterea silphii succus cum oleo et passo. Sed et vinum dulce per se largius potum egregie auxiliatur.

Cap. XII. [De taxo.] Quae (Graecis) smilax, nonnullis thymion, Romanis taxus dicitur, pota frigus universo corpori, strangulatum celeremque interitum infert. Huic eadem, quae conio, opem ferunt.

Κεφ. ιγ'. [Περὶ ὁποῦ καρπάσου.] Καὶ ὁ τῆς καρπάσου<sup>98</sup> ὁπὸς ποθεῖς κάρον ἐπιφέρει καὶ πνιγμὸν ὅξυν· βοηθοῦνται δὲ καὶ οὗτοι, ὑφ' ὧν καὶ οἱ τὸ κώνειον πεπωκότες.

Κεφ. ιδ'. [Περὶ τῆς σαρδωνίας πόας.] Ἡ δὲ σαρδώνιος λεγομένη πόα, βατραχίου<sup>99</sup> εἶδος οὖσα, ποθεῖσα ἢ βρωθεῖσα, παραφορὰν διανοίας ἐπιφέρει καὶ σπάσματα μετὰ συνολκῆς χειλέων, ὥστε γέλωτος φαντασίαν<sup>100α</sup> παρέχειν, ὑφ' ἧς διαθέσεως καὶ ὁ σαρδώνιος γέλως οὐκ εὐφρόνως ἐν τῷ βίῳ καθωμίληται· ἐφ' ὧν ἰδίως καὶ μετὰ τὸν ἔμετον ἀρμόζει μελίκρατον πολὺν διδόμενον καὶ γάλα· ἐμβροχὴ τε καὶ λιπασμὸς ὅλου τοῦ σώματος διὰ θερμαντικῶν φαρμάκων, καὶ ἐμβάσεις δι' ὑδρελαίου θερμοῦ· ὑπαλείφειν μέντοι δεῖ ἱκανῶς καὶ ἀνατρίβειν μετὰ τὴν ἐμβασιν αὐτούς· καθόλου δὲ, ὡς πρὸς σπασμὸν, ὅλην τὴν θεραπείαν δεῖ ποιεῖσθαι.

Κεφ. ιε'. [Περὶ ὑοσκυάμου.] Ὑοσκύαμος δὲ ποθεῖς ἢ βρωθεῖς παρακοπὴν τοῖς μεθύουσιν ὁμοίαν ἐπιφέρει· ἔστι δὲ

98) Paull. καρπησίας.

99) Vulgo βατράχου.

100α) X. γέλωτα φαντασίας.

Cap. XIII. [De carpasi succo.] Epotus carpasi succus soporem inducit ac repentinam strangulationem. Adiuvantur itidem, qui hunc hauserunt, epoti conii remediis.

Cap. XIV. [De herba sardoniam.] Sardoniam herba, quae ranunculi species est, in cibo potuque sumpta, mentis aberrationem producit et convulsiones cum laborum contractione, quae risus speciem praebet: hinc de sardonio risu adagium in vulgus infausto omine manavit. Post vomitum peculiariter convenit pota liberalius aqua mulsa, itemque lac: nec non et irrigatio unctioque totius corporis per calefacientia medicamenta, praeterea descensus in solium ex hydrelaeo calente, ita tamen ut post egressum e solio illitibus ac frictionibus minime parcatur. In summa curationem omnem, quae convulsioni adhibetur, exsequi oportet.

Cap. XV. [De Hyoscyamo.] Hyoscyamus, in potu ciboque sumtus, mentis alienationem, qualis ebriorum est,



εὐίατος, βοηθούμενος μελικράτῳ πολλῷ ποτιζομένῳ, καὶ γάλακτι μάλιστα ὀνείῳ· εἰ δὲ μή γε, αἰγείῳ ἢ<sup>100b</sup> βοείῳ, ἢ σῦκων ξηρῶν ἀφεψημάτι· ποιοῦσι δ' ἐπ' αὐτῶν καὶ στρόβιλοι, καὶ τὸ σικύων<sup>1</sup> σπέρμα σὺν γλυκεῖ λαμβανόμενον, καὶ ἄλμυρὸς οἶνος σὺν στέατι ὑεῖῳ νεαρῷ καὶ γλυκεῖ σὺν ὕδατι ἀρμόζει<sup>2</sup>, καὶ κνίδης σπέρμα ὁμοίως, ἢ νίτρον σὺν ὕδατι· ἀρμόζει καὶ κηῳρίον, καὶ νάπυ, καὶ κάρδαμον, καὶ ῥάφανος, καὶ κρόμμου, καὶ σκόροδα, ἕκαστον τούτων σὺν οἶνῳ λαμβανόμενον· ἡσυχάζειν δὲ αὐτοὺς ἀναγκάζειν δεῖ, ὅπως τὸν οἶνον πεπωκότες ἐκπέψωσιν<sup>3</sup>.

Κεφ. ις'. [Περὶ μανδραγόρου.] Μανδραγόρου δὲ ποθέντος εὐθέως κάρως ἐπακολουθεῖ καὶ ἔκλυσις, καταφορά τε ἰσχυρά, κατὰ μηδὲν διαφέρουσα πάθους τοῦ λεγομένου ληθάργου· ὧ, πρὸ τοῦ τι τούτων συμβῆναι, ἀρμόζει ὅ, τε ἔμετος, καὶ μελίκρατον, καὶ μετὰ τοῦτο καὶ νίτρον καὶ ἀψίνθιον σὺν γλυκεῖ ἢ οἶνῳ γλυκάζοντι λαμβανόμενα· καὶ ἡ τῆς

100b) Ald., 'Paull. et Goupyl. cod. habent αἰγείῳ ἢ, quod Asul. et rell. omiserunt.

1) X. γλαυκίου.

2) Sic cod. X. Vulgo γλυκεῖ α νεαρῷ separatur, nec σὺν ὕδατι habet Paull., nec interpretes.

3) Sic Ald., consentientibus Paullo et Aëtio; ὥςπερ οἱ τὸν οἶνον πίνοντες Asul. et reliqui.

infert: sed facile medicamentis cedit. Auxiliatur aqua mulsa copiose propinata, praesertim lac asininum: si id desideratur, caprinum vel bubulum, aut aridarum ficuum decoctum. Faciunt ad id et nuclei pinei et cucumerum semen ex passo sumtum, et vinum salsum cum adipē suillo recenti passoque; itidem urticae semen aut nitrum ex aqua. Conferunt et cichorium, sinapi, nasturtium, raphanus, cepa et allium, quorum singula ex vino sumuntur. Verum ut quiescant cogendi sunt, vini bibiti excoquendi gratia.

Cap. XVI. [De mandragora.] Mandragoram voratam illico sopor excipit, exsolutio ac vehemens veternus, nihil distans a lethargo. Huic, antequam aliquid accidat, vomitus proderit et aqua mulsa, postea nitrum et absinthium ex vino dulci aut passo sumantur. Caput rosaceo

κεφαλῆς ἑμβροχὴ διὰ ῥοδίνου καὶ ὄξους· καὶ διέγερσις καὶ κίνησις τοῦ σώματος. Καὶ ἡ δι' ὀσφραντικῶν καὶ εὐπατορίου<sup>4</sup> καὶ πεπέρους καὶ νάπυος καὶ καστορίου καὶ πηγάνου ὅξει τετριμμένων· καὶ πίσεως ὑγρᾶς, καὶ τῶν κεκαυμένων καὶ ἐσβεσμένων ἑλλυχνίων δυσανακλήτως δὲ αὐτῶν ἐχόντων, καὶ παρμικὰ ἐπάγειν, καὶ τοῖς ἄλλοις κοινοῖς βοηθήμασι χρῆσθαι καὶ ἐπὶ τούτων.

Κεφ. ιζ'. [Περὶ μήκωνος ὁποῦ.] Μήκωνος δὲ ὁποῦ ποθέντος παρακολουθεῖ καταφορὰ μετὰ καταψύξεως καὶ κνησμοῦ ἐπιτεταμένου, ὡς πολλάκις, ἐνισχύοντος τοῦ φαρμάκου, ἐπιγίνεσθαι τοσοῦτον κνησμόν, ὥστε διεγείρεσθαι ὑπ' αὐτοῦ· ὁσμή δὲ τοῦ φαρμάκου δι' ὅλου τοῦ σώματος ἐκδίδεται· οἷς βοηθεῖ μετὰ τὸν τοῦ ἐλαίου ἔμετον, καὶ κλυσθῆναι δοιμὲν κλύσματι, ὀξύμελι σὺν ἁλσὶ πινόμενον, ἢ μέλι σὺν ῥοδίνῳ θερμοῦ· καὶ ἀκρατος πολὺς σὺν ἀψινθίῳ ἢ κινναμώμῳ· ἢ ὄξος θερμοῦ καθ' ἑαυτό· νίτρον τε σὺν ὕδατι, καὶ ὀρίανον σὺν κορίαν, πηγάνου τε ἀγρίου σπέρμα σὺν πεπέρει καὶ οἶνῳ καὶ πάνακι, πέπερί τε μετὰ καστορίου καὶ ὀξύμελιτος, ἢ μετὰ

4) Lacun. et Cornar. εὐφορβίου.

et aceto perfundatur. Proficit etiam excitatio et agitatio corporis, itemque olfactus tritorum in aceto eupatorii, piperis, sinapis, castorei ac rutae, praeterea odor picis liquidae et funiculi lucernarum, quae vicissim accendantur et exstinguantur. Quodsi aegre expergescant, sternutamenta cienda, aliaque et his adhibenda communia adminicula.

Cap. XVII. [De papaveris liquore.] Epoto papaveris liquore consequitur veternus cum frigore et pruritu vehementi. Quin saepenumero invalescente veneno tanta existit prurigo, ut hominem excitet. Odor vero medicinali toto se corpore prodit. Post citatam oleo vomitionem infusumque clyisma acriusculum, opitulatur acetum mulsum cum sale potum, aut mel cum rosaceo calido. Item merum copiosum cum absinthio et cinnamomo, aut calidum per se acetum; nitrum quoque ex aqua, et origanum cum lixivio: sylvestris rutae semen cum pipere, vino et panace: ac piper etiam cum castoreo et aceto mulso,

θύμβρας ἢ ὀριγάνου<sup>5</sup> σὺν οἴνῳ· δεῖ δὲ καὶ τούτους διεγείρειν τοῖς ὀσφραντικοῖς καλουμένοις, καὶ ἐμβιβάζειν εἰς θερμόν, καὶ πυριᾶν, διὰ τὸν ἐπιγινόμενον κνησμόν· ὀνήσει αὐτούς καὶ μετὰ τὸ λουτρὸν χρῆσθαι ζωμοῖς λιπαροῖς μετὰ οἴνου ἢ γλυκέως, καὶ μυελὸς δὲ μετ' ἐλαίου πινόμενος.

Κεφ. ιη'. [Περὶ μήκωνος κερατίτιδος.] Ἡ δὲ λεγόμενη κερατίτις μήκων ἐν τῷ βρωθῇναι ἢ ποθῇναι τὰ αὐτὰ ἐπιφέρουσα τῷ ὁπῷ τῆς μήκωνος συμπτώματα, τοῖς αὐτοῖς βοηθήμασιν ὑποπίπτει.

Κεφ. ιθ'. [Περὶ φαρικοῦ.] Τὸ δὲ καλούμενον φαρικόν<sup>6</sup> τὴν μὲν γεῦσιν πᾶσαν νάρδω ἀγρία ἔοικεν· ἐπιφέρει δὲ παράλυσιν, ποθὲν μετὰ παρακοπῆς καὶ σπασμοῦ. Δεῖ δὲ μετὰ τὸ ἐξεράσαι αὐτοὺς ποτίζειν οἶνον ἀψινθίτην, σὺν κινναμώμῳ, ἢ σμύρνῃ, ἢ νάρδω κιλικία<sup>7</sup>, ἣν ἔνιοι νῆριν<sup>8</sup> ἐκάλεσαν· ἢ ναρδοστάχυος ὀλκᾶς β', ἢ σμύρνης β' ὀβόλους<sup>9</sup>, μεμιγμένους σὺν γλυκεῖ, ἱριδί τε καὶ κροκίνῳ ἄνθει<sup>10</sup> σὺν

5) Paull. addit ἀφεψήματος.

6) Schol. Nicandri Alex. v. 393.

7) Sic Paull.; κελτικῇ vulgo.

8) E lib. i. c. 3. restitui. Vulgo σερύνην; Paull. ἰσάτιν.

9) X. <β'.

10) Paull. sic; ῥοδίνῳ ἄνθει Ald.; ἢ ἱρίν μετὰ κρόκου Asul. et sequ.

aut cum thymbra et origano, addito vino. Sed et hos odoramentis excitare et in calidae solium mittere ac fovere abortae pruriginis caussa oportet. Proderit autem a balneo iusculorum pinguium usus ex vino aut passo, ac medulla etiam ex oleo pota.

Cap. XVIII. [De papavere corniculato.] Quod papaver corniculatum appellant, et potu et cibo eadem symptomata inferre consuescit, quae papaveris succus, iisdem quoque debellanda auxiliis.

Cap. XIX. [De pharico.] Quod pharicum vocant, sapore quidem nardum omnino sylvestrem aemulatur: potum vero producit nervorum resolutionem cum delirio et convulsione. Sed oportet, post evacuationem, vinum absinthites potui dari, cum cinnamomo aut myrrha aut nardo cilicia, quam nonnulli et nerin appellant, aut spicae nardi drachmas duas et myrrhae totidem obolos, admixto



οἶνω· δεῖ δὲ καταπλάσσειν τὴν κεφαλὴν αὐτῶν ξυρήσαντες, κριθίνῳ ἀλεύρῳ σὺν πηγάνῳ λείῳ καὶ ὄξει.

Κεφ. κ'. [Περὶ τοξικοῦ.] Τὸ δὲ τοξικὸν δοκεῖ μὲν ὀνομάσθαι ἐκ τοῦ τὰ τόξα τῶν βαρβάρων ὑπ' αὐτοῦ χρίσθαι. παρακολουθεῖ δὲ τοῖς πεπωκόσι χειλῶν καὶ γλώττης γλεγμαγή· μανία τε ἀκατάσχετος ποικίλαις ἐπιβάλλουσα φαντασίαις· ὥς καὶ διὰ τοῦτο δυσιάτους εἶναι ἐν ταῖς θεραπαίαις· σπανίως δὲ καὶ σώζεσθαι τινὰς τῶν πεπωκότων. Δεῖ μέντοι συνέχειν αὐτοὺς δεσμοῖς ἀναγκάζοντας, καὶ βιαζομένους γλυκὺν οἶνον σὺν ῥοδίνῳ πίνειν καὶ ἐξεμεῖν· τό, τε τῆς γογγυλίδος σπέρμα πινόμενον<sup>11</sup> σὺν οἶνῳ· ἰδίως δ' ἐπ' αὐτῶν ἄρμोजει καὶ ἡ τῆς πενταφύλλου ῥίζα, αἶμά τε τράγου ἢ αἰγὸς, ὁμοίως λαμβανόμενα· δρυὸς τε φλοιὸς ἢ φηγοῦ ἢ πρίνου, γάλακτι συνεκλεανθείς· καὶ μῆλα κυδῶνια ἐσθιόμενα λεία· ἢ σὺν γλήχωνι καὶ ὕδατι πινόμενα<sup>12</sup>, ἄμωμόν τε καὶ βαλσάμου καρπὸς σὺν οἶνῳ· καὶ εἴ τινες αὐτοῦ φύγοιεν τὸν

11) Sic Paull. et Ald.; τό, τε τῆς γογγύλης σπέρμα σὺν Asulan. et sequi.

12) Sic Ald.; ἐσθιόμενα, ἢ λεία σὺν γλήχ. Paull.; Asulan. λεία omisit.

passo, iride etiam et croci flore, cum vino. Deraso vero capiti adhibenda farina hordeacea cum ruta trita et aceto.

Cap. XX. [De toxico.] Toxicum ex eo appellatum creditur, quod barbarorum sagittae eo illinantur. Qui biberunt, mox labiorum linguaeque inflammatione prehenduntur, iisque furor mentis coerceri nescius varias observat imagines: quare vix medicinae locus est, raroque, qui hauserunt, incolumes evadere contingit. Vinculis tamen cohibendi, vique adigendi, ut vinum dulce bibant cum rosacco ac revomant, ut et rapi semen ex vino. Privativum vero iis convenit quinquifolii radix, itemque hircinus sanguis aut caprillus, eodem modo sumtus: proficit et roboris, fagi aut ilicis cortex cum lacte tritus, et mela cydonia trita in cibo sumta, aut cum pulegio et aqua bibita: amomum denique et balsami fructus ex vino. Si qui autem periculum eluctati fuerint, ii per

κίνδυνον, πολὺν χρόνον κλινοπετεῖς διαμένουσι, καὶ ἀναστάν-  
τες ἐπτοημένοι<sup>13</sup> τὸν λοιπὸν χρόνον διάγουσιν.

Κεφ. α'. [Περὶ ἰξίου.] Ἰξίας δὲ, ὃς καὶ οὐλόφορον<sup>14</sup>  
καλεῖται, ἐν τῷ πίνεσθαι οἶόν τι ὠκίμῳ κατὰ τὴν ὁσμὴν  
καὶ κατὰ τὴν γεῦσιν ἐμφαίνει· ἐπιφέρει δὲ γλώσσης φλεγμο-  
νὴν ἰσχυρὰν καὶ παρακοπήν· καὶ τὰς ἐκκρίσεις ἐπέχει πάσας·  
βορβορυγμούς τε καὶ ψόφους μετὰ λειποθυμίας ἐπιφέρει, δι-  
χὰ τοῦ προχωρεῖν τι. Βοηθεῖ δὲ αὐτοῖς, μετὰ τὸ ἐξε-  
μέσαι τὸ πλεόν, ἢ μετὰ τὸ τὴν κοιλίαν λυθῆναι, πινόμε-  
νον ἀψινθίου ἀπόβρεγμα σὺν οἴνῳ πολλῷ ἢ ὀξυμέλιτι· πη-  
γάνου τε ἀγρίου σπέρμα, ἢ σιλφίου ῥίζα· ὁμοίως τε τραγο-  
ριγάνου ἀφέψημα σὺν τινι τῶν προειρημένων, ἢ γάλακτι, ἢ  
τερεβινθίνῃ ῥητίνῃ, ἢ νάρδῳ, ἢ καστορίῳ, ἢ σιλφίῳ, ἐκά-  
στου ὀβολός· ἀρμόζουσιν σὺν οἴνῳ<sup>15</sup> καὶ οἱ τῆς βασιλικῆς  
καρύας καρποὶ σὺν ῥητίνῃ, καὶ καστορίῳ, καὶ πηγάνῳ, ἐκά-

13) Manard. suadet ἐφθογημένον, sed Paull. nobiscum et Aët.

14) Ald. οὐλόφορον. Sed cf. Diosc. lib. 3. c. 9. et Paull.

15) Paullum sequor. Vulgo ἢ νάρδου, ἢ καστορέου, ἢ σιλφίου,  
ἐκάστου ὀβολος ἀρμόζουσιν σὺν οἴνῳ.

longum tempus tamen lecto adstricti sunt, et dum sur-  
gunt, stupefacti reliquum tempus transigunt.

Cap. XXI. [De ixiā.] Ixias, qui et ulophonon appella-  
tur, inter potandum quiddam tum odore tum sapore ocimum  
referens prodit: inducit etiam vehementem linguae inflam-  
mationem et mentis alienationem: excretiones omnes sup-  
primit: borborygmus ac murmura intestinorum cum animi  
deliquio producit, quamvis nihil egeratur. Auxilium prae-  
stat, post eductam vomitionibus maiorem veneni partem, aut  
postquam alvus soluta fuerit, absinthii infusum cum multo  
vino aut cum aceto mulso: nec non rutae sylvestris se-  
men, aut silphii radix: item tragorigani decoctum cum ali-  
quo praedictorum, aut cum lacte, resina terebinthina,  
aut nardo, castoreo, seu silphio, singulorum obolo. Con-  
ferunt et cum vino nuclei iuglandium nucum cum resina  
et castoreo et ruta, singulorum drachma una: item cha-

στου < α'. ὁμοίως χαμελαίας ἢ θαψίας ὀβολοὶ β' <sup>16</sup> σὺν μελικράτῳ, καὶ ὄξος θερμὸν πινόμενον <sup>17</sup>.

Κεφ. κβ'. [Περὶ ψιμυθίου.] Τὸ δὲ ψιμύθιον λαθεῖν οὐ δύναται διὰ τὸ χροῶμα· ἐκουσίως γὰρ ληφθὲν, λευκαίνει τὸν οὐρανίσκον καὶ τὰ οὐλα καὶ τὴν γλῶτταν καὶ τὸ μεταξὺ τῶν ὀδόντων· ἐπιφέρει δὲ λυγμοὺς καὶ βῆχα καὶ γλώττης ξηρότητα καὶ ψύξιν ἀκρωτηρίων, μετὰ παρακοπῆς καὶ δυσκινήσεως. Οἷς ἀρμόζει μελικράτον δίδόναι, ἢ σύκων ἢ μάλαχης ἀφέψημα, ἢ γάλα θερμὸν, ἢ σήσαμον λεῖον μετ' οἶνου, ἢ κονίαν κληματίνην, ἢ ἀμαράκινον ἔλαιον, ἢ ἴριον· περσικῶν τε ὁστᾶ σὺν κρίνου ἀφεψήματι <sup>18</sup>, περιστερῶν δὲ ὡὰ σὺν λιβάνῳ ἢ κριθίνῳ ἀφεψήματι· ἢ κοκκυμήλων κόμμι, ἢ πτελέας τὸ ἐν ταῖς φύσκαις ὑγρὸν <sup>19</sup>, μετὰ χλιαροῦ ὕδατος·

16) Paullum iterum sequor, excepta tamen mensura, quae in tam ancipitibus medicamentis ultra trientem drachmae esse non potest. Utriusque autem in Paulo binae drachmae sumi iubentur: sic et in Aldina, adiecto ἀψινθίου χυλοῦ. Asul. χαμελαίας οἶγγται β', ἀψ. < β', omissa θαψία.

17) Sic Paull. et Ald.; καὶ ὄξει πολλῷ πινόμενον Asul. et sequ.

18) Ald. lectio, citra κρίνου, quod ibi κρίνου scribitur. Paulus σὺν κριθῶν ἀφεψήματι, omissis sequentibus: περιστερῶν δὲ ὡὰ. Asul. et sequentes omittunt ἀφέψημα.

19) Totus hic locus e Paulo restitutus. Ald. ἢ κοκκυμήλοις· ἢ κόμμι πτελέας· ἢ τὸ ἐν τοῖς φύλλοις τῆς πτελέας ὑγρὸν. Ita et sequ. Sed nostram lectionem esse genuinam, patet e comparatis locis Diosc. lib. 1. c. 112. et 174.

melaecae et thapsiae, singularum oboli bini cum aqua mulsa et aceti calidi potus.

Cap. XXII. [De cerussa.] Cerussa sumta propter colorem latere nequit. Ultro enim vorata dealbat palatum, gingivas, linguam dentiumque commissuras. Assert et singultus, tussim, linguae ariditatem et artuum frigus, cum desipientia motusque difficultate. His convenit aquam mulsam dare, aut ficuum et malvae decoctum, aut lac calidum et sesamum tritum cum vino aut lixivium e sarmentorum cinere, aut oleum amaracinum vel irinum: persicorum etiam nucleos cum farinae crassioris decocto: columbina ova cum ture aut decocto hordei, aut prunorum gummi, humor etiam, qui in folliculis ulmi conficitur,



ἄρμόζει δὲ ἐπ' αὐτῶν καὶ θαψίας χυλὸς ἢ σκαμμωνίας ὅπου τριώβολον<sup>20</sup> πινόμενα.

Κεφ. κγ'. [Περὶ μυκήτων.] Μυκήτων δὲ οἱ μὲν τῷ γένει βλάπτουσιν, οἱ δὲ τῷ πλήθει· ἐπιφέρουσι δὲ πάντες<sup>21</sup> πνιγμοὺς ἑοικότας ἀγχόταις. Οἷς εὐθέως βοηθεῖν δεῖ κοινῶς, ἀναγκάζοντας ἑμῖν δι' ἐλαίου· θαυμαστῶς δὲ ὠφελοῦνται πίνοντες κονίαν κληματίνην, ἢ ἔξ ἀγραδίνου ξύλου, μετὰ ὀξυκράτου καὶ ἁλῶν ἢ νίτρου· καὶ συνεπόμεναι δὲ αἱ ἀχράδες ἢ τὰ φύλλα τοῖς μύκησιν, ἀφαιροῦνται τὸ πνιγῶδες αὐτῶν· ἐσθιόμεναι δὲ ὠφελοῦσιν· βοηθεῖ δὲ αὐτοῖς ἀλεκτοριδίων ὡς<sup>22</sup> σὺν ὀξυκράτῳ πινόμενα, μετ' ἀριστολογίας ὀλκῆς α', ἢ ἀψίνθιον σὺν οἶνῳ· μέλι τε<sup>23</sup> ἐσθιόμενον καὶ πινόμενον σὺν ὕδατι· μελισσόφυλλόν τε σὺν νίτρῳ<sup>24</sup>, πάνακός τε ῥίζα καὶ καρπὸς<sup>25</sup> σὺν οἶνῳ· τρύξ τε οἶνου κεκαυμένη μεθ' ὕδατος, καὶ χαλκοῦ ἄνθος<sup>26</sup> σὺν ὄξει, ῥάφανός τε ἢ νάπυ ἢ κάρδαμα<sup>27</sup> ἐσθιόμενα.

20) Mensuram hanc e Lacun. cod. et Paullo addidi.

21) Paull. παντελεῖς ληρθέντες.

22) Cornar. voluit ἀφάδευμα, ut congruat cum Diosc. 4, 83. Sed Paullus nostram lectionem tuetur.

23) Sic Lacunae cod.; μέλι δὲ Paull.; καὶ μέλιτι vulgo.

24) Sic Ald., Aët. et Paull.; οἶνῳ vulgo.

25) Καρπός omittitur in Ald., est tamen in Paullo.

26) Ex Ald. et Paullo; γάλλανθος vulgo.

27) Ex Paullo; καρδάμωμον vulgo.

cum tepida aqua. Convenit etiam thapsiae succus aut scammonii trioboli pondere sumtus.

Cap. XXIII. [De fungis.] Fungorum alii toto genere, alii copia maiore nocent: omnes tamen strangulationem, velut a laqueo productam, inferunt. Quare confestim communi auxilio succurrendum est, scilicet oleo citata vomitione. Mirifice vero iuvat lixivium sarmentitia aut e pyrastris ligno, cum posca et sale aut nitro pota. Sed et pyrastris fructus aut folia cum fungis decocta strangulandi vim illam auferunt, comestaque iuvant. Prosunt et gallinarum ova cum posca bibita, itemque aristolochiae aut absinthii drachma una cum vino: insuper etiam mel, seu in cibo, seu ex aqua sumtum. Sic et melissophyllum cum nitro, panacis radix et semen in vino: faex quoque vini cremata cum aqua, et aeris flos cum aceto, denique raphanus, sinapi, aut nasturtium esu prosunt.

Κεφ. κδ'. [Περὶ γύψου.] Καὶ ἡ γύψος πνιγμὸν ἐπιφέρει λιθουμένη· ὅθεν καὶ τούτοις ἀρμόζει διδόναι τὰ πρὸς τοὺς μύκητας βοηθήματα· καὶ ἐπὶ τούτων τὸ τῆς μαλάχης ἀφεψήμα, ὃ παραληπτέον ἀντὶ τοῦ ἐλαίου· λιπαρὸν γὰρ ὄν καὶ ἐν τῷ ἐξεμείσθαι ὀλισθόν ἐμποιοῦν, οὐκ ἔῃ καταξύεσθαι τὰ σώματα· λιθουμένη γὰρ ἡ γύψος ἐργάζεται τοῦτο· ἀρμόζει δὲ καὶ τὸ ἐλαιον σὺν μελικράτῳ ἢ σύκων ἀφεψήματι· καὶ κονία συγκίνη ἢ κληματίνη σὺν οἴνῳ πολλῷ πινομένη· καὶ ὀρίγανος ἢ θύμος σὺν κονίᾳ, ἢ ὕξει, ἢ γλυκεῖ· δεῖ δὲ τούτους ὑποκλύζειν τῷ τῆς μαλάχης ἀφεψήματι.

Κεφ. κέ'. [Περὶ αἵματος ταυρείου.] Αἷμα δὲ ταυρείον νεοσφαγὲς ποθὲν δύσπνοϊαν ἐπιφέρει καὶ πνιγμὸν· ἐμφράττον τοὺς περὶ τὰ παρίσθμια καὶ τὴν κατάποσιν πόρους μετὰ σπασμοῦ ἰσχυροῦ· εὐρίσκεται τε ἐπ' αὐτῶν ἡ γλῶττα ἐρυθρὰ, καὶ ὀδόντες βεβαμμένοι<sup>28</sup>, καὶ θρομβία μεταξὺ αὐτῶν. Ἐφ' ὧν τὸν ἔμετον παραιτούμεθα, τῶν θρόμβων μᾶλλον ἐν τῷ στομάχῳ σφηνουμένων, διὰ τὸ μετεωρίζεσθαι αὐ-

28) Paull. βεβρωμένοι mendose.

Cap. XXIV. [De gypso.] Et gypsum suffocationem infert, dum intra ventriculum lapidescit: quare et eadem, quae adversus fungos, valent auxilia: super haec malvae decoctum, quod quidem olei vice assumendum est; quoniam, pingue cum sit, et ad vomitiones lubricas vias praestet, deradi corpora minime sinit; quod alioqui gypsum, ubi duratur in lapidem, facere solet. Quin etiam prodest oleum ex aqua mulsa aut ficuum decocto, et lixivium e ficulneo aut sarmentitio cinere facta, cum vino largiore pota: item origanum vel thymum cum lixivium, vel aceto, vel passo. Sed et malvae decoctum clystere infundi oportet.

Cap. XXV. [De taurino sanguine.] Tauri recens iugulati sanguis potus spirandi difficultatem strangulatumque producit, dum tonsillarum fauciumque meatus cum vehementi convulsione obstruit. Lingua inde rubescit, ac dentes tinguntur, grumique inter ipsos remanent. Vomitus in hoc malo vitabimus, ne forte grumi eiusmodi, attractu

τούς κατὰ τὴν ὀλκὴν. Διδόναι <sup>29</sup> δὲ, ὅσα δύναται τὴν πῆ-  
ξιν διαλύσαι τοῦ αἵματος, καὶ τὴν κοιλίαν ὑπάγειν· τούς  
τε ὀλύνθους, πλήρεις ὄντας τοῦ ὀποῦ, σὺν ὀξυκράτῳ· καὶ  
νίτρον δὲ καθ' ἑαυτὸ ὠφελεῖ· καὶ πυτία ἅπαντα σὺν ὄξει,  
καὶ σιλφίου ῥίζῃ ἢ τῷ ὀπῳ· ὁμοίως καὶ κράμβης σπέρμα,  
κονία τε συκίνη, καὶ κονύζης φύλλα <sup>30</sup> σὺν πεπέρει, καὶ βά-  
του χολός σὺν ὄξει· δεῖ δὲ τὴν κοιλίαν ὑπάγειν. Εἴωθε δὲ  
τοῖς σωζομένοις ἀποδίδοσθαι διὰ τῆς ἐδρας δυσώδη καὶ ῥοώ-  
δη <sup>31</sup>· καταπλάσσειν δὲ καὶ στόμαχον καὶ τὴν κοιλίαν ἀλεύρω  
κρίθινῳ μετὰ μελικράτῳ.

Κε φ. κς'. [Περὶ γάλακτος ἐμπυτιασθέντος.] Καὶ τοῖς  
λαβοῦσιν ἐμπυτιασθὲν γάλα ἄθρουν <sup>32</sup>, πολὺς πνιγμὸς γίνε-  
ται, διὰ τὸ θρομβοῦσθαι· οἷς βοηθοῦντας προσφέρειν δεῖ,  
ὥσπερ ἀντίδοτον, πυτίαν σὺν ὄξει, πολλάκις ἀναγκάζοντας  
πίνειν· καὶ καλαμίνθης τὰ φύλλα ξηρὰ, ἢ τὸν χυλὸν ὁμοίως·

29) Sic cum Paullo lego propter accus. sequentes; δίδοται vulgo.

30) Cum Ald. et Paull.; σπέρμα, Asul. et rell.

31) Δυσώδη, vulgo omissum, lacunam prodit, sequente καὶ. Paul-  
lus: κοπρώδη καὶ δυσώδη. Marcell. et Cornar. legendum ita esse  
censent, ut ego posui. Sed fere magis arridet scriptura Io. Actuarii  
(meth. med. 5, 12.) καρυκώδη, quam vocem Galenus, (expos. voc.  
Hipp. p. 492.) ὑφαίμα interpretatur.

32) Sic Paull.; γάλα, ἀθρόως vulgo perperam.

in sublime elati, gulae magis impingantur. Danda vero sunt,  
quae sanguinem concretum solvere et alvum subducere  
possunt, uti caprifici grossi latice turgentes ex posca.  
Nitrum quoque per se auxiliatur: atque coagulum omne  
cum aceto, et silphii radice, aut eius succo: itidem et  
brassicae semen, et e cinere ficulneo lixivium. Prosunt et  
conyzae folia cum pipere, et rubi succus ex aceto. Al-  
vum praeterea solvere par est: siquidem in iis, qui evasuri  
sunt, solent per alvum foetida et fluida (intriti similia  
cruenta) egeri. Stomacho denique alvoque hordeaceam fa-  
rinam ex aqua mulsa cataplasmatibus vice imponere debemus.

Cap. XXVI. [De lacte intus coagulato.] Eos quoque,  
quibus lac largius iusto assumptum intus coagulatur, stran-  
gulatio frequens invadit, quia in grumos coalescit. Hos  
iuvaturi debemus adhibere antidoti vice coagulum ex aceto,  
cogentes id saepius bibere. Et calaminthae folia arida



ἡ σιλφίου ῥίζαν ἢ τὸν ὀπὸν σὺν ὄξυκράτῳ· θύμον τε σὺν οἴῳ<sup>33</sup>, καὶ τὴν πηλοποιητικὴν<sup>34</sup> κονίαν· ἄλυκὸν δὲ μὴδὲν προσφερέσθω· μᾶλλον γὰρ πῆγνυται καὶ τυροῦται τὸ γάλα· ἀλλ' οὐδὲ τούτους ἐμῖν δεῖ· ἐνιστάμενον γὰρ ἐπὶ τὰ τοῦ στομάχου στενὰ τεθρομβωμένον πνίγει.

Κεφ. κζ'. [Περὶ λιθαργύρου.] Λιθάργυρος δὲ ποθεῖσα βάρους ἐπιφέρει στομάχῳ καὶ κοιλίᾳ καὶ ἐντέροις, μετὰ στρόφων ἐπιτεταμένων· ἐνίοτε δὲ καὶ τιτρώσκει τὰ ἐντερα διὰ τὸ βάρος· καὶ ἐπέχει τὰ οὖρα· παροιδεῖ δὲ αὐτῶν τὸ σῶμα, καὶ μολυβδῶδη ἀπρέπειαν λαμβάνει<sup>35</sup>. ἐφ' ὧν ἀρμόζει μετὰ τὸν ἔμετον πινόμενα σὺν οἴῳ, ὀρμίνου<sup>36</sup> ἀγρίου σπέρμα, σμύρνης <, ἢ ἀψίνθιον<sup>37</sup>, ὕσσωπον, σελίνου σπέρμα, ἢ πέπερι, ἢ κύπρου ἄνθος σὺν οἴῳ· περιστέρων τε ἀγρίων ἄφοδος ξηρὰ μετὰ νάρκτου ἢ οἴνου.

33) Ald. et Paull. consentiunt; ὄξει Asul. et sequi.

34) E. Gorraei et H. Stephani inquisitionibus patescit significatus huius vocis, quam vulgo πηλοποιητικὴν scribunt.

35) Sic Ald. et Cornar.; βάρους, καὶ τὸ σῶμα μολυβδῶδες γίνεται, τὴν ἀπρέπειαν λαμβάνον Asulan.

36) Paull. ὀρμίνου, manifesto errore, quamvis Galenus adversus sanguinem taurinum θέρμινον ἄλευρον imperet (de antidot. lib. 2. p. 143. ed. Lips.). Asul. τέρμινθος ἀγρίου.

37) Sic lego; quanquam in Ald. et Paull. σμύρνης < ἢ. ἀψίνθιον sit. Aëtius habet σμύρνης τριώβολον.

damus, aut succum similiter, aut silphii radicem et latricem ex posca: pariter et thymum ex vino, ac lixiviam, qua pileorum opifices utuntur. Ceterum salsi nihil exhibeatur: magis enim lac coit et in caseum densatur. Neque hos vomitus adiuvat: lac enim concretum in gulæ angustias semet insinuans facile strangulat.

Cap. XXVII. [De lithargyro.] Lithargyrus pota stomacho, ventri intestinisque gravitatem cum torminibus vehementibus affert: interdum et pondere suo intestina vulnerat, urinamque suppressit: intumescit vero corpus, plumbeamque concipit deformitatem. His secundum vomitionem subveniunt pota ex vino sylvestris hormini semen, myrrhæ drachma, aut absinthium, hyssopum, apii semen, aut piper, aut cypri flos ex vino: nec non et fimus palumbinus aridus cum nardo et vino.

Κεφ. κη'. [Περὶ ὑδραργύρου.] Ὑδραργυρος δὲ πο-  
θεῖσα τὰ αὐτὰ ἐπιφέρει τῇ λιθαργύρῳ, καὶ ἐπὶ τούτων δεῖ  
τοῖς αὐτοῖς βοηθήμασι χρῆσθαι· δοκεῖ δὲ αὐτοὺς ὠφελεῖν  
γάλα πολὺ<sup>38</sup> πινόμενον· ἐμείψαν δὲ καὶ οὗτοι.

Κεφ. κθ'. [Περὶ τιτάνου, σανδαράχης καὶ ἀρσενικοῦ.]  
Τίτανος, σανδαράχη καὶ ἀρσενικὸν ποθέντα, τὰ αὐτὰ ἀλ-  
γήματα κοιλίας καὶ ἐντέρων ἐπιφέρει μετὰ δηγμοῦ σφοδροῦ·  
ὅθεν προσφέρειν δεῖ ἅπαντα, ὅσα μετὰ τοῦ κινῆσαι, δύνα-  
ται τὸ εὐμενές<sup>39</sup>, καὶ πρὸς τὴν κοιλίαν ὀλισθηρὸν παρέχειν·  
οἷος ἐστὶν ὁ τοῦ ἱβίσκου καὶ τῆς μαλάχης χυλὸς, λίαν ὀλισθηρὸς  
ὑπάρχων· παρέχειν δὲ δεῖ καὶ ἀφέψημα λινოსπέρμου, ἢ τρά-  
γου<sup>40</sup>, ἢ ἱρύζης· καὶ γάλα πολὺ σὺν μελικράτῳ καὶ ζωμὸν  
λιπαροῦς καὶ εὐχύμους<sup>41</sup>.

Κεφ. λ'. [Περὶ λαγωῦ θαλασσίου.] Λαγωῦ δὲ θα-  
λασσίῳ ποθέντος, παρακολουθεῖ γένσις ὁμοία ἰχθύσι βρωμιώ-  
δεσιν· ἐν δὲ τῷ χρονίσει κοιλία τε ἀλγεῖ<sup>42</sup>, καὶ οὖρα ἐπέχε-

38) Hoc in Ald., omissum ab Asul. et rell.

39) Paull. *εὐμεές*, quem et Marcell. et Goupyl. et Sarac. sequuntur.

40) Sic Paull.; καὶ ὁ τῆς τράγου καλουμένης βοτάνης καρπός su-  
pervacanea μετάφρασις librarii senioris in Ald. et senioribus editt.

41) Vulgo nominat. *ζωμοί* etc.

42) X. *ἀργεῖ*.

Cap. XXVIII. [*De hydrargyro.*] Hydrargyrus pota  
eadem, quae lithargyrus, infert, quapropter et eadem ex-  
pocit auxilia. Lac autem largius potum auxiliari con-  
stat. Vomitus etiam minime negligendus est.

Cap. XXIX. [*De calce, sandaracha et arsenico.*] Calx,  
sandaracha et arsenicum eosdem ventris et intestinorum  
dolores cum vehementi rosione inferunt. Quamobrem ex-  
hibenda, quaecunque et acrimoniam temperare et blan-  
diorem ac lubricam alvi excretionem praestare possunt:  
cuiusmodi hibisci et malvae succus est: natura enim utri-  
que perlubrica. Praebendum etiam decoctum seminum  
lini seu tragi (frumentacei) vel oryzae, et lac copiosum  
cum aqua mulsa: iura denique pingua et boni succi.

Cap. XXX. [*De lepore marino.*] Hausto marino le-  
pore, virosus quidam sapor, qualis putentium piscium,  
percipitur: procedente vero tempore venter dolore affici-

ται· εἴ ποτε δὲ ἐκκριθείη, πορφυρίζοντα τῇ χροᾷ δοῖται· ἀποστροφὴ τε καὶ μῖσος πρὸς πάντα ἰχθύν· καὶ ἰδρῶσι δυσώδη· παρτίπεται δὲ αὐτοῖς καὶ ἔμετος χολώδης, ἐνίοτε αἵματι μεμιγμένος· οἷς δοτέον γάλα ὄνειον, ἢ γλυκὺ <sup>43</sup> συνεχῶς, καὶ μαλάχης ῥίζης καὶ τῶν φύλλων τὸ ἀφέψημα, ἢ κυκλαμίνου <sup>44</sup> ῥίζαν λείαν σὺν οἴνῳ· ἢ ἑλλεβόρου μέλανος ἢ σκαμμωνίας ὁποῦ < α' <sup>45</sup> μετὰ μελικράτου· ῥοῶν τε πυρῆνας <sup>46</sup>, ἢ κεδρίας λείας μετ' οἴνου· ποιῇ καὶ χηνὸς αἷμα ποθὲν θερμόν· μὴ δυνάμενοι δὲ οὗτοι ἰχθύας προσενέγκασθαι, μόνους τοὺς ποταμίους καρκίνους ἐφθοὺς ἐσθίουσι, καὶ πίνοντες οἶνον μεμιγμένον ἐπ' αὐτῶν, πέσσουσιν ὡφελούμενοι <sup>47</sup>· τεκμήριον δ' ἐστὶν ἐπ' αὐτῶν σωτηρίας, ὅταν ἄρξωνται ἰχθύας προσφέρειν.

Κεφ. λα'. [Περὶ φρύνου.] Φρύνος ἢ βάτραχος ἑλίου προσνεχθεὶς ἐπιφέρει οἰδήματα σώματος μετὰ ὥχρότητος ἐπι-

43) Sarac. suspicatur ἢ (γάλα) γυναικεῖον.

44) Paull. πευκεδάνου.

45) Mensuram addunt Ald. et Paull., omittit Asul., quem posteriores sequuntur.

46) Sic Aët., cod. X. et Cornar.; πυρήνων vulgo.

47) Sic credo esse textum Aldinae restituendum. Hic autem est: Καὶ πίνουσι οἶνον μεμιγμένον ἐπ' αὐτῶν καὶ πέσσ. ὡφ. Hoc ultimum omittunt seniores.

tur urinaque cohibetur: quae si quando redditur, purpurascens colore conspicitur. Accedit et omnis generis piscium aversatio ac odium, ac sudor graveolens: biliosus itidem vomitus, admixto interdum sanguine, subsequitur. Ilis propinandum assidue lac asininum aut passum, nec non et decoctum radicis foliorumque malvae, aut trita cyclaminis radix cum vino, aut hellebori nigri scammoniaeve succi drachma cum aqua mulsa: puniceorum porro nucleos aut cedrias tritas cum vino. Iuvat et anserinus sanguis adhuc calens epotus. Sed cum pisces omnes respuant, solos caneros fluviatiles elixos comedunt, et superbibito vino mixto cum levamento concoquunt. Signum denique salutis fuerit, si pisces in cibos admittere coeperint.

Cap. XXXI. [De rubeta.] Rubeta aut rana palustris assumpta corporis tumorem ciet, cum intenso pallore,



τεταμένης, ὡς δοκεῖν πύξω εἰκέναι, δυσπνοεῖν τε καὶ δυσω-  
 διά ὀδωδέναι τὸ στόμα· καὶ λυγμὸς αὐτοῖς ἔπεται, ἐνίοτε δὲ  
 καὶ σπέρματος ἀπροαίρετος ἔκκρισις. Εὐβοήθητοί τε τυγχά-  
 νουσι μετὰ τὸν ἔμετον λαμβάνοντες ἄκρατον πολὺν, καὶ κα-  
 λάμου ῥίζης < β', ἢ κυπείρου τὸ αὐτό· δεῖ δὲ αὐτοὺς καὶ  
 ἀναγκάζειν συντόνως περιπατεῖν καὶ τρέχειν, διὰ τὸ ἐν αὐ-  
 τοῖς ναρκῶδες· λούειν τε καθ' ἑκάστην ἡμέραν.

Κε φ. λβ'. [Περὶ βδέλλων.] Βδέλλας τὰς καταπινο-  
 μένας σὺν τῷ ὕδατι καὶ προσφυομένας τῇ καταπόσει ἢ τῷ  
 στόματι τῆς κοιλίας <sup>48</sup>, ἐλκούσας τὰ μέρη, καὶ φαντασίαν  
 ἐκμυζήσεως παρεχούσας, ὅπερ καὶ σημειῶν ἐστι τοῦ βδέλλας  
 καταπεπόσθαι, ἀποβάλλει ἄλμη καταρρόφουμένη, καὶ ὁπὸς  
 κυρηναικὸς, ἢ φύλλα, σιλφίου ἢ τεύτλου, σὺν ὄξει πινόμενα,  
 ἢ χιῶν σὺν ὀξυκράτῳ <sup>49</sup>. ἀναγαγαριζέσθωσαν δὲ νίτρον σὺν  
 ὕδατι καὶ χαλκάνθῳ σὺν ὄξει ἀνεθέντι <sup>50</sup>. πρὸς <sup>51</sup> τὰς δὲ τῷ

48) Vulgo ἐν τῇ καταπόσει τῷ στόματι, ubi pro actu deglutitionis  
 sumitur. At vero ipse meatus, seu pharynx et oesophagus, huic au-  
 ctori audit κατάποσις. Diosc. 3, 94.

49) Ultimum habent Ald. et Paull. (mendose χιτών). Ad notha,  
 nescio cur, ablegavit Asul.

50) Sic Paull.; ἀναγαγαριζεσθαι νίτρον vulgo.

51) Vulgo πρὸς deest. Deest etiam in Paulo, sed hic post διακρα-  
 τεῖν ponit ἐξέλκεις.

qui buxi colorem imitatur. Accedunt spirandi difficultas  
 et gravis oris halitus singultusque, ac interdum invita se-  
 minis excretio. His, qui sumere, facile succurritur post  
 vomitionem largiore meri potu et calami (aromatici) ra-  
 dicis binis drachmis aut cyperi totidem. Cogendi quoque  
 sunt, ut vehementi ambulatione cursibusque corpus exer-  
 ceant, ob torporem ex hoc morbo nasciturum. Quin etiam  
 quotidie lavandi sunt.

Cap. XXXII. [De hirudinibus.] Devoratae cum  
 aqua hirudines si gulae aut ori ventriculi adhaerescant, tra-  
 ctione partium nonnullam suctionis imaginem praebent:  
 atque hoc signo hausta hirudo deprehenditur. Eas muria  
 sorbitione excutit, et cyrenaicus liquor, aut folia silphii  
 vel betae cum aceto pota, vel nix cum posca. Nitrum  
 praeterea ex aqua gargarizatur itemque chalcanthus aceto  
 dilutus. Si vero faucibus haeserint, demisso in aquae ca-

βρόγχῳ προσφνεύσας, ἐμβιβάσας εἰς ἔμβασιν θερμὴν, δίδου ψυχρὸν ὕδωρ ἐν τῷ στόματι διακρατεῖν, καὶ ἐξελεύσονται.

Κεφ. λγ'. [Περὶ τῶν ἐπ' ὠφελείᾳ διδομένων, πολλάκις δὲ ἐπικινδύνων.] Προνοητέον δὲ καὶ τῶν ἐπ' ὠφελείᾳ διδομένων, ἐπιφερόντων δὲ πολλάκις κίνδυνον οὐχ ἥττονα τῶν ἄλλων φαρμάκων· ὡς ἑλλεβόρου λευκοῦ, καὶ θαψίας, καὶ ἐλατηρίου, καὶ ἀγαρικοῦ τοῦ μέλανος· πνιγμὸν γὰρ ἐπιφέρει<sup>52</sup> ταῦτα ἢ ὑπερκάθαρσιν· ἐφ' ὧν τοὺς πνιγμοὺς μὲν θεραπεύσομεν<sup>53</sup>, ὡς προεῖρηται ἐπὶ μυκήτων καὶ τῶν ὁμοίων· τὰς δὲ ὑπερκαθάρσεις τοῖς δυναμένοις ἐπέχειν τὰς ἐκκρίσεις στελοῦμεν. Καὶ τῶν μὲν δοκούντων ἐπ' ὀλίγον βλάπτειν, ἐνίστε δὲ κινδύνους ἐπιφερόντων, οὐκ ἀμελητέον· ὧν ἐστὶ τὸ ἄγριον πήγανον, καὶ τὸ μελάνθιον, καὶ οἱ νέαροι πάπποι· ἄνθη δὲ ἐστὶν ἀκάνθης τῆς καλουμένης κάκτου<sup>54</sup>. ἐφ' ὧν ἔμετος μόνος παραληγθεὶς ἀποκαθίστησι τοὺς λαμβάνοντας.

Κεφ. λδ'. [Περὶ τῶν συμφύλων ἡμῶν, ὕδατός τε ψυ-

52) Ald. ὑπερφέρει sphalmate.

53) Sic e Paull. emendavit Cornar. vulg. θεραπεύομεν δὲ, ὡς.

54) Sic e Paullo emendavit Sarac. vulg. νέαροι παγετοί. Ἄξος ἐστὶν ἄνθος ἀκάνθης τῆς καλουμένης ἄξου. De Cacto vid. Theophr. hist. 6, 4. Athen. 2, 70. Plin. 21, 57.

lidae solium aegro, frigidam ore continendam exhibeto, et ad eam prodibunt.

Cap. XXXIII. [*De iis, quae utiliter data tamen saepius periculum afferunt.*] Providendum etiam iis, quae, quamvis utiliter exhibeantur, haud minora tamen pericula, quam venena cetera, saepius afferunt: qualia sunt elleborus albus, thapsia, elaterium et agaricum nigrum: siquidem haec suffocationem inferunt aut nimiam purgationem. Ac suffocationibus quidem ea medentur, quae in fungorum similiumque mentione retulimus: nimias autem deiectiones iis, quae sistere possunt excretiones, coërcibimus. Neque vero negligenda, quae paullulum quidem nocere videntur, interim vero periculo non vacant: quo in numero sunt sylvestris ruta, melanthium, et recentes pappi, hoc est, flores spinae, quae cactus appellatur. Eos vero, qui talia sumere, sola vomitio restituit.

Cap. XXXIV. [*De domesticis, ut frigida aqua et*

χροῦ καὶ οἴνου.] Καὶ τὸ ψυχρὸν ὕδωρ ἀθρόον ποθὲν, ἢ ἄκρατος πολὺς καὶ γλυκὺς οἶνος ποθεῖς, μάλιστα ἀπὸ βαλανείου ἢ δρόμου καὶ τῶν εὐτόνων γυμνασίων πνιγμοὺς καὶ ἀλγήματα ἐπιφέρει· ἐφ' ὧν φλεβοτομία ταχέως παραληφθεῖσα καὶ κένωμα<sup>55</sup> λύει τὸν ἐπηρεζομένον κίνδυνον.

Καὶ περὶ μὲν τῶν σημείων τοῖς λαβοῦσι τὰ θανάσιμα τῶν φαρμάκων, καὶ τῆς ἀρμοζούσης αὐτοῖς θεραπείας, ἔτι δὲ προφυλακτικῆς ἀγωγῆς, ἐπὶ τοσοῦτον ἡμῖν εἰρήσθω· ὑπογράψομεν δὲ καὶ τὰς ἀντιδότους ἀναγκαιότατα καὶ γενναιότατα βοηθοῦσας, αἷς ἐχρήσαντο, τῇ τε Μιθριδατείῳ, καὶ τῇ δι' αἱμάτων, καὶ τῇ διὰ σκίγκων· ἃς διὰ τὸ ἐν ταῖς ἀντιδότοις ἀκριβέστατα ἀναγεγράφθαι παρατησάμεν ἀναγράψειν ἐνταῦθα.

55) Sic e Paullo emendavit iam Cornar. vulg. κενώσασα.

*vino.*] Aqua etiam frigida largius pota, aut meracum vinum ac dulce liberalius haustum, praesertim a balneo aut cursu et concitata exercitatione, strangulatus doloresque infert. In eiusmodi casu venaesectio protinus adhibita itemque per enemata vacuatio ab imminente liberat periculo.

Hactenus de signis veneficiorum eorumque convenientibus remediis, nec non et praecavendi modo dictum esto. Subiungeremus et usitata antidota maxime necessaria, quaeque inter cetera praeclare auxiliari constat: quale est Mithridatium, et quod e sanguinis variis generibus, et quod e scinco paratur. Verum, quoniam inter antidota accuratissime descripta sunt, visum est hoc loco eorum descriptione supersedere.

---



---

[ΠΕΔΑΝΙΟΥ ΔΙΟΣΚΟΡΙΔΟΥ]  
ΠΕΡΙ ΙΟΒΟΛΩΝ, ΕΝ ΩΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙ  
ΛΥΣΣΩΝΤΟΣ ΚΥΝΟΣ.<sup>56</sup>

---

Τ Ο Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Ν.

Τὸν μὲν περὶ τῶν ἰοβόλων ζώων καὶ θανασίμων φαρμάκων λόγον προτιθέμεθα διελθεῖν εἰς συμπλήρωσιν τοῦ θεραπευτικοῦ τρόπου<sup>57</sup>. Καὶ γὰρ οὐδενὸς τῶν ἄλλων ἦσσαν ἀναγκαῖόν ἐστι τοῖς ἰατροῦουσιν· ἐπειδήπερ καὶ κινδύνων καὶ

<sup>56</sup>) Hanc inscriptionem omnes ab Aldo ad Goupylum habent. Inchoat vero hic liber VII. in Ald. et sequentibus. Sarac. περὶ ἰοβόλων, καὶ τῆς τῶν ἀπ' αὐτῶν πληγέντων σημειώσεως καὶ θεραπείας.

<sup>57</sup>) Sic Marcell. in duobus codd. legit. Vulgo περιουτευτικοῦ; X. περιουδικοῦ. Sarac. suspicatur θηριακοῦ.

---

[PEDANII DIOSCORIDIS]  
DE HIS, QUAE VIRUS EIACULANTUR, ANI-  
MALIBUS LIBELLUS, IN QUO ET DE  
RABIOSO CANE.

---

P R A E F A T I O.

De bestiis venenatis et exitiislibus venenis agere iccirco nobis propositum est, ut curationis expleatur modus. Si- quidem pars haec non minus quam cetera necessaria est iis, qui medicinam faciunt: quippe cum eorum admini-

περιωδυνῶν<sup>58</sup> καὶ ἀλγηδόνων καὶ πλείστων ἄλλων κακῶν ἀπαλλάσσεσθαι τοὺς ἀνθρώπους συμβαίνει διὰ τῶν ἐν αὐτοῖς παραδιδόμενων.

Κατὰ δὲ τῶν ἀνωτάτω μερίζεται διχῇ, καθάπερ ἐν ἀρχῇ προαναπεφώνηται·<sup>59</sup> καὶ ὁ μὲν περὶ τῶν ἰοβόλων προσ-αγορεύεται θηριακός· ὁ δὲ περὶ τῶν θανασίμων ἀλεξιφάρμακος, ὃν τάξαντες δὴ προδείξομεν τὰ εἰωθότα παρακολουθεῖν· τὰ τε δυνάμενα βοηθεῖν πρὸς ἕκαστον αὐτῶν. Δεῖ δὲ πάντα πρόχειρα τὸν τεχνίτην ἔχειν, διὰ τὸ κατεπεῖγειν πολ-λάκις τὴν χρείαν· ὀλίγα μὲν γὰρ καὶ τῶν ἰοβόλων καὶ τῶν θανασίμων σχολαίους καὶ ἔξ ἀναβολῆς φέροι τοὺς κινδύνους, τὰ πολλὰ δὲ εὐθέως· καὶ οἱ δι' ἔμφυτον πονηρίαν ἐπιβου-λεύοντες ἐτέροις ἀνυπέρθετον τὸ κακὸν ἀπεργάζεσθαι βούλον-ται· καὶ οἱ διὰ μοχθηρὰν συνείδησιν ἢ χαλεπὴν περίστασιν ἐκουσίως προσενεγκάμενοι θανάσιμα, εἴτα φωραθέντες ἢ με-τανοήσαντες, ὅξυτάτης δέονται βοηθείας· καὶ πολέμιοι δὲ

58) Henr. Stephanus iam vulgarem lect. περιωδυνῶν sic emenda- vit. Posset tamen περτωδύνων retineri, cum τὸ περιωδυνον substant. occurrat.

59) Αναφωνεῖν hoc sensu in Arist. de mundo c. 5. Sed haec di- visio nusquam reperitur.

culo, quae in ea traduntur, periculis, cruciatibus dolori- busque et plurimis aliis malis homines liberari contingat.

Haec autem summatim bipartito distribuitur, ut iam initio annunciatum est: de bestiis enim virus eiaculantibus doctrina theriaca appellatur; alexipharmaca de exitiali- bus. Eum porro servabimus ordinem, ut, quae sympto- mata comitari consuerunt, priore loco praecipiamus, dein unicuique propria subiungamus remedia. Omnia autem in promptu artificem habere oportet, propter urgentem saepe- numero necessitatem. Etenim pauca sunt e virulentis ani- malibus venenisque, quae tarda temporisque dilationem admittentia pericula cieant, plura vero confestim (perni- ciem minantur.) Sunt praeterea, qui ingenita pravitate struentes aliis insidias, repentinum afferre exitium cu- piant. Alii, scelesti conscientia aut infausto rerum eventu instincti, sponte sua venena hauriunt: dein vero depre-

τόξα χρίοντες καὶ βέλη<sup>60</sup>, καὶ φρέατα καὶ πηγὰς δηλητηρίοις διαφθείροντες φαρμάκοις, ἀνυπέρθετον μηχανῶνται τοῖς ἐναντίοις τὸν θάνατον. Ἐφ' ὧν δὲ οὐχ εὐθύς, ἀλλ' ἐξυστερον ἀπαντᾷ τὸ κακὸν πέφυκεν, εἰ μὴ παραχρῆμα προληφθεῖ<sup>61</sup> τοῖς βοηθήμασιν, ἀνόνητος ἢ εἰσαυθις ἐπικουρία, τῆς φθοροποιοῦ δυνάμεως καταδραξαμένης<sup>62</sup> τῶν σωμάτων. Διόπερ, οὐχ ὅπως ἔτυχε καὶ τὴν ἐν τούτοις ποιητέον ἐντρέχειαν, ἵνα, ὅπερ<sup>63</sup> ἐν τοῖς ἄλλοις, τοῦτο καὶ ἐνταῦθα<sup>64</sup> ἢ τέχνη παρέχῃ τοῖς ἀνθρώποις τὴν σωτηρίαν. Παρὰ μὲν οὖν τοῖς ἀρχαίοις τοῦ θεραπευτικοῦ μέρους ὑπέλαμβάνετο οὗτος ὁ τρόπος· οἱ δὲ νεώτεροι αὐτὸν ἐχώρισαν, προφυλακὴν καὶ προφυλακτικὸν ὀνομάζοντες· τοῦ δὲ ὑγινοῦ καὶ τοῦ θεραπευτικοῦ μέσον τάξαντες, μικρὰ καὶ παντάπασιν ἐπιπολαίῳ πλανηθέντες πιθανότητι. Φασὶ γὰρ γίνεσθαι τρεῖς καταστάσεις τοῖς ἀνθρωπίνοις σώμασι· μίαν μὲν, καθ' ἣν ὑγιαίνουν· ἑτέραν δὲ, καθ' ἣν νοσοῦσι· τρίτην δὲ μέσσην ἐκατέρων,

60) Ex interpretibus priscis; πολέμια δὲ τόξων χρίοντες βέλη Ald., Asul., Marcell.; πολέμιοι Cornar., Goup., Sarac.

61) Cod. X. et Sarac.; παραληφθεῖ Ald.—Goupyl.

62) Cod. X. καταδραξαμένης.

63) Sarac. coniiicit ὥσπερ — οὕτως.

64) Asulan. et sequ. habent ὅλη, quod neque in Ald., neque in cod. X.

hensi, aut poenitentia ducti, celerrimam exposcunt opem. Atque hostes tela iaculaque inficientes, aut puteos fontesque venenis perniciosus corrumpentes, inevitabilem adversariis necem moliantur. In quibus autem haud subito, sed aliquando post malefici effectus contingere consueverunt, inutile est tum auxilium, obsessis iam corporibus vi veneni perniciosus. Proinde non vulgarem industriam adhiberi convenit, ut, quemadmodum in aliis malis, ita et in his ars mortalibus asserat salutem. Itaque apud priscos hic modus curandi ad therapeuticen pertinere existimabatur. At recentiores, posito discrimine, praecautiorem et prophylacticen nominarunt: medium ei locum assignantes inter hygienem et therapeuticen, parva nihilominus eaque levi persuasionem decepti. Enimvero tres esse corporum humanorum status agnoscunt; unum, quo secunda fruuntur valetudine, alterum, quo aegrotant, ter-



καθ' ἣν δοκοῦσι μὲν ὑγιαίνειν, εὐεμπτότως δὲ εἰς τὰ πάθη καὶ τοὺς κινδύνους ἔχουσι, διὰ τινα φθοροποιὸν ἐγκειμένην τοῖς σώμασι δύναμιν ὥς ἐπὶ τῶν ὑπὸ κυνὸς λυσσῶντος δεδηγμένων θεωρεῖται, καὶ μήπω περιπετωκῶτων<sup>65</sup> ὑδροφόβῳ· καὶ τῶν κανθαρίδας εἰληφότων, μήπω δὲ περιωδυνομένων ἢ δυσουρῶντων. Ἀναλόγως οὖν ταύταις ταῖς τρισὶ καταστάσεσιν εἰς τρία<sup>66</sup> διηρῆσθαι (φασὶ) τὴν τέχνην· εἰς τε τὸ ὑγιανόν, ὃ δὴ τηρητικόν ἐστι τῆς ὑγείας, καὶ εἰς τὸ προφυλακτικόν, ὅπερ κωλυτικόν ἐστι τῆς εἰς τὰς νόσους ἐμπτώσεως, καὶ εἰς θεραπευτικόν, δι' οὗ λύεται τὰ πάθη.<sup>67</sup>

Ῥητέον δὲ πρὸς αὐτοὺς· πρῶτον μὲν, ὅτι κατὰ τὴν ἐπιβολὴν<sup>68</sup> ταύτην οὐχὶ τρεῖς καταστάσεις περὶ τὸ σῶμα, ἀλλὰ τέσσαρες εἶναι λέγονται· ὥς γὰρ εἰσὶ τινες, οἱ μήπω μὲν νοσοῦντες, ἐπιτηδείως δὲ πρὸς τοῦτο διακείμενοι διὰ τὴν ἐπικειμένην αἰτίαν, οὕτως εἰσὶ τινες, οἱ μηκέτι νοσοῦντες, μήπω δὲ τὴν ὑγίαν εἰληφότες· ὅπερ ἰδεῖν ἐστὶν ἐπὶ τῶν ὑπο-

65) Sic cod. C. et X.; πεπιτωκῶτων Ald. — Goupyl.

66) Sarac. addit μέρος.

67) Cf. Galen. de constit. artis med. ad Patroph. p. 296. Ars med. p. 359. ed. Lips.

68) Cornar. et Goupyl. ἐπιβουλήν.

tium, medium inter utrumque, in quo positi recte quidem valere videntur, attamen parati sunt facili lapsu in morbos incurrere et in pericula, propter vim corruptricem, quae corporibus insidet. Quemadmodum in iis videre licet, qui, a cane rabioso morsi, nondum aquae horrore prehensi sunt: itidemque in iis, qui cantharidibus haustis nondum cruciatus sentiunt aut urinae difficultates. Huic igitur triplici corporum constitutioni tripartitam artis distinctionem merito (aiunt) respondere: hygienem nimirum, quae sanitatem tueatur, prophylacticen, quae morbos arceat, et therapeuticen, qua morbi solvantur.

Respondendum vero iis est: primum quidem, secundum hanc ipsam sumtionem non tres esse corporis constitutiones, sed quatuor. Sicut sunt nonnulli, qui, nondum aegrotantes, in morbum tamen, ob terrentem causam, proclives habentur; ita et alii, licet haud amplius aegro-

γυίως ἀπὸ ἀλλήλων τῆς νόσου, ἀναλήψεως δὲ καὶ ῥώσεως δεομένων· ἀλλ' ὅνπερ τρόπον ἢ ἐπιμέλεια τοῦ θεραπευτικοῦ μέρους τῆς τέχνης ἐστὶ, τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ τὸ προφυλακτικὸν ὑπὸ τοῦτω τετάχθαι προσήκει· βοηθήμασι γὰρ χρῶμεθα καὶ τοῖς σφοδροτάτοις ἐν τῇ προφυλακῇ, κατασχάσασθαι βαθυτέρῳ, καὶ καύσει, καὶ περικοπῇ, καὶ δηγτικοῖς ἐπιθέμασι, καὶ προποτισμοῖς, καὶ ἄλλοις πλείοσιν· ἀλλὰ γε οὕτως εἰσὶ τινες ἀγνώμονες, ὥς μηδὲ βοηθήματα καλεῖν τὰ προφυλακτικά· οὐ ῥᾶδιον εἰπεῖν καθ' ὃν τινα λόγον· καὶ τὸ ὄνομα μὲν γὰρ προφυλακῇ, καὶ ὁ τῆς ἐνεργείας δὲ τρόπος τοῦτο αὐτὸ πάντως βοήθημα ἀποδείκνυσιν· πῶς δὲ οὐχ ὑποτάσσουσι τῇ διαιρέσει καὶ τοῖς ἐν ταῖς λοιμικαῖς περιστάσεσιν, οὕπῳ μὲν ἐαλωκότας πάθει, διακειμένους δὲ πρὸς τοῦτο ἐπιτηδεύως πως διὰ τὴν ἐκ τοῦ περιέχοντος ἀφορμὴν; Εὔποιοι δ' ἂν τις, καὶ τὴν τῶν ὑγιεινῶν παραγγελιῶν ἀγωγὴν οὐδὲν ἕτερον ἢ προφυλακτικὸν ὑπάρχεν· δυσπαθῇ γὰρ τὰ σώματα καὶ στερεὰ παρασκευάζειν πειρώμεθα, χάριν τοῦ δυσάλωτα γενέσθαι ταῖς νόσοις· τὸ δὲ κυριώτατον ῥητέον ἐστὶ, τὰ μέρη

tantes, pristinae tamen valetudini nondum restituti sunt: id quod in iis cernere licet, qui nuper a morbo liberati virium recreationem ac confirmationem desiderant. Sed quemadmodum haec curandi ratio ad therapeuticen pertinet, ita et prophylacticen huic subiici par est. Utimur enim adminiculis in praecautione et violentissimis, scilicet scarificatione altiore, ustionibus, et amputationibus, rodentibus fomentis, similibus sorbitionibus et pluribus aliis. Attamen adeo rudes sunt nonnulli, ut prophylactica praesidia haud adminicula esse velint. Nec facile quis dixerit, quamnam ob causam. Namque et ipsa praecautio appellatio et modus facultatis, adminiculis esse omnino accensenda illa praesidia, probant. Sed quomodo non complectuntur divisione illa eos, qui in pestilenti constitutione nondum correpti morbo, propter ambeuntis tamen aëris opportunitatem prout in eum redduntur? Dicit forte quispiam, nec salubrium praeceptorum observationem aliud esse, quam prophylacticen, quippe cum corpora morbis minus obnoxia reddere ac firma nitamur, ne

τῆς ἰατρικῆς οὐχὶ ταῖς καταστάσεσι τοῦ σώματος δεῖν διηρῆσθαι<sup>69</sup>, ἀλλὰ φυσιολογεῖν διὰ τὸ σημειωτικὸν ἰδίᾳ ἕκαστον τῶν ἄλλων, ὥς ἐν τοῖς οἰκείοις τόποις ὑποδείκνυμεν. Πρὸς τούτους μὲν οὖν οὐ πλείονα ῥητέον. Ἐκεῖνο δὲ μᾶλλον παρασημειωτέον, ὅτι καλεῖται μὲν ἀναιτιολόγητα τὰ ἀπὸ τῶν ἰοβόλων ζώων καὶ τὰ ἀπὸ τῶν θανασίμων συμβαίνοντα φαρμάκων<sup>70</sup>. Διὰ τοῦτό γε καὶ παρατηρητικῆς τυγχάνει ἀναλογητικῆς τε τέχνης προσπεσούσης ἀπόρημα, καθ' ἣν<sup>71</sup> δὴ ὁ λόγος πεπίστευται· οὐδὲ γὰρ ἐν τῷ καθάπαξ τοῦτο ἦν ἀληθές· ἀλλ' αἰὲ τὸ παρέλκον καὶ μηδεμίαν χρεῖαν ἐπὶ τινὰ τῶν ἔργων παρεχόμενον, δυστόχαστον<sup>72</sup>, καὶ τελέως ἀναιτιολόγητον ὑπάρχει κατὰ τὰς ιδιότητας· τοῦτο δὲ ἐπὶ τῶν θανασίμων φαρμάκων καὶ τῶν ἰοβόλων ζώων εἰωθὸς ἀποβαίνειν. Τὸ μέντοι εὐχρηστον<sup>73</sup>, εἰς τὰ ἔργα καὶ τὸ παρέχον τὰς τοῦ θεραπεύειν ἀφορμὰς, οὐτ' ἀκατάληπτόν ἐστιν, οὐτ' ἀναιτιολόγητον· καὶ μᾶλλον τις ὁρμώμενος ἀπ' αὐτοῦ, πίστιν

69) Vulgo ἀναλόγως εἰρησθαι.

70) Quod interpositum habent: καὶ πρὸς ταῦτα βοηθεῖ, nec huius loci, nec in cod. X. est.

71) Καθ' apposui, ut accus. ne ψιλός et obscurus maneat.

72) Εἰ redundat.

73) Sic cod. Par. apud Goupyl.; εὐχρηστον vulgo.

aegritudinibus tam facile succumbant. Tanquam summa vero rei tenendum est, quod medicinae partes haud ita distribuendae sint, ut constitutionibus corporis respondeant: sed in naturam cuiusque seorsim inquirendum est, quemadmodum id congruis locis docemus. Cum illis igitur non est pluribus agendum. Illud potius animadvertitor, affectuum, qui a virulentis animalibus venenoque contrahuntur, causas latere videri: unde et dubia nascuntur circa praeservationem in analogia ad artem adplicanda, quanquam vulgari expositioni fides tribuatur. Neque tamen id prorsus verum est. Sed id, quod superfluum est ac nullum in operibus usum praebet, haud facile est assequi: quia causa exponi iuxta proprietates prorsus nequit. Id autem in exitiis venenis ac virulentis animalibus evenire solet. Verumtamen, quod ad opera est utile, quodque medendi exhibet opportunitates, id nec incomprehensibile est, nec causa eius penitus latere existimatur.



καὶ παρῶρησίαν ἔχειν διεβεβαιώσατο περὶ τῆς καταλήψεως τῶν ἀδελῶν· διαφέρουσι γὰρ ταῖς αἰσθήσεσιν ἀπὸ τῶν ἰδίων, διὰ τὴν σμικρότητα, καταλήψεως δὲ ἐναργοῦς ἐξ ἀλλήλων τυγχάνουσιν· ἱκανῶς δὲ ἐφώδευσε τοὺς τρόπους Διοκλῆς ἐν τῷ πρὸς Πλείσταρχον ὑπομνήματι, γράφων ταῦτα κατὰ λέξιν. Γνοίη δ' ἂν τις τοῦτο καὶ ἐπ' ἄλλων οὐκ ὀλίγων καὶ ἐπὶ τῶν ἐχιδνῶν καὶ σκορπιῶν καὶ ἐτέρων τοιούτων, ἀτενίσας δὲ ὡς ἀδελὰ καὶ μικρὰ τὸ γένος ὄντα, μεγάλων αἷτια κινδύνων καὶ πόνων γίνεται· ὧν οὐδὲ ἰδεῖν ἓνα ῥάδιον παρά τινα σμικρότητα καὶ ἰσχὺν ἀπολειπομένην αὐτοῖς ἀπὸ τῶν ἄλλων θηρίων· ὀπηλίκον γάρ τι νομίζειν τὸ μέγεθος, ὅσον ἀπὸ τῆς πληγῆς, τοῦ σκορπίου καὶ τῶν ἄλλων τῶν τοιούτων τῇ σαρκὶ λυμαينوμένων; ὧν τὰ μὲν ἐστὶ ποιοῦντα πόνον ἰσχυρόν, τὰ δὲ σήποντα, τὰ δὲ κτείνοντα συντόμως· ἢ τὸ διὰ τοῦ φαλαγγίου δῆγματος ἐνιέμενον καὶ ὅλον τὸ σῶμα διαπονούμενον; οὐδὲ γὰρ ἂν διαγνῶναι τὸ μέγεθος αὐτῶν δύναιτό τις, διὰ τὸ παντάπασιν εἶναι μικρόν. Ὅτι μὲν οὖν

Quin potius ab eo aliquis proficiscens certiore de abditorum comprehensione fiduciam se comparasse affirmabit. Nam etsi exiguitate differant, sensibus percepta, a peculiaribus rebus, evidenter tamen ex ipsis inter se collatis deprehenduntur. Diocles autem in eo commentario, quem ad Plistarchum scripsit, modos abunde persecutus est, ad verba ita loquens. Nosse aliquis hoc potest cum in aliis non paucis, tum in viperis et scorpionibus et aliis id genus, animo reputans, quantorum, licet parva sint et inconspicua, discriminum dolorumque caussae sint. Ex iis constat nonnulla ne cerni quidem ob parvitatem posse, robore etiam a ceteris bestiis separari. Quantula enim censebitur, si vulnus spectes, scorpionis et aliorum eiusmodi corporibus nostris perniciem afferentium, magnitudo? Et horum tamen aliqua vehementes excitant cruciatus, alia putrefaciunt, alia cito enecant. Rursus, quantum, quacso, aestimabitur, quod a phalangii morsu ingeritur venenum, quodque universum corpus magnopere affligit? Magnitudinem certe aliquam vix ac ne vix quidem deprehendere quisquam possit, dum id ipsum animal pror-

πρὸς τὰς διαθέσεις ταῦτά ἐστιν, ὁμολόγηται παρὰ πάντων· ὅτι δὲ καὶ ἀκριβῶς κατείληπται, τῷ τὴν δύναμιν αὐτῶν γενέσθαι τινὰ φθοροποιὸν, ἣτις καταμινυμένη τοῖς σώμασιν αἰτία τῶν συμβαινόντων κακῶν γίνεσθαι συγκεχώρηται, καὶ τοῦτο πεπίστευται. Καὶ οὐδεὶς ἂν οὕτως εὐρεθείη φιλόνοκος, ὥς ἄλλοθεν φῆσαι τὰς ὀχλήσεις καὶ οὐχὶ δι' ὕλης φθοροποιοῦ καθαπτομένης τῶν σωμάτων μόνων ἀπὸ μέρους συμπίπτειν. Τοῦτο δὲ ἦν τὸ πρὸς τὰ ἔργα τῆς τέχνης χρησιμεύοντα, κατὰ πᾶν ἔργον, τὸ ἔργον<sup>74</sup> τοῦτο ποιοῦμενον ὑπαγορεύειν, ὥστε ἡμᾶς μηδὲ βλάπτεσθαι τι κατὰ πάντα ὑπὸ τῆς κατὰ τὴν ιδιότητα ἀκαταληψίας· τῆς κοινῆς αἰτίας καὶ τότε ἐνδείκνυσθαι δυναμένης, βεβαίως κατελλημμένης. Διὸ καὶ ὁ Ἐρασίστρατος, ἐπισκώπτων τὴν αὐθάδειαν τῶν ἐμπειρικῶν<sup>75</sup>, αἰτίαν τοῖς ἀναιτιολογῆτοις ἀνέθηκεν· οὐ συγχωρῶν αὐτοῖς, τὴν αἰτίαν τὴν ἐπαναβεβηκυῖαν καὶ καθολικὴν ἄληπτον ἐπὶ τῇ νόσῳ ὑπόσχειν· τῇ τε περὶ αἰτιῶν

74) Sic Cornar., Goupyl. et Sarac.; τὸν ἔργον Ald., Asulan., Marcell.

75) Solius Philini Coi aetatem Erasistratus attigit.

sus exigua mole constet. Ergo haec ad dispositiones potius referenda esse, apud omnes est in confesso. Id quoque exacte deprehensum est, vim quamdam ipsis inesse corruptricem, quae, insinuata corporibus, malorum, quae accidunt, caussa sit, id quod acceptum est iam dudum et omnium consensu persuasum. Neque quisquam invenietur tantopere contentiosus, ut aliunde perturbationes existere asserat, neque e materia corruptrice, ex parte tantum corpora contingente. Id erat, quod inter utilia artis opera in omni opere dicere par erat, quatenus res hoc efficiat, ut nihil prorsus nos laedat incomprehensa causae proprietates, quandoquidem communis caussa tunc ostendi potest, cum firmiter comprehensa est. Ideo et Erasistratus, cavillans empiricorum arrogantiam, quorum causae explanari non posse credebantur, eorum causam in medium protulit: illis minime largiens, causam morborum supremam et communem incomprehensibilem esse, et hanc in eo, quem de causis edidit, commentario

γραφῇ ταύτην διαλαμπρύνων<sup>76</sup>. τῷ τε μὴ λέγειν, ἐπὶ τίνων ἀρκούμεθα τῇ τετριμμένη θεραπείᾳ, οἷον ἐπὶ τῶν θηριοδῆκτων καὶ θανασίμων, ἢ ἐπὶ τῶν λοιπῶν ἀρκεσθησόμεθα τῇ παρατηρήσει, τῆς τῶν αἰτιῶν προσλήψεως χωριζόμενοι τελέως· πρῶτον μὲν κατὰ γένος οὐκ ἀκατάληπτά<sup>77</sup> εἰσιν· ὅτι μὲν γὰρ δύναμις ὑπάρχει φθαρτικὴ καὶ τῶν ὑποκειμένων ἀλλοιωτικὴ, καὶ τούτων<sup>78</sup> κατὰ γένος, οὐ μὲν κατ' εἶδος ὑπογράφει θεραπείαν, δι' ἧς<sup>79</sup> ταῦτα ἀμβλυντέον καὶ κατεργαστέον. <sup>80</sup>Ὅτι δέ φησιν· ἦλθέ τις ἐφ' ὕδωρ γλυκὺ καὶ πότιμον, καὶ πρὸ τῆς παρατηρήσεως ἐπ' ἔμετον, διατάσιν<sup>80</sup> τοῦ πεπληγότος ἢ δεδηγμένου μέρους ἀποθηλασμόν<sup>81</sup>, σίκυας προσβολὴν, ἐκτομὴν καυτηρίων, φαρμάκων τὸ αὐτὸ δυναμένων ἐπιθεσιν, τὸ τελευταῖον ἀποκοπὴν τοῦ μέρους, ἀνελογίστατο, τῶν πεφυκότων φαρμάκων εἰς τὴν ἐπιφάνειαν φέρεσθαι τινα, τῇ ἐνιεμένη εἰς τὰ κατὰ βλάβος ἐναντιοῦσθαι φθορᾷ. Ταῦτα

76) Vulgo διαλευκάνων.

77) Sic Goup. et Sarac.; οὐκ ἄληπτα cod. X.; οὐ κατόληπτα Ald., Asul., Cornar.

78) E cod. X. Sarac. sic; ἐκ τῶν Ald. — Goup.

79) Sic Ald., cod. X. et Sarac.; διό Asul., Cornar. et Goupyl.

80) Cod. Par. apud Goup. διάσπασιν.

81) Sic Asul. et sequ.; ἀποθλασμόν Ald.

illustrans. (Quin et illos reprehendit,) quod non prae-  
cipiant, in quibus dispositionibus satisfaciatur trita me-  
dendi ratio. Siquidem (secundum eos) in venenatorum  
morsibus, veneficiis et ceteris id genus observatione con-  
tenti fuerimus, comprehensione caussarum penitus able-  
gata. At vero primum generatim non incomprehensibiles  
sunt: etenim vis exstat corruptrix subiectaque corpora ita  
immutans, ut etiam perimat: haec quidem generalem, sed  
non specialem subindicat curationem: quae scilicet vim  
habeat (virus) hebetandi ac expugnandi. Dum vero sub-  
iunxit: „Venit quis ad aquam dulcem ac potulentam, et  
„ante observationem vomitum provocavit, vulnus dilata-  
„vit, aut partem demorsam exsugere iussit, cucurbitulas ad-  
„movit, cauteriorum ope exsecuit, imposuit remedia idem  
„valentia, postremo partem amputavit:“ animo versasse  
videtur nonnulla eorum remediorum, quae, ad summam  
cutim adhibita, perniciosi ad intima immissae adversari



μὲν οὖν, δι' ὧν εἶρηκεν Ἑρασίστρατος, πάντα εἶρηκε καλῶς καὶ τοῖς ἔργοις ἀκολουθῶς.

Θαυμάζειν δέ ἐστιν ἐπὶ τῶν Μεθοδικῶν, οὔτινες οὐ συγχωροῦσιν<sup>82</sup>, αἰτίαν εἶναι τὴν φθοροποιὸν ἐνιμένην δύναμιν, τῶν ἀπ' αὐτῆς γινομένων ὁκληρῶν, ἀλλὰ τρόπον μόνον<sup>83</sup>, ἀνοήτως οὕτω τῷ ὀνόματι προσέχουσι· φθοροποιὸς γὰρ καὶ παρ' αὐτοῖς ἀντικρὺς ἡ ἐνιμένη δύναμις προσαγορεύεται· τὸ δὲ φθοροποιὸν εἶναι τι, αἰτίας, οὐκ ἄλλου τινὸς ἔργον<sup>84</sup> ἐστίν. Φασὶ δὲ τὸ μὲν ὄνομα τὸ μάρσιππος καὶ τὸ ἀνακαλύπτειν τοῖς λοιποῖς πᾶσι παραπλήσιον ὑπάρχειν, ἐφ' ὧν μέρη τινὰ τῶν λέξεων οὐχ ὅτι κατὰ δύναμιν, ἀλλὰ κατὰ ψιλὴν περιείληπται τὴν ἐκφορὰν· ἐν τε γὰρ τῷ μάρσιππος καὶ τῷ ἀνακαλύπτειν, ὡς τὰς κυρίας<sup>85</sup> καὶ προηγουμένας οὐκ ἔχει σημασίας, οὕτω καὶ ἐν τῷ φθοροποιεῖν παρελκόντως καὶ οὐ κατὰ δύναμιν ἐντέτακται. Μεταβαίνουσι δὲ ἐνταῦθα ἐπὶ τὰς τῶν αἰτίων διαφορὰς, καὶ λέγουσιν, ὅτι τῶν αἰ-

82) Lacunae cod. interpositum habet ἀπλῶς.

83) Vulgo μέν.

84) Sic cod. X.; ἔργου vulgo.

85) Sic cod. X.; κυρίας Ald. — Goup.

possent. Haec itaque, quae disseruit Erasistratus, tum veritati, tum artis operibus sunt consentanea.

At Methodicos demirari licet, qui quidem non concedant, corruptricem vim corporibus iminissam esse causam perturbationum ab ea profectarum, sed solummodo modum: usque adeo inepte nomini insistent. Manifesto enim et apud ipsos vis immissa corporibus corruptrix appellatur. Corruptricem autem vim habere, caussae, non alius cuiuspiam rei opus est. Aiunt porro, voces μάρσιππος et ἀνακαλύπτειν reliquis omnibus esse similes, in quibus partes quaedam dictionum non pro virtute, sed iuxta nudam enunciationem comprehensae sunt. Sicut enim in vocibus μάρσιππος et ἀνακαλύπτειν non principes et praevis significatus insunt, ita et vox φθοροποιός supervacuo modo, nec secundum virtutem, coagmentata est. Dein trans-eunt ad caussarum differentias, affirmantque caussarum quasdam esse praecursorias (praeparatorias), quae, post-

τίων τινὰ μὲν ἔστι τὰ προκατάρξαντα, ἃ ποιήσαντα πάθος χωρίζεται· οἷον κόπος καὶ ψύξις, ἔγκαισις, καὶ τὰ παραπλήσια· τὰ δὲ συνεκτικά, διὰ τὸ ποιεῖν τὸ πάθος καὶ παραμένειν, τουτέστιν, ὧν μὲν παρόντων τὰ ἀποτελέσματα πάρεστιν, αὐξανομένων δὲ αὖξεται, καὶ μειουμένων μειοῦται, καὶ παυσαμένων παύεται· καὶ αὐτοτελῇ δύναται εἶναι καθ' ἑαυτὰ παραγινόμενα τῶν ἀποτελεσμάτων. Καὶ τοιαῦται μὲν τῶν αἰτίων αἱ δοκιμώταται διαφοραί· τὸ δὲ φθοροποιὸν οὐδεμιᾷ τούτων ὑποτάσσεται πέφυκε· προκαταρκτικὸν μὲν γὰρ οὐκ ἔστιν, ἐπειδήπερ τὸ πάθος αὐτὸ παραμένει καὶ τοῦ σώματος οὐ χωρίζεται.<sup>86</sup> συνεκτικὸν δ' οὐκ ἂν λέγοιτο· πλεῖστον μὲν γὰρ τοῦτο πάρεστι<sup>87</sup>, καθάπερ ὑπὸ λυσσῶντος κυνὸς δεδηγμένον γίνεται. Εἰ δὲ μὴ προκαταρκτικὸν γίνεται, μηδὲ συνεκτικὸν, οὐδὲ αὐτοτελές, οὐδὲ συναίτιον ἂν εἴη. Εἰ δὲ ἐκ μηδεμιᾶς διαφορᾶς τῶν αἰτίων ἄγειν δυνησόμεθα τὸ φθοροποιόν, συγχωροῦμεν αὐτὸ μηδὲ αἷτιον ὑπάρχειν. Τοιούτων δὲ λεγομένων καὶ ὄντων, τὸ μὲν τινα τῶν ὀνομάτων

86) Galen. differ. sympt. p. 44. 45. ed. Lips.

87) Cael. Aurel. acut. 3, 15. p. 227. ed. Almelov. Forte hic ἀλ-  
λαχόθεν omissum.

quam morbum effecerunt, a corpore separantur, cuiusmodi sunt labor, frigus, aestus et similia: alias (caussas) esse continentes, quae excitato morbo etiamnum permanent, hoc est, quibus praesentibus et effectus integri adsunt, quibus incrementibus et effectus augescunt, decrementibus minuuntur, desinentibus cessant; quae igitur per se perfectae (sinem per se constituentes) dici possunt, quia, dum adsunt, affectus omnes per se inducunt. Tales quidem sunt celebratissimae caussarum differentiae, quarum neutri τὸ φθοροποιόν subiici recte potest. Praeparatoria enim causa non est, quoniam passio permanet, nec a corpore separatur: nec continentem caussam id quis dixerit, quoniam plerumque (aliunde) adest, quemadmodum fit in iis, qui a cane rabioso demorsi sunt. Quodsi neque praeparatoria, neque continens causa fuerit, utique neque perfecta dici potest, neque adiuvans causa. Quando vero τὸ φθοροποιόν nulli caussarum discrimini accensere possumus, fateamur necesse est, neulquam id caussam esse.

ἐν αὐτοῖς μὴ ἔχειν μέρη σημαντικά τῶν πραγμάτων, ἀλλὰ κατὰ ψιλὴν τὴν ἔκφοράν πεποιημένα, συγχωρητέον. Ὅτι δὲ μὴ πάντα ὑποληπτέον τοιαῦτα ὑπάρχειν, ἀλλὰ παντελῶς ὀλίγα· οὐδὲ τὸ ποιεῖν ἐν τῷ φθοροποιῷ παραπλησίως τοῖς παραλειφθεῖσιν<sup>88</sup> ἐξενήνεγκται· κυριωτάτην δὲ ἔχει τὴν σημείωσιν· ὥς γὰρ τὸ τῆς φθορᾶς ὄνομα τῆς ἐπὶ τὸ χεῖρον μεταβολῆς σημαντικόν ἐστιν, οὕτω καὶ τὸ ποιεῖν παραληπτέον, μηδὲν ἐν τῷ φθορᾷ ἔχειν δηλοῦν· τούτου δ' οὐ πρὸς ἐξακούουσι πάντες, τελῶς ἄσημον γίνεται τὸ ὄνομα, καὶ παραπλήσιον τῷ παιδί ἔχειν, δίψος.

Εὖ διδάσιν, ἀπὸ τῆς φθορᾶς ὑγιᾶ γίνεσθαι τὴν νόσον, συγχωροῦσι δηλονότι καὶ ἐπὶ τοῦ ποιεῖν, εἰ μὴ τι φθορᾶς ἀπεργαστικόν ἐστι· πᾶν δὲ τὸ ποιοῦν καὶ ἀπεργαζόμενόν τι καθ' ἑκάστον αἴτιον δέικνυται τῶν ὑποκειμένων ἐν τοῖς σώμασιν, ἐπὶ τε τῶν ἐνιεμένων καὶ θανασίμων φαρμάκων· ἀλλὰ καὶ ὑποπίπτειν τί φασὶ ταῖς τῶν αἰτίων διαφοραῖς· πεπλά-

88) Sic Ald. et cod. X.; ὑπολειφθεῖσιν Asulan. — Sarac.

Hisce hoc modo dictis constitutisque, esse vocabula quaedam, quae in se non habeant partes rerum significatrices, sed iuxta nudam effictas pronunciationem, concedendum est. Verum plane perpauca, nedum omnia talem nascisci conditionem, existimandum est. Neque enim ποιεῖν in hoc nomine φθοροποιόν, perinde ac in reliquis exemplis vocum partes, enunciat, sed longe principem obtinet significationem. Nam, quemadmodum φθορᾶς nomen mutationem in peius, sic et hoc verbum ποιεῖν ita accipiendum est, ut nihil declaret in eo, quod corruptioni obnoxium est, atque, quod omnes palam audiunt, vox sit nihil penitus significans, sicut infanti (vocalae) ἔχειν et δίψος.

Quodsi largiuntur, ex corruptione morbum sano contingere, concedunt utique, vim in verbo ποιεῖν esse, siquidem aliquid est, quod corruptionem efficiat. Omne autem, quod aliquid facit ac perficit, per singulas causas ostenditur subiectorum in corpore, idque tam in iis, quae ingeruntur, quam in letalibus venenis. Sed cum asserunt, differentiis causarum aliquid tribuendum esse, falluntur



τηνται δὲ κἀνταῦθα, διαίρεσιν ἀκριβῆ οὐκ εἰληφότες· λέγεται δὲ καὶ παρὰ τοῖς δογματικοῖς αἴτιον ὑπάρχειν καὶ αὐτὸ κατὰ μὲν τι παρασκευαστικόν, κατὰ δέ τι συνεκτικόν· ὡς βουβώνων ἔλκος καὶ βουβώνων πυρετὸς, καὶ τὸ συνεφιστάμενον τῷ ἀποτελεσματικῷ, χωριζόμενόν τε ὡς πτώμα κατάγματος· καὶ καθόλου δὲ, ὅταν τι κατὰ τὴν ἑαυτοῦ φύσιν αἴτιον ὑπάρχῃ, μὴ περιέχεται δὲ ἐν τινι διαίρεσει, μοχθηρὸν μὲν, οὐχὶ δὲ καὶ αἴτιον τῆς τῶν ὁμογενῶν περιγέγραπται φύσεως. Ὅτι δὲ τὸ φθοροποιόν ἐστὶν αἴτιον, ἐλέγχεται μὲν καὶ ἀπὸ τοῦ ὀνόματος· δείκνυται δὲ ἐναργέστερον ἐπὶ τῶν συμβαινόντων. Τί γὰρ αἴτιον ὑπέλαβον εἶναι μετὰ τὴν ἐκ τοῦ δακέτου πληγὴν, ἢ τὴν ἐπιγινομένην ὑπὸ τοῦ ζώου δύναμιν, καὶ τὸν εἰς τὰ σώματα βαλλόμενον ἰόν; μήτε ψύξιν, μήτε ἔγκαυσιν, μήτε ἔκκοπὴν<sup>89</sup>, μήτε ἀπειρίαν, μήτε ἄλλό τι παραπλήσιον ἔχοντες αἰτιᾶσθαι. Ἐπεὶ δὲ καὶ ταῖς διαφοραῖς χαίρουσι τῶν αἰτίων, τὰ μὲν καλοῦντες συνεκτικά, τὰ δὲ προκα-

89) Singularis significatus ab ἔκκοπος, quod idem ac ἔγκοπος, κατὰκοπος.

et in hac parte, quoniam haud exactam proposuerunt divisionem. Apud dogmaticos vero dicitur ea caussa partim praeparans, partim continens, quemadmodum e bubonibus tum ulcus tum febris exsistit, et quae ad effectum plenum producendum confert, tum vero secedit e corpore, sicut lapsus (ex alto) fracturam affert. In summa, quoties quidpiam suapte natura caussa fuerit, nec ulla caussarum divisione comprehenditur, molestum quidem est, neque simul tanquam caussa naturae eorum circumscribitur, quae eiusdem generis sunt. Sed, quod φθοροποιόν caussa sit, probatur quidem ipso nomine, ostenditur etiam apertius ex iis, quae contingunt. Nam post acceptum a venenata bestia ictum, quam, quaeso, aliam arbitrantur esse caussam, nisi vis ipsa fuerit ab animante profecta, ac illapsum in corpora virus? Quandoquidem neque frigus, neque aestus, neque lassitudo, neque digestionis labes, neque aliud quicquam caussari possunt. Quoniam vero etiam caussarum differentiis gaudent, has continentes, illas praeparatorias appellantes, regerendum

ταρκτικά, λεκτέον αὐτοῖς, ὅτι καθ' ἕτερον δὴ τούτων αἰτιόν ἐστι· τὸ προκαταρκτικὸν ῥηθήσεται δὲ ἀπὸ τοῦ προάγειν τοῦ ἀποτελέσματος καὶ τοῦ προϋπόστασιν λαμβάνειν τοῦ σώματος<sup>90</sup>, συνεκτικὸν δὲ, ἐπειδὴ τῶν παθῶν παρόντων καὶ αὐτὸ πάρεστι, καὶ χωρισθέντος αὐτοῦ χωρίζεται καὶ τὰ συμβαίνοντα περὶ αὐτό.

Περὶ τούτων μὲν οὖν οὐ πλείω ῥητέον. Θετέον δὲ, δύναμιν ἔσωθεν φθοροποιὸν ἐναργεστάτην εἶναι αἰτίαν, καὶ τὸν προηγούμενον σκοπὸν τοῦτον ποιητέον· καὶ πρὸ μὲν τῆς κατασκήψεως τῶν παθῶν ποικίλως διαγωνιστέον, μέχρι τοῦ παντελῶς αὐτὴν ἀποσκευασθῆναι τῶν σωμάτων· τοῦτο μὲν, ὑπεξαίρουμένην, δι' ὧν εἰσῆι μερῶν· τοῦτο δὲ, κρατουμένην περὶ ἐνὶ, καὶ μάλιστα οὐ κυρίῳ τόπῳ, πρὶν εἰς τὸ βάθος ἀπελθεῖν καὶ σπλάγχνων ἄψασθαι· τοῦτο δὲ ἀποπλυνομένην ἢ ἐπικιρνωμένην, ἐπειδὰν φθάσῃ χωρεῖν διὰ τῶν σωμάτων· ὅτε μὲν οὖν ὑπέρξεις αὐτοῖς, κομιδὴ ἐπὶ τῶν θανασίμων φαρμάκων δι' ἐμέτων γίνεται· ἐπὶ δὲ τῶν ἰοβόλων διὰ τοῦ

90) Sarac. exemplo correxī vulgarem scriptionem: καὶ τὸ πρ. λαμβάνον.

iis est, utroque modo esse caussam. Ac praeparatoria quidem dicetur, quod effectum plenum praecedat, et corporis substantiam praeoccupet: continens vero, quod passionibus praesentibus et ipsa adsit, hacque remota abscedant simul, quae ex ipsa evenerant.

Sed de his hactenus. Statuendum autem, vim intrinsicam corruptricem manifestissimam esse caussam, et hunc principem nobis proponendum esse scopum. Idcirco, antequam irruant passiones, variis modis certandum est, donec vis omnis ea corporibus excutiat. Modo enim, qua parte intro subierit, eam revocari oportet; modo coerceri circa partem quampiam, maxime vero haud nobilem, priusquam altius irrepens viscera tentet: modo ablui (corruptricem rem) ac dilui oportet, quando iam ipsa pervasura est membra. Cum igitur primum efferbuerit, vomitionibus evacuanda sunt exitialia venena: si ictu morsuve (perniciēs allata fuerit), scarificationes adhi-

κατασχασμοῦ, καὶ σικυῶν προσβολῆς, ἐκμυζήσεως καὶ περι-  
σαρκισμοῦ, ὅτε δὲ δι' ἀκρωτηριασμοῦ· ἡ δὲ κατοχὴ καὶ διακρά-  
τησις διὰ κλύσιων καὶ διὰ δριμέων ἐπιθέσεως φαρμάκων· ταῦ-  
τα δὴ κρατεῖν ὁμοῦ καὶ ἀποπλύνειν δύναται τὸν ἰόν. Ὁσβέσις δὲ  
καὶ ἡ ὑποκράτησις <sup>91</sup> δι' ἀκρατοποσίας ἀκράτου τε καὶ γλυ-  
κέως, ἢ καὶ ἐκ τῶν ἐναντίων δριμυφαγίας· ἐπὶ τέλει δὲ συν-  
εργεῖ τούτοις καὶ κάθαρσις κοιλίας καὶ ἰδρωτοποιΐα, καὶ  
τινα ἄλλα κοινῶς, καθὼς κατὰ μέρος ἐπιθεύξομεν.

Δεῖ δὲ οὐ μόνον τὴν φθοροποιὸν ὕλην ποιεῖσθαι σκο-  
πὸν, ἀλλὰ καὶ τὸ μέγεθος <sup>92</sup> αὐτῆς καὶ τὸν χρόνον· καὶ γὰρ  
παρὰ ταῦτα πλείστην ὅσῃν διαφορὰν τὰ βοηθήματα λαμβά-  
νει· παρὰ μὲν τὸ μέγεθος, ἐπειδήπερ τῶν δηλητηρίων καὶ  
τῶν ἰοβόλων, τὰ μὲν διεγερτικὰ κινδύνων γίνεται, τὰ δὲ ση-  
πεδόνων βαθυτέρων ἢ ἐπιπολαιωτέρων, τὰ δὲ περιωδυνῶν  
σφοδροτέρων ἢ ἀμυδροτέρων, τὰ δὲ ἄλλων δυσεργημάτων,  
ἥσσον ἢ μᾶλλον ὀχλούντων· δεῖ δὲ πρὸς τὰ κίνδυνον ἔχοντα  
διὰ τῶν ἀγωνιστικωτέρων ἀγωνίζεσθαι βοηθημάτων, πρὸς δὲ

91) Sic Ald.-et cod. X.; κράτησις Asulan. et sequ.

92) Sic iterum Ald. et cod. X.; μέρος Asulan. et sequ.

bendae et cucurbitulae, suctio etiam et incisio carnis cir-  
cinata, nonnunquam et membri amputatio. Retinetur ve-  
ro ac cohibetur collutionibus et impositis acribus rebus:  
haec virus coërcere possunt et cluere. Restinguitur porro  
et subigitur meracioris vini passive potu, aut etiam esu  
acrium, quae contraria vi polleant. Post alvi purgatio, su-  
doris evocatio et alia quaedam communia, quae singulatim  
praecipiemus, auxiliantur.

Attamen non solum ad materiam corruptricem consi-  
lium transferatur, sed et ad ipsius magnitudinem ac ad  
ipsum tempus. Etenim ab his remedia quam maximum  
capessunt discrimen. A magnitudine quidem, quoniam  
nonnulla e venenis, tam haustis, quam morsu inflictis,  
pericula accersunt, alia putredines excitant altiores vel  
magis superficiem legentes, alia dolores cient aut vehe-  
mentiores aut leviores, alia denique incommoda magis  
minusve molesta inferunt. Quamobrem oportet, quae  
gravius periculum afferunt, valentioribus debellare admi-



τὰ ἥσονα χαλεπὰ διὰ τῶν ἐπιεικεστέρων· ἄτοπον γὰρ, ἐπὶ τῶν μειζόνων μικροτέροις, ἂν οὕτω τύχη, χρώμενον βοηθήμασι, κινδύνῳ τὸν θεραπευόμενον περιβάλλειν, ἐπὶ δὲ τῶν μικροτέρων δι' ἀποτόμου τῆς βοηθείας μάτην αἰκίσασθαι τὸ σῶμα.

Πρόχειρος δὲ καὶ ὁ ἀπὸ τῶν χρόνων ἐστὶν ὀρισμός· ὁ μὲν γὰρ ὀξέως καὶ παραχοῆμα καὶ τὰς ὀχλήσεις καὶ τοὺς κινδύνους ἐπιφέρει· ὁ δὲ ἐξ ἀναβολῆς καὶ χρόνου πλείονος ἢ ἐλάττονος. Προσῆκει τοίνυν, τοῖς μὲν ὀξέσι κατεσπευσμένους βοηθεῖν καὶ διὰ πολλῶν ὁμοῦ, τοῖς δὲ σχολαιοτέρωσ. Ταυτὶ μὲν οὖν, ὥς ἐν τεχνολογίᾳ, μετρίως ὥρισται· προάγωμεν δὲ ἐξῆς, ὥς ἐπὶ καταμέρος.

Κεφ. α'. [Σημεῖα κυνὸς λυσσῶντος καὶ τῶν ὑπ' αὐτοῦ δεδηγμένων.] Τὸν περὶ τῶν λυσσοδῆκτων λόγον προετάξαμεν τῶν ἄλλων, ἐπεὶ καὶ τὸ ζῶον πολὺ τε καὶ σύννηθές ἐστι, καὶ συνεχῶς ἀλίσκεται τῇ λύσσει ὁ κύων καὶ ἀπόλλυται, καὶ δυσφύλακτον καθέστηκε· καὶ ὁ ἀπ' αὐτοῦ κίνδυνος ἀπαραίτητός ἐστιν, εἰ μὴ πολλοῖς χρήσαιτο τοῖς βοηθήμασι.

niculis; quae minus infesta sunt, mitioribus. Quippe ineptum fuerit, in gravioribus malis leviora adhibere, si fors tulerit, praesidia, atque adeo hominem in discrimen adducere, in minoribus vero praecipiti violentaque curatione corpus cruciari.

Est et in promptu, quae a temporibus desumitur, indicatio. Sunt enim, quae praesentes ac subitaneas inferant perturbationes et calamitates, alia vero nonnisi temporis spatio, et modo longiore, modo brevior, nocent. Itaque in acutis quidem multa festinanter auxilia simul adhiberi oportet, reliquis tardius. Haec, sicut in tractatu de arte (fieri assolet), mediocriter praecepimus: iam in singula statim descendamus.

Cap. I. [Signa rabiosi canis eorumque, qui ab eo demorsi fuerint.] De rabidi canis morsu commentarium aliis iccirco praeposuimus, quod id animal, ut frequens et homini familiare est, ita et rabie saepenumero prehenditur, indeque perit, et ab eo sibi cavere difficile est. Hinc ideo periculum inevitabile hominem manet, nisi multis

Λυσσᾷ δὲ ὁ κύων ὥς τὸ πολὺ<sup>93</sup> μὲν ἐν τοῖς σφοδροτάτοις καύμασιν, ἐνίοτε δὲ ἐν τοῖς ἐφισταμένοις<sup>94</sup> κρύεσι· λυσσήσας δὲ ἀποτρέπεται καὶ βρῶσιν καὶ πόσιν· καὶ φλέγμα πολὺν ἀφρῶδες ἐκ τοῦ στόματος καὶ τῶν ῥινῶν προβάλλει· καὶ πονηρὸν βλέπει καὶ στυγνότερον τοῦ συνήθους· ἐφορμᾷ<sup>95</sup> δὲ χωρὶς ὑλακῆς πᾶσιν ὁμοίως καὶ θηρίοις καὶ ἀνθρώποις, πᾶσι τι συνήθεσι καὶ ἀγνώστοις, δάκνων. Καὶ παραχοῆμα μὲν οὐδὲν ὀχληρὸν ἐπιφέρει, πλὴν ὅσον ὁδύνην, τὴν ἐκ τοῦ τραύματος· ὕστερον δὲ ἐμποιεῖ πάθος τὸ καλούμενον ὕδροφοβικόν· συμπίπτει δὲ μετὰ σπασμῶν καὶ ἐρυδημάτων ὅλου τοῦ σώματος, μάλιστα δὲ ὅλου τοῦ προσώπου, καὶ μετὰ ἐφιδρώσεως καὶ ἀπορίας.<sup>96</sup> καὶ τινὲς μὲν φεύγουσι τὴν αὐγὴν, τινὲς δὲ τρέχονται συνεχῶς· ἔτιοι δὲ ὑλακτοῦσιν, ὥς περ κύνες, καὶ δάκνουσιν ἐπιόντας.<sup>97</sup> καὶ δάκνοντες αἵτιοι

93) Sic Ald., Asul. et Paull. lib. 5. c. 5., ubi haec excerpserit; ἐπὶ τὸ πολὺ Cornar., Goup. et Sarac.

94) Melius Paull. ἐπιτεταμένοις.

95) Ald. ἐφορᾷ.

96) E Paulo mendosum textum: καὶ μάλιστα ἀπὸ ἰδρώσεως καὶ ἀπυρίας, quem Ald., Asulan. et Cornar. habent, Goup. et Sarac. tamen ἀπορίας, sic emendavi.

97) E Paulo loco ἐπιόντας.

utatur praesidiis. Plerumque vero canis in rabiem agitur per flagrantissimos aestus, ac interdum etiam per instantia (saevissima) frigora. Rabie autem correptus et cibum et potum aversatur, largam spumantemque pituitam ex ore proicit naribusque, torvum ac solito tristius intuetur, in omnes homines iuxta ac bestias irruit, ac omnes passim, tam familiares, quam ignotos, morsu petit. Neque tamen protinus aliud quicquam grave, quam ex vulnere dolorem, infert: deinceps vero morbum producit, hydrophobia appellatum. Hunc comitantur convulsiones ac totius corporis rubedines, praesertim faciei, cum sudoribus profusis et anxietate. Non desunt aegri, qui lucis splendorem refugiant, alii continuo conficiuntur (cruciantur.) Nonnulli latratus edunt, et obvios morsibus invadunt, quibus ipsorum morbum aliis inferunt. Ex iis porro, qui

τοῦ αὐτῶν <sup>98</sup> πάθους κατέστησαν. Τῶν δὲ ἐμπεσόντων εἰς τὸ πάθος μηδένα ἴσμεν περισωθέντα <sup>99</sup>, εἰ μὴ καθ' ἱστορίαν παρελήφμεν περιγενέσθαι ἓνα καὶ δεύτερον· καὶ γὰρ Εὐδήμος περιγεγενῆσθαι τινά φησι· καὶ Θεμισῶνα οἱ μὲν λέγουσι τῷ πάθει δηχθέντα περιπεσεῖν, καὶ σωθῆναι· οἱ δὲ, φίλῳ ὑδροφοβιῶντι προσκαρτερήσαντα προθύμως καὶ συμπαθῶς, εἰς τὴν ὁμοίαν ἐμπεσεῖν διάθειν, καὶ πολλὰ κακοπαθήσαντα σωθῆναι. Τὸ μὲν οὖν πάθος ἐστὶν ἀργαλέον· πρὸ δὲ τῆς πείρας αὐτοῦ <sup>100</sup> πολλοὺς καὶ αὐτοὶ περιεσώσαμεν, καὶ ὑπ' ἄλλων ἱατρῶν σωθέντας ἔγνωμεν.

Κε φ. β'. [Θεραπεία τοπικὴ τῶν ὑπὸ λυσσῶντος κυνὸς δηγμάτων.] Τῆς θεραπείας ἡ μὲν ἐστὶ κοινή· καὶ χρηστέον αὐτῇ ἐπὶ πάντων τῶν ὑπὸ τινος ἰοβόλου ζώου δεδογμένων· ἡ δὲ τις ἰδία τῶν λυσσοδήκτων, τοῖς μὲν γὰρ ἄκρως ὠφελεῖν εἰθισμένη, τοῖς δὲ ἀπὸ πολλοῦ δηχθεῖσιν, ἀνάρμοςτος· καὶ πρῶτόν τε αὐτὴν ἐκθέμενοι, μετὰ τοῦτο

98) Recte sic Ald.; αὐτῶν tell.

99) Haec e Paullo, quibus cum careant editiones, lacuna nata est.

100) Paull. πρὸ δὲ τῆς τοῦ πάθους καταπείρας.

in eiusmodi aegritudinem illapsi fuerint, nullum servatum scimus, nisi unum vel alterum evasisse, ex historiis accepimus. Namque et Eudemus superstitem quendam evasisse narrat. Themisonem quoque demorsum referunt in hanc incidisse affectum, servatum tamen fuisse. Quin et fertur, quendam, cum apud amicum hydrophobicum libenter et amore commotus perseveraret, similem contraxisse affectum, attamen post multos cruciatus salvum tandem superfuisse. Est igitur hoc morbi genus atrocissimum: a quo tamen, priusquam ipsum experirentur, demorsos haud paucos ipsi servavimus, et complures ab aliis medicis curatos cognovimus.

Cap. II. [*Curatio particularis morsuum rabidi canis.*] Ratio medendi quaedam communis est, qua utendum in iis omnibus, qui a virulenta quadam bestia demorsi fuerint, altera iis peculiaris, quos rabiosus canis momorderit. Haec nonnullis quidem maxime prodesse consuevit, aliis vero, qui iam dudum morsi fuerint, inu-



καὶ τὴν κοινὴν ἐκτροχάσομεν. Διὰ τοίνυν καρκίνους ποταμίους ἐπὶ κληματίδος λευκῆς ἀμπέλου καῦσαι, καὶ τὴν τέφραν αὐτῶν λειοτριβήσαντα ἔχειν ἀποκειμένην· ὁμοίως δὲ καὶ ῥίζαν γεντιανῆς ἀποθέσθαι κεκομμένην καὶ σεσησμένην. Ὅποτε δὲ τις δηχθείη ὑπὸ λυσσῶντος κυνός, εἰς οἴνου ἀκράτου κυάθους δ' ἐμβάλλειν δύο μὲν κοχλιάρια τῆς τῶν καρκίνων τέφρας, ἐν δὲ κοχλιάριον τῆς γεντιανῆς, καὶ ἐγκυκῆσάντας ὥς ἐν ἀλφίτῳ δεδευμένῳ, πίνειν ἀπὸ τῆς α' ἡμέρας, μέχρι τεσσάρων ἡμερῶν.<sup>1</sup> ἀπαρχῆς μὲν οὖν διδόμενον τὸ φάρμακον τοῦτον προσφερόσθω τὸν τρόπον· εἰ δὲ ἡμέραι παρεληλύθασιν δύο ἢ τρεῖς ἀπὸ τῆς δήξεως, ἐγχειροῦντας τῇ θεραπείᾳ, τριπλάσιον δεῖ διδόναι, ὅσον ἐξαρχῆς εἰρήκαμεν. Τὸ μὲν ἀρίστον ἐπὶ τῶν λυσσοδῆκτων βοήθημα, ὃ δὴ καὶ μόνον ἐνίοις ἤρκεσε, τοῦτό ἐστι, καὶ χρηστότεον αὐτῷ μετὰ πεποιθήσεως· ἔνεκα δὲ τοῦ καὶ δι' ἄλλων ἡσφαλίσθαι πρὸς ἄφικτον δοκοῦντα κίνδυνον, οὐδὲν τὸ κωλύον ἐστὶ καὶ τοῖς λοιποῖς χρήσασθαι· αἰρετώτερον δὲ διακενῆς, ἂν οὕτω τύχη, τῶν

1) Suspiciabatur Cornar. τεσσαράκοντα ἡμερῶν. Sed et Paullus: πότιζε ἡμέρας δ'.

tilis. Qua quidem ratione protinus exposita, dein et communem illam perstringemus. Cancros igitur fluviatiles igni e clematidis albae sarmentis cremare oportet, et cinerem eorum ad laevorem tritum reconditum habere: pariterque gentianae radicem tusam cribratamque repone. Quoties autem aliquis a cane rabioso demorsus fuerit, in quaternos meraci vini cyathos bina cineris cancerum cochlearia, unumque gentianae coniiciantur, ac, ubi in polentae dilutioris modum subacta remistaque fuerint, quadriduo bibantur. Hoc vero modo exhibetur remedium statim ab initio. Quodsi ab illato morsu duo tresve dies iam elapsi fuerint, curationem inchoaturi, triplex eius modi, quod ab initio retulimus, exhibebimus. Optimum id est adversus rabiosorum morsus praesidium, quod etiam unicum nonnullis satis ad salutem fuit, quoque cum fiducia uti licet: attamen, quo firmitus contra periculum, ut videtur, inevitabile muniamur, nihil quicquam obstat, quominus et aliis utamur auxiliis. Sed et inhumanos

βοηθημάτων τὸ ἀπάνθρωπον ὑπομεῖναι, ἢ διὰ τὴν ὀλιγο-  
ρίαν κινδύνῳ περιπεσεῖν.

Οὐχ οὕτω δ' εὐλαβητέον τὰ μεγάλα τραύματα ἐπὶ τῶν  
λυσσοδῆκτων, ὥς τὰ μικρὰ καὶ ταῖς ἀμυχαῖς ἐμφερῇ· διὰ γὰρ  
τῶν μειζόνων ἄθρουν καὶ πολλὴ αἷμα προχέομενον δύναται τε καὶ  
τοῦ ἰοῦ συναποκλύζειν, διὰ δὲ τῶν μικροτέρων οὐδαμῶς· καὶ  
ἐκ μὲν τῶν μειζόνων τὰς ἀφισταμένας σάρκας αὐτόθεν ἀφαιρε-  
τέον καὶ τὰ χεῖλη περιγλυπτέον διὰ τῆς ἀκμῆς· ἀνατεθείσης δὲ  
τῆς σαρκὸς ἀγκίστροφ ἢ μυδίῳ<sup>2</sup>, τὴν ἐκτομὴν ἀποτελεστέον·  
ἐπὶ ἀμφοτέρων δὲ τὰ ἐν κύκλῳ βαθυτέrais ἀμυχαῖς κατασχα-  
στέον, ὅπως<sup>3</sup> ἢ τοῦ αἵματος πλείων<sup>4</sup> γενομένη κένωσις ἐναν-  
τιωθήσεται τῇ τοῦ ἰοῦ διὰ τὸ σῶμα διαδόσει.<sup>5</sup> Πολλὴν δὲ  
καὶ ἡ σικύα κολληθεῖσα μετὰ πολλῆς φλογὸς παρὰ σχοι ὠφέ-  
λειαν, ὥστε λύσαι τοῦ ἰοῦ τὴν δύναμιν.

Ἡ δὲ καύσις<sup>6</sup> ἀνυσιμώτατον ἐπὶ τῶν ἰοβόλων ἐστὶ βοή-  
θημα.<sup>7</sup> Τὸ γὰρ πῦρ, πάσης δυνάμεως εὐτονώτερον ὑπάρχον,

2) Sic Ald.; μύδρω Cornar. et sequ. Μύδιον etiam alio loco habet  
Paull. 6, 78.

3) Sic Goup.; εὐπως Ald. et tell.

4) Sic cod. Par. apud Goup.; παραπλησιωτέρα Ald. et tell.

5) Vulg. ἐναντ. τὰ σώματα τῇ τοῦ ἰοῦ διαδόσει.

6) Ald. peculiare habet cap. περὶ καύσεως.

7) Vulg. βοηθημάτων.

quantumvis frustra remediorum tolerare cruciatus satius  
multo fuerit, quam per inertiam in discrimen adduci.

Neque vero tantopere metuenda in demorsis a rabioso  
cane maiuscula vulnera, quantopere minora, rimisque similia:  
quippe e maiori vulnere copiosus sanguis confertim ema-  
nans simul veneni particulam eluere potis est: id quod  
minori vulnere fieri nequit. Quin et a maioribus absce-  
dentes carnes quamprimum auferri, ipsa quoque labra  
acie scalpelli circumscribi oportet: hamulo autem aut vol-  
sella prehensa caro abscindi. In utrisque partes circina-  
tim profundioribus rimis scarificantor: sic enim uberior  
sanguinis evacuatio adversabitur distributioni viri per cor-  
pus. Multam et affert utilitatem cucurbitula cum insigni  
flamma affixa, ut vim veneni exsolvat.

Ustio vero expeditissimum est contra virulentos ictus  
adminiculum. Ut enim ignis, qua prae ceteris pollet effi-

ὁμοῦ μὲν κρατεῖ καὶ κωλύει φέρεσθαι τὸν ἰὸν ἐσωτέρω, ὁμοῦ δὲ τὸ κρατηθὲν αὐτοῦ μέρος τῆς ἐφεξῆς θεραπείας καταβολὴν οὐ τὴν τυχοῦσαν ἐργάζεται, παραμενούσης τῆς ἐλκώσεως ἐπιπλέον. Τὴν μὲν γὰρ ἔκπτωσιν τῆς ἐσχάρας μάλιστα ἐκ τούτου φροντιστέον, ὅπως μὴ τάχιον τὰ μέρη συγκλεισθῇ. Ἀλλ', εἰ δυνατόν ἐστι, πολὺ τῆς προθεσμίας τὰς ἐλκώσεις τηρητέον, καὶ ἐπιφλεγμαινούσας καὶ ἐπιφύμπαινομένας· παρῆξι δὲ αὐταῖς τὸ τοιοῦτον τάριχος ἐπιτιθέμενος, καὶ σκόροδον ἄγριον λελειοτριβημένον<sup>8</sup>, κρόμνυά τε ὡσαύτως· ὁπὸς μὲν οὖν μάλιστα ὁ κυρηναϊκὸς ἢ ὁ καλούμενος μηδικὸς ἢ παρθικὸς· κόκκοι δὲ πυρῶν ἐπιτιθέσθωσαν καὶ μεμασσημένοι καὶ ἀμάσσητοι· διαφυρῶμενοι μὲν γὰρ ἀπὸ τῆς ἐμβροχῆς ἀνευρύνουσι τὰ τραύματα. Τινὲς δὲ οἴονται, τοὺς μεμασσημένους ἀντιπαθές τι ἔχειν ἀπὸ τῆς τῶν μεμασσηκότων νηστείας· οὐ μὴν τοῦτο βέβαιόν ἐστι· ἀλλὰ εὐκαίρως αὐτοῖς χρηστέον. Εἰ δὲ, ὅπερ γίνεται πολλάκις, καὶ οὐλαὶ συνερχόμεναι φθάνουσι πρὸ τῶν ἡμερῶν, διὰ χειρὸς ἀναξαίνιν

8) Cornar. et Goup. *λειοτριβόμενον*.

cacia, virus ipsum evincit penitiusque ferri prohibet; ita et pars ignem experta futurae deinceps curationi non mediocre ponit fundamentum, dum diutius ulcerata permanet. Quam ob caussam etiam exinde accurate animadvertendum est, ut ne, cum exciderit crusta, ulceris orae celerius coalescant. Quin, si fieri potest, magnam praefiniti temporis partem ulcerationes, licet inflammatione obsessas et sordibus inquinatas, prorogari convenit. Id commodè praestabit inditum iis salsamentum, itemque alium sylvestre ad laevorem tritum: similiter et cepae, ac inprimis liquor cyrenaicus, aut quem medicum parthicumve appellant. Tritici quoque grana tam mansa, quam minime mansa imponantur: haec enim, dum humore concepto turgescunt, vulnera dilatant. Neque desunt, qui commanducata eiusmodi grana arbitrentur a mandentium ieiunio vim aliquam veneno adversariam asciscere, verum id certum non est. Sed tempestive ea adhibenda sunt. At si, quod saepius accidit, cicatrices ante dies praestitutos coire desierint, promte eas refricare expedit, seu car-



προσῆκει, περισαρκίζοντας καὶ τέμνοντας, ἢ καὶ ἐπικαίοντας πάλιν, εἰν οὕτω τύχῃ· παρελθούσης δὲ τῆς προκειμένης προθεσμίας, ἀφετέον μὲν ἀπουλωθῆναι τοῖς ἔλκεσιν· ἐμπλάστρω δὲ τῇ διὰ τῶν ἁλῶν ὅλον τὸν τόπον καταληπτέον· μετὰ ὀλίγας δὲ ἡμέρας συναπιστέον.

Κεφ. γ'. [Περὶ διαίτης τῶν ὑπὸ κυνὸς λυσσῶντος δηχθέντων.] Ἡ μὲν οὖν τοπικὴ θεραπεία τῶν λυσσοδῆκτων τοιαύτη τίς ἐστι. Δεῖ δὲ καὶ τὴν διαίταν αὐτῶν ἐστοχάσθαι τῆς πρὸς τὸν ἰὸν ἐναντιώσεως, ἵνα ὁμοῦ μὲν ἀμβλύνη καὶ σβεννύῃ τὴν δύναμιν, ὁμοῦ δὲ κωλύῃ τὴν εἰς βάθος φθορὰν· καταλαμβάνόμενα γὰρ ἀντιπίπτει τῇ παρεισδύσει τῆς φθοροποιοῦ δυνάμεως· δύναται δὲ τούτων ἐκάτερον παρέχειν τοῦτο, οἶνου ἀκράτου ζωροτέρου πόσις καὶ γλυκέος καὶ γάλακτος· οἱ γὰρ ταῦτα πάντα λαμβάνοντες πρὸς τὴν ἐπιμέλειαν, ἐνίστανται τι ἰῶ, ὅτι πᾶσαν αὐτοῦ τὴν δριμύτητα ἐκκναίει.<sup>9</sup> ὥσαύτως δὲ καὶ σκορόδων καὶ πράσων καὶ κρομμύων ἐδωδῇ· καὶ ταῦτα γὰρ τὸ ὅλον δυσμετάβλητα καὶ δυσ-

9) Etiamsi nusquam non ἐκκναίει legatur, mea tamen scriptura et natura rei ipsa, et priscorum interpretum auctoritate sancitur.

nes circinatim incidere, seu etiam, si fors ita tulerit, iterum adurere. Transacto vero praefinito tempore permitendum est, ut ulcera cicatrice obducantur, et pars tota emplastro, quod e salibus conficitur, comprehendenda. Paucos tandem post dies etiam sinapismus imponendus est.

Cap. III. [De victus ratione eorum, qui a cane rabioso demorsi sunt.] Talis est curatio eorum topica, qui a cane rabioso morsi sunt. Oportet vero eam victus institui rationem, quae veneno adversetur, ut ipsius vires hebetet ac restinguat, simul vero arceat, quominus ad intima pernicies illabatur. Namque assumpta malefica qualitatis penetrationi resistunt. Horum utrumque praestare potest vini meraci annosioris potus, passi lactisque: siquidem, qui haec omnia provide assumunt, veneno non parum resistunt, cum omnem eius acrimoniam obtundant. Simili modo protest alliorum, porrorum ceparumque esus, quippe cum difficillime transmutentur ac vix aboleantur.

εξίτηλα· παραμένουσι γὰρ αὐτῶν αἱ ποιότητες ἐπὶ πλείους ἡμέρας, ὅποταν οὐ νικᾶται οὐδὲ τρέπεται ὑπὸ τῆς φθοροποιοῦ δυνάμεως· ἐκ δὲ τῶν ἐναντίων κρατεῖν αὐτῆς πέφυκεν· εἰς τοῦτο δὲ καὶ τῶν ἀντιδότων ἐστὶ χρεία, καὶ τῆς θηριακῆς, καὶ τῆς Εὐπατωρίου λεγομένης, καὶ τῆς Μιθριδατείου, καὶ πάσης ἄλλης, ἣτις ἐκ πλειόνων ἀρωμάτων εἴληφε τὴν σύστασιν· δυσμετάβλητα γὰρ τῇ συστάσει πάντα τὰ ἀρώματα ταῖς δυνάμεσι καὶ ταῖς οὐσίαις· διὸ περικρατεῖται τοῖς σώμασι. Τοιοῦτος μὲν οὖν καὶ ὁ τῆς διαίτης τρόπος.

Δεῖ δὲ γινώσκειν, ὅτι ἡ τοῦ ὑδροφοβικοῦ πάθους ἐγκατάσκηψις οὐδὲ ὥρισμένην ἔχει προθεσμίαν· ὥς ἐπιτοπλεῖστον γὰρ ἕως τεσσαρακοστῆς ἡμέρας εἰωθὸς, τοῖς ἀμεληθεῖσι καὶ δι' ἑξαμήνου ἐνίοις ἀπῆντησε, καὶ δι' ἑναυτοῦ· καὶ ταῦτα ἡμῖν ἐώραται<sup>10</sup>. ἱστοροῦσι δὲ τινες μετὰ ἑπταετίαν ἐνίοις ἐνδιδόναι τῷ πάθει· καὶ κατὰ μὲν τὰς ἀρχὰς τῶν λυσσοδῆκτων ἡ θεραπεία τοιαύτη ἐστίν· ἐὰν δὲ ὅπωςδηποτοῦν ἐν ταῖς πρώταις ἡμέραις μὴ προληφθῇ τὰ προειρημένα βοηθήματα, τὸ

10) Ald. ὁρᾶται.

Complures enim dies qualitates eorum permanent, ac tamdiu a vi mortifera neque vincuntur neque mutantur, sed contra hanc ipsam sua natura superant. Ad hoc ipsum valet antidotorum usus, theriacae, et eius, quae Eupatoria dicitur, Mithridatiae etiam et alius cuiusvis, quae e pluribus constet aromatis: quippe aromata omnia aegre suas tum qualitates tum substantias permutant, atque adeo integris viribus in corporibus retinentur. Victus igitur ratio hoc modo se habet.

Nosse autem oportet, hydrophobici affectus invasionem haud certum praefinitumque servare tempus. Cum enim ut plurimum ad quadragesimum usque diem differri soleat, neglectis tamen quibusdam post semestre, imo etiam post annum supervenisse observavimus. Sunt et qui narrent, nonnullos post septennium eo affectu correptos fuisse. Ac inter initia quidem ea, quam praecepimus, debet curatio esse morsorum a cane rabioso. At vero, si qua demum cunque e caussa praesidia ante memorata primis diebus praetermissa fuerint, alienum deinceps erit, et

μὲν περισαρκίζειν καὶ καίειν παραλειπτέον·<sup>11</sup> οὐ γὰρ ἱκανῶς εἰς τὸ βάθος παρελθελὺς μετάγειν δύναται·<sup>12</sup> οὐδεμία γὰρ ὄνησις τῆς ἐπιβολῆς, ἀλλὰ διακενῆς τὰ σώματα ταῖς ὀδύναις ὑποβληθήσεται.<sup>13</sup>

Τρόπος δὲ τῆς θεραπείας ἕτερος ἀγέσθω, καθαρίσις, ἣ καὶ μέγα ὄφελος ἐμπαρέχειν δυναμένη, συμμεταποιεῖ γὰρ τὴν ἑξιν κινουῦσα· ἥ τε διὰ τῆς κολοκυνθίδος ἱερὰ δόσις· καὶ δὴ καὶ τὸ γάλα τὸ σχιστὸν ὁμοῦ καθαρίσιν καὶ ἐπικράσεις<sup>14</sup> παρέχειν δυνάμενον· αἷ τε δοιμυφαγία καὶ ἡ τοῦ ἀκράτου πόσις παραλαμβάνανσθωσαν καθημέραν, ἀμβλύνειν δυνάμεναι τὸν ἰόν· καὶ πρὸς τούτοις ἰδρωτοποιεῖα καὶ πρὸ τροφῆς καὶ μετὰ τροφῆν· δρωπακισμός τε καὶ σινάπισμός κατὰ μέρος ἐφ' ὅλου τοῦ σώματος· πάντων δὲ ἀνυσιμώτατον αὐτῶν<sup>15</sup> ὁ ἐλ-

11) Sic Ald.; παραληπτέον Asul.; μὴ παραλειπτέον Paull., ubi suspicor, παραληπτέον esse legendum, cum sequatur: φθάσαντος ἤδη τοῦ ἰοῦ χωρῆσαι παρὰ τὸ βάθος.

12) Vulgarem lectionem: καὶ γὰρ ἐκ. εἰς τὸ παρελ. μ. δ. sic emendavi. Imperant eam emendationem et nexus et modus, quo Paullus haec intellexit.

13) Sic Ald.; βλαβηθήσεται Asul. et sequ.

14) Ald. ἐπικρατήσεις. Sed nostram lectionem, quae vulgaris est, tuctur Diosc. lib. 2. c. 53. et Galenus, qui ἐπικράσεως definitionem tradit, meth. med. lib. 9. c. 10. p. 640.

15) Sic Ald.; ἀπὸ τούτων Asul. et tell.

carnem scalpro circinare et ustionem experiri. Non enim satis, quod iam ad penetralia progressum est, transferre (ac iterum revocare) haec auxilia possunt. Nullus tum esset eius administrationis profectus, sed corpora frustra doloribus opprimerentur.

Proinde alia curationis ratio ineunda est: imperanda nimirum purgatio, quae, dum corpus agitando ipsius habitum transmutat, magnum affert adiumentum. Adhibenda est hiera, quae colocynthidem recipit, itemque lac schiston, quippe quod simul et deiectionem moliri potest et contemperandi vim habet. Acrium porro esus et meraci potus, quibus hebetari venenum potest, quotidie assumi debent. Praeter haec sudores et ante pastum et post eum eliciendi: quin et dropaces et sinapismi alternatim universo corpori applicandi. Attamen helleborismus omnium



λεβορισμὸς ἐγνώσθη, καὶ χρηστέον τεθαρῆγκότως τῷ βοηθήματι, οὐχ ἅπαξ, οὐδὲ δις, ἀλλὰ καὶ πλειστάκις πρὸ τῆς τσσαρακοστῆς ἢ καὶ μετὰ ταῦτα· τὸσαύτην γὰρ τὴν ἰσχὺν προσφέρεται τὸ βοήθημα, ὥστε τῶν ἤδη συνησθημένων τοῦ ὑδροφόβου, περισωθῆναί τινας λαβόντας ἐλλέβορον εὐθὺς ἐν τῷ πρώτῳ καταπειρασμῷ τοῦ συμπτώματος· τοὺς γὰρ ἤδη κατεσχημένους, οὐδὲ αὐτὸς τι περιποιῆσαι δύναται.

Τὴν μὲν οὖν τῶν λυσοδῆκτων ἐπιμέλειαν πρώτην ἐξεθέμεθα, δι' ὃν ἔμπροσθεν εἰρήκαμεν ἐπιλογισμὸν· μεταβαίνοντες δ' ἐπὶ τὰ λοιπὰ τῶν ἰοβόλων, πρῶτον μὲν τὰς σημειώσεις αὐτῶν ὑπὸ μίαν ἐκθησόμεθα πρόφασιν· μετὰ δὲ τοῦτο, κοινὴν τὴν θεραπείαν, πᾶσιν ἀρμόσαι δυναμένην· ὑποδραμόντες δὲ ἐξῆς ὑποδείξομεν, εἴ τινα κατ' ἰδιότητα ἐνίοις προσωφελεῖν πέφυκεν· ὁμοίως καὶ τὰ τελείως ἀβοήθητα παρασημειωσόμεθα.

Κεφ. δ'. [Περὶ φαλαγγίων.]<sup>16</sup> Τοῖς μὲν ὑπὸ φαλαγγίων δεδηγμένοις αὐτὸς μὲν ὁ τόπος ἐνερευθῆς ἐστὶ καὶ

<sup>16</sup>) Ald., Asul. et Marcellus hic ordiuntur librum octavum universi operis. Cornarus primus, ut par erat, cum priori contraxit.

efficacissimum deprehenditur praesidium, quo quidem cum fiducia non semel aut iterum, sed frequentius etiam ante diem quadragesimum, vel post hoc etiam tempus, uti licet. Tantam enim vim habet id genus auxilii, ut nonnulli, qui aquae metu iam prehendebantur, sumto in ipso morbi insultu helleboro incolumes evaserint. Nam eo malo iam occupatos ne helleborus quidem servare poterit.

Atque iam primariam exposuimus huius morbi curationem, iuxta ratiocinium, quod initio protulimus. Nunc transgrediendum est ad reliqua ictu aut morsu infesta animalia: protinus eorum signa, unam secuturi normam, trademus: dein vero communem medendi rationem, quae omnibus ex aequo conveniat: tandem cursim ea subiiciemus, quae nonnullos sua proprietate iuvare possunt. Similiter, et quae prorsus insanabilia sunt, annotabimus.

Cap. IV. [De phalangiis.] Eis, qui a phalangiis demorsi fuerint, pars affecta rubens et velut aculeis com-

ὅμοιος κεντήμασιν, οὔτε διωδικῶς, οὔτε περίθερμος, ἀλλὰ μετρίως μὲν ὑπέρυθρος<sup>17</sup>, ἐκ δὲ τῶν ἐναντίων κατεψυγμένος· παρακολουθεῖ δὲ τρόμος δι' ὅλου τοῦ σώματος, καὶ ἐντάσεις περὶ τοὺς βουβῶνας καὶ τὰς ἰγνύας, προσεικνύται σπασμῷ· περὶ τὴν ὀσφὺν ἄλγημα<sup>18</sup>, καὶ συνεχὴς πρὸς οὔρησιν ἐρεθισμός· δυσκολία πολλή περὶ τὴν ἐκκρίσιν τοῦ περιττώματος· ὁμοίως δὲ τούτοις καὶ ἰδρῶς ψυχρὸς καθ' ὅλην τὴν ἐπιφάνειαν ἐκκρίνεται· τὰ τε ὅμματα δακρύει καὶ ποσῶς ἀμαυροῦται.

Κεφ. ε'. [Περὶ σκολοπένδρας.] Τοῖς δὲ ὑπὸ τῆς καλουμένης σκολοπένδρας ἢ ὀφιοκτένης<sup>19</sup> δεδηγμένοις, ὃ μὲν ἐν κύκλῳ τόπος τοῦ δήγματος πελιοῦται καὶ περισήπεται<sup>20</sup>· καὶ ποτε τρυγῶδης, κατὰ τὸ σπάνιον καὶ ἐνερευθὴς φαίνεται· ἔλκοῦται δὲ, ἀπ' αὐτοῦ τοῦ δήγματος λαμβάνων τὴν ἀρχήν, ἔλκωσιν τινα ἐπίπονον καὶ δυσάλθῃ<sup>21</sup>· πρὸς δὲ τούτοις περὶ ὅλον τὸ σῶμα συναίσθησις γίνεται κνησμώδης.

17) Asul., Cornar. et Ruell. ὑπέρυθρος. Sed nobiscum scribunt Paull., Aët., Ald., Marcell., Goup. et Sarac.

18) Ex Actuario sic emendavit Sarac. vulg. σύλλημα Ald., Asul., Cornar., σύλλημα Marc., Goupyl., quam vocem corruptam censuit H- Stephan., vario modo intellexerunt interpretes.

19) Ὀφιοκτένης mavult Schneider in lex.

20) Paull. ἐπαίρειται.

21) Sic Ald., Cornar., Goup. et Sarac.; δυσανθῇ mendose Paull.; δύσφορον Asul. et Marc.

puncta conspicitur; ceterum neque intumescit, neque adeo calet, sed contra, quamvis mediocriter rubeat, friget tamen. Consequuntur totius corporis tremor, ac distentiones circa inguina et poplites, convulsionibus haud absimiles, lumborum dolor et perpetua mingendi cupido, nec non et eiusdem excernendae difficultas. Similiter et per universam cutem frigidus sudor excernitur: collacrimant oculi, et quodammodo caligant.

Cap. V. [De scolopendra.] Si cui scolopendra seu ophioctones morsum intulerit, pars per ambitum livet ac computrescit: interdum faeci similis, at rarius rubra, conspicitur. Ulceribus autem, quae a parte demorsa originem ducunt, dolores cient, et curationem respuunt, obsidetur membrum. Ad haec prurigo per totum corpus sentitur.

Κεφ. ε'. [Περὶ σκορπίου.] Τοῖς δὲ ὑπὸ σκορπίου πληγέσιν<sup>22</sup> ὁ μὲν τόπος εὐθέως ἄρχεται φλεγμαίνειν, σκληρὸς καὶ ἐνερευθὴς καὶ περιτενὴς<sup>23</sup> σὺν ὀδύνῃ γινόμενος· καὶ ἐναλλάξ, ὅτε<sup>24</sup> μὲν γὰρ πύρωσις, αὐτὸς δὲ ψύξις ἐπιλαμβάνεται· καὶ πόνος ἐξαπίνης, καὶ ποτε μὲν ῥαΐζει, ποτὲ δὲ ἐπιτείνεται· παρέπεται δ' αὐτοῖς ἰδρῶς καὶ φρικώδης αἴσθησις, καὶ τρόμος καὶ περίπυξις ἀκρωτηρίων, καὶ βουβῶνων ἔκρσις, φυσήματα<sup>25</sup> διὰ τῆς ἔδρας· ὀρθοτριχία τε καὶ δύσχροια ἐπαλγῆς περὶ τὴν ἐπιφάνειαν τῆς αἰσθήσεως, καθάπερ ἀπὸ βελόνης κεντημάτων ὀδυνωμένης.<sup>26</sup>

Κεφ. ζ'. [Περὶ τρυγόνος θαλασσίου.] Τοῖς δὲ ὑπὸ τρυγόνος θαλασσίῳ δηχθεῖσι<sup>27</sup> παραυτίκα μὲν περιωδυνίαι συμβαίνουσι δυσκατέργαστοι, σπασμοὶ τε συνεχεῖς, καὶ πόνος, καὶ ἀτονία, καὶ διανοίας διαφορά· μετὰ δὲ τοῦτο ἄφωνία καὶ σκοτασμός ὀφθαλμῶν· αὐτὸς δὲ ὁ πληγείς τόπος πέλιος

22) E Paullo, loco vulg. δηχθεῖσιν, cum non mordeant scorpiones.

23) E Paullo; περιπελής Ald.; περιπαθής Asul. et sequ.

24) Sic Paull.; γινόμενος ἐναλλάξ. ὅτε vulgo.

25) Egregie lectionem vulg. φύματα sic ex Paullo correxit Sarac. In Paullo enim: πνευμάτων μετὰ ψόφου διὰ τῆς ἔδρας ἔκδοσις.

26) E Paullo, loco vulg. ὀδυνώμενος.

27) Rectius dicturus fuisset πληγέσιν, sed Paull. etiam δηχθεῖσι.

Cap. VI. [De scorpione.] Icta a scorpione pars ilico incipit inflammari, indurescit, rubescit, et cum dolore circumquaque distenditur: vicissimque modo exaestuat, modo frigore prehenditur: dolor itidem, qui derepente accessit, modo se remittit, modo intenditur. Comitantur vero sudor, horroris sensus atque tremor. Quin et extremae corporis partes frigescent, tument inguina, flatus per sedem erumpunt, surriguntur capilli, accedit decoloratio, dolorque velut ex pungente acu per universam cutem sentitur.

Cap. VII. [De pastinaca marina.] A pastinaca marina percussis protinus accidunt pertinaces dolores, convulsiones assiduæ, lassitudo, languor et mentis alienatio: post hæc etiam vocis interceptio et oculorum caligo. Ipsa vero pars percussa livet ac nigrescit per ambitum: et partes,



γίνεται καὶ μέλας τὰ κύκλω<sup>28</sup>, καὶ τὰ πλησίον αὐτοῦ μέρη καὶ πρὸς τὴν ἀφὴν ἀναισθητεῖ· ἐπὰν δέ τις αὐτὸν ἀποψήσῃ, ἰχῶρ ἐξ αὐτοῦ μέλας, παχύς, δυσώδης ἐκκρίνεται.

Κεφ. η'. [Περὶ μυγαλῆς.] Τοῖς δὲ ὑπὸ μυγαλῆς δηχθεῖσι, κύκλω μὲν περὶ τὸν τόπον τοῦ δῆγματος γίνεται φλεγμονή, φλυκτὶς δὲ ἐπανίσταται μέλαινα, μεστὴ ἰχῶρος ὑδατώδους· καὶ τὰ πλησίον πάντα πελίουται· ῥαγείσης τε τῆς φλυκταίνης, νομὴ παραλαμβάνει παραπλησίᾳ τῇ ἀπὸ τῶν ἐρυσσινικῶν· σὺν τούτοις δὲ παρέπεται καὶ στρόφος περὶ τὰ ἔντερα, καὶ δυσουρία, καὶ ψυχρᾶς νοτίδος περίχυσις<sup>29</sup>.

Κεφ. θ'. [Περὶ ἐχίδνης.] Τοῖς δὲ ὑπὸ ἐχίδνης δηχθεῖσιν οἶδεῖ καὶ ἐφ' ἱκανὸν τὸ σῶμα ξηραίνεται, τὴν χροιάν δὲ ὑπόλευκον ἔχει· ἰχῶρ δὲ ἀπὸ τοῦ τραύματος προχέεται, τὸ μὲν πρῶτον ὑπολίπαρος, μετὰ ταῦτα δὲ αἱματώδης· φλυκταινῶν τε ἐπανάστασις, καθάπερ ἐπὶ τῶν πυρκαϊύστων, ἔπεται· καὶ νομὴ περιλαμβάνει<sup>30</sup>, προχωροῦσα ἐπὶ τὰ παρακείμενα πάντα πλησίον, οὐ μόνον ἐπιτόλαιος, ἀλλὰ καὶ διὰ

28) Sic cod. Pat. apud. Goup. et Sarac.; μέλας γίνεται κύκλω Ald. — Cornar.

29) Paull. περίχυσις.

30) Ex Paullo loco vulg. προκαταλαμβάνει.

quae iuxta sunt, tactum non sentiunt. Si quis eam partem defricuerit, atra excernitur, crassa et graveolens sanies.

Cap. VIII. [De mure araneo.] A mure araneo demorsis circa locum morsus nascitur inflammatio, pustula quoque nigra exsurgit, aquosa sanie plena: proximae vero partes omnes livent. Rupta pustula accedit depascens ulcus, ei non absimile, quod a serpentium ictibus existit. Super haec intestinorum tormina, urinae difficultas et circumfluus mador frigidus.

Cap. IX. [De vipera.] A vipera demorsi corpus intumescit ac magnopere inarescit, subalbidum colorem nanciscens. Sanies e vulnere profunditur, primum subpinguis, mox vero cruenta, tandemque pustulae, quales in ambustis, erumpunt. Accedit his ulcus depascens, quod in proximas partes omnes serpit. Nec summam so-

βάθους· αἰμάσσεται δὲ αὐτοῖς καὶ τὰ οὖλα· καὶ περὶ τὸ ἥπαρ συνίσταται φλεγμονή· στρόφοι τε καὶ χολώδεις ἐπισυμβαίνουνσιν ἔμετοι· προσγίνεται δὲ αὐτοῖς καὶ τρόμος<sup>31</sup> καὶ κᾶρος καὶ δυσουρία καὶ ψυχρὰ περιόδῳσις.

Κεφ. ι'. [Περὶ σκυτάλης καὶ ἀμφισβαίνης.] Παραπλήσια δὲ συμβαίνει καὶ τοῖς ὑπὸ τῆς προσγορευομένης σκυτάλης ἢ ἀμφισβαίνης δηχθεῖσι· βοηθεῖ δὲ σχεδὸν ἤδη τὰ πάντα· διόπερ ἰδίας ἀναγραφῆς οὔτε τετύχηκεν, οὔτε ἤξιώθη τὸ εἶδος τοῦτο.

Κεφ. ια'. [Περὶ δρυίνου.] Τοῖς δὲ ὑπὸ δρυίνου δηχθεῖσιν ἰσχυραὶ περιωδυνίαι ἐμπίπτουσι καὶ φλυκταινώδεις ἐν τῷ οἰκείῳ μέρει, ὅπου δὲ καὶ ὑδατώδους ἰχώρος ἔκχυσις· ἐπακολουθεῖ δὲ καὶ καρδιωγμός<sup>32</sup> καὶ στρόφος.

Κεφ. ιβ'. [Περὶ αἰμόρῳου.] Τοῖς δὲ ὑπὸ αἰμόρῳου δηχθεῖσιν ἰσχυραὶ περιωδυνίαι ἐμπίπτουσιν· βραχέα δὲ παντελῶς καὶ στενὰ παρέχουσι τὰ ἀραιώματα ὑπὸ συνεχείας τῶν

31) Ex Paullo loco vulg. ἔμετος,

32) Ex Paullo loco vulg. δηγμός.

lum cutem occupat, sed et altius intro subit. Gingivae quoque cruentantur, et hepar inflammationeprehenditur. Succedunt tormina vomitusque biliosi: ad haec tremor, sopor, urinae difficultas frigidique sudores.

Cap. X. [De scytale et amphisbaena.] Consimilia eveniunt iis, qui a scytale aut amphisbaena demorsi sunt: eademque fere auxiliantur. Quamobrem propriam descriptionem hoc genus sortitum non est, neque visum est eius indigere.

Cap. XI. [De dryina.] A dryina morsis graves incidunt vehementesque dolores, parsque ipsa affecta in pustulas attollitur, e quibus sanies aquosa profunditur. Quin etiam stomachi rosiones et tormina consequuntur.

Cap. XII. [De haemorrhoo.] Ab haemorrhoo demorsis vehementes accidunt cruciatus, quibus assidue torquentibus interstitia membrorum plana vehementer contrahuntur brevioraque redduntur. E morso vero loco copiosus

ἀλγημάτων<sup>33</sup>· ἐκ δὲ τοῦ δῆγματος αἵματος<sup>34</sup> ἔκκρισις γίνεται πολλή· καὶ οὐλὴ καθ' ὅλου τοῦ σώματος<sup>35</sup> ὑπάρχει, ῥήγνυται καὶ αἰμορροεῖ<sup>36</sup>· τὰ δὲ διαχωρήματα αἵματωδῇ ἐκκρίνεται, καὶ τὸ ἀπορροούμενον αὐτοῖς<sup>37</sup> αἷμά ἐστι τεθρομβωμένον· βήσσοντές τε ἀπὸ πνεύμονος αἷμα ἀνάγουσι, καὶ τελευτῶσιν ἐξαιματοῦντες ἀβοηθήτως.<sup>38</sup>

Κε φ. ιγ'. [Περὶ διψάδος.] Τοῖς δὲ δηχθεῖσιν ὑπὸ διψάδος ἄστεκτος ὁ καῦσος γίνεται<sup>39</sup> καὶ δίψος ἐπιτεταμένον ἰσχυρῶς, ὥστε ἀπλήρωτόν τε καὶ ἀδιάλειπτον εἶναι, καὶ τὸ ποτὸν χανθὸν ἔλκειν· εἰς τὸ αὐτὸ δὲ καθίστανται τῷ μὴδὲ τὴν ἀρχὴν εἰληφότι τὸ ποτόν·<sup>40</sup> παραπλησία τε τοῦ ὅλου συγκρίματος ἕξις παρακολουθεῖ τῇ τῶν ὑδρωπικῶν<sup>41</sup> διὰ τὴν συνεχὴ τοῦ πόματος εἰσφοράν· ὅθεν προσητὴρ τε καὶ καῦσος προσαγορεύεται ἢ διψάς.

33) Ex Paullo, loco vulg. βραχέα δὲ καὶ στεγνὰ παντελῶς τὰ σώματα ὑπὸ συντυχίας τῶν ἀλγημάτων.

34) Ex Paullo: in editt. omittitur αἷματος.

35) Indidem: vulg. ἕτερον μέρος τοῦ σώματος.

36) Similiter e Paullo: vulg. παρέχει αἰμορροεῖν.

37) Sic Paull.; ἀπ' αὐτῆς vulgo.

38) Ex Paullo; vulg. ἀνάγουσι, καὶ ἐξεμουσιν ἀβοηθήτως.

39) Iterum e Paullo, loco vulg. ἄστεγνος ὄγκος ἔγκειται.

40) Et hoc e Paullo: vulg. καὶ τῷ αὐτῷ καθίστασθαι· τῷ δὲ μὴ τὴν ἀρχὴν εἰληφότι τὸ ποτόν.

41) Sic cum Cornar. ex Aëtio lib. 13. c. 22. correxi vulg.: παραπλησίον τι ὅλου τοῦ συγκρίματος ἀκολουθεῖ διὰ.

manat cruor. Quacunque alia corporis parte cicatrix forte fuerit, ea quoque finditur et sanguinem fundit. Quin et excrementa reiiciuntur cruenta, et quod iis secedit, grumosum sistit cruorem. Tussientes etiam e pulmonibus sanguinem educunt, et velut in sanguinem versi denique, sine auxiliorum spe, pereunt.

Cap. XIII. [De dipsade.] A dipsade percussos ardor habet intolerabilis, urgetque sitis usque eo pertinax, ut neque expleri possit, neque intermittat, atque ut ore pleno affatim potum hauriant. Perinde cetera se habent, ac si nullum antea potum sumsissent. Similis autem totius corporis habitus est hydropicis, propter assiduam potationem. Qua de caussa dipsas etiam presteris et causi cognomina meruit.



Κεφ. ιδ'. [Περὶ ὕδρου.] Τοῖς δὲ ὑπὸ ὕδρου δηχθεῖσι τὸ ἔλκος πλατύνεται καὶ μέγα γίνεται, πελιούμενον <sup>42</sup> ἰχώρ! τε ἐξ αὐτοῦ μέλας καὶ πολὺς καὶ δυσώδης, οἷος ἀπὸ νομῆς, ἐκκρίνεται.

Κεφ. ιε'. [Περὶ κέγχρου·<sup>43</sup>] Τοῖς δὲ ὑπὸ κέγχρου δηχθεῖσι τὸ μὲν δῆγμα ὁμοιον τοῖς ἀπὸ τῆς ἐχίδνης, σηπεδὼν δὲ παρακολουθεῖ· καὶ περιθρῆουσι σάρκες ἐξοιδήσασαι πρότερον, ὡς ἐπὶ ὕδρωπος· ληθαργαῖες τε γίνονται καὶ καταφορᾶς αἷτιοι. Ἐρασίστρατος δέ φησιν, αὐτοὺς πεπονθέναι τὸ ἥπαρ καὶ τὴν κύστιν<sup>44</sup> καὶ τὸ κῶλον· ἀνατμηθέντων γὰρ αὐτῶν διεφθαρμένα πως εὗρίσκεται ταῦτα<sup>45</sup> τὰ μέρη.

Κεφ. ις'. [Περὶ κεράστου.] Τοῖς δὲ ὑπὸ κεράστου δηχθεῖσιν ὁ μὲν τόπος ἐπαίρεται μετὰ σκληρίας καὶ φλυκταίνωσews· ῥεῖ δὲ ἀπὸ τοῦ δῆγματος ἰχώρ, ποτὲ μὲν μέλας, ποτὲ δὲ ὑπαώρεος· κιθόοειδής<sup>46</sup> δὲ γίνεται περὶ σύγκριμα τὸ ὅλον· καὶ τὸ μὲν αἰδοῖον τείνεται· ἡ δὲ διάνοια ἐξίσταται,

42) Actuar. addit. ἐν μέσῳ.

43) Τὸν κεγχρίνην appellant Nicander et Paull., κεγχρίδα Aristot., κεγχρίαν et κεγχρίην Actius, κεγχριδίαν noster infra c. 32.

44) Sic Ald.; νῆστιν Asul. et sequ.

45) Cum Sarac. loco πάντα scribo ταῦτα. Paullus etiam πάντα omisit.

46) Paull. κιρσοειδεῖς γίνονται.

Cap. XIV. [De natrice] A natrice demorsis vulnus dilatatur et ampliatur, simul livescens. Quin et sanies ex eo copiosa, eaque nigra et putida, quasi ex ulcere depascente, manat.

Cap. XV. [De cenchro.] Cenchri morsum, qui quidem viperino similis est, putredo consequitur, ac undique dilfluunt carnes, quae prius, velut in hydrope, intumuerant. Quin et icti veterno altoque sopori obnoxii sunt. Iisdem et iecur, vesicam et colon vale affici, Erasistratus asserit: dissectis enim corporibus haec viscera quodammodo corrupta deprehenduntur.

Cap. XVI. [De ceraste.] A ceraste demorsis pars in tumorem attollitur, cum duritia et pustularum eruptione. Profluit e plaga sanies, modo atra, modo quandantenus pallida: totus vero corporis habitus fulvescit: ipsum ge-

ὁφθαλμῶν τε ἀμαύρωσις ἐπιγίνεται· τέλος δὲ ἀπόλλυται σπώ-  
μενος τετάνω.<sup>47</sup>

Κεφ. ιζ. [Περὶ ἀσπίδος.] Τοῖς δὲ ὑπὸ ἀσπίδος  
δηχθεῖσι τὸ μὲν δῆγμα ὁμοιον τοῖς ὑπὸ βελόνης κεντήμασι  
μικρὸν παντελῶς φαίνεται χωρὶς τῆς ἐπάρσεως· καὶ αἱμάτιον  
δὲ οὐ πολὺ, ἀλλὰ βραχὺ καὶ μέλαν ἀποστάζει· ταχέα δὲ  
ἀμαύρωσις ὁμιάτων καταλαμβάνεται, πόνος τε ὅλου τοῦ σώ-  
ματος πολυειδής, παντάπασιν ἐλαφρὸς, καὶ οὐκ ἄτερ ἡδο-  
νῆς παρακολουθεῖ· διὸ καλῶς ὁ Νικάνδρος πεφώνηκε<sup>48</sup>

— — καμάτου δ' ἄτερ ὅλλυται ἀνήρ.

Χρόαν ἀτρόπιος καὶ χλωρανθῆς<sup>49</sup>, καρδιαγμὸς ὀλίγος· μέ-  
τωπον δὲ συνεχῶς ἀνασπᾶται· βλέφαρα κινοῦνται<sup>50</sup> μετ'  
ἀναισθησίας, ὁμοίως ὕπνω· κἂν τούτοις θάνατος συναίρει,  
μηδὲ τρίτον ἡμέρας διαλιπών.

47) Paull. τετανικῶς. Quod autem loco τέλος, πέλας habeat, men-  
dam esse existimo.

48) Nicandri ther. v. 188.

49) Vulgo χλοανθῆς; χλωανθῆς Paull.; χροὴ μῆλινόςεσσα καὶ αἰό-  
λος Nicander.

50) Quanquam interpretes prisci, qui *connivere* oculos dicunt,  
μύονται aut χαμμύονται loco κινοῦνται legisse videntur, haud ausus  
sum textum mutare, quoniam et Aëtius et Paullus et Actuarius κι-  
νεῖται s. κινοῦνται repetunt.

nitale arrigitur, mens labat et oculis caligo supervenit:  
tetano denique convulsi pereunt.

Cap. XVII. [De aspide.] Ab aspide commorsis  
vulnus perquam exiguum, quasi ab adacta acu, citra tu-  
morem conspicitur. Sanguis non ita copiosus, imo per-  
paucus, idemque ater, exstillat, ac derepente acies oculo-  
rum hebetatur: dolor simul totius corporis multiplex, sed  
omnino levis et non sine voluptate consequitur. Qua-  
propter recte Nicander cecinit:

— — at vir perit absque dolore.

Color minime constat, plerumque vero pallore virescit: ac-  
cedit exigua stomachi rosio: frons assidue revellitur: pal-  
pebrae sine sensu nictitant, velut per somnum: atque inter  
haec, vix interposito diei triente, mors ipsaprehendit.

Κεφ. ιη'. [Περὶ βασιλίσκου.] Ἐρασίστρατος ἐν τῷ καλουμένῳ περὶ δυνάμεων καὶ θανασίμων, περὶ τοῦ καλουμένου βασιλίσκου ῥητῶς οὕτω φησὶν· ὅταν δὲ ὁ βασιλίσκος δάκῃ, πληγὴ ὑπόχρυσος γίνεται.

Τὰ μὲν οὖν ἐν τοῖς πλείστοις τῶν ἰοβόλων παρακολουθοῦντα σημεῖα τοιαῦτά ἐστι· μεταβαίνοντες δ' ἐπὶ τὴν θεραπείαν, πρῶτον τὰ κοινὰ τῆς θεραπείας, ὥς δυνατόν, παραδώσομεν.

Κεφ. ιθ'. [Τίς κοινὴ τῶν ἰοβόλων θεραπεία<sup>51</sup>.] Πρὸς πᾶσαν πληγὴν ἰοβόλου ἀρμόζει ἡ διὰ τοῦ στόματος ἐκμύζησις· δεῖ δὲ μὴ ἄσιτον εἶναι τὸν ἐκμυζῶντα, ἀλλὰ καὶ εἰληφέναι τροφὴν καὶ διακλύζεσθαι οἶνῳ· ἔπειτα δὲ καὶ βραχὺ τι ἐν τῷ στόματι ἐλαίου κατέχων, οὕτω τὴν ἐκμύζησιν ἐπιτελείτω· καὶ αὐτὸς δὲ ὁ τόπος σπόγγῳ πυριάσθω, ἔπειτα δὲ ἐγκατασχαζέσθω· βαθυτέρας δὲ ἐμβάλλειν τὰς ἀμυχὰς προσήκει, ὅπως τὴν ὕλην ἐκ βάρους ἀναλαμβάνῃ· καὶ περισαρ-

51) Cornarus et Goup. hic incipiunt librum Dioscoridis octavum; ceteri secus.

Cap. XVIII. [*De basilisco.*] Erasistratus in libro, qui de medicaminibus ac venenis inscribitur, de basilisco ad verbum ita scribit: Cum momorderit basiliscus, vulnus ad auri colorem efflavescit.

Ceterum istae fere sunt notae, quae plerorumque virulentorum animalium ictus consequuntur. Iam superest, ad medendi rationem transgrediamur: ac primum communia, quoad eius fieri poterit, curationis praecepta tradamus.

Cap. XIX. [*Communis vulnorum a venenatis animalibus inflictorum curatio.*] Adversus quemvis virulenti animalis ictum oris suctio convenit. Sagentem vero oportet minime ieiunum esse, sed et prius cibum sumsisse, et os vino colluisse, praetereaque, dum vulnus exsugit, olei pauxillum ore continere. Ipse autem locus sponsia fovendus, deinde scarificandus: sed rimas (vulnusculla) altius adigere expedit, quo melius materiem e profundo revocemus. Caruis vero circinatio sectioque scari-

κισμός δὲ καὶ ἔκτομή πλουσιώτερον κατασχασμοῦ βοηθοῦσιν· ἴδια γὰρ ἐπ' αὐτῶν τὰ χρησιμεύοντα γίνεται· ἐν μὲν, ὅτι αἵρεται ὁ ἰὸς ἐκ τοῦ τόπου· δεύτερον δὲ, ὅτι τῷ αἵματι συνεκκρίνεται πολλῶ καὶ ἀθρόω τὸ φθάσαν ἔσω παραελθεῖν· εἰ δὲ ὁ τόπος τὸν περισαρκισμὸν οὐ προσδέχοιτο, σικύας χρὴ προσβάλλειν μετὰ φλογὸς πλείονος· περὶ δὲ καύσεως ἐπὶ τῶν λυσσοδύκτων προειρήκαμεν· εἰ δ' εὐφυῶς ἔχει πρὸς ἀποκοπὴν τὸ μέρος τὸ δεδηγμένον, μάλιστα ἐπὶ πάντων θηρίων ἀνενδοιάστως τὸν ἀκρωτηριασμὸν ποιητέον, ὡς ἀσπίδος καὶ κεράστου καὶ τῶν ὁμοίων. Ὡς ἐπιτηδειότερα δὲ<sup>52</sup> τῶν προειρημένων βοηθημάτων ἄξιά ἐστιν τὰ ἐπιθέματα· ἐπιτιθέσθω δὲ τέφρα κληματίνη ἢ συκίνη, μετὰ κονίας στακτῆς πεφυραμένη<sup>53</sup>, γάρου δριμέος, ταρίχου· πράσα τε καὶ κρόμμυα καὶ σκόροδα, ποτὲ μὲν ὡς ἐκλειοτριβθέντα καταπλάσσεται<sup>54</sup>, ποτὲ δὲ καέντα προσβάλλεται τοῖς δῆγμασι· καὶ οἱ τῶν ὀρνίθων νεοσσοὶ διασχισθέντες καὶ θερμότατοι περιπτυσσόμενοι τῷ πεπληγότι τόπῳ· τινὲς μὲν ὡς ἀντιπαθέ-

52) Asulan. et sequ. habent διὰ, quod deest in Ald.

53) Ald. πεφυραμένης.

54) Sic Ald.; καταπλασσεσθω Asulan. et sequ.

ficatione ipsa longe potentius opitulantur: peculiararia nimirum haec duo commoda eveniunt: unum, quod virus e loco tollitur, alterum, quod eius veneni pars, quae iam ad interiora pervaserat, cum multo copiosoque sanguine excernitur. At, si locus circinationem haud admittit, cucurbitulae cum largiore flamma adhibendae sunt. Quod ad unctionem spectat, de ea iam ante inter rabiosorum remedia disseruimus. Si vero icta pars commodam, ut praecidatur, habet indolem, praesertim in omnium serpentium morsibus, uti aspidis, cerastae similiumque, ea procul dubio amputanda est. Tanquam opportuniora praedictis adminicula merito censentur epithemata. Imponatur ergo sarmentitius cinis aut ficulneus cum lixivio percolato subactus, additis garo acri et salsamento. Porra quoque, cepae et allia modo ad laevorem trita illinantur, modo cremata plagis adhibeantur. Iuvant et pulli gallinacei discissi, et, dum maxime calent, percusso loco adhibiti. Neque desunt, qui iis velut repugnantibus ve-



σιν αὐτοῖς ἐχρήσαντο· πρόχειρον δὲ ἔχει τὸν λόγον· φύσει γὰρ αἱ<sup>55</sup> ὄρνιθές εἰσι θερμαὶ, διὸ καὶ ἐπίσημον τὸν ἰὸν καταπιεῖναι τρύχουσι· καὶ τὰ ξηρότατα δαπανῶσι τῶν σπερμάτων· ἐνίοτε καὶ ψάμμους καὶ λίθους διαλύουσιν ἐμφαρυγξάμεναι· τοιγαροῦν πρὸς τὴν τοῦ ζώου θερμασίαν τὸ πνεῦμα, τὸ ἐκ τοῦ δεδηγμένου μέρους ὄρμην λαμβάνον, συνεξάγει τὸν ἰόν.

Ἔγνωμεν δὲ ἐπὶ τῆς Αἰγύπτου τοιοῦτόν τι γινόμενον· ὁπόταν οἱ Αἰγύπτιοι θερίσωσι τὸν στάχυν, χύτραν ἔχουσι κατεσκευασμένην πίσεως καὶ σφήκωμα προσηρτημένον τῇ χύτρᾳ· τότε γὰρ μάλιστα δεδίασι τὰ θηρία, καὶ διὰ τὴν ὥραν καὶ τὸ<sup>56</sup> λανθάνειν αὐτὰ κείμενα κατὰ τῶν ὁπῶν τῶν ἐν ταῖς ἀρούραις, ἐπισκοτούμενα ὁμοῦ καὶ ὑπὸ τῆς δασύτητος τῶν χωρῶν· πολλὰ δὲ κατὰ τὰ πεδία χαλεπώτερα τῶν ἰοβόλων ζώων ἢ Αἴγυπτος φέρει· ἐπειδὴν οὖν δηχθῇ τις πόδα ἢ ἄλλο τι μέρος, ταχέως οἱ παρατυχόντες τὸ σφήκωμα βάλλουσιν εἰς τὴν χύτραν τῆς πίσεως, καὶ περιειλοῦσιν ἅπαξ ἢ

55) Ald. οί.

56) Vulg. τῷ.

нено usi fuerint: verum in promptu est eius remedii ratio. Gallinae siquidem natura calidae sunt, argumento, quod devoratum insigne virus conficiunt et aridissima quaeque semina consumunt: interdum et arenas calculosque deglutitos molliunt ac dissolvunt. Itaque animantis admoti calore nativo adiutus spiritus, ab icta parte impetum capessens, simul venenum expellit.

Comperimus etiam, quid in Aegypto in eiusmodi casu fieri soleat. Dum spicas Aegyptii metunt, ollam picis paratam habent et appensam ollae fasciam. Tunc enim a serpentibus sibi maxime timent, tum propter anni tempestatem, tum quod opacis abditi cavernis densoque arborum caespite delitescunt: multa vero et infestissima e venenatis animalibus Aegyptus in campestribus alit. Cum primum ergo quispiam in pede aliave parte demorsus fuerit, ilico, qui adsunt, fasciam in ollam picis immittunt, ac semel aut bis brachium vel crus paulum supra vulnus

δὲς περὶ τὸν πῆχυν ἢ τὴν κνήμην, μικρὸν ἐπάνω τοῦ δῆγμα-  
τος, καὶ περισφίγγουσι δύο παρεστῶτες ἰσχυρῶς, καὶ ἐν-  
τέμνοντες τὸν τόπον διὰ τῆς περιθέσεως τοῦ βρόχου, ἐπι-  
χέουσι τὴν πίσσαν· ὅταν δὲ αὐταρκῶς ἔχῃν δοκῇ, τὸν βρό-  
χον ἀφαιροῦσι, καὶ καταπλάσσουσι κρομμύοις, καὶ δι' ἄλλων  
τῶν προειρημένων. Καὶ τούτων δὲ χωρὶς ὑγρὰ πίσσα μετὰ  
ἁλῶν λείων θερμότερων καταπλασσομένων σπουδαίως βοη-  
θεῖ, αὐτὴ καινοποιηθεῖσα συνεχέστερον· ὡς αὐτως ἀρμόζει  
καὶ κέδρος<sup>57</sup>, τὰ τε σφυρίδια τῶν αἰγῶν ἐν οἴνῳ καθεψό-  
μενα· ἀρήγει δὲ αὐτοῖς καὶ κατάντλησις δι' ὄξους θερμοῦ,  
καὶ καλαμίνθη ἐψομένη δι' οὔρου καὶ θαλάσσης ἢ ὀξάλης.  
Εἰσὶ δὲ καὶ ἐμπλαστροὶ δριμύταται καὶ θερμόταται, καὶ δυ-  
νάμεναι τὸν ἰὸν ἐπισπᾶσθαι καὶ διακρατεῖν καὶ διαφορεῖν·  
ὡς δι' ἁλῶν ἢ νίτρου καὶ σινάπεως ἢ κάγχρους προσφερό-  
μεναι· ὥσπερ<sup>58</sup> ἑξῆς ῥητέον.

Οὐκ ἀλόγως δὲ ὁ Ἐρασίστρατος ἐπιμέμφεται τοῖς ἀγνώ-  
στοις δυνάμει πρὸς τὴν χρεῖαν ἀναγεγραφόσιν, ὡς χολὴν  
ἐλέφαντος καὶ κροκοδείλου, καὶ αἷμα χελώνης καὶ ὠὰ, καὶ

57) Posset quidem ex Diosc. 1, 105. κεδρ/α potius legi: sed et  
Paullus habet κέδρον.

58) Ald. ὥσπερ.

obligant, et arctissime duo e praesentibus undique con-  
stringunt, locumque incidentes, qua circumactus est la-  
queus, picem instillant. Ubi vero sat picis infudisse sibi  
videntur, laqueum resolvunt et cepas aliaque memorata  
adhibent. Quin et citra haec pix liquida cum sale trito  
ac fervente illita praesentaneo est auxilio, si frequentius  
deinceps innovetur. Similiter et convenit cedrus (cedria),  
itemque fimum caprinum ex vino decoctum. Sed et iu-  
vat perfusio ope aceti calidi, calaminthae etiam in urina  
et aqua marina seu muria acida decoctae. Sunt et em-  
plastra acerrima simul et calidissima, eaque quae vene-  
num elicere, vincere ac discutere possunt: cuiusmodi  
sunt, quae e sale et nitro, sinapi et canchry componun-  
tur, de quibus deinceps erit agendum.

Non sine ratione Erasistratus eos reprehendit, qui  
incognita remedia in hunc usum conscripsere: qualia sunt  
fel elephanti aut crocodili, sanguis testudinis eiusque ova,

τὰ παραπλήσια· δοκοῦσι μὲν γάρ τινα πεποιοῦσθαι παράδο-  
σιν ὠφελούντων· ἐξηπατήκασι δὲ αὐτὰ μόνα τοὺς ἐντυγά-  
νοντας· ὅθεν τὰ μὲν τοιαῦτα παραιτητέον, μήτε ῥαδίως εὐ-  
ρεθῆναι δυνάμενα, εἰ μὴ ὑπ' ἐξουσίας βασιλικῆς· μήτε διὰ  
τῆς πλείστης τηρήσεως οἷαν εἰς τὸ πιστευθῆναι τὴν πείραν  
παρεσχημένα· τὰ δὲ κοινωφελῆ καὶ εὐπόριστα ὑποδεικτέον,  
τὰ καὶ εἰς πάντα καὶ ἐν πᾶσι τοῖς θηριοδῆκτοις δυνάμενα  
τὴν χρῆσιν παρέχειν. Σέρις τοίνυν καὶ ἐρίκη καὶ ἀστράγα-  
λος<sup>59</sup> πινόμενα μετ' ὄξους, πᾶσι τοῖς θηριοδῆκτοις βοηθεῖ·  
ὥσαύτως καὶ ἀσφαλτος<sup>60</sup> καὶ πλατάνου χλωρὰ σφαιρία, καθ-  
εψηθέντα ἐν κράματι, καὶ παλιούρου ἀφέψημα· καὶ ῥίζα  
ἀριστολοχίας καὶ ἡρύγκης· καὶ δαφνίδες ἐφθαι κατεσθιόμε-  
ναι, καὶ πέπερι θαυσιλέστερον τρωγόμενον, καὶ πήγανον, καὶ  
ἄνηθον, καὶ κυκλάμινον· πράσων τε ἢ κόμη ἰδίᾳ σὺν ἄρτω,  
ἢ σκόροδα, ἢ κρόμμυα, καὶ τάριχος δριμύτατος· καὶ ὀριγᾶ-  
νου ἀφέψημα σὺν οἴνῳ πινόμενον· καὶ μαράθρου καὶ γλή-  
χωνος καὶ καλαμίνθης καὶ πράσων χυλὸς σὺν μέλιτι καταρ-

59) Paull. ἀστραγαλώτης, forte ἴρις ἀστραγαλῆτις, οἱ δὲ ἰλλυρικῇ.  
Galen. de compos. med. sec. loca lib. 1. p. 422.

60) Forte ἀσφάλτιον Diosc. lib. 3. c. 123. Sed utrumque habet  
Paullus.

aliaque similia. Videntur enim literis nonnulla tradidis-  
se, quae invare possint: ista vero sola lectoribus impo-  
suere. Quamobrem talia repudianda sunt, quippe quae  
non nisi facultatibus regiis facile redimi possint, neque  
pluribus experimentis fidei faciendae idoneis comprobari  
potuerint. Quae autem ad communem usum pertinent,  
quaeque paratu facilia sunt, et quibuscunque a serpente  
percussis auxilium ferre possunt, subiungenda esse viden-  
tur. Intybus itaque, erica et astragalus ex aceto pota  
contra omnes serpentium morsus auxiliantur. Itidem et  
asphaltus (asphaltium) ac virentes platani globuli in vino  
diluto cocti, paliuri decoctum, radix aristolochiae et  
eryngii: decoctae etiam lauri baccae in cibo sumtae, pi-  
per largius esitatum, ruta, anethum et cyclamen: coma  
porrhorum privatim ex pane, aut allia, vel cepae et salsam-  
entum quam acerrimum: itemque origani decoctum e  
vino potum, quin etiam foeniculi, pulegii, calaminthae

ῥοφούμενος· ταῦτα μὲν ἐκ τῶν φυομένων· ἀπὸ ζώων δὲ λαμβάνεται τινα ὠφελίμως, ἐγκέφαλοι μὲν ἀλεκτρούων ἐσθιόμενοι, πιτύα δὲ λαγωῦ σὺν οἴνῳ πινομένη, καὶ καστορίου <β'<sup>61</sup> τὸν αὐτὸν τρόπον· λέγεται δὲ καὶ, ὅτι χελώνης θαλασσίας οἱ ὄρχεις λαμβανόμενοι βοηθοῦσιν· ἔτι δὲ καὶ ἡ γαλῇ σκελετευθεῖσα τῶν βεβοημένων εὐρίσκεται· πρότερον δὲ πάντῃ σχισθεῖσα, τῶν ἐντὸς ἐκκριθέντων, σκελετεύεται, καὶ ἀπ' αὐτῆς δίδραχμον σὺν οἴνῳ πίνεται.<sup>62</sup>

Τοσαῦτα δὴ καὶ τὰ ἀπλᾶ τῶν προσγερομένων. Ἀρμόζει δὲ τοῖς θηριοδῆκτοις καὶ κάθαρσις διὰ κοιλίας, καὶ ἰδρωτοποιΐα, καὶ οὖρων πολλῶν ἔκκρισις· σκευαστὰ δὲ ποτῆματα παραδέδοται καινότερως ὑπισχνούμενα βοηθεῖν, ὥς ὁπίου καὶ σμύρνης ἀνὰ ὀβολὸς, καὶ πεπέρεως <β'. ταῦτα δὲ δεῖ μέλιτι ἀναλαμβάνειν, καὶ διδόναι κυάμου μέγεθος αἰγυπτίου μετ' οἴνου· ὁμοίως πηγάνου ἀγρίου σπέρματος, μελανθίου,

61) Cum Paullus <α', Dioscorides 2, 26. <β' pondus impereant, nec facile quisquam maiorem ferre possit dosin, οὐγγίαι β', quas editiones habent, expungendae sunt.

62) Omnis hic locus: ἔτι δὲ καὶ — οἴνῳ πίνεται, a Cornario iam sic restitutus est. Vulgo legitur: ἔστι δὲ ἡ γαλῇ ἡ σκελετευθεῖσα τῶν βεβοηθημένων, εὐρίσκεται δὲ πρότερον ἢ πάντῃ σχισθεῖσα τῶν ἐντὸς ἐκκριθέντων — — — πινόμενον.

porrorumque succus cum melle sorptus. Et haec quidem e plantis sumuntur. Ab animalibus vero quaedam utiliter etiam accipiuntur, velut cerebra gallinaceorum comesta, et coagulum leporinum ex vino potum, et castorii drachmae binae. Dicuntur et testiculi testudinis marinae assumpti prodesse. Mustela itidem assiccata celebratur: haec, prius exemtis interaneis, undequaque discinditur ac deinde exsiccatur, et ex ea binae drachmae cum vino bibuntur.

Sed de simplicibus, quae exhiberi solent, hactenus. Porro convenit etiam a serpente percussis purgatio per alvum, uti et sudoris evocatio, et copiosa urinae excretio. Exstant et compositae quaedam potiones, quae polliceri praesidia nuper traditae sunt, uti, quae constat ex opii myrrhaeque singulis obolis et piperis drachmis duabus. Ea melle excipiuntur, et mole aegyptiae fabae dantur cum vino. Similiter rutae sylvaticae seminis, melanthii, cu-



κυμίνου αἰθιοπικοῦ, χαλβάνης, ἀριστολογίας, ταῦτα πάντα λεανθέντα καὶ φυραθέντα χυλῷ εὐζώμου, ἀναπλάσσονται τροχίσκοι δραχμιαῖοι· διδόναι δὲ ἐξ αὐτῶν μετὰ οἴνου ἡμικοτύλιον<sup>63</sup>. Ταῦτα μὲν περὶ τῶν κοινῇ βοηθούντων· τὰ δὲ ἴδια πρὸς ἕκαστον τῶν ἰοβόλων ἐξῆς εἵπομεν.

Κεφ. κ'. [Περὶ θεραπείας τῶν ὑπὸ σφηκῶν καὶ μελισσῶν δεδηγμένων.<sup>64</sup>] Ἐν τῇ σημειώσει περὶ σφηκῶν καὶ μελισσῶν οὐδὲν διηρθρώσαμεν· εὐδήλα γὰρ πᾶσιν ἦν, καὶ παράσημον ἔχει ἐξαίρετον, οὐδ' ὅτιοῦν φυλασσόμενον· ἐν δὲ τῇ θεραπείᾳ καὶ τούτων οὐκ ἄτοπον μνημονεύσαι. Πρὸς οὖν<sup>65</sup> τὰς πληγὰς σφηκῶν καὶ μελισσῶν ἀρμόζει μαλάχη καταπλασσομένη, καὶ κρίθινον ἄλευρον σὺν ὄξει, καὶ συκῆς ὁπὸς ἐνσταζόμενος τοῖς δῆγμασι, καὶ πυρία δι' ἄλμης ἢ θαλάσσης.

Κεφ. κα'. [Περὶ τῶν ὑπὸ φαλαγγίων δεδηγμένων.] Τοῖς δὲ ὑπὸ φαλαγγίων δεδηγμένων ταῦτα ἐπιτιθέναι δεῖ·

63) Sic Ald.; ἡμικοτυλιαίου Asul. et reli.

64) In Ald., Asulan. et Marc. incipit hic liber IX. Dioscoridis.

65) Cornar. primus οὖν addidit: ut in unum contraheret, quae ab Ald., Asul. et Marc. seiuncta essent, cum hic caput primum apud eos inciperet,

mini aethiopici, galbani, aristolochiae, singulorum portiones tritae et cum erueae succo subactae digeruntur in pastillos, quorum singuli drachmam pendeant: datur vero cum vino hemina dimidia. Haec adversus omnes ictus communia sunt. De peculiaribus contra unamquamque bestiam venenatam auxiliis deinceps agendum.

Cap. XX. [Curatio a vespis et apibus morsorum.] In doctrina de signis minime de vespis et apibus speciatim disseruimus. Omnibus enim manifesta videbantur, neque eximium quicquam aut notatu dignum in iis observabatur. Inter remedia tamen et eorum (signorum) meminisse haud abs re fuerit. Igitur adversus apum vesparumque ictus prodest imposita malva et hordeacea farina cum aceto, itemque lac ficulneum ictibus instillatum, denique fots ex muria aquave marina.

Cap. XXI. [Curatio eorum, quos phalangia momorderint.] Phalangiorum vero morsibus sequentia imponi

τέφραν συκίνην σὺν ἁλσὶ λείοις μετ' οἴνου πεφυραμένην, ἣ  
 ῥίζαν ἀγρίας ῥόας λελειοτριβημένην, ἣ ἀριστολογίαν, σὺν κρι-  
 θίνῳ ἀλεύρῳ καὶ ὄξει δεδευμένην· καταντλεῖν δὲ θαλάσσην<sup>66</sup>  
 τὰ ἔλκη, ἣ μελισσοφύλλου ἀφεψήματι, ταύτης δὲ τὰ φύλλα ἐπι-  
 πλάσσειν· λουτρὰ δὲ παραλαμβάνειν συνεχέστερον<sup>67</sup> καὶ προ-  
 ποτισμοῖς χρηστέον διὰ τούτων τῶν φαρμάκων, ἀβροτόνου τὸ  
 σπέρμα, ἀνισον<sup>68a</sup>, ἀριστολογία, ἐρέβινθος ἄγριος, κύμινον  
 αἰθιοπικόν, κεδρίδες λῆλαι, πλατάνου φλοιὸς, καὶ τὸ σπέρμα  
 τῆς τριφύλλου πόας· τούτων δὲ ἐκάστου διδόναι κατ' ἰδίαν  
 <β>, μετ' οἴνου κοτύλης α'. Λίδοται δὲ καὶ μυρικής ὁ καρ-  
 πὸς ὡσαύτως καὶ χαμαιπίτυος καὶ τῶν χλωρῶν τῆς κυπα-  
 ρίσσου σφαιρίων τὸ ἀφέψημα κιονάμενον μετ' οἴνου. Φασὶ  
 δὲ τινες καὶ καρκίνον ποτάμιον χυλισθέντα μετὰ γάλακτος,  
 καὶ προσλαβόντα σελίνου σπέρμα, παραχρηῖμα<sup>68b</sup> τῶν ὀχλη-  
 ρῶν ἀπαλλάσσειν.

Κεφ. κβ'. [Περὶ τῶν ὑπὸ σκολοπένδρας δεδηγμένων.]  
 Τοῖς δὲ ὑπὸ σκολοπένδρας δεδηγμένοις κατὰ μὲν τὴν πλη-

66) Paull. addit *θερμοτέρα*.

67) Sic Paull.; *λουτρῶν δὲ λίαν συνεχέστερον* vulgo.

68a) Paull. *ἀνηθον*.

68b) Sic Ald., *omissum ab Asul. et sequ.*

oportet: ficulneum cinerem, adiecto sale trito cum vino  
 subactum, aut radicem punicae sylvestris ad laevorem tri-  
 tam, aut aristolochiam cum hordei farina et aceto sub-  
 actam. Ulcera autem aqua maris perfundenda, aut melis-  
 sophylli decocto, ac eiusdem folia illinenda. Balnea  
 etiam frequentius adhibenda, itemque potiones e sequen-  
 tibus; abrotani inquam semine, aniso, aristolochia, cicere  
 sylvestri, cumino aethiopico, cedri fructibus tritis, plata-  
 ni cortice et trifolii herbae semine: seorsim autem sin-  
 gulorum binas drachmas dare convenit cum vini hemina.  
 Exhibetur et tamaricis fructus: similiter et chamaepityos  
 ac viridium expressi globulorum decoctum vino tempera-  
 tum. Sunt et qui asserant, fluviatilis cancri expressum  
 cum lacte succum, adiecto apii semine, omnibus statim  
 liberare molestiis.

Cap. XXII. [De scolopendrae morsu.] A scolopen-  
 dra morsis sal quam tenuissime tritus ex aceto vulneri  
 DIOSCORIDES II. F

γὴν ἐπιθέσθαι δεῖ λειοτριβημένον<sup>69</sup> μετ' ὄξους ἄλας, ἢ πήγανον ἄγριον· καταντλεῖν δὲ ὀξάλην τὸν τόπον, πότιμα δὲ προσφέρειν ἀριστολογίαν μετ' οἴνου, ἢ ἔρφυλλον, ἢ καλαμίνθην, ἢ πήγανον ἄγριον.

Κε φ. κγ'. [Περὶ σκορπίου πληγῆς.<sup>70</sup>] Τοῖς δὲ ὑπὸ σκορπίου πληγεῖσι παραχρῆμα μὲν ἀκριβῶς βοηθεῖ συκῆς ὀπὸς εἰς τὰ τραύματα ἐνσταχθεῖς· αὐτός τε ὁ πλήξας σκορπίος λειοτριβηθεὶς καὶ ἐπιτεθεὶς τῷ πληγθέντι τόπῳ, τῆς ἰδίας πληγῆς γίνεται βοηθὸς κατὰ τινὰ ἀντιπάθειαν, ὥς ἔοικε· μετὰ δὲ τοῦτο ἀρμόζει λεῖος ἐπιτιθέμενος ὁ σκορπίος σὺν ἅλατι καὶ λινοσπέρμῳ καὶ τῇ ἁλθαίᾳ βοτάνῃ· βοηθεῖ δὲ καὶ θεῖον ἄπυρον ἀναληψθὲν ῥητίνῃ τερμινθίνῃ, καὶ ὥς ἐμπλαστρον ἐπιρῥοφέν· ὁμοίως δὲ καὶ χαλβάνῃ πλατυνθεῖσα σπληνίου τύπῳ, καὶ καλαμίνθῃ λεῖα καταπλασσομένη, καὶ ὠμήλυσις ἐν οἴνῳ σκευασθεῖσα, ἐν ἀγεψήματι πηγάνου· βοηθεῖ δὲ τὸ σπέρμα τῆς τριφυλλοῦ<sup>71</sup> πόας λεαινόμενον καὶ ἐπιρῥοπτούμενον. Τοπικὰ μὲν οὖν ταῦτα. Μετὰ δὲ τούτων καὶ ποτή-

69) Sic Ald. et Asul.; Corn. λειοτριβόμενον; Paull. λειοτριβήμενους.

70) Sic Paull.; vulg. περὶ τῶν ὑπὸ σκ. δεδηγμένων.

71) Ald. τριφυλλίας.

imponendus, vel ruta sylvestris. Locus acida muria foven-  
dus, et danda in potu aristolochia cum vino, aut ser-  
pyllum, calamintha etiam, aut ruta sylvestris.

Cap. XXIII. [De scorpionis ictu.] Ictis a scorpione  
praesentissimo est auxilio lac ficulneum in vulnera instil-  
latum. Scorpium etiam ipse, qui ictum vibravit, tritus et  
percusso loco impositus sui ipsius ictus remedium est,  
quod antipathia quadam fieri videtur. Praeterea convenit  
et scorpium tritus, et cum sale, lini semine et althaeae  
herba impositus. Auxiliatur et sulfur ignem hand exper-  
tum, resina terebinthina exceptum, et emplastri modo  
adhibitum. Similiter et galbanum ad splenii formam di-  
ductum, itemque calamintha trita et illita, nec non et  
cruda farina cum vino subacta, addito rutae decocto. Iu-  
vat etiamnum semen trifolii herbae tritum ac vulnere in-  
iectum. Localia haec sunt. Cum his autem utendum est

μασι χρηστέον ὡς ἀνυσιμωτάτοις· ἔστι δὲ ἀριστολογίας δί-  
 δραχμον, μάλιστα τοῦ φλοιοῦ, σὺν οἴνῳ, γεντιανὴ κεκομ-  
 μένη, καὶ γλήχων καθεψημένη<sup>72</sup>, καὶ δαφνίδες ἀριθμῶ βρα-  
 χεῖ<sup>73</sup> λειοτριβοῦμεναι, καὶ καλαμίνθη μετὰ ὀξυκράτου· δεῦ δὲ  
 αὐτὴν ἐπιπολὺ ἐψηῆσαι ἐν τῷ ὀξυκράτῳ· καὶ κύπειρος<sup>74</sup> μετ'  
 οἴνου ἢ πηγάνου ὡσαύτως· καὶ συκῆς ὀπὸς, καὶ σίλφιον, εἰ  
 παρείη· μὴ παρόντος δὲ, τῷ παρθικῷ<sup>75</sup> χρηστέον ὁπῶ·  
 ποιεῖ δὲ καὶ ὁ τοῦ τριφύλλου καρπὸς πινόμενος καὶ τὸ τοῦ  
 ὠκίμου σπέρμα· τούτοις δὲ πᾶσιν ἀντιπαρατάσσεται λου-  
 τροῦ συνεχῆς χρῆσις<sup>76</sup> μετὰ πολλῆς ἰδρώσεως καὶ οἰνοποσίας  
 μετὰ κρύματος.

Κεφ. κδ'. [Περὶ τῶν ὑπὸ τρυγόνος θαλασσίας πεπλη-  
 γμένων.] Τοῖς δὲ ὑπὸ τρυγόνος θαλασσίας πληγεῖσιν ἀρμό-  
 ζει πάντα τὸν αὐτὸν τρόπον, ὅσον<sup>77</sup> μικρὸν ὕστερον ἐπὶ τῶν  
 ἐχιδοῦκτων ἐροῦμεν.

Κεφ. κέ'. [Περὶ δράκοντος καὶ σκορπίου τῶν ἐκ θα-

72) Ex Paullo: ἐπικαθημένη vulgo.

73) Paull. δέκα.

74) Paull. κυπερίς. Vulgo κυπάρισσος.

75) Ex Paullo, loco vulg. πευκεδάνου. Supra iam ὀπὸς μηδικὸς  
 ἢ παρθικὸς laudabatur.

76) Sic Ald. et Goup.; τούτοις δὲ πλατύτερον λουτροῦ συνεχῶς χρῆ-  
 σις Asulan.

77) Sarac. mavult ὅσα.

potionibus ut efficacissimis, quales parantur ex aristolo-  
 chia, praesertim corticis, binis drachmis cum vino, e  
 gentiana tusa et pulegio decocto, tritis itidem lauri bac-  
 cis numero paucis, et calamintha in posca multum de-  
 cocta. Valet et cyperus cum vino, et ruta similiter: sic  
 et lac ficulneum, et silphium, si affuerit, sin minus, par-  
 thico utendum succo. Efficax quoque est epotum trifolii  
 semen, nec non et ocimi. Sed his omnibus aequipollent  
 frequens balnei usus cum multa sudatione, dilutaque po-  
 tio vini.

Cap. XXIV. [De morsis a pastinaca marina.] Quae  
 deinceps a vipera demorsis conferre dicemus, eadem  
 omnia et eodem modo percussis a pastinaca marina con-  
 veniunt.

Cap. XXV. [De marinorum draconis scorpiique



λάσσης.<sup>78]</sup> Γίνονται δὲ ἰδίως<sup>79</sup> πληγαὶ καὶ ὑπὸ δράκοντος καὶ σκορπίων τῶν ἐκ θαλάσσης· καὶ περιωδυνίας χαλεπὰς φέρουσι, σπανίως δὲ ποτε καὶ νομάς· ἀρμόζει δὲ πρὸς τὰς πληγὰς αὐτῶν ποτισμὸς ἀψινθίου ἢ ἐλελίσφακου, ἢ θείου σὺν ὄξει τετριμμένου· καὶ αὐτοὶ δὲ ἀναπτυχθέντες καὶ ἐπιτεθέντες τοῖς τραύμασι τὰς ἰδίας ἰῶνται πληγὰς<sup>80</sup>.

Κεφ. κς'. [Περὶ τῶν ὑπὸ μυγαλῆς δεδηγμένων.] Τοῖς δὲ ὑπὸ μυγαλῆς δηχθεῖσι βοηθεῖ χαλβάνης<sup>81</sup> σπληνίων ἐπιτεθέν κατὰ τοῦ δήγματος, ὡς φάρμακον μετ' ὄξους λελειοτριβημένον, καὶ κρόθινον ἄλευρον μετ' ὄξυμέλιτος ἐπιπλασθέν· καὶ ἡ αὐτὴ δὲ ἡ δακοῦσα μυγαλῇ ἀναπτυσσομένη καὶ ἐπιτιθεμένη τῆς ἰδίας πληγῆς ἀντιφάρμακόν ἐστι, καὶ γλυκείας ῥοιᾶς ἐφθὰ καταπλασθέντα κοκκία<sup>82</sup> καὶ πράσα ἐφθὰ καταπλασθέντα καὶ σκόροδα συντετριμμένα καὶ ἡ διὰ τῆς

78) Cod. Paris. habet hanc inscriptionem peculiaris capitis. In Ald. sine inscriptione continuantur sequentia ad verbum, Asulan. ἀρμόζει δὲ proxime post ἐροῦμεν ponit.

79) Cod. Paris. et Sarac. ἰώδεις.

80) E Diosc. 2, 15. sic Marcell. emendavit vulg. αὐτὴ δὲ ἀναπτυχθεῖσα etc., cuius loco Cornar. ex Paullo et Dioscor. 2, 24. καὶ τριγλὴ δὲ ἀναπτυχθεῖσα praeferit.

81) E Paullo; vulgo χαλβάνη, cuius loco Sarac. suadet χαλβάνη ὡς σπληνίων.

82) Σίδια habent Paull. et Aët.

ictibus.] Peculiares sunt etiam ictus, qui a dracone scorpioque marinis inferuntur, quippe qui acerbissimos dolores, raro etiam depascentia ulcera excitant. Hisce absinthii, aut salviae, vel sulfuris ex aceto triti potio subvenit. Quin et ipsi (piscēs), diffissi et vulneribus impositi, propriis ictibus medentur.

Cap. XXVI. [De muris aranei morsu.] Demorsis a mure araneo splenium e galbano vulnere impositum per se, aut ex aceto tritum auxiliatur, itemque hordeacea farina ex aceto mulso illita. Quin et mus ipse araneus, qui morsum intulerit, si divulsus imponatur, contra ictum suum remedio est. Idem praestant dulcis mali punici cocculi decocti et illiti. Similiter porri cocti adhibitique, itemque allia contrita, et muriae calidae fots. Atque

θερμῆς ἄλμης<sup>83</sup> κατάντλησις. Τοπικὰ μὲν ταῦτα· ποτιζόμενον δὲ ἀρήγει ἀβρότονον καθεψηθὲν, εἶτα δι' οἴνου προσφερόμενον· ἔρπυλλος δὲ καὶ χαλβάνη καὶ εὐζωμον διεθέντα οἶνω, καὶ κυπαρίσσου τὰ ἀπαλὰ σφαιρία μετ' ὄξους, καὶ κυκλάμινον μετ' ὄξυμέλιτος, καὶ πύρεθρον σὺν οἶνω, καὶ χαμαιλέοντος τῆς βοτάνης ἢ ῥίζα. Τινὲς δὲ ἀναγράφουσιν, ὅτι καὶ αὕτῃ λειοτριβηθεῖσα ἡ μυγαλῇ πρὸς τὸ ἴδιον πλῆγμα ποτίζεται· τὴν δὲ ἱστορίαν ταύτην ἐν ἄλλοις κειμένην εὐρόντες, παρασημειώσεως μόνον ἠξιώσαμεν· ἔτιοι δὲ φασὶ μὴ ἄλλως ἐλκοῦσθαι τὸν δηχθέντα, εἰ μὴ ἔγκυος<sup>84</sup> ἡ μυγαλῇ τυγχάνει· τότε οὖν φασὶ βοηθεῖν.

Κεφ. κζ'. [Περὶ τῶν ὑπὸ ἐχίδνης διεδηγμένων.] Τοῖς δὲ ὑπὸ ἐχίδνης δηχθεῖσι βοηθοῦσι τῶν αἰγῶν αἱ σπύραθοι μετ' οἴνου ἀνατεθεῖσαι<sup>85</sup> σπουδαίως· καὶ δάφνη ὡσαύτως, καὶ ἀβρότονον καὶ χαλβάνη ἀντὶ σπληνίου ἐπιρριπτούμενα, καὶ ὀρίανος γλωρὰ ἀνεθεῖσα<sup>86</sup>, καὶ τῶν ὀρνίθων οἱ νεοσσοὶ ἀναπτυχθέντες καὶ παραχρῆμα προστιθέμενοι· ὀροβινόν τε ἄλευρον μετ' οἴνου πεφυρωμένον· καὶ ῥαφάνου γλοιὸς ἰσχυ-

83) E Paullo ἄλμης addidi.

84) Ex Oribas. et Aët. Cornarius restituit. Vulgo ἐκτός,

85) Paull. κατέπλησθεῖσαι. Sarac. mavult ἀνεθεῖσαι,

86) Paull. λειανθεῖσα.

haec quidem affecto loco imponuntur. Prodest vero potum abrotani decoctum, in vino exhibitum: praeterea serpyllum, galbanum ac cruca, si in vino diluantur, itemque teneri cupressi globuli cum aceto, cyclamen cum aceto mulso, pyrethrum cum vino et chamaeleontis herbae radix. Tradunt nonnulli, tritum murem araneum contra suos ictus commodè bibi. Eam traditionem apud alios inventam dignam rati sumus, quae commemoraretur. Asserunt alii, vix ulcerari demorsum, nisi praegnans fuerit mus araneus, ac tum demum auxiliari ferunt.

Cap. XXVII. [De morsis a vipera.] Demorsis a vipera fimum caprinum cum vino impositum statim opitulatur: nec non et laurus, abrotanum et galbanum, splenii loco superiecta, nec non origanum viride dilutum: item pulli gallinaei discerpti ac protinus appliciti: ervi farina vino subacta, raphani cortex valide contusus, ut

ρῶς κοπεῖς, ὥστε λειότατος γίνεσθαι, καὶ σκίλλα ὅπτη<sup>87</sup> καὶ χαμαίμηλον λελειωμένα, καὶ ὠμήλυσις δι' ὄξυμέλιτος ἐσκευασμένη, προκατηντλημένου θερμοῦ. Ταῦτα μὲν το-  
πικῶς ἐπιτιθέμενα· ὠφέλει δὲ τοὺς ἐchioδήκτους καὶ βά-  
τος μετ' οἴνου· ἐνιοὶ δὲ ἄγχουσαν τὴν λεπτόφυλλον βοηθεῖν  
ἀφηγοῦνται·<sup>88</sup> πίνεται δὲ καὶ λαγωῦ τῆς πιτύας ὅσον τριώ-  
βολον ἐν οἴνῳ<sup>89</sup>, καὶ πράσου χύλισμα ὅσον ἡμικοτύλιον<sup>90</sup>  
ἐν ἀκράτῳ· καὶ μελισσοφύλλου τῶν φύλλων ὁ χυλὸς, καὶ  
πήγανον ἄγριον· ταῦτα δὲ ἐν οἴνῳ δεῖ ποτίζειν· καὶ αὐτὴ ἡ  
ολινοποσία συνεχῶς παραλαμβανομένη, σκόροδά τε ἐσθιόμενα  
καὶ κρόμμυα, καὶ πράσα ἀπαλὰ, καὶ τάρικος δοιμύτατος  
καὶ πολυτελέστατος·<sup>91</sup> καὶ τὰ μὲν ἀπλᾶ ταῦτα. Καὶ αὐτὸ  
δὲ τὸ φάρμακον εὐδοκιμοῦν ἐπὶ τῶν ἐchioδήκτων<sup>92</sup>, ὅπερ ἐστὶ  
σμήρνης, καστορίου, πεπέρως, σανδαράχης ἀνὰ < α' <sup>93</sup>,  
ἀνήθου σπέρματος ὄξυβάφον τὸ ἥμισυ· ταῦτα λέαινε ἐν γλυ-

87) Paull. ἐφθή.

88) Solus Asul. mendose ἐφικνοῦνται.

89) Sic Ald. Ceteri omittunt ἐν οἴνῳ.

90) E Paullo: κατύλιον vulgo.

91) Cornar. coniecit πολυτελέστατος.

92) Sic Cod. Par. apud Goup. Vulgo ὀφιοδήκτων.

93) Sic Paullus e Lyco. Vulgo ἀνδράχνης ἄνθους καὶ σπέρμα-  
τος ὄξυβάφον.

tritus appareat: seilla tosta et chamaemelum, quae ad  
laevorem terantur, et cruda farina ex aceto mulso sub-  
acta: sed locus ante calida foveatur. Et haec quidem  
affectae parti admoventur. Rubus vero intro sumtus con-  
tra viperae ictus in vino prodest. Nonnulli et anchusam  
tenuifoliam auxilio esse prodiderunt. Bibuntur et leporini  
coaguli oboli terni, et porracei succi semihemina in me-  
ro: itemque foliorum melissophylli succus et sylvestris  
ruta: haec ipsa quoque in vino propinari debent. Quin  
et ipsa vini potio frequens iuvat, alliorumque, ceparum  
ac porrorum tenerorum esus, salsamentaue acerrima et  
exquisitissima. Simplicia haec sunt. Compositum vero  
medicamentum contra viperarum morsus celebratur,  
quod e myrrhae, castorii, piperis, sandarachae anethi-  
que seminis, singulorum dimidio constat acetabulo: haec

κεῖ κρητικῶ, ἥ ἐτέρῳ τινὶ τῶν σπουδαίων. Ἐρασίστρατος δὲ ἐν τῷ περὶ δυνάμεων ἀνεγράψατο, καὶ ἄλλα τινὰ πλείονα βοηθεῖν δυνάμενα τοῖς ἐχιοδήκτοις· τὰ δοκιμώτατα δὲ τοιαῦτα.<sup>94</sup> τοὺς τῶν ὀρνίθων ἐγκεφάλους σὺν οἴνῳ πινομένους, καὶ κράμβης ἡμέρου τοῦ σπέρματος ὀξύβαφον λεῖον πινόμενον μετ' οἴνου· ἀγαθὸν δὲ καὶ τὸν δάκτυλον καταβάπτειν εἰς πίσσαν ὑγρὰν, ἔπειτα εἰς οἶνον ἀποκλύζοντα πίνειν· τοιαῦτα μὲν πρὸς τοὺς ἐχιοδήκτους.

Κεφ. κη'. [Περὶ τῶν ὑπ' ἀμφισβαιίνης δεδηγμένων.] Περὶ ἀμφισβαιίνης τοπικῶς ἐπεμνήσθημεν, ὅτι πῶς ταῖς πρὸς τὰς ἐχίδνας ἀναγεγραμμέναις βοηθείαις πέφυκε βοηθεῖσθαι ὁ ἐξ αὐτῆς πληγείς.

Κεφ. κθ'. [Περὶ τῶν ὑπὸ δρυίνου δεδηγμένων.] Τοῖς δὲ ὑπὸ δρυίνου πληγέσιν ἀρμόζει ἀριστολογία σὺν οἴνῳ πινομένη, καὶ ἡ τρίφυλλος πόα, ῥίζα δὲ ἀσφοδέλου παραπλησίως λαμβανομένη, καὶ δρυὸς πάσης ὁ καρπὸς πινόμενος· καὶ

94) Haec et quae sequuntur in Ald., ab Asul. ad notha ablegantur.

omnia in passo cretico aut alio quopiam generoso teruntur. Erasistratus eo in libro, quem de facultatibus scripsit, complura etiam alia contra viperarum morsus auxilia tradidit: celebratissima autem sequentia: gallinarum cerebella in vino pota, et brassicae sativae seminis triti acetabulum cum vino bibitum. Utile praeterea censetur, digitum in picem liquidam intingere, ac dein in vinum demergere, potuique hoc dare. Et de iis quidem hactenus, quae contra viperarum morsus auxiliantur.

Cap. XXVIII. [De amphisbaenae morsu.] De amphisbena supra agentes iam monuimus, localia remedia eadem ab ipsa percussis adhiberi, quae contra viperarum morsus scripta fuere.

Cap. XXIX. [De morsu dryini.] A dryino ictis convenit aristolochia cum vino pota et trifolium herba: similiter et assumpta asphodeli radix et quercus cuiusvis



τῆς πρίνου αἰ ῥίξαι κοπτόμεναι καὶ καταπλασσομένηαι τοπι-  
κᾶς παρηγοροῦσιν.

Κεφ. λ'. [Περὶ τῶν ὑφ' αἰμόρρῳ καὶ διψάδος δε-  
δηγμένων] Αἰμόρρῳ καὶ διψάδος πρὸς τοῖς πλείστοις<sup>95</sup>  
τῶν προγενομένων ἀπηγορεύθησαν, ὡς ἀβροήθητοι αἰ δῆ-  
ξεις· διὸ καὶ τῶν κατ' ιδιότητα πρὸς τὸ θηρίον τὴν διψάδα  
ὠφελούντων ἀποροῦσι· δεῖ μὲν οὖν ἀποπειρᾶσθαι τῶν κοι-  
νῶν βοηθημάτων· παραχρῆμα δὲ τοὺς κατασχεασμοὺς παρα-  
λαμβάνειν, τὴν τε καῦσιν ποιεῖν, καὶ εἰ ὁ τόπος ἐγχωροίη, τὸν  
ἀκρωτηριασμόν· ἐξεῖς δὲ τὰς τῶν δριμέων καταπλασμάτων  
ἐπιθέσεις, ὑπὲρ ὧν εἰρήκαμεν πολλάκις· χρησιμέειν οἶδα καὶ  
δριμυφαγίας, μάλιστα τὰς ἀπὸ τῶν ταριχηρῶν· ἀκρατοπο-  
σία τε καὶ λουτρὸν ὠφελεῖ· ταῦτα συνεχῶς ἐκ μικρῶν δια-  
στημάτων πλεονάκις παραληπτέον<sup>96</sup>, πρὶν κατασκήψῃ τὸ  
τῶν νοσημάτων εἶδος· ἐκείνων δὲ ἅπαξ ἐπιφανέντων, αὐδο-  
τιοῦν παρὰ τῆς τῶν ἱατρῶν ἐπικουρίας ὄφελος γίνεται· ἐπὶ  
δὲ τοῦ αἰμόρρῳ τὰ αὐτά· καὶ πρὸς ταύτοις τὰ ἐν τῷ κοι-  
νῷ τῶν βοηθημάτων· οἷον τοὺς κατασχεασμοὺς καὶ τὰς καύ-

95) Asul. τοῖς πληγείσι.

96) Ex Paullo, loco vulg. καταληπτέον.

generis fructus epotus. Parti vero ictae ilicis radices tusae  
et impositae auxiliantur.

Cap. XXX. [De morsu et haemorrhoi et dipsadis.]  
Haemorrhoi dipsadisque morsus a plerisque maiorum no-  
strorum pro immedicabilibus habentur: quapropter et du-  
bitant, peculiaria quaedam iuvantia contra dipsada sua-  
dere. Attamen communia experiri operae pretium fuerit.  
Protinus ergo scarificationes adhibendae ustionesque, et  
si locus id permiserit, praecidenda membra. Dein et a-  
cria imponenda cataplasmata, quorum saepe meminimus.  
Deprehendi etiam, acrium esus, praecipue salsamenta, u-  
sui esse. Quin et meri potio balneaque iuvant: sed haec  
continuo et brevibus interiectis temporis spatiis adhiben-  
da sunt, priusquam morbus apparuerit, quo semel oborto  
nihil iuvare medicorum conatus possunt. In haemor-  
rhoi ictibus eadem valent, et ad haec communia praesi-  
dia: scarificationum exemplo et ustionum, acrium esus

σεις καὶ δομνφαγίας, καὶ ἀκρατοποσίας, καὶ ὅσα ὠρίσαμεν ἐπὶ διαβάδος· ἔτι δὲ καὶ ἀμπέλου φύλλα ἐφθὰ σὺν μέλιτι λελειωμένα.

Κεφ. λα'. [Περὶ τῶν ὑφ' ὕδρου δηχθέντων.] Τοῖς ὑφ' ὕδρου δηχθεῖσιν ἀρμόζει ὀρίγανος λεία φυραθεῖσα ὕδατι, κονία τε ἐνεθεῖσα ἐλαίῳ<sup>97</sup>, ἢ ἀριστολογίας φλοιὸς ἢ ῥίζα<sup>98</sup> λειοτριβηθεῖσα, καὶ κρίθινον ἄλευρον σὺν ὕδατι μετὰ μέλιτος συντετηκός· ποτίζεται δὲ καὶ ἀριστολογίας δίδραχμον ἐν κράματι ὀξυκράτου κυάθοις δυσίν·<sup>99</sup> ἢ πρασίῳ χυλὸς, ἢ ἀφέψημα ὀποτέρου σὺν οἶνῳ· πρόσφατόν τε κηρίον προσφερόμενον μετ' ὄξους.

Κεφ. λβ'. [Περὶ τῶν ὑπὸ κεγχριδίου δηχθέντων.] Τοῖς δὲ ὑπὸ κεγχριδίου δηχθεῖσι θριδακίνης ὁ καρπὸς μετὰ λινοσπέρμου καταπλασσόμενος βοηθεῖ, καὶ θύμβρα, καὶ ἄργιον πήγανον, καὶ ἔρπυλλος σὺν ἀσφοδέλῳ λελειωμένος· ποτιζόμενα δὲ παραχοῆμα, κενταυρίου τῆς ῥίζης <β' σὺν οἶνου

97) Paull. κονία δρυὸς ἐλαίῳ δευθεῖσα.

98) Interpositum vulgo δρυὸς expungendum esse, ex Actuario censeo cum Sarac.

99) Ex Paullo, loco vulg. κυάθων ἑξ.

et meri potus, quae ad dipsadem notavimus. Conferunt et vitis folia cocta cum melle et ad laevorem trita.

Cap. XXXI. [De morsu natricis.] Morsis a natrice confert origanum tritum aqua subactum, itemque lixivium oleo temperatum, vel aristolochiae cortex aut radix tritae, et hordeacea farina cum aqua et melle colliquefacta. Bibuntur et aristolochiae drachmae binae in poscae dilutae cyathis duobus, aut marrubii succus, vel alterutrinus decoctum cum vino. Favus item recens cum aceto exhibetur.

Cap. XXXII. [De cenchridii morsu.] Morsis a cenchridio auxiliatur lactucae semen cum lini semine cataplasmatibus in modum applicitum: itemque thymbra, sylvestris ruta et serpyllum cum asphodelo tritum. Dantur vero protinus in potu centaurii radices drachmae binae cum

κνᾶθοις γ', ἢ ἀριστολογίας ῥίζα ὡσαύτως· καρδαμόν τε καὶ γεντιανὴ παραπλησίως.<sup>100</sup>

Κεφ. λγ'. [Περὶ τῶν ὑπὸ κεράστου δηχθέντων.] Τοῖς δὲ ὑπὸ κεράστου δηχθεῖσι καὶ ἀσπίδος συντόμως ὁ ἀκρωτηριασμός ἐπαμύνει· διόπερ ἀνυπερθέτως ἀποκόπτειν δεῖ, ὅσον τὸ δηχθὲν μέρος, ἢ περισαρκίζειν τὰ δηχθέντα μέρη παραχρῆμα καὶ τὰ τούτοις πλησίον.<sup>1</sup> εἶτα δὲ τὰ ὑπολειπόμενα τοῖς καυτηρίοις ἀνικμαστέον.<sup>2</sup> καὶ γὰρ καὶ τούτοις ὁ ἰὸς οἶος ὁ τοῦ βασιλίσκου.

Κεφ. λδ'. [Περὶ τῶν ὑπ' ἀσπίδος δηχθέντων.] Τοῖς δὲ ὑπὸ ἀσπίδος δηχθεῖσιν, ὅσα καὶ τοῖς ὑπὸ κεράστου, ὡς προγγραπται, προσενεκτέον βοηθήματα· ὃν τρόπον γὰρ βοὸς αἷμα ὀξύτατα πηγνυσὶ τὸ ἐν ταῖς ἀρτηρίαις αἷμα καὶ πνεῦμα<sup>3</sup>, πρὸς τούτων καὶ ὁ ἰὸς, ὡςπερ καὶ ὁ τοῦ βασιλίσκου.

Κεφ. λε'. [Περὶ τῶν ὑπὸ βασιλίσκου δηχθέντων.] Τοῖς

100) Omnem hunc locum e Paullo transscripsi, praeuentibus interpretibus priscis et Saraceno et ipso consensu codd. Pariss., quos Goupylus contulit. Lect. vulg.: καὶ ξρπυλλος σὺν ἀσφοδέλου <β', καὶ σὺν οἴνου κνᾶθοις γ', ἢ ἀριστολογίας ῥίζα ὡσαύτως, καὶ καρδάμωμον καὶ γεντιανὴ παραπλησίως.

1) Ex Paullo, loco vulg. παραπλήσια.

2) Ibidem ex Paullo; ἐπακτέον Ald., Cornar. et Goupyl.; αἱμακτέον Asul.

3) Ex Paullo, loco vulg. πηγνυσται.

cyathis vini ternis, aut aristolochiae radix eodem modo. Similiter et nasturtium et gentiana.

Cap. XXXIII. [De morsu cerastae.] A ceraste et aspide ictis cita succurrit extremae partis amputatio. Quare sine mora totam partem ictam resecare oportet, aut tum partes affectas, tum iis vicinas scalpro confestim circumcidere. Tandem vero reliquiae cauteriis exsiccandae, siquidem horum animalium virus basilisci veneno simile est.

Cap. XXXIV. [De morsu aspidis.] Ictis ab aspi- de eadem, quae adversus cerastae morsus, uti modo scriptum est, accommodanda remedia. Horum enim, uti et basilisci virus, haud secus ac taurinus sanguis, sanguinem spiritumque arteriis contentum ocissime coagulat.

Cap. XXXV. [De basilisci morsu.] Morsis basilisco

δὲ ὑπὸ βασιλίσκου δηχθεῖσιν, ὥς Ἐρασίστρατός φησι, βοη-  
θεῖ καστορίου < α', πινομένη σὺν οἴνῳ· ὡσαύτως δὲ καὶ ὁ  
τῆς μήκωνος ὁπός.

Τοιοῦτος μὲν ὁ θηριακὸς τρόπος.

Erasistratus auxiliari asserit castorii drachmam unam in  
vino potam, itidem papaveris succum.

Et haec quidem est ratio medendi ictibus morsibusque  
venenatorum animalium.



---

[ΠΕΔΑΝΙΟΥ ΔΙΟΣΚΟΡΙΔΟΥ  
ΑΝΑΖΑΡΒΕΩΣ]

ΠΕΡΙ ΕΥΠΟΡΙΣΤΩΝ ΑΠΛΩΝ ΤΕ ΚΑΙ  
ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΡΩ-  
ΤΟΝ ΠΡΟΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΟΝ.

---

Ἡ τῶν ἀπλῶν φαρμάκων παράδοσις, τιμιώτατε Ἀνδρό-  
μαχε, τῆς τῶν ποικίλων ἀποδεκτοτέρα πέφυκεν, οὐ μόνον  
διὰ τὸ εὐπαρακολούθητον, ἀλλὰ καὶ διὰ τὸ εὐπόριστον· καὶ  
διὰ τὸ αὐτῶν τῶν προσφερομένων ἑκάστου τὴν δύναμιν φανε-  
ρὰν ὑπάρχειν τοῖς προσφερομένοις καὶ χρωμένοις, ἀπολελυ-  
μένην καὶ ἀνεπίμικτον ἑτέρου γένους ὑπάρχουσιν, λαμβά-

---

[PEDANII DIOSCORIDIS  
ANAZARBEI]

DE FACILE PARABILIBUS TAM SIMPLICI-  
BUS QUAM COMPOSITIS MEDICAMENTIS  
AD ANDROMACHIUM LIBER PRIOR.

---

Doctrinam de simplicibus medicamentis, spectatissime  
Andromache, ea, quae de varie compositis agit, gratiorem  
acceptioremque esse constat: quia non modo intellectu fa-  
ciliior est, sed et expeditior. Adde, quod singulorum, quae  
exhibentur, vis et facultas, tanquam sincera, soluta et im-  
permixta, utentibus ipsis conspicuam sese praebet, ex iis-

νεσθαι τε ῥαδίως ἐξ αὐτῶν<sup>1</sup> τὸ πρὸς τὰ πάθη κατάλληλον· ὅπερ ἐπὶ τῶν ποικιλωτέρων οὐχ ὁρᾶται γινόμενον φαρμάκων· ἀναφέρεται γὰρ ἐπ' ἐκείνων, οὐκ ἐπὶ τὰς κατὰ μέρος τῶν μιγνυμένων ἐνεργείας ἢ δύνάμεις, ἐπὶ δὲ τὴν ἐκ μίξεως ἀνεκλάλητον ἀλληλουχίαν. Ἀνατίθεμεν δέ σοι τὰ βιβλία τῷ δυναμένῳ ἐπικρίναι, δι' ἧς ἔχεις ἐμπειρίας τῶν ἡμετέρων πόρων, καὶ διότι ὀφείλεται ἀνδρὶ ἀποδεχομένῳ ἡμᾶς ἢ τοιαύτη χάρις. Ποιησόμεθα δὲ τὴν ἀρχὴν ἀπὸ τῶν περὶ κεφαλὴν συνισταμένων παθῶν, προδιαστέλλόμενοι, ὅτι ὅσα ἐν ποτήματος μέρει παραλαμβάνομεν ἐπὶ τῶν ἐντοσθιδίων, ταῦτα ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ ἐπὶ τῶν κεχροτισμένων ἤδη καὶ τύλον ἔχουσῶν ἐγκρίνομεν διαθέσεων· οὐκ ἀγνοοῦντες μὲν, ὅτι πρόσφατον πάθος διὰ τῆς κοινῆς καὶ ἀπεριέργου θεραπέυεται ἀγωγῆς.

Εὐπόριστα βοηθήματα πρὸς τὰ περὶ τὴν κεφαλὴν πάθη.

Κεφ. α'. Πρὸς κεφαλαλγίας προσφάτους δίχα πυρετοῦ

1) Sic Moib.; ἐξ αὐτῆς τὸ ὡς πρὸς vulgo.

que facile deprehenditur, id quod peculiaribus affectibus curandis apte convenienterque congruit: at in iis medicamentis, quae maiore varietate praedita sunt, haud ita fieri animadvertitur. In iis enim facultas non ad singulares eorum, quae simul miscentur, actiones, sed ad ineffabilem quamdam ipsius mixtionis compagem refertur. Hos autem libellos tibi dedicamus, tum quia pro rerum usu, quo ipse vales, de laboribus nostris iudicium facere potes, tum quia viro nostri studioso talis etiam gratia merito debetur. Porro a capitis affectibus ordiemur, si prius monuerimus, remedia, quae ad interna vitia potio-num forma usurpamus, ea nos non nisi in diuturnis, quique iam veluti callum contraxerint, affectibus admittere: quippe qui haud ignoremus, mala recentia communi ac minus operosa curatione sanari.

*Parabilia capitis affectuum remedia.*

Cap. I. Capitis doloribus recentibus citra febrim

γινόμενας ὠφελῆν πέφυκεν, ἔλαιον ἐμβρεχόμενον τὸ ἐκ τῆς ἀγριαῆδος ἐλαίας, ῥόδινον, μυρσίνινον, ἀμυγδάλινον, μήλινον, οἰνάνθινον· ποιεῖ δὲ ταῦτα καὶ μετὰ ὄξους, καὶ μετὰ χυλοῦ ἐνίοτε παραμυγνυμένου ἀνδράχνης, αἰζώου, ἐλξίνης, στρύχνου, τριβόλου γλωροῦ, μυώτου.<sup>2</sup> Ποιεῖ δὲ καὶ τὸ ψύλλιον σὺν ὄξει βραχὲν καὶ ῥοδίνῳ· καὶ τῆλις βραχεῖσα ἐν ὕδατι, καὶ ἐψηθεῖσα ἐπὶ ὀλίγον, ἕως γλισχράσματος αὐτῆς μετὰ ῥοδίνου καὶ ὄξους ἐμβρεχομένης. Κατάπλασμα κεφαλῆς, μετώπου καὶ κροτάφων· ἄρτον μετ' ὄξυκράτου καὶ ῥοδίνου λειώσας ἐπιτίθει.

Κε φ. β'. Πρὸς δὲ τὰς χρονίας κεφαλαλγίας ὀνίνησιν ἐμβρεχόμενα σὺν ὄξει καὶ ῥοδίνῳ ταῦτα· σπονδύλιον, πευκέδανον, ἄγνου σπέρμα, σὺν ὄξει καὶ ῥοδίνῳ γλοιοποιηθὲν, ὠκιμον, ἄμωμον, δαφνίδες, ἔρπυλλον, καλαμίνθη, κόνυζα ἢ λεπτόφυλλος, πήγανον, ἀμύγδαλα πικρά· καὶ τὰ ἀποζέματα δὲ τούτων, μιννύμενα τῷ ὄξει καὶ ῥοδίνῳ, ποιεῖ· πρὸς δὲ τούτοις σκαμμωνία τε καὶ συκαμίνου ὀπὸς, καταπλασσομένου τοῦ μετώ-

2) Μύωτον vid. tom. 1. p. 334.

ortis auxilio sunt infusa haec olea: sylvestris olivae, rosaceum, myrtinum, amygdalinum, melinum et oenanthinum: eaque cum aceto, admixto interdum succo portulacae, sempervivi, helxines, solani, tribuli virentis aut myosotidis. Est et efficax psyllium maceratum in aceto cum rosaceo: nec non et e foeno graeco in aqua macerato et leviter cocto extracta muccago, cum rosaceo et aceto itidem irrigata. Capiti vero, fronti ac temporibus cataplasmatibus in modum adhibeto panem, cum posca et rosaceo tritum.

Cap. II. Doloribus capitis inveteratis haec cum aceto et rosaceo utiliter irrigantur: Spondylium, pencedanum, viticis semen cum aceto et rosaceo in glutinis molam mutatum, ocimum, amomum, lauri baccae, serpyllum, calamintha, conyza tenuifolia, ruta et amygdalae amarae. Idem praestant eorundem decocta, admixtis aceto et rosaceo: ad haec scammoniae et mori succus, fronti

που καὶ κροτάφων· ἐνίοτε δὲ, εἰ ἐπείγοι, καὶ ὅλης τῆς κεφαλῆς. Ἀρμόζει δὲ μετὰ ἀλφίτου, ἥγουν ἀλεύρου κριθίνου, ἢ ἄρτου ταῦτα· ἡδύοσμον ὑγρὸν καὶ ξηρὸν, ἀνδράχνη, ὑοσκυάμου φύλλα, στρώχνον, κόριον, σέριδος, πολυγόνου, αἰζώου, σισυμβρίου τῆς καλουμένης καρδαμίνης· μετὰ ὄξους δὲ καὶ ῥοδίνου μιχθέντα καταπλάσσεται ἄγνου φύλλα, ἀλόη<sup>3</sup>, μελίλωτον, μύρτα, ὄξυμυρσίνης καρπὸς, οἰνάνθινον, ῥόδα, ῥίζα ἱρίδος ξηρᾶς, ἀγριελαιᾶς ἄνθη, μελάνθιον, σταφίς ἀγρία μετὰ δαφνίδων, μάλιστα δὲ ἐπὶ τῶν χρονίων· σήσαμον ὁμοίως, αἶρινον ἄλευρον μετὰ στέατος χοιρείου· καὶ τὸ αὐτὸ ἐπὶ τῶν κεχροτισμένων ἦδη· ἢ κάρδαμον φώξας λεῖον, ἀναλάμβανε ὄξει καὶ ῥοδίνῳ, καὶ ἔμπλασον ἐπὶ τοῦ μετώπου· ἢ κάρυα ποντικὰ καὶ πήγανον ὀλίγον, λεῖα σὺν ῥοδίνῳ· ἢ ὀρίανον λεῖον σὺν ὄξει καὶ ῥοδίνῳ φυράσαι, ἢ σικίου ἀγρίου ῥίζαν ξηρὰν λείαν σὺν οἴνῳ ἀμυναίῳ<sup>4</sup> ἢ ἱρεως λείας ὀξύβαφον, καὶ πεπέρεως κόκκους ἐπτά, σὺν ὄξει καὶ ῥοδίνῳ.

3) Repetuntur vulgo ἀμύγδαλα πικρά, quae iam supra.

4) Vulg. καμηναίῳ.

ac temporibus adhibitus: interdum etiam, si dolor urgeat, toti capiti. At cum polenta farinave hordeacea aut pane conveniunt isthaec: menta seu recens, seu arida, portulaca, hyoscyami folia, solanum, coriandrum, intybi folia, itemque polygoni sempervivi, et sisymbrii, quod cardamine dicitur. Aceto vero et rosaceo mixta haec imponuntur: viticis folia, aloë, melilotus, myrti baccae, rusci fructus, oenanthe, rosae, radix iridis sicca, oleastri flores, melanthium, staphis agria cum lauri baccis, praesertim in diutinis doloribus: sesamum similiter, loliacea farina cum adipe suillo, idemque in affectibus iam inveteratis. Aut nasturtium tostum et tritum excipe aceto et rosaceo, frontique alline: aut nucibus avellanis et pauca ruta tritis cum rosaceo eodem modo utitor: aut origanum tritum cum aceto et rosaceo subigito, aut cucumeris sylvestris radicem tritam cum vino aminaeo: aut denique iridis tritae acetabulum, additis piperis granis septem cum aceto et rosaceo.



Κεφ. γ'. Πταρμικά, ἐγγεόμενα ταῖς ῥίσι σὺν μέλιτι, καθαίρει καὶ διὰ στόματος ὠφελίμως· χρώμεθα δὲ αὐτοῖς ἐπὶ τῶν κεχροτισμένων κεφαλαλγιῶν, καὶ πρὸς μηδὲν τῶν ἄλλων βοηθημάτων ὑπακουουσῶν. Ἀναγλλιῖδος χυλός, πρασίου, κυκλαμίνου ῥίζης, ἀνιμώνης ῥίζης, σικύου ἀγρίου ῥίζης, χελιδονίου τοῦ μικροῦ τῶν ῥιζῶν, κισσοῦ φύλλων, κράμβης φύλλων, τευτλίου λευκοῦ τῆς ῥίζης· ἴριον μῦρον. Ξηρὰ δὲ λεία ἐγχεῖται σὺν μέλιτι στρουθίον, δαφνοειδοῦς σπέρμα, ἴρις ξηρὰ, ἐλλέβορος λευκός, καστόριον, νίτρον, σάμψυχον, πέπερι, σταφίς ἀγρία, μελάνθιον σὺν ἱρίνῳ, ἐλατήριον σὺν ὕδατι.

Κεπ. δ'. Ὑποθυμώμενον δὲ ταῖς ῥίσι διὰ τῆς τῶν ἀτμῶν ἀναδόσεως, ὠφελεῖ ἄνισον. Ὡφελεῖ δὲ κατὰ τοὺς οἰκείους καιροὺς παραλαμβανόμενα καὶ τὰ πταρμικά· ἔστι δὲ ἐλλέβορος καὶ καστόριον, πέπερι, στρουθίον, σίνηπι, ἰὸς ξυστός, τριχομανὲς λείον ἐντιθέμενον ταῖς ῥίσιν, καὶ ἡ λεγομένη πταρμικὴ πόα.

Κεφ. ε'. Καὶ οἱ ἀποφλεγματισμοὶ δὲ οὐκ ἀνωφελῶς ἐπὶ τῶν χρονίως κεφαλαλγούντων παραλαμβάνονται. Ἐπι-

Cap. III. Sternutatoria, quae naribus infunduntur cum melle, utiliter etiam per os evacuant. Iis autem utimur in antiquis capitis doloribus, quique aliis nullis cedunt auxiliis. Sunt autem succi anagallidis, marrubii, radicum cyclaminis et anemones, itemque cucumeris agrestis et chelidonii minoris. Itidem foliorum hederæ et brassicae, nec non et radicis betæ albae: praetereaque irinum unguentum. Sicca vero tritaque cum melle infunduntur struthium, daphnoidis semen, iris sicca, helleborus albus, castorium, nitrum, sampsuchum, piper et staphis agria: itemque melanthium cum irino unguento, et elaterium ex aqua.

Cap. IV. Erit et utile suffitus excitare, quorum vapores naribus excipiantur, uti ex aniso. Iuvant et convenientibus adhibita temporibus sternutatoria: qualia sunt helleborus, castorium, piper, struthium, sinapi, et aerugo rasilis: trichomanes itidem tritum naribus inditum, uti et ptarmica dicta herba.

Cap. V. Quin et apophlegmatismi haud inefficaciter usurpantur in his, qui diuturno capitis dolore infestantur.

τηδεύονται δὲ διαμασσωμένων τούτων, δαφνοειδοῦς σπέρματος, καππάρεως τοῦ ἐκ τῶν ἀγρίων καρποῦ, κρίθμου, καρδάμου καρποῦ, μαστίχης, νάπυος, πεπέρεως στρογγύλου καὶ μακροῦ, πυρέθρου, καὶ σταφίδος ἀγρίας, μετὰ νίτρου καὶ πεπέρεως· (καίει δὲ ἀρτηρίαν·) ἀνεμώνης ῥίζα, σταφίς ἐκγεγαρτισμένη μετὰ πεπέρεως, θύμον, ὕσσωπον, στρουθίον· ὑπατριζόμενα δὲ πρὸς ὠφελείας καθίσταται θάλασσα θερμὴ σὺν ὄξει ἐψομένη.

Κεφ. ε'. Εἰ δέ ποτε ἀναγκαζόμεθα δι' ὑπερβολὴν ἀλγημάτων ἐπὶ ποικιλωτέρας ἔρχεσθαι βοηθείας, χρῆσόμεθα ἐκ τῶν προειρημένων καὶ καταντλήμασιν, ἐψιλωμένης τῆς κεφαλῆς, ἀποζέματι κυπαρίσσου, δάφνης, μήκωνος κωδίων ξηρῶν, ἄγνου φύλλων, καὶ καρποῦ μήκωνος τῆς ῥοιάδος τῶν κεφαλῶν· χρώμεθα δὲ τούτοις καὶ ἐπὶ τῶν φρενιτικῶν· ὑπνωτικά γὰρ ἄγαν καθεστήκασιν.

Κεφ. ζ'. Κατάρρους δὲ τοὺς ἐν μυκτῆρσιν ἐπίστησιν, ἄσφαλτος ὑποθυμωμένη, σμύρνα διαχριομένων τῶν μυκτῆρων, κυάμινον ἄλευρον σὺν σκορόδῳ ῥοφούμενον· μελάνθιον

In eum vero usum commode commanducatur daphnoidis semen, capparis agrestis fructus, crithmi et nasturtii semina, mastiche, sinapi, piper rotundum aeque ac longum, pyrethrum et staphis agria cum nitro et pipere: (sed haec fistulam spiritalem adurunt:) anemones radix, uva passa, extractis vinaceis, cum pipere, thymus, hyssopus, struthium. Est et utilis vaporatio ex aqua marina calente in aceto cocta.

Cap. VI. Sin doloris acerbitas nos ad alia magis composita transire cogat auxilia, post ante memorata, ab-raso prius capite, perfusionibus utemur e decocto cupressi, lauri, capitulorum papaveris siccorum, viticis foliorum et seminis, quod papaveris erratici capitulis continetur. Sed his utimur etiam in curandis phreniticis: sunt enim somnifera.

Cap. VII. Catarrhos, qui in nares feruntur, inhibent bitumen suffitum, myrrha naribus illita, et farina fabarum cum allio absorpta. Confert et nigella plurimum

δοσφραίνόμενον ὠφελεῖ μεγάλως, κυπαρίσσου σφαιρίου σπέρμα, τετριμμένον μετὰ οἴνου καὶ ἀναρρόφηθὲν τῷ μυζωτῇρι.

Κεφ. ή'. Παρμὸνς δὲ κινουῖσι παρακρατηθεῖσαι τοῖς δακτύλοις αἱ ἐγκανθίδες γλέβες καὶ ῥίνες· παύει δὲ παρμὸνς συνεχεῖς ὠκίμου σπέρμα λεῖον, καὶ ἡ πόα ἀποσφραίνομένη.

Κεφ. θ'. Τοῖς δὲ σειριῶσι παιδίοις ὠφελίμως κατὰ τοῦ βρέγματος ἐπιτίθεται ἡλιοτροπίου τοῦ σκορπιούρου καλουμένου φύλλα, κολοκύνθης ξέσματα, σικύου τοῦ πέπονος τὸ ἐπικείμενον τῇ σαρκὶ δέρμα, στρύχνου κηπαίου τῶν φύλλων χυλὸς μετὰ ῥοδίνου.

Κεφ. ι'. Ἐπὶ δὲ τῶν μετὰ πυρετοῦ τὴν κεφαλὴν πεπονθότων, ὡς ἐπὶ φρενιτικῶν καὶ ληθαργικῶν, ἀρμόζει ιδίως ἄγνου σπέρμα μετ' ἐλαίου ἐψηθὲν καὶ ἐπιβρεχόμενον· ἀμύγδαλα πικρὰ σὺν ὄξει καὶ ῥοδίνῳ, πήγανον σὺν ὄξει καὶ ῥοδίνῳ, καὶ ἔρπυλλον ὁμοίως, κισσοῦ τῶν φύλλων χυλὸς, καστόριον, ἢ πευκέδανον, ἢ σφονδύλιον μετὰ ῥοδίνου καὶ ὄξους,

olfactu, itemque cupressi globulorum semen cum vino tritum et in nares attractum.

Cap. VIII. Sternutamenta excitantur, si digitis firmiter prehendantur nares simul et venae ad oculorum angulos sitae. Contra sistuntur sternutationes continuae herbae ocimi aut seminis eiusdem contriti odore.

Cap. IX. Siriasi laborantibus puerulis ex usu sunt haec sincipiti imposita: heliotropii, quem scorpiurum vocant, folia, cucurbitae ramenta, cucumeris, qui pepon dicitur, cutis carni incumbens, solani hortensis e foliis succus cum rosaceo.

Cap. X. His, quibus cum febre caput male affectum est, veluti phreniticis atque lethargicis, privatim ista conveniunt: lini semen cum oleo coctum et instillatum, amygdalae amarae cum aceto et rosaceo, ruta itidem cum aceto et rosaceo, similiterque serpyllum, hederaceorum foliorum succus, castorium, aut peucedanum, aut sphondylium cum aceto et rosaceo: ruta denique et lini semen

πήγανον καὶ λίνου σπέρμα πεφωγμένον ἡσυχῇ, ἀναληφθέντα κηρωτῇ καὶ ἐπιτεθέντα ἐπὶ τὴν κεφαλὴν καὶ τὸ μέτωπον.

Κεφ. ια'. Ὑπνοποιὰ δὲ καθέστηκεν καταπλασσομένη κατὰ τοῦ μετώπου καὶ μυκτῆρσι προσαγόμενα, καρπὸς ὠκίμου, ἀτρακτυλίδος, μήκωνος ὁπὸς, ὕσκυάμου καρπὸς καὶ φύλλα, ἀλικάκαβου ὁμοίως· καὶ τὰ μωρίου φύλλα· εἶδος δὲ ἔστι μανδραγόρου· στρύχνου ῥίζης τοῦ ὑπνωτικοῦ φλοιὸς, βακχάριδος φύλλα· ἔστι δὲ εὐώδη· μαράθρου<sup>5</sup> φύλλα ἐψηθέντα ἐν οἴνῳ, τῶν μυξωτήρων διαψώμενα, κρόκινον, μετώπιον, κύπρος· ἄνθη μανδραγόρου, ὁπὸς καὶ ῥίζα καὶ καρπός· καὶ μήκωνος ὁμοίως, καστόριον, σμύρνα.

Κεφ. ιβ'. Πινόμενα δὲ ὕπνον ποιεῖ· μηχανείου < α', μετὰ στύρακος καὶ σμύρνας ἴσων, δίδου ὀρόβια γ'. ἡ μανδραγόρου ὀβόλους δύο μετὰ τῶν προγεγραμμένων ἴσων, ἢ τῶν ῥιζῶν τὸ ἀπόβρεγμα, κυάθων δύο λαμβανομένων· ἢ ὁποῦ μήκωνος ὅσον ὄροβος καταπινόμενος· ἢ τὰ φύλλα τοῦ μήκωνος ἀντιλαμβανόμενα, ἐσθιόμενα· θρίδακος ἀγρίας ὁπὸς

5) Sic coniecit Sarac.; vulg. μελαθρῶν; Moiban. μαλαβάθρου.

leviter tostum, si cerato excipiantur et capiti frontique adhibeantur.

Cap. XI. Somni porro conciliandi vim habent haec imposita fronti cataplasmatum more, vel naribus admota: semen ocimi et atractylidis, papaveris liquor, semen ac folia hyoscyami, — similiterque halicacabi, morii, quae species est mandragorae, folia, solani somniferi e radice cortex, baccharis folia, quae quidem odorata sunt, foeniculi folia in vino decocta et naribus affricta, crocinum unguentum, metopium, cyprus, mandragorae similiterque papaveris flores, liquor, radix et semen, castorium, myrrha.

Cap. XII. Haec vero sumpta somnos alliciunt: meconii drach. j. cum styracis ac myrrhae pari pondere misceto: dosis, quanta est trium ervi granulorum magnitudo. Aut mandragorae obolos duos cum ante memoratorum pari pondere exhibeto. Aut infusi, quod ex eiusdem radicibus paratur, cyathos duos. Aut papaveris liquor ervi magnitudine deglutatur: aut papaveris folia in cibo sumantur. Idem praestant lactucae sylvestris ae-



καὶ ἡμέρας πινόμενος, καὶ αὐταὶ δὲ ἐσθιόμεναι. Χρώμεθα δὲ τοῖς ὑπνωτικοῖς καὶ ἐφ' ὧν ἐστι χρόνια τὰ πάθη, ὅτε τεμνόμενός τις ἢ καίόμενος ἀναντίληπτος ἐθελήσῃ τῶν ἀλλαγῶν γίνεσθαι.

Κεφ. ιγ'. Λακτυλίῳ δὲ προσαγόμενα ὑπνον ποιεῖ μανδραγόρου ἢ μήκωνος ὁπὸς ἀνεθείς, καὶ σὺν ἐρίῳ προστεθείς.

Κεφ. ιδ'. Ἐγερτικὴν ἔχει δύναμιν, ἐπὶ ληθαργικῶν ταῖς ῥισὶ προσαγόμενα, ὄξος, ἐλλέβορος λευκός, σίνηπι, πέπερι, καστόριον, στρουθίον, σφονδύλιον, πευκέδανον, φώκης πυτία, κεδρία, πίσσα ὑγρὰ, πήγανον, ἀβρότονον, ἐλλύχνιον κεκαυμένον, κάρδαμον, πίττα ὠμὴ, σιλφίου ὁπὸς, κρόμμυον, σκόροdon, χαλβάνη, ἄσφαλτος, κνίδη προσαγομένη σκέλεσι καὶ μετώπῳ· ὕδατος πολλοῦ καὶ ψυχροῦ, ἢ ὄξους κατάντησις· σίνηπι λαῖον σὺν ὄξει καταχριόμενον κατὰ τῶν σκελῶν καὶ χειρῶν ἄκρων· ἐκ τοῦ ῥύπου τοῦ ὠτὸς τοῦ ὄνου ἄλειφε τὸ μέτωπον τοῦ ἔχοντος. Ἄλλο, μὴ διεγερτικόν, ἀλλὰ ὑπνωτικόν·<sup>6</sup> λιβάνου, σμύρνης, μανδραγόρου μέλανος

6) Sarac. correctio, Lectio vulg. ἄλλο διεγερτικόν καὶ ὑπνωτικόν.

que ac sativae liquor haustus, ac ipsae quoque lactucae esitatae. Ceterum utimur et somnificis in diuturnis affectibus, cum quis sectionem ustionemve admissurus cruciatuum sensum cupit subterfugere.

Cap. XIII. Accersit et somnum mandragorae aut papaveris liquor, si dilutus lana excipiat anoque subdatur.

Cap. XIV. Lethargicos excitare valent haec admota naribus: acetum, helleborus albus, sinapi, piper, castorium, struthium, sphondylium, peucedanum, vituli marini coagulum, cedria, pix liquida, ruta, abrotanum, ustus lucernae funiculus, nasturtium, pix cruda, laserpitii liquor, cepa, allium, galbanum, bitumen, urtica cruribus et fronti admota, frigidae copiosae aut aceti perfusio, tritum sinapi ex aceto cruribus et manibus extremis illitum. Aliud: asininae auris sordibus aegri frontem illine. Aliud, quod non quidem excitat, sed somnum potius allicit: turis, myrrhae, radice siccae nigrae mandra-

τῆς ῥίζης ξηρᾶς ἀνὰ < β', ὀπίου μήκωνος < α', τρίψας, μίξας μετὰ ῥοδίνου ἐλαίου, καὶ ἀναλαβὼν εἰς ῥάκος λινοῦν ὁσφραίνειν.

Κεφ. ιε'. Υποθυμιώμενα δὲ ἐγείρει λίθος κάτωθεν τῇ σαμιά γῇ εὐρισκόμενος, λωτοῦ τοῦ δένδρου πρισμμάτων τὸ ἀπόβρεγμα, καστόριον, βαλσάμου καρπὸς μεθ' ὕδατος, ὃς καὶ τοὺς σκοτωματικούς ὠφελεῖ ἐν ἐμβρέγματι, λίθος γαγάτης, πευκέδανον, ἄσφαλτος, χαλβάνη, σφονδύλιον, σαγαπηνὸν, λειχὴν ἵππων, ἡμιόνου, ἐλέφαντος ὄνυξ, καὶ ξύσμα ὀδόντων, κέρας ἐλάφου, φώκης πυτία καὶ ἐρίφου, τράγου ῥύπος, κροκοδείλου στέαρ, ἀβρότονον, σίλφιον. Πινόμενα δὲ ἐγείρει λίθος ὁ ἐν τῇ σαμιά γῇ εὐρισκόμενος, λωτοῦ τοῦ δένδρου πρισμμάτων τὸ ἀπόβρεγμα, καστόριον, βαλσάμου καρπὸς μεθ' ὕδατος.

Κεφ. ις'. Καὶ τοὺς σκοτωματικούς δὲ ὠφελεῖ ἐμβρέγματα τὰ προγεγραμμένα ἐπὶ τῶν κεφαλαλογούντων· διεγείρει δὲ αὐτοὺς ὅσα καὶ τοὺς ληθαργικούς.

Κεφ. ιζ'. Χρᾶσθαι δὲ καὶ ἐπὶ τῶν μαινομένων, ἐπι-

gorae ana drachmas ij., opii drachmam j., terito et cum rosaceo misceto, tandemque panniculo lineo excepta olfacito.

Cap. XV. Suffitu vero excitant haec: lapis, qui sub samia terra reperitur, loti arboris ramentorum dilutum, castorium, balsami semen ex aqua (quod vertiginosos itidem irrigatum adiuvat), lapis gagates, peucedanum, bitumen, sulphur, galbanum, sphondylium, sagapenum, lichen equorum, muli et elephantis ungula, eboris ramentum, cornu cervinum, vituli marini, itemque hoedi coagulum, hirci sordes, adeps crocodili, abrotanum et silphium. Excitant et haec in potu sumpta: lapis, qui in samia terra reperitur, loti arboris ramentorum dilutum, castorium, semenque balsami ex aqua.

Cap. XVI. Vertiginosis utiles sunt irrigationes, quas antea caput dolentibus convenire diximus. Eosdem etiam excitant quaecunque lethargicos expergefaciunt.

Cap. XVII. Furiosos itidem iuvabunt irrigationes,

βρέγμασι τοῖς εἰρημένοις ἐπὶ κεφαλαλγίας. Ποτήματα δὲ ἄφε-  
λεῖ τοὺς μαινομένους, ἵππομαράθρου ῥίζα καὶ τὸ σπέρμα σὺν  
ὔδατι, βρυωνίας ῥίζας < α', μεθ' ὕδατος καθημερινή σὺν  
μελικράτῳ· καὶ λίθος ὁ ἐν τῇ σαμία γῇ εὐρισκόμενος, ῥητί-  
νης λιβυκῆς < α', μεθ' ὕδατος πινομένη· θυμιάται δὲ ἐπ'  
αὐτῶν ὠφελίμως, ὅσα ἐπὶ ληθαργικῶν ἰστόρηται.

Κεφ. ιη'. Ἐπιληπτικοὶ δὲ ὠφελοῦνται, ἔάν τις τὰς χοι-  
ράδας αὐτῶν μέχρι τοῦ τραχήλου γαλῆς αἵματι καταχρίσῃ·  
ὠφελὲ δὲ καὶ ἐφθῇ ἐσθιομένη γαλῇ, χωρὶς τῶν ποδῶν αὐ-  
τῆς καὶ κεφαλῆς· καὶ τὸ ἥπαρ δὲ αὐτῆς μεθ' ὕδατος πινό-  
μενον ὠφελεί· καὶ ἥπαρ ὄνειον ἐσθιόμενον· νῆστεις δὲ λαμ-  
βανέτωσαν· ἢ λέοντος χολὴν μίξας, μέλιτι ἀπόθου, καὶ δί-  
δου ἐντεῦθεν κοχλιάριον ἐν μεθ' ὕδατος ἐπὶ ἡμέρας ἑπτὰ,  
προκαθαίρων τούτῳ· κρόκου ὁβ. γ', νάρδου ὁβ. β', ἔλ-  
λεβόρου μελανος ὁβ. α', σκαμμωνίας < δ', νίτρου < β' μέλιτι  
ἀναλάμβανε, καὶ δίδου < β' μετὰ μελικράτου. Ποιεῖ καὶ  
πελαργοῦ κόπρος μεθ' ὕδατος, ἢ μετ' ὄξυμέλιτος· καὶ ἀγα-

7) Sarac. mavult κνέκου, ut purgans vis augeatur; sed helleborus  
cum scammonia iam sufficiunt.

quarum usum in capitis doloribus esse diximus. Iisdem  
porro in potu conferunt hippomarathri radix et semen  
ex aqua, bryoniae radice itidem drach. j. ex aqua aut  
melicrato quotidie sumpta, nec non et lapis, qui in samia  
terra reperitur, ac resinae itidem africanae drach. j. ex  
aqua pota. His praeterea suffitus iidem adhibentur, quos  
lethargicis ascripsimus.

Cap. XVIII. Comitiales iuvantur, si eorum glandulae  
ad collum mustelae sanguine perungantur. Sed et ipsa mu-  
stela confert, abiectis capite ac pedibus cocta, et in cibo sum-  
pta: veluti et iecur eiusdem ex aqua potum, itemque iecur  
asininum esitatum, idque ieiuno ventriculo. Aliud:  
fel leoninum melli admixtum serva, et de eo exhibe  
cochlear unum ex aqua ad dies septem, purgato tamen  
prius corpore sequenti medicamento: Croci obolos tres,  
nardi ob. ij., hellebori nigri ob. j., scammoniae drach. iiij.,  
nitri drach. ij. melle excipito, et drachmas duas ex aqua  
mulsa potui dato. Prodest et ciconiae sinum ex aqua

ρικοῦ ὀβ. γ'. πευκεδάνου τὸ αὐτό· καὶ φώκης πυτίας ὀβ. α', συνειληφέντα λεῖα· ἢ ὀνώνιδος ῥίζας ἐν ὀξυμέλιτι εἰς τὸ ἥμισυ ἔψει. Πίνεται ὠφελίμως σὺν ὀξυκράτῳ αἰγείρου καρπός· ἀμμωνιακοῦ θυμιάματος < α', αἷμα δὲ ἄγει, πηγάνου ἀγρίου σπέρμα· ἀκόνης ραξίας τὸ ἀπότριμμα, καὶ τοῦ πρὸς αὐτὴν ἀκονηθέντος σὺν ἐλαίῳ σιδήρου· πυτία λαγωοῦ ἢ νεβροῦ· σφονδύλιον σὺν ὕδατι· βρουωνίας ῥίζης < α', καθ' ἡμέραν εἰς ἐνιαυτὸν λαμβανομένη· στρύχνου τοῦ τὸν καρπὸν ἔχοντος πυρρὸν ῥίζα ξηρά· βαλσάμου καρποῦ < ε'.<sup>8</sup> ἢ φώκης πυτία μετὰ ἵππου λειχάνων· καὶ αὐτοὶ δὲ καθ' ἑαυτοὺς λειχῆνες· ἴου ἀγρίου ἄνθος· λίθος ἄσσιος μετὰ μέλιτος, ἐπὶ παιδιῶν· καρδαμώμου < α', λωτοῦ τοῦ δένδρου τῶν πρισματίων ἀπόβοεγμα· πενταφύλλου φύλλα λ', καθ' ἑκάστην ἡμέραν ἐπὶ ἡμέρας λ', πινόμενα καθ' ἑαυτά· πίνεται δὲ καὶ χελώνης χερσαίας καὶ θαλασσίας αἷμα· ποιεῖ δὲ καὶ ἐψηθεῖσα καὶ ἐκλειχομένη· ἀρνόγλωσσον ἐσθιόμενον· ὄξος σκυλλητικὸν καταρροφούμενον ὁποῦ φύλλον, ἢ ὁπὸς σὺν τροφῇ λαμβανό-

8) Aëtius < γ'.

vel aceto mulso. Itidem agarici ob. iij., pencedani tantundem, et coaguli phocae obolus unus terantur, simulque misceatur. Aut: radices ononidis in aceto mulso coquito ad medias. Utiliter quoque bibitur ex posca populi nigrae fructus, nec non ammoniaci thymiamatis drach. j., (sed sanguinem educit:) rutae sylvestris semen, quod e cote naxia ferro exacuendo deteritur, cum oleo, leporis aut hinnuli coagulum, sphondylium ex aqua: radix bryoniae drach. j. pondere sumpta quotidie ad annum integrum: solani, quod fulvum gerit fructum, radix sicca, balsami semen pondere drach. vj. Sic et phocae coagulum cum lichenibus equorum, ac ipsi quoque lichenes per se, flos violae agrestis, lapis assius cum melle, in puerulis: cardamomi drach. j., loti arboris ramentorum dilutum. Conveniunt et quinquifolii folia tricena, diebus triginta per se pota. Bibitur et sanguis testudinis tam marinae quam terrestres: eadem etiam cocta et delincta proficit: plantago esitata prodest, acetum scilliticum absorptum, silphii semen, aut ipse liquor in cibis sumptus,



μενος, ἐπιθρόφεϊν δὲ ὑδρόμελι. Ποιεῖ καὶ τοῦτο· γαλῆς κοιλίαν κορίω πληρώσας ξήρανον, καὶ δίδου ἐξ αὐτοῦ μεθ' ὕδατος, ἢ ὄξους· ἢ λίθον σεληνίτην ἀποξύων δίδου· ἢ μήκωνος ἀφρώδους καρπὸς, ὀξυβάφου πληθος· ὄνυχος ὀνείου κεκαυμένου κοχλιαρίων β' πληθος· ὠφελεῖ δὲ καὶ ἡ ὑπὸ τὴν γλῶσσαν φλέψ ἐνμηθεῖσα κατὰ τὸ δεξιὸν μέρος ὥς ἐπὶ δάκτυλον· κνίδη λεία καταπλασθεῖσα· καὶ ταῖς ῥίσι δὲ ἐντίθεται ὠφελίμως χολὴ χελώνης θαλασσίας.

Κεφ. ιθ'. Περιεπτόμενον δὲ ἱκανῶς ὠφελεῖ τοῦτο τοὺς ἐπιληπτικούς· χελιδόνων νεοσσούς ἀνασχίσας ἐκ τῆς πρώτης νεοσσιᾶς, εὐρήσεις λίθους ἐν τῇ γαστρὶ δύο, ποικίλον ἓνα, καὶ τὸν καθαρὸν ἓνα· τοὺς δύο δὴ πρὶν ἡ χαμαὶ τεθῆναι, ἐνδύσων εἰς δέρμα γαλῆς, ἢ πλατυκέρωτος ἐλάφου, καὶ περιέσπον τραχήλῳ ἢ βραχίονι· διηνεκῶς δὲ ἐχέτω τοῦτο, χαμαὶ μηδέποτε τιθείς· λάμβανε δὲ μεταξὺ αὐξομένης τῆς σελήνης τοὺς λίθους· τοῦτο ἂν προσάψης ἐπιληφθέντι, διεγερθήσεται.

Κεφ. κ'. Ἀνακαλεῖται καὶ τοὺς ἐπιλήπτους σίνηπι μετ'

dummodo aqua mulsa superbibatur. Efficaciter etiam auxiliatur mustelae ventriculus coriandro refertus et exsiccatus, si de eo bibendum detur ex aqua vel aceto. Aliud: lapidis selenitis derasum pulverem exhibeto, aut papaveris spumei semen acetabuli mensura, aut ungulae asininæ ustae cochlearia duo. Iuvat et venam, quæ linguae parti dextrae subiacet, ad digiti ferme spatium incidere. Valet et urtica trita et adhibita. Naribus vero fel testudinis marinae utiliter inditur.

Cap. XIX. Inter amuleta comitiales hoc potenter adiuvat: Hirundinum pullos primæ feturæ diffindito: in eorum ventre duos invenies lapillos, unum quidem colore varium, alterum purum et unicolore. Hos, priusquam terram attigerint, pelli mustelæ aut cervi platycerotis illigato, et e collo brachiove suspendito continenter gestandos, ita ut nunquam humi deponantur. Sunt porro hi lapilli, dum luna crescit, inquirendi. Hoc eodem amuleto, quem accessio comitalis invaserit, si contigeris, excitabitur.

Cap. XX. Excitant et comitiales sinapi cum aceto

ὄξους ὁσφραινόμενον, χαλβάνη ὑποθυμιαθεῖσα. Καὶν διέλῃς δὲ ἐξ οὐδηποτοῦν μέρους τὸ σῶμα ἀπ' αὐτῶν, καὶ τῷ ἀποδρέοντι αἵματι διαχρίσης τὸ στόμα, εὐθέως διεγείρονται.

Κεφ. κα'. Ἐλέγχει δὲ ἐπιληπτικούς θυμιώμενα, ἄσφαλτος, γαγάτης λίθος, κέρας αἴγειον. Ἐσθιόμενα δὲ, ἥπαρ τράγιον, ἡ ὁσμὴ τε ἀπ' αὐτοῦ ὀπτωμένου ἀναφερομένη.

Κεφ. κβ'. Πρὸς δὲ τοὺς ὑπὸ τῶν ἐφιάλτων συνεχῶς πνιγμένους ἰῶνται γλυκυσίδης οἱ μέλανες κόκκοι ἰέ, ποθέντες μεθ' ὕδατος πολλάκις.

Κεφ. κγ'. Ἀμέθυστα δὲ ἐστὶν ἀμυγδαλῶν πικρῶν ἀποβρέγματος κύαθος εἰς πινόμενος, ἐλάφιον ταριχηρὸν ὀπτὸν προεσθιόμενον, ἡ οἶνος ἀψινθίτης προπινόμενος, ἡ μυρτίτης, ὁμοίως λαμβανόμενος, καὶ τὰ μύρτα ἐσθιόμενα, καὶ πηγάνου ἀπόξεμα πινόμενον.

Κεφ. κδ'. Ἐπιπινόμενα δὲ μέθην σβεννύει κενταυρίου τοῦ λεπτοῦ ἀπόξεμα, ἱερᾶς βοτάνης τὸ σπέρμα μεθ' ὕδατος ποθέν, καὶ κράμβη ἐπεσθιομένη, καὶ ῥάφανος.

olfactum et suffumigatum galbanum. Quin etiam confestim revocabitur aeger, si quamcunque libuerit illius corporis partem compunxeris, mananteque inde sanguine os ipsius perunxeris.

Cap. XXI. Suffitu vero comitiales arguunt bitumen, lapis gagates et cornu caprinum: iecoris itidem caprini assati nidor, et ipsum quoque iecur in cibo sumptum.

Cap. XXII. Iis, quos incubus frequenter quasi praefocat, remedio sunt paeoniae grana nigra XV, ex aqua saepenumero pota.

Cap. XXIII. Ebrietatem arcent amygdalarum amararum cremor, cyathi unius mensura potus, cervina caro sale condita, si assata praesumatur, vinum absinthites praebibitum, ac myrtites etiam similiter sumptum, myrti quoque baccae esitatae, et rutae decoctum haustum.

Cap. XXIV. Ebrietatem vero iam contractam discutiunt centaurei tenuis decoctum, verbenae supinae semen ex aqua potum: sic et brassica et raphanus, si superedantur.

Κεφ. κέ. Δεῖ δὲ παραφυλάττεσθαι ἐπὶ τῶν περὶ τὴν κεφαλὴν παθῶν τὰ ἀπτόμενα ταύτης, καὶ πολλάκις εἰς ὑπομνήσεις καὶ παροξυσμούς ἄγοντα τὰς διαθέσεις· ἔστι δὲ πινόμενα μὲν ἄγνου σπέρμα, ἀψινθίου χύλισμα, γάλα γλυκύ· ἐσθιόμενα δὲ βάλανοι δρύϊνοι, ἐλαίαι μέλαιναι, ὁ καρπὸς τοῦ κομάρου, ἔστι δὲ μεμαίκνυλα, ὄροβος· οὗτος δὲ καὶ ἄρθρα παραλύει, πολλάκις βρωθεῖς· ἐπὶ πλεῖον δὲ ἄπτεται, ὥστε καὶ ὑποκαροῦν, σμύρνα πινομένη· λίβανος, ὃς καὶ μαρίαν ποιεῖ· κισσοῦ κόρυμβοι, οἱ καὶ ταρασσουσι τὴν διάνοιαν· ὀλοσχοίου καρπὸς καρωτικός<sup>9</sup>, ὥστε καὶ πταίνειν<sup>10</sup> πολλάκις τὴν διάνοιαν· κρόκος, πευκέδαρον, κυκλάμινος ξηρὰ σὺν οἴνῳ ποθεῖσα· στύραξ δὲ ὀλίγος μὲν ποθεῖς λύει σκυθρωπότητα, πολὺς δὲ καὶ κατασκευάζει.<sup>11</sup>

Κεφ. κς. Ταραχώδεις δὲ ὕπνους ποιῇ ποθέντα σὺν οἴνῳ, πυκνοκόμου καρπὸς, λεοντοποδίου ὁμοίως, ἐρεγμὸς πολὺς βρωθεῖς.

9) Sarac. sic emendavit lectionem corruptam κρητικός.

10) Sarac. loco vulg. παίζειν.

11) Moib. ex Gal. et Aëtio addit ταραχώδεις ὕπνους.

Cap. XXV. Porro in capitis affectibus cavenda, quae id ipsum tentare apta sunt, adeoque affectus ipsos plerumque renovant aut exacerbant. Sunt autem huius generis, quae bibuntur, ista: viticis semen, absinthii succus et lac dulce. In cibis vero sumuntur glandes quernae, olivae nigrae, fructus arbuti, quos memaccyla vocant: ervum, quod quidem frequentius esitatum etiam articulos resolvit. Amplius vero caput offendit, adeo ut levem etiam soporem inducat, myrrha epota: tus, quod et insaniam parit: hederæ corymbi, qui mentem etiam permovent: holoschoeni semen, soporiferum adeo, ut mentem etiam saepe lacdat: crocus, peucedanum, cyclamen siccum, in vino pota: styrax denique, qui quidem, parce bibitus, tristitiam solvit, liberalius vero haustus, eandem affert.

Cap. XXVI. Somnos turbulentos efficiunt haec in vino pota: pycnocomi semen, itidemque leontopodii, nec non et faba fresa copiosior in cibo sumpta.

## Τὰ τῶν ὀφθαλμῶν βοηθήματα.

Κεφ. κζ'. Ὁφθαλμῶν δὲ μελλόντων ρευματίζεσθαι, ἐπίστησι πολλοῦ ψυχροῦ κατάντησις, ἐνίοτε καὶ ὄξους μιγέντος, καὶ μάλιστα θέρους.

Κεφ. κη'. Ἰστησι δὲ τὰ ρεύματα ἐπὶ τοῦ μετώπου ἐπιτιθέμενα ἀνακολλήματα, ὡοῦ τὸ λευκόν, γῦρις, λίβανος, μιγέντα καὶ ἐπιχρισθέντα ὀθονίῳ, ἢ ἀπὸ τῶν μαγειρείων<sup>12</sup> αἰθάλη πτυέλῳ μαλαχθεῖσα ἐπιχρίεται.

Κεφ. κθ'. Πρὸς δὲ τὰς φλεγμονὰς τῶν ὀφθαλμῶν καταπλάσματα ἀρμόζει ἄλφιστα μετὰ ἀρνογλώσσου καταπλασσομένα, βάτου φύλλα ἢ ἀρνογλώσσου, ἢ μυδὸς ὠτίδος, ἢ τριβόλου χλωροῦ, ἀνδράχνης, αἰζώου, ἀμώμου, ἡμεροκάλλους, ἴου, κρότωνος· φύλλα ἐλατίνης<sup>13</sup>, φύλλα πολυγόνου, σερίδος, σελίνου, κορίου, κυπαρίσσου φύλλα λεῖτα, κολοκύνθης ξέσματα, πέπονος σὰρξ, σχοίνου φύλλα τὰ ἀπαλὰ, ὑοκυνάμου φύλλα, κυδωνίων ἄνθος, μήκωνος κωδίων ἀφέψημα προσαντλούμενον, καὶ αὐταὶ αἱ κωδίαὶ λεῖται καταπλασσομέ-

12) Sarac. loco vulg. μεγείρων; Gesn. καμίνων; Moiban. αἰγείρων.

13) Moiban. recte sic vulgatum ἐλάτης emendat.

*Oculorum affectorum remedia.*

Cap. XXVII. Quominus oculi fluxionibus reddantur opportuni, prohibet largioris frigidae affusio, admixto etiam interdum aceto, praesertim aestatis tempore.

Cap. XXVIII. Ipsas vero fluxiones sistunt adhibita fronti anacollemata ex ovi albumine, farinae polline et ture simul mixtis et linteolo inductis. Iuvat et coquinariam fuliginem saliva subactam illinere.

Cap. XXIX. Oculorum inflammationibus pro cataplasmate adhibita conveniunt polenta cum plantagine, folia rubi, plantaginis, auriculae muris, tribuli virentis, portulacae, sempervivi, amomi, hemerocallis, violae purpureae, ricini, elatines, polygoni, intybi, apii et coriandri: itidemque cupressi folia trita, cucurbitae ramenta, peponis caro, tenella iunci folia, uti et hyoscyami, cotoneorum flos. Conferunt et fots e papaveris capitum decocto, ac ipsa quoque capita trita et adhibita, butyrum



ναι, βούτυρον νεαρὸν μετὰ ἐρίου ἐπιτιθέμενον, κράμβης φύλλα θερμὰ ἐπιτιθέμενα, κρόκος σὺν μελιλώτῳ καὶ γλυκεῖ, φλόμων φύλλα ἐφθὰ σὺν οἴνῳ μετὰ παλῆς ἀλφίτου, ἀβρότονον σὺν μήλῳ κυδωνίῳ ἐφθῶ, τυρὸς νεαρὸς λεῖος.

Κεφ. λ'. Κατὰ δὲ τοῦ μετώπου<sup>14</sup> καταπλασσόμενα ὠφελεῖ σέυτλον σὺν στυπτηρίᾳ ὀλίγη λεία, μαλαβάθρου φύλλα ἐν οἴνῳ ἀποξεσθέντα, κυάμινον ἄλευρον σὺν ὕδατι, σικύου πέπωνος σάρξ, πηγάνου φύλλα ἐν οἴνῳ ἐφθὰ.

Κεφ. λβ'. Πρὸς δὲ τὰς φλεγμονὰς καὶ τὰ ρεύματα τοῦ ἀσφοδέλου ῥίξης χυλοῦ < α', κρόκου < α', σμύρνης < α', γλυκέως παλαιοῦ ξέ. β' ἔψει, ἕως ἐνωθῇ καὶ σχῇ ἐπίχριστον πάχος· ποιεῖ καὶ τὸ γλαύκιον σὺν ὕδατι, κρόκος σὺν γάλακτι, κωνίου χύλισμα, λύκιον, ῥόδων χυλὸς ἐψημένος.

Κεφ. λβ'. Ἐγχυματίζόμενα δὲ ὠφελεῖ ἀπλᾶ καὶ ἀπερίεργα ὄντα, καὶ στέλλοντα<sup>15</sup> ταχέως τὰς ἐπιφορὰς, καὶ

14) Sarac. loco προσώπου.

15) Sarac. coniecit, loco vulg. ἄγοντα.

recens cum lana impositum, nec non et brassicae folia calientia, crocus cum meliloto et passo, verbasci folia cum meliloto et passo, verbasci folia cum vino cocta, addito polentae polline, abrotanum cum malo cotoneo cocto, denique et caseus recens tritus.

Cap. XXX. Fronti vero imposita iuvant beta cum exiguo alumine trito, malabathri folia in vino fervefacta, fabacea farina cum aqua, cucumeris peponis dicti caro, et rutae folia in vino decocta.

Cap. XXXI. Ad inflammationes simul et fluxiones oculorum valet sequens remedium: succi radiceis asphodeli, croci, myrrhae an. drach. j. cum passi veteris sextariis duobus coquito, dum unita probe linimenti crassitudinem adipiscantur. In id ipsum faciunt glaucium ex aqua, crocus cum lacte, densatus cicutae succus, lycium, ac denique coctus rosarum succus.

Cap. XXXII. Quae vero sequuntur simplicia, neque adeo operosa remedia, ipsis adhibita oculis, valent tum ad sistendas confestim oculorum lippitudines, tum ad co-

τὰ ἔλκη πληροῦντα καὶ ἀποκαθαίροντα· σπόδιον καὶ ὀπὸς, ἴσα μιννύμενα αὐτοῖς εἰς ἀνάπλασιν· αἰζώου χυλὸς, καὶ ἀνδράχνης κατὰ τὸ πρόσφατον ἐγγυματιζόμενοι μετὰ κόμμεως καὶ σποδίου ἡμίσεως, ἢ ἀναπλασθέντες καὶ ἀναχριόμενοι· καὶ ἀρογλώσσου χυλὸς, ὥκιμον σὺν οἴνῳ.

Κε φ. λγ'. Τὰς περιωδυνίας δὲ παύει κρόκος σὺν γάλακτι, σπόδιον σὺν κωνείου χυλίσματι, ὅπιον ὁμοίως, χαλκὸς κεκαυμένος, λίθος γαλακτίτης μετὰ γάλακτος γυναικείου, καὶ μάλιστα ἐπὶ παιδίου ἐνσταζόμενος. Ποιεῖ δὲ ἄκρως καὶ τοῦτο τὸ ἐγχρίσμα· ἀγρώστεως χυλοῦ τῆς ἐν Παρνασσῶ, καὶ μελίλωτος ἴσα, σμύρνῃς ἡμισυ, πεπéρεως καὶ λιβανωτοῦ τὸ τρίτον, οἴνου καὶ μέλιτος σύμμετρον· ἔψε ἐν χαλκοῖς καὶ χρῶ.

Κε φ. λδ'. Πρὸς δὲ τὰ κεχρονισμένα ἔλκη καὶ ρεύματα ἀρμόζει σὺν ὕδατι λεῖα ἐγχριόμενα λίθος γαλακτίτης, λίθος θυίτης καλούμενος, λίθος σάπφειρος σὺν γάλακτι, χαλκὸς κεκαυμένος σὺν γάλακτι, θρίδακος ἀγρίας ὀπὸς σὺν γυναικίῳ γάλακτι· αὐτὴ καὶ ποιεῖ πρὸς ἔλκη καὶ πρὸς ἐπι-

rundem ulcera et expurganda et carne implenda: spodium et laser, paribus mista portionibus, et in pastillos conformata, sempervivi ac portulacae succi, cum gummi et spodii dimidia parte in trochiscos conformati, ac in recenti malo seu instillati, seu etiam illiti: itidem portulacae succus, et ocimum cum vino.

Cap. XXXIII. Vehementes oculorum dolores mitigant crocus cum lacte, spodium cum densato cicutae succo, opium similiter, aes ustum, lapis galactites cum lacte muliebri, maxime infantibus, instillatus. Eximiam vero opem affert et iste illitus: Sume succi graminis parnassii et meliloti partes aequales, myrrhae dimidium, piperis ac turis tertiam partem, vini ac mellis quantum sat est: coquito in aeneo vase, ac utitor.

Cap. XXXIV. Inveteratis ulceribus atque fluxionibus conveniunt trita, et ex aqua illita, lapis galactites ac thyites itidem dictus: lapis sapphirus cum lacte, sylvestris lactucae liquor cum lacte muliebri: ipsa quoque lactuca facit ad ulcera et adustiones. Sumptum vero

καύματα. Πινόμενον δὲ ἴσῃσι ρεύματα χρόνια κύμινον, σὺν οἴνῳ καὶ ὕδατι λαμβανόμενον.

Κεφ. λε'. Περιεπτομένη δὲ τῷ τραχήλῳ διηνεκῶς κω-  
λύει ὀφθαλμίαν, τριβόλου ῥίζα, πολυγόνου ὁμοίως. δοκοῦσι  
δὲ τηρεῖν ἐπ' ἐνιαυτὸν ἀνοφθαλμιάτους κύτινοι ῥοιᾶς μικροὶ  
καὶ μέμυκότες καταπινόμενοι.

Κεφ. λς'. Οἰδήματα δὲ πραῦνει ἄμμι σὺν λινοσπέρμῳ,  
ἀνήθου ῥίζα μεθ' ὕδατος λεία, κυάμινον ἄλευρον σὺν λιβα-  
νωτῷ λείῳ, καὶ ὠοῦ τὸ λευκόν.

Κεφ. λζ'. Πρὸς δὲ τὰς ἐκ πληγῆς συγχύσεις καὶ φλε-  
γμονὰς ἰδίως ποιεῖ στοίβης καρπὸς ἐν οἴνῳ ἐψηθεὶς καὶ λείος  
ἐπιτεθείς.

Κεφ. λη'. Ὑποδρομὰς δὲ αἵματος θεραπείαι ἐγχειρίμε-  
νον αἶμα περιστερᾶς πρόσφατον, τρυγόνος, πέριδος, φάτ-  
της· γάλα γυναικῆον σὺν λιβανωτῷ, κόκκος βαφικὸς σὺν  
γάλακτι ὁμοίως, αἱματίτης λίθος σὺν γάλακτι γυναικείῳ,  
ὑσσωπον λείον ἐνδεθὲν εἰς ὕθόνιον, καὶ ἀποβαπτόμενον εἰς

in potu cuminum ex vino et aqua diuturnas fluxiones  
sistit.

Cap. XXXV. Ophthalmiam arcet perpetuo appensa  
collo tribuli radix similiterque polygoni. Creduntur et  
anno toto ab eo affectu incolumes conservari, qui puniceae  
arboris cytinus exiguos necdum hiantes devoraverint.

Cap. XXXVI. Oculorum oedemata mitigant ammi  
cum lini semine, anethi radix in pulverem redacta cum  
aqua, fabacea farina cum pulvere turis, itemque ovi al-  
bumen.

Cap. XXXVII. Oculorum ab ictu confusionibus  
et inflammationibus privatim opitulatur stoeches fructus in  
vino coctus, deindeque tritus et impositus.

Cap. XXXVIII. Oculis cruore suffusis medetur  
sanguis recens detractus e columba, turture, perdice, pa-  
lumbo: lac item muliebre cum ture, granum tinctile cum  
lacte similiter, haematites lapis cum lacte muliebri, hys-  
sopus tritus, linteolo involutus, in calentem aquam demer-

ὑδωρ θερμὸν, πυριωμένου τοῦ ὀφθαλμοῦ· ἄσφαλτος καὶ λίβανος ἴσα ὑποθυμιαθέντα.

Κεφ. λθ'. Προπτώσεις δὲ ὀφθαλμῶν στέλλει καταπλασόμενα, εἰ μὲν ἀλγήματα εἴη, λινόσπερμον καὶ τῆλιν σὺν ὑδρομέλειτι ἐφθά· εἰ δὲ παρήκμακε τὰ ἀλγήματα, ἢ μηδὲ ἐγένετο, εὐθέως ἐπὶ τὰ στύφειν καὶ ψύχειν δυνάμενα παραγίνεσθαι δεῖ· ὅποιά ἐστι βάτου φύλλα, μελίλωτον σὺν γλυκεῖ καὶ ὠοῦ ἐφθοῦ λεκύθοις καὶ κρόκῳ, κυάμινον ἄλευρον σὺν ῥόδοις, λινόσπερμον σὺν ὕδατι καὶ λιβανωτῷ καὶ σμύρνῃ, μελάνθιον σὺν ἀλφίτῳ λείῳ, μηκόνιον σὺν λεκύθῳ ὠοῦ ὀπτοῦ καὶ κηρωτῇ, πήγανον σὺν ἀλφίτῳ.

Κεφ. μ'. Σταφυλώματα δὲ αἶρει, κανθαρίδος προσφάτου θλασθείσης ἐγχριόμενον τὸ ὑγρὸν, ἢ αὐτὴ· καθαίρει δὲ τὰ ἐπισκοτοῦντα ταῖς κόραις, ἄργεμα καὶ νεφέλια καὶ ἀχλὺς· ποιεῖ δὲ καὶ ὄξυδερκίαν.

Κεφ. μα'. Ἐπὶ δὲ τῶν ἀμβλυπούντων ἐγχριόμενα, ἀκόρου χύλισμα, λιβανωτίδος σπέρμα λεῖον μετὰ γάλακτος· μήκωνος κερατίτιδος τοῦ φύλλου ἢ καὶ τῶν ἀνθῶν ὁ χυλὸς ἐν-

sus, et oculo pro fotu adhibitus. Suffumigantur et oculi bituminis ac turis paribus portionibus.

Cap. XXXIX. Procidentes oculos reprimunt, siquidem dolores infestant, imposita haec: lini semen et fenum graecum cum aqua mulsa cocta. Sin dolores remiserint, aut nulli prorsus adfuerint, statim ad ea, quae adstringendi refrigerandique facultate pollent, accedendum: qualia sunt rubi folia, melilotus cum passo, ovorum coctorum vitellis et croco: lomentum fabarum cum rosis, lini semen cum aqua, ture et myrrha: melanthium cum polenta tritum, meconium cum assati ovi vitello et cerato, ruta cum polenta.

Cap. XL. Staphylomata tollit contusae recens cantharidis humor illitus: ac ea ipsa quoque. Purgat et quaecunque pupillis tenebras offundunt, uti argema, nubes et caligines, oculorumque aciem exacuit.

Cap. XLI. Oculorum hebetudini medentur haec illita: densatus acori succus, libanotidis semen cum lacte tritum, e corniculati papaveris folio aut etiam flore suc-



σταζόμενος, καὶ ἐπὶ κτηνῶν ἄργεμον ἀποκαθαίρει· ἄλικακά-  
 βου ῥίζης τοῦ φλοιοῦ καὶ καρποῦ χυλὸς ὁμοίως, ἢ καὶ ὁπὸς  
 αὐτοῦ σὺν μέλιτι· πευκεδάνου ὁπὸς ὁμοίως, σαγάπηνον  
 ὁμοίως, ἀνεμωνίου χυλὸς ὁμοίως, ὀρμίνου ἀγρίου σπέρμα  
 ὁμοίως, κεγχρίδων ἄφοδος ὁμοίως, ἐλαίας αἰθιοπικῆς τὸ δά-  
 κρουον, ἐλλέβορος λευκός, ἔρια οἰσυπηρὰ κεκαυμένα, εὐφορ-  
 βίου χυλὸς, ἰὸς καεῖς, κισσός, κιννάμωμον, ἱτέας χυλὸς καὶ  
 ὁπὸς, κενταυρίου τοῦ λεπτοῦ χυλὸς, κίσσηρις ὀπτὴ λεία,  
 κρομμύου χυλὸς, κυκλαμίνου τῆς ῥίζης χυλὸς, μαράθρου τῆς  
 ῥίζης χυλὸς, μελανθίου καὶ μελισσοφύλλου χυλὸς, ἡριγέρον-  
 τος χυλὸς, ὀμφάκιον, ὁπὸς σιλφίου, ὀποπάναξ, πηγάνου  
 ἀγρίου χυλὸς, δρακοντίου ῥίζης χυλὸς, θρίδακος ἀγρίας χυ-  
 λὸς, ἁψίνθιον λεῖον, λωτοῦ τῆς πόας χυλὸς, χαμαΐδρους  
 χυλὸς, ὠκίμου χυλὸς, πρασίου χυλὸς, νίτρον, ζιγγίβρι,  
 στρουθίον, στυπτηρία ἢ κεκαυμένη, αἱματίτης λίθος, κο-  
 ράλλιον, κοχλίας χερσαῖος κεκαυμένος, χελιδόνων νεοττῶν κε-  
 καυμένων ὡς τέφρα· τούτων ἕκαστον σὺν μέλιτι ἄττικῳ λε-  
 λειωμένον καλῶς· ἐβένου ῥίνημα σὺν οἴνῳ, οὖρον ἀφθόρου  
 παιδὸς ἐν χαλκῳματι ἐψηθὲν μετὰ μέλιτος, οὖρου ἀνθρω-

cus instillatus, qui quidem et argema inmentorum expur-  
 gat: halicacabi e radicis cortice et semine succus eodem  
 modo, ac liquor etiam eiusdem cum melle. Similiter et  
 peucedani liquor, sagapenum, anemones succus, hormini  
 sylvestris semen, finum cenchridum, olivae aethiopicae  
 lacrima, helleborus albus, lanae succidae ustae, euphor-  
 bii succus, aerugo usta, hederæ, cinnamomum, salicis  
 succus et liquor, centaurii minoris succus, pumicis usti  
 pulvis, cepae succus, cyclaminis e radice succus, uti et  
 e radice foeniculi: succi melanthii, apiastri et senecio-  
 nis: omphacium, laser, opopanax, rutae sylvestris suc-  
 cus, dracunculi e radice succus, agrestis lactucæ succus,  
 absinthium tritum: succi loti herbae, chamaedryos, oci-  
 mi et marrubii: nitrum, zingiber, struthium, alumen  
 ustum, haematites lapis, corallium, terrestris cochlea  
 cremata, ustorum hirundinis pullorum ceu cinis: horum  
 inquam unumquodlibet cum melle attico probe contritum.  
 Scobs ebeni cum vino, urina pueri impubis in aeneo  
 vase cocta cum melle, urinae humanae sedimentum cum

πείου ὑποστάθμη σὺν κυπρίνῳ ἐλαίῳ· χαλκοῦ ἄνθος λεῖον  
 προσεπτόμενον ἐλαίῳ, ἴσα μίγντα· ἔλαιον παλαιόν· βαλσά-  
 μου ὀπὸς, κύπρινον ἔλαιον, ἴσα μίγντα· πισσέλαιον, σάκ-  
 χαρις, στέαρ ποταμίου ἰχθύος ἐν ἡλίῳ ἀποτακέν καὶ μίγν  
 μέλιτι· χολή δὲ πέρδικος ἀγρίου, ἰχθύος τοῦ καλλιωνύμου,  
 σκορπίου ἰχθύος, χελώνης θαλασσίας, ὑαίνης, αἰγὸς ἀγρίας,  
 σὺν μέλιτι πᾶσαι.

Κεφ. μβ'. Οὐλὰς δὲ σμεῖ ἐγχειρόμενα ἰδίως ἀλκυνόνιον  
 μιλῆσιον σὺν μέλιτι, ἀμμωνιακὸν λειανθὲν σὺν οἴνῳ καὶ  
 μέλιτι, ἀνεμώνης ῥίζα τῆς στογγύλης σὺν μέλιτι, ἀναγαλλί-  
 δος φοινικῆς χυλὸς ὁμοίως, πηγάνου ἀγρίου χυλὸς ἐγχειρό-  
 μενος.

Κεφ. μγ'. Ἀρμόζει δὲ ἐσθιόμενα ἀμβλυώπουσι ταῦτα·  
 ἐχίδνης σάροξ ἐφθῆ, θύμον, κρόμβης καυλοὶ ὥμοι, ῥάφανος,  
 μάραθρον, κρόμμυον, κάρδαμον, καὶ πάντα καθόλου τὰ δρι-  
 μέα, ὅξος σκιλλητικόν· φυλάσσεσθαι δὲ δεῖ καὶ τὰ ἐπιτεί-  
 νοντα τὰς ἀμβλυώσεις, ἐσθιόμενα· ἔστι δὲ ἄνηθον καὶ τὸ

cyprino oleo, aeris flos tritus et cum aequali portione  
 olei subactus, oleum antiquum, balsami liquor cum olei  
 cyprini pari portione, picis oleum, saccharum, adeps flu-  
 viatiliū piscium in sole eliquatus et melli admixtus:  
 fella denique perdicis sylvestris, callionymi piscis, scorpii  
 piscis, testudinis marinae, hyaenae et caprae agrestis, ho-  
 rum inquam singula cum mellē.

Cap. XLII. Privatum oculorum cicatrices illita ex-  
 terunt alcyonium milesium cum melle, et ammoniacum  
 cum vino ac melle tritum, anemones rotundae radix iti-  
 dem cum melle: similiter et anagallidis puniceae succus,  
 nec non et rutae agrestis.

Cap. XLIII. Porro laborantius oculorum hebetu-  
 dine in cibus ista conveniunt: viperae caro cocta, thy-  
 mus, crudi brassicae caules, raphanus, foeniculum, cepa,  
 nasturtium, acetum scilliticum, et in universum acria  
 omnia. In iisdem vero cibus ea cavere oportet, quae he-  
 betudinem augent, uti anethum cum suo semine, lenticu-

σπέρμα αὐτοῦ, φακός, ἑλαῖαι μέλαιναι, θριδάξ, πρᾶσον κεφαλωτὸν, σέλινα, ὠκισμον.

Κεφ. μδ'. Νυκτάλωπας δὲ ἐγχερίομενα ὠφελεῖ αἷμα τρυγόνος, φάσσης, περιστερᾶς, πέροδικος, ἢ αἰγὸς ἀγρίας καὶ τράγου, ἥπατος αἰγείου ὃ ἐν τῇ ὀπτήσει ἰχὼρ ἀπορρέων ἐγχερίομενος, καὶ αὐτὸ τὸ ἥπαρ ἐσθιόμενον, καὶ ἡ ἀτμὶς ἀπ' αὐτοῦ ἐφομένου ἐλκομένη ἀνεωγόσι τοῖς ὀφθαλμοῖς· ὠφελεῖ δὲ καὶ ἐλατήριον λεῖον σὺν μέλιτι ἐγχερίομενον.

Κεφ. με'. Πτερύγια δὲ τὰ ἐν ὀφθαλμοῖς τήκει προσ-αγόμενα κίσσηρις ὀπτὴ λεῖα, σηπίας ὄστρακον λεῖον, ἢ ἄλλες καὶ καδμία λεῖα, ἅπαντα ἴσα.

Κεφ. μς'. Τὰ δὲ τραχέα βλέφαρα λεπτύνει ἐγχερίομενα σὺν μέλιτι λεῖα· (δεῖ δὲ πυριᾶν ὑδατι μετὰ τὴν ἐγχερίσιν, μέ-χοι παύσονται δακνόμενα·) ἰὸς χαλκοῦ καὶ σιδήρου σκωρία κεκαυμένη, χάλκανθος κεκαυμένη, μίσυ κεκαυμένον, χαλκίτις κεκαυμένη, ὀμφάκιον, λεπίς χαλκοῦ καὶ σιδήρου, καδμία καῖτσα τρίτον καὶ σβεσθεῖσα οἶνω, στυπτηρίαί πᾶσαι καῖτσαι,

lam, nigricantes olivas, lactucam, porrum capitatum, apium et ocimum.

Cap. XLIV. Nyctalopas iuvant inuncta haec: sanguis turturis, palumbis, columbae, perdicis aut caprae sylvestris et hirci, latex e caprino iccore, dum inassatur, exstillans inunctus, ac ipsum quoque iccur in cibo sumptum, nec non et ex eodem, dum coquitur, vapor in apertos oculos attractus. Confert et elaterium tritum cum melle inunctum.

Cap. XLV. Ungues oculorum absumunt haec adhibita: pumex crematus et tritus, sepiac testa trita, sal et cadmia, trita omnia aequali pondere.

Cap. XLVI. Scabras palpebras extenuant quae sequuntur, trita et cum melle illita, ita tamen ut hand ita multo post aqua locus foveatur, dum morsu excitatus dolor desinat. Sunt autem isthaec: aerugo, ferrique scoria usta, chalcanthus cremata, misy ustum, chalcitis cremata, omphacium, squama aeris et ferri, cadmia tertio usta vinoque restincta, aluminis genus omne ustum, maxime-

καὶ μάλιστα σχιστῇ, οὔσωπον<sup>16</sup> κεκαυμένον, οὔρου ἀνδρείου ὑποστάθμῃ σὺν κυπρίνῳ μύρῳ.

Κεφ. μζ'. Ξύειν δὲ δεῖ τὰ τετυλωμένα, ἐκστρέφοντα βλέφαρα συκῆς<sup>17</sup> φύλλοις τραχέσιν, ἢ σμιλίῳ, ἢ σπητίας ὀστράκῳ σχηματισθέντι εἰς κολλύριον· καὶ ἰῶ ἀναληφθέντι κόμει εἰς κολλύριον.

Κεφ. μη'. Μίλφους δὲ καὶ τὰ βεβρωμένα βλέφαρα ἀφελεῖ ἀμόργῃ ἐψημένῃ καὶ ἐγχριόμενῃ· ἢ λύκιον, ἀρμενιακὸν<sup>18</sup> σὺν ὕδατι ἐγχριόμενον, ὃ καὶ τὰς τρίχας αὖξει· θαλλίας χυλὸς· ἰὸς σιδήρου ἐπὶ πολλὰς ἡμέρας ἐν ἡλίῳ τριβείς, μετὰ οἴνου καὶ σμύρνης εἰς κολλύριον ἀναπλασθεῖς· κρομμύου χυλὸς σποδίῳ ἀναληφθεῖς, λεπίς χαλκοῦ· ἢ καδμία λεπτή ἀναληφθεῖσα μέλιτι καὶ καῖσα ἐν χυτρίδιῳ καινῷ, πηλῷ τε κεραμικῷ πεπωμασμένῳ· ἔπειτα ὀπηθεῖσα ἐπ' ἀνδρακώματος, μγέντων αὐτῇ χαλκοῦ κεκαυμένου ἴσου καὶ στίμμεως δὲ ἡμίσεως μέρους.

16) Sarac. loco ὕσωπον, recte.

17) E Paullo, loco vulg. ἰοῦ.

18) Ex Galeno fac. simpl. lib. 9. p. 211. loco vulg. ἀμμωνιακόν Moiban.

que scissile, oesypum ustum, ac denique urinae virilis sēdimentum cum unguento cyprino.

Cap. XLVII. Callosas vero palpebras eversas radere oportet fici foliis asperis, aut scalpello, aut sepiae testa in collyrium conformata, aut denique collyrio ex aerugine excepta gummi.

Cap. XLVIII. Defludio pilorum arrosisque palpebris prosunt amurca cocta et illita, lycium, armenium quoque cum aqua inunctum, (quod et pilorum incrementum promovet,) succus recentium oleae germinum, rubigo ferri, multis diebus in sole trita, et cum vino ac myrrha in collyrium redacta, spodium cepae succo exceptum, squama aeris, aut cadmia tenuis, melle excepta ustaque in ollula nova, quae argilla figlina operculata sit: deinde tosta super prunis cum aequali portione aeris usti ac stibii parte dimidia.



Κεφ. μθ'. Ξηροφθαλμίαν δὲ καὶ κνησμούς ἰάσεις ψω-  
ρικῶ λείῳ προσαπτόμενος, ἢ λεπίδι λείᾳ πεπλυμένη καὶ πε-  
πέρει, ἢ καὶ σὺν πεπέρει, ἢ σιδήρου ἰῶ ξηρῶ, ἢ ὀμφακίῳ  
ξηρῶ λείῳ ὁμοίως.

Κεφ. ν'. Τὰ δὲ λεπρώδη πάθη τῶν βλεφάρων ὑγιά-  
ζει συκῆς ὁπὸς καταχρίόμενος.

Κεφ. νά'. Φθειριάσεις δὲ τὰς ἐν τοῖς βλεφάροις καὶ  
ὀφρῦσι θεραπεύει σὺν μέλιτι ἢ ὕδατι ἐπιχρίόμενα σανδαράχη,  
σταφίς ἀγρία.

Κεφ. νβ'. Τὰς δὲ νυκτούσας δίχα ρευματισμοῦ χρονίου  
καὶ ἐκτίλεισας τρίχας ἐπὶ τῶν βλεφάρων ὥς τὸ πολὺ οὐκ  
ἐᾷ φυῆναι, μετὰ τὸ ἐκτιλῆναι εὐθέως καταχρίόμενα, αἷμα  
βατράχων τῶν χλωρῶν πρόσφατον καθ' ἑαυτὸ, ἢ μίγν χα-  
μαιλέοντι κεκαυμένῳ λευκῶ ἄχρῳ ἀνδρακώσεως, ἢ αἷμα κό-  
ρεως καθ' ἑαυτὸ, ἢ καπνοῦ τοῦ ἐν ταῖς κριθαῖς φυομένου  
ὁ χυλὸς σὺν κόμμει, ἢ τελλῖναι ταριχηραὶ κεκαυμέναι λείαι  
μετὰ κεδρίας, λωτοῦ κεκαυμένου ἢ τέφρα, ἢ στυπτηρία φο-  
ρίμη.

Cap. XLIX. Lippitudinem aridam et pruritum ocu-  
lorum sanabis, si leviter attingas psorico contrito, aut  
squama trita lotaque et pipere, aut alio quopiam cum pipe-  
re, aut rubigine ferri sicca, aut omphacio sicco tritoque  
similiter.

Cap. L. Leprosos vero palpebrarum affectus sanat  
ficulneus liquor illitus.

Cap. LI. Pediculare vitium in palpebris et super-  
ciliis curatur sandaracha et staphide agria cum melle et  
aqua illitis.

Cap. LII. Evulsos vero pilos, qui citra diuturnam flu-  
xionem oculos pungebant, ut plurimum renasci prohibent  
ea, quae sequuntur, siquidem illinantur, cum primum illi  
evulsi fuerint: nempe sanguis ranarum viridum recens  
per se, vel mistus albo chamaeleonti unto, dum in carbo-  
nes redactus fuerit: aut sanguis cimicis per se, aut fu-  
mariae nascentis inter hordea succus addito, gummi, aut  
tellinae salsae ustae tritaeque cum cedria, loti combusti  
cinis, denique alumen liquidum, quod phorimon dicitur.

Κεφ. νγ'. Ανακολλήματα δὲ πρὸς τὰς εἰςκλωμένας ἢ παραφυσμένας τρίχας ἐν τοῖς βλεφάροις, μαστίχη μηλωτίδι θερμῇ προσαγομένη αὐτοῖς, καὶ οὕτως ἀνακολλωμένων ἐπὶ τὴν ἰδίαν τάξιν τῶν τριχῶν· ἢ ἄσφαλτος ὁμοίως, ἢ λιθοκόλλα· ὁμοίως κοχλίου τὸ κολλῶδες βελόνῃ ἀναλαμβανόμενον, ἢ χονδρίλλης κόμμι ὁμοίως· Κάλαμον λεπτὸν σχίσας τὸ μῆκος δακτύλων β', καὶ τὸ δέριμα τὸ ἐπάνω τῶν βλεφάρων λαβιδώσας, δῆσον ἰσχυρῶς, ἕως οὗ πέσῃ ἀφ' ἑαυτοῦ μὴ λύσῃς, καὶ ἔσται ὑγιής.

Κεφ. νδ'. Αἰγίλωπας δὲ θεραπεύει, ἐφ' ὧν μὴ διὰ βάθους ἔφθαρται τὸ ὀστέον, ἀνθέμιδος φύλλα μασσηθέντα καὶ ἐπιτεθέντα, αἰγίλωπος τοῦ ἐν τοῖς σίτοις χυλὸς σὺν ἀλεύρῳ σιτανίῳ καταπλασσόμενος, ἀρογλώσσου φύλλα μασσηθέντα καὶ ἐπιτεθέντα, ἢ μαλάχης φύλλα λεῖα σὺν χολῇ τανυαῖα, ὡς ἐν τούτῳ ὑγρῷ ὄντι βρέχων σπληνάρια ἢ ὀθόνια ἐπιτίθει, καὶ ὑγραίνει τῷ φαρμάκῳ· ξηραίνόμενα δὲ ἄλλασσε δις ἢ τρίς τῆς ἡμέρας· ἢ αὐτὰ μασσησάμενος τὰ φύλλα τῆς μαλάχης μετὰ ἑλός· μετὰ δὲ τὸ ἀναστομωθῆναι αὐτοὺς, τῇ

Cap. LIII. Intro reflexos aut transverso tramite natos palpebrarum pilos ita replicat glutinatque, ut in suum redigantur ordinem, per specillum calens admota mastiche: similiter et bitumen, atque lithocolla, nec non et cochleae viscidus lentor acu exceptus, denique et chondrillae gummi ad eundem modum. Arundine tenui ad duorum digitorum longitudinem fissa, cutem, quae supra palpebras est, prehendito, arcteque stringito, neque prius solvito, quam sponte per se excidat: atque sanabitur.

Cap. LIV. Aegilopas, in quibus nondum ima parte corruptum os est, sanant chamaemeli folia commanducata et imposita: succus aegilopis, qui inter frumenta nascitur, cum sitanii seu trimestris tritici farina adhibitus, plantaginis folia commanducata et imposita, malvae folia trita cum felle taurino, ita ut hoc remedio madentia splenia linteolave imponantur: haec si resiccantur, denuo bis terve quotidie humectari par est. Idem praestabunt malvae contrita folia cum sale: sed post apertum aegilopeni

μαλάχῃ λεία χρῶ μέχρι κατουλώσεως· ἢ καρύων βασιλικῶν τὸ ἐντὸς μασσώμενον ἐπιτίθει, ἢ μύρτα ὡσαύτως, ἢ οἰνάνθην ὁμοίως· μὺς ὧτων τοῖς φύλλοις ὁμοίως μετὰ ἁλῶν χρῶ· ποιεῖ δὲ καὶ στρύχνος κηπεῖος, καὶ μάλιστα ὁ καλούμενος ἀλικάκαβος, χαμαῖζηλον ἔχων ἐν φύσῃ τὸν ἐρυθρὸν καρπὸν· ἢ λίβανος καὶ περιστεῖρας κόπρος, λεία μίγντα, λιθοῦται δὲ καὶ προσμένει μέχρι ἀπουλώσεως· ἢ αἰζῶον καθ' ἑαυτὸ, καὶ μετὰ μέλιτος· στυπτηρία σχιστὴ ὥς ὅτι πλείστη τερμινθίνη ἀναληφθεῖσα· πρόπολις καὶ τερμινθίνη καὶ χόνδρος, ἴσα ἐν σπληνίῳ· ἢ ἅλεις μετὰ μαστίχης<sup>19</sup>, μάννα μετὰ στακτῆς ἀναμαλαχθεῖσα, ἢ μάννα σόγγου χυλῷ γαλακτίζοντι ἀναληφθεῖσα· ποιεῖ καὶ βάλανος δρυῖνῃ καεῖσα σὺν ὄξει· καὶ σποδὸς ἀμπελινῇ ὁμοίως, ἢ ὕροβος μετὰ μέλιτος· ἢ σὺκα ξηρὰ λιπαρὰ σὺν πίσσῃ βρουττία ἀναμαλαχθέντα ἴσα.

Κεφ. νέ'. Χαλάζια δὲ διαφοροῦσιν ὄλυνθοι ἐφθοῖ ἐπιπλασθέντες, ἢ τὰ τῆς συκῆς φύλλα.

19) Moiban. loco vulg. μαστίας.

ipsa malva trita utere, dum cicatrix inducta fuerit. Similiter et nucis iuglandis partem interiorem commanducatam imponito, aut myrti baccas, aut oenanthen. Ad eundem quoque modum auriculae muris foliis cum sale uti licebit. Id ipsum praestat solanum hortense, maxime vero quod halicacabum dicitur, quodque intra folliculum rubentem fructum in terram pronum continet. Itidem tus et simum columbinum trita simulque mixta: quae lapidescunt inhaerentque, dum cicatrix inducta fuerit. Sempervivum quoque, seu per se, seu cum melle: alumen scissile copiosa terebinthina exceptum, propolis terebinthinae et chondri pares portiones splenio inducta: sal cum mastiche: manna cum stacte subacta, aut souchi lacteo succo excepta. Facit et glans querna cremata cum aceto: itemque cinis vitium similiter: nec non et ervum cum melle, itidemque caricae pingues cum picis bruttiae pari portione subactae.

Cap. LV. Grandines palpebrarum dissipant grossi cocti et impositi, aut ficulnea folia.

Κεφ. νς'. Ὑπόπια δὲ αἶρει καὶ πελιώματα καταπλασ-  
σόμενα ἀνισον σὺν μέλιτι ἀττικῷ, ὁμοίως ὀρίγανον· ῥα-  
φάνου φλοιὸς, σάμψυχον, ταῦτα σὺν μέλιτι· σκόρδιον κε-  
καυμένον σὺν μέλιτι, βρυωνίας ῥίζα σὺν οἴνῳ ἐπιχριομένη,  
βολβὸς μετὰ λεκύθων ὡοῦ καταπλασσόμενος, ἀψίνθιον ὁ-  
μοίως· ἄλευρον κυάμινον, ἢ αἶρινον· κυμίνου σπέρμα, μετὰ  
ἁλῶν καὶ ἐλαίου, θάλασσα πυριωμένη, θαψίας χυλὸς ἐπι-  
χριόμενος πρὸς βραχὺ, καὶ ἡ ῥίζα σὺν κηρωτῇ, θέρμινον ἄ-  
λευρον σὺν ἀλφίτῳ, καλαμίνθη ἐν οἴνῳ ἐφθῇ, καρύου βα-  
σιλικοῦ τὸ ἐντὸς λεῖτον, κύμινον ἄχριον μασσηθὲν σὺν ὄξει  
καὶ μέλιτι ἢ σταγίδι, μαράθρου σπέρμα σὺν κηρωτῇ, νάπυ  
σὺν κηρωτῇ ἢ μέλιτι, σιλφίου ῥίζα σὺν ἐλαίῳ· ἢ ὕσσωπον  
καταπλασθὲν καὶ ἐνδεθὲν εἰς ὀθόνιον ἀποβαπτομένου τοῦ ἐν-  
δέσμου εἰς θερμὸν ὕδωρ, καὶ πυριωμένου τοῦ ὑπωπίου· ἐπὶ  
πάντων δὲ τῶν καταχρισμάτων πυριᾶν δεῖ μετὰ τὴν ἀφαί-  
ρεσιν αὐτῶν· ἅμα γὰρ τὰ οἰδήματα καὶ τὰ πελιώματα δια-  
φορεῖ· ἔτι δὲ καὶ τυρὸς ἄλμυρὸς καταπλασσόμενος· αἶρει γὰρ  
παραχοῆμα· ἐὰν δὲ μένη, καὶ κρομμύου δεῖ μῆγναι χυλόν·

Cap. LVI. Sugillata liventiaque emendant haec im-  
posita: anisum cum melle attico, similiter et origanum,  
raphani cortex, sampsuchum, haec inquam cum melle:  
scordium ustum cum melle, bryoniae radix cum vino il-  
lita, bulbus cum vitellis ovorum impositus, absinthium  
eodem modo, farina fabacea aut loliacea, cumini semen  
cum sale et oleo, fotsus ex aqua marina, thapsiae succus  
ad breve tempus inunctus, eiusdem radix cum cerato, fa-  
rina lupinorum cum polenta, calamintha in vino cocta,  
nucis iuglandis pars interior trita, sylvestre cuminum  
commanducatum cum aceto et melle aut uva passa, foe-  
niculi semen cum cerato, sinapi cum cerato aut melle,  
laserpitii radix cum oleo. Aliud: hyssopum in catapla-  
smatis formam redactum nodulo illigato, hocque in calen-  
tem aquam demerso sugillata foveto. Sed et post quem-  
vis illitum, statim ut aufertur fomentum, adhiberi oportet:  
simul enim et oedemata et livores discutit. Insuper et  
caseus salsus utiliter imponitur: confestim enim sugillata  
tollit: quodsi perseverent, etiam alii succum admisceri



αἶρου δὲ καὶ ἄρου ρίζα ἐπιτιθεμένη· ἢ σηπίας ὄστρακον ξυσθὲν, καὶ μετὰ ὄξους καταχρισθὲν, ἢ νάπυ ἀναληφθὲν σὺν κηρωτῇ.

Τῶν πρὸς τὰ ὦτα παθῶν βοηθήματα.

Κεφ. νζ'. Τὰς δὲ περὶ τὰ ὦτα ἀλγηδόνας καὶ φλεγμονὰς παραμυθεῖται ταῦτα, ἐνσταζόμενα χλιαρά· παρθενίου χυλὸς, μυρωτίδος ὁμοίως, ἀχιλλείου, ἡδυόσμου χυλὸς σὺν μελικράτῳ, δρακοντίου χυλὸς ἐν ἐλαίῳ διεθείς, ἐλξίνης χυλὸς σὺν ῥοδίνῳ εἰς τὸ ἀντικείμενον οὗς ἐγγεόμενος, κολοκύνθης ξυσμάτων ὁ χυλὸς ὁμοίως· λεύκης φύλλων χυλὸς ὁμοίως σὺν ῥοδίνῳ· ναρκίσσου φύλλων χυλὸς ὁμοίως, ἢ τῆς ῥίζης· ὀριγάνου χλωροῦ χυλὸς σὺν γαλακτι γυναικίῳ· πηγάνου χυλὸς, ἢ πολυγόνου ἐν σιδίῳ ῥοιᾶς θερμοανθείς· πράσου τῶν φύλλων χυλὸς σὺν ῥοδίνῳ καὶ μηκωνίῳ, ἱέας τῶν φύλλων χυλὸς, ἀλώπεκος στέαρ χλιαρὸν ἐνσταζόμενον, ἀλεξόρουκτοὶ λειοὶ σὺν μέλιτι (ἐλαιον) ἀμυγδάλινον, ἱρινον, δάφνινον, κίκινον, κρόκινον, σησάμινον, ὑοσκιάμινον· τὸ δὲ ἀμυγδάλινον μετὰ ἀλόης ὀλί-

oportet. Eadem quoque tollit ari radix imposita, itemque testae sepieae ramentum cum aceto illitum, nec non et sinapi cerato exceptum.

#### *Aurium male affectarum remedia.*

Cap. LVII. Aurium dolores et inflammationes mitigant haec, si tepida instillantur: parthenii succus et auriculae muris similiter, achilleae et menthae succus cum aqua mulsa, dracunculi succus oleo solutus, helxines succus cum rosaceo in aurem contrariam infusus, et cucurbitae ramentorum succus ad eundem modum: itidem foliorum populi albae succus cum rosaceo, narcissi e foliis aut radice succus simili modo, origani virentis succus cum lacte muliebri, rutae aut polygoni succus in cortice mali punici calfactus, porri foliorum succus cum rosaceo et meconio, foliorum salicis succus, vulpinus adeps tepide instillatus, sal fossile tritum cum melle: amygdalinum oleum, irinum, laurinum, ricini, crocinum, sesaminum et hyoscyaminum: amygdalinum cum aloë pauca et croco:

ρης καὶ κρόκου· κάχρου σὺν ἀμυγδαλίῳ ὁμοίως· κυάμου αἰ-  
 γυπτίου τὸ ἐντὸς πικρὸν σὺν ῥοδίῳ· λιβανωτὸς σὺν οἴνῳ·  
 χαλκὸς κεκαυμένος λεῖος σὺν ὄξει καὶ ῥοδίῳ· μηκώνιον σὺν  
 σμύρνῃ καὶ ῥοδίῳ καὶ κρόκῳ καὶ γάλακτι γυναικείῳ· οὖρον  
 ὄνου, ταύρου, σάκχρου, αἰγὸς, σὺν ῥοδίῳ· πισσέλαιον·  
 κεδρία σὺν ῥοδίῳ μύρῳ· στυπτηρία, πολυρόνου ἢ ῥοιᾶς χυ-  
 λῶ ἀνεθεῖσα· νάρδος ἐν κοχλίᾳ λιβυκῶ ἀναληφθεῖσα, καὶ  
 μετὰ τὸ ἐψηθῆναι ἐγχυθεῖσα, ὠφελεῖ· καὶ τὸ λίπος ἐκ τοῦ  
 ἐλαιοῦ, ὃς ῥωμαῖστὶ καλεῖται γλῆρις, καὶ ἄλλου, ὃς σκίου-  
 ρος λέγεται<sup>20</sup>, ἐγγεόμενον· καὶ σιλφῶν τῶν κατοικιδίων τὸ  
 ἐντὸς λεῖον, σὺν ῥοδίῳ ἐνσταζόμενον· ἢ οἱ κατοικίδιοι ὄνοι  
 μετὰ ῥοδίνου ἢ ἐλαίου λεῖοι χλιανθέντες· ἢ γῆρας ὄφως ἐν  
 ἐλαίῳ ἐψηθὲν, ἢ μύρῳ μετὰ κωδίας μήκωνος· ἀράχνη τὸ  
 ζῶον λεῖον μετὰ ῥοδίνου καὶ ὄξους· κηκὶς λεῖα ἐντεθεῖσα  
 ὀθονίῳ καὶ ἐψηθεῖσα ἐν οἴνῳ, ἀνωδύνους ποιεῖ· ὠφελεῖ καὶ  
 ψυχρὸν ὕδωρ, εἰς τὸ ἀντικείμενον οὗς ἐγγεόμενον· καὶ σαρ-  
 κῶν βοείων ὀπτωμένων ἰχώρ, ἐγγεόμενος τῷ ἀλγοῦντι· καὶ

20) Post Moibanum et Saracenum textum valde corruptum sic restituere conatus sum.

cachrys cum amygdalino, simili modo: fabae aegyptiae  
 interior pars amara cum rosaceo, tus cum vino, aes  
 ustum tritum cum aceto et rosaceo: meconium cum myr-  
 rha, rosaceo, croco et lacte muliebri: urina asini, tauri,  
 apri et caprae cum rosaceo: oleum picis, cedria cum un-  
 guento rosaceo, alumen, polygoni aut mali punici succo  
 solutum: nardum etiam, cochlea africana exceptum, utili-  
 ter, ubi coctum fuerit, infunditur: sic et pingue anima-  
 lis, quod Latini glirem, et alius, quod sciurum appellant.  
 Sed et blattarum domesticarum interanea, trita cum ro-  
 saceo, instillantur: sic et millepedae cum rosaceo aut oleo  
 simplici contritae et tepefactae: anguis senecta cocta in  
 oleo aut unguento cum capite papaveris: araneus, ani-  
 malculum, contritus cum rosaceo et aceto: galla trita in-  
 ditague linteolo et cocta in vino dolorem eximit. Invat  
 et frigidam aquam auri oppositae infundere: ipsi vero  
 dolenti serosum humorem, qui ex assata carne bubula

κεδρία μιγῆσα ναρδίνῳ, ποτὲ μὲν πρὸς ἴσον, ποτὲ δὲ πρὸς διπλοῦν.

Κεφ. νή'. Πρὸς δὲ τὰς γινομένας ῥήξεις τῶν ὥτων ἀρμόξει ἐγγυματιστὰ ταῦτα· ἄνισον σὺν ῥοδίνῳ, ἀπαρίνης χυλὸς, ἀρνογλώσσου χυλὸς, στρύχνου χυλὸς ὁμοίως, κεδρία σὺν ῥητίνῃ τερμινθίνῃ συντακεῖσα, σόγχου χυλὸς καὶ ἡ ῥίζα σὺν ἐλαίῳ καὶ σιδίῳ ἐψηθεῖσα, χολὴ βοεῖα μετὰ γάλακτος, ἢ πράσου χυλοῦ· ὠκίμου χυλὸς σὺν χρινεῖῳ στέατι.

Κεφ. νθ'. Τπατμίζεται δὲ διὰ καλάμου πρὸς ὠταλγίας καὶ ἤχους ἀψινθίου ἀπόζεμα, ὑσώπου, ἢ δαφνίδων· ἢ ἀβροτόνου δι' ὄξους, ἢ διὰ κοχλάκων πεπυρωμένων ἐψηθέν· ἢ θάλασσα θερμὴ, θεῖον ἄπυρον ὑποθυμιώμενον· δεῖ δὲ παμάσαντα τὴν χύτραν καὶ περιπλάσαντα πηλῷ τιτράναι κατὰ μέσον τὸ πῶμα, καὶ οὕτω δέχεσθαι εἰς τὴν εὐρύτητα<sup>21</sup> τοῦ ὠτός τὸν ἀτμόν· καὶ πυρία δὲ ἀρμόξει πρὸς τὰ ἀλγήματα τοιαύτη· ἐγγέας εἰς ὄξος ἔλαιον καὶ κρομμύων χυλὸν, θέρμαινε, καὶ περιθεῖς ἔριον μηλωτίδι, ἀπό-

21) Sic Moib. loco vulg. εὐρείαν.

exstillat. Denique confert et cedria nardino mixta oleo, interdum aequali, alias dupla portione.

Cap. LVIII. Fractis auribus commode instillantur anisum cum rosaceo, succi aparines, plantaginis, solani: cedria cum resina terebinthina liquata, sonchi succus, eiusdemque radix cum oleo et malicorio cocta: fel bubulum cum lacte aut porri succo, ocimi succus cum anserino adipe.

Cap. LIX. Auribus dolore ac sibilo affectis per calamum vapor immittitur, instillato in silices ignitos aceto, cui incocta sint absinthium et hyssopum, aut lauri baccac, aut abrotanum. Excipitur et vapor aquae marinae calentis, itemque sulphuris ignem minime experti sufflitus. Sed ollulae operculatae lutoque oblitae operculum in medio perforandum, quo vapor in aurium cavitatem suscipiatur. Convenit et ad aurium dolores fomentum huiusmodi: acetum, cui oleum et ceparum succum infuderis, calfacito: eique calenti lanam obvolutam

βαπτε θερμῷ τῷ ὕξει, καὶ κάθετες εἰς τὸ οὖς, μέχρῃς ἀνέχεται. <sup>22</sup>

Κεφ. ξ'. Πρὸς δὲ τὰς πυρορροίας καὶ ἐλκώσεις ἀρμόζει ἐνσταζόμενα ἢ σὺν ξρίῳ ἀπαλῷ ἐντιθέμενα ταῦτα· ἀγριελαιίας χυλὸς, ἀπαρίνης χυλὸς ὁμοίως, ἀμόργη, ἐν ἐλαίῳ ἐψημένῃ, λύκιον, μάλιστα τὸ Ἰνδικόν, ἀσφοδέλου χυλὸς καθ' ἑαυτὸν, καὶ σὺν λιβανωτῷ καὶ μέλιτι καὶ σμύρνῃ καὶ οἶνῳ χλιαθείς· ἀψίνθιον λεῖον σὺν μέλιτι· γῆς ἔντερα ἐψηθέντα σὺν στέατι χοιρείῳ ἢ ἐλαίῳ· ἢ βάτου φύλλων χυλὸς ἐν ἐλαίῳ· γῆρας ὄφως ἐψηθὲν ἐν οἶνῳ· διφρυγές σὺν μέλιτι· ἐλαιίας χυλὸς· σμύρνα σὺν καστορίῳ καὶ μηχανίῳ καὶ γλαυκίῳ <sup>23</sup>, κισσοῦ λευκοῦ χυλὸς σὺν ἐλαίῳ, κρομμύων ὁμοίως· μίσυ σὺν ῥοδίνῳ· ἀπαρίνης χυλὸς καὶ ἀφέψημα· ὀμφάκιον σὺν μέλιτι· οὖρον ἀφθόρου παιδὸς ἐν ῥοιᾷ σιδίῳ ἐψηθὲν· κονία συκίνη συγκλυζομένη· πίσσα ὑγρὰ ὁμοίως, καὶ αὐτὴ σὺν ῥοδίνῳ ὀλίγῳ ἐν κελύφει ῥοιᾶς ἐψηθεῖσα· καὶ στοίβης καρπὸς ἐψηθείς ἐν οἶνῳ· στυπτηρία πᾶσα σὺν πολυγόνου χυ-

<sup>22</sup>) Sarac. sic corruptum textum restituit,

<sup>23</sup>) Sic Moib. l. γλυκεῖ.

specillo intingito, demittitoque penitius in aurem, quatenus aeger sustinebit.

Cap. LX. Pure manantibus et ulceratis auribus conveniunt instillata, aut cum molli lana indita, haec: oleae sylvestris succus, uti et aparines, amurca in oleo cocta, lycium, praesertim indicum, asphodeli succus per, se et cum ture, melle, myrrha et vino tepefactus: absinthium tritum cum melle, lumbrici terrestres cocti cum adipe suillo vel oleo: rubi foliorum succus cum oleo, anguium senecta in vino cocta, diphryges cum melle, oleae succus, myrrha cum castorio, meconio et glaucio: hederæ albae succus cum oleo, ac ceparum similiter, misy cum rosaceo, aparines decoctum, omphacium cum melle, urina pueri incorrupti cocta in malicorio, lixivium e cineribus ficulneis infusum auribus: sic et pix liquida, ac ipsa quoque cum paucis rosaceo in cortice mali punici cocta, stoebe fructus in vino coctus, alumen omne cum succo po-



λῶ, χάλκανθον ἐψηθὲν σὺν μέλιτι, καὶ χολή βοεία μετὰ μέλιτος.

Κεφ. ξα'. Τοὺς δὲ γινομένους σκώληκας ἐν ταῖς χρονίαις περὶ ὧτα ἐλκώσεισιν ἀποκτείνει ἀμυγδάλινον ἔλαιον ἐγχέομενον, καὶ καλαμίνθης χυλὸς, ἢ τοῦ καρποῦ γλωροῦ· κεδρία, οὖρον ἀνθρώπειον παλαιὸν, ἐλλέβορος λευκὸς λεῖος μετὰ μέλιτος· καὶ τοῖς πρὸς τὰς ἐλκώσεις ἀναγεγραμμένοις χρηστέον.

Κεφ. ξβ'. Τὰς δὲ ὑπερσαρκώσεις τὰς ἐν τοῖς ὠσὶ γινομένας καθαιρεῖ μέλας ἐλλέβορος ξηρὸς λεῖος ἐπιπασσόμενος. Ἀφαιρεῖ δὲ αὐτὰς ταχέως τρυξ μετ' ἀσβέστου καὶ κογίας στακτῆς λεία, γλοιώδης, δι' ἐρίου καὶ μηλωτίδος προστεθείσα.<sup>24</sup>

Κεφ. ξγ'. Ἦχους δὲ τοὺς περὶ τὰ ὦτα ὠφελεῖ σῦκον λιῶν ἀναληφθὲν σὺν σινήπει καὶ νίτρον, καὶ ἐντεθὲν καὶ ἐαθὲν ἐπὶ ἡμέραν, ἐλλέβορος μέλας ξυόμενος καὶ ἐντιθέμενος ἐκάστης ἡμέρας νεαρός· ἢ σαφνίαν καὶ ἀμυγδαλίνου ἐκάστον

24) Moiban. mutilum textum sic restituit.

lygoni, chalcanthum cum melle coctum, et fel bubulum una cum melle.

Cap. LXI. Vermes in diuturnis aurium ulceribus genitos haec interimunt: oleum amygdalinum infusum, calaminthae succus, vel seminis eiusdem virentis: cedria, urina humana antiqua, helleborus albus, tritus cum melle. Utendum et illis, quae ad ulcerationes iam praescriptae sunt.

Cap. LXII. Carnes immodice in auribus excrescentes leniter erodit et imminuit helleborus niger in pulverem redactus atque inspersus. Ipsas vero celeriter aufert et absomit faex cum calce viva et lixivio stillatitio ad stigmenti crassitiem redacta, per lanam et specillum indita.

Cap. LXIII. Contra sonitus, qui auribus obstrépunt, ista prosunt: ficus trita, excepta sinapi ac nitro, et intra aurem relictā dici unius spatio: helleborus niger derasus et quotidie recens inditus. Aut: olei laurini et amygdalini

ἴσον, καστορίου ὀλίγον, ὅξους σταλαγμοὺς τρεῖς τρίψας ἐν τῷ αὐτῷ, καὶ γλιάνας ἑνσταξον· ἡ φλοιοῦ ῥαφανίδος χυλὸν ἐπὶ τρεῖς ἡμέρας ἔγχει· τῇ δὲ τετάρτῃ ἐκχέας τὸν χυλὸν, καλαμίδα διαμπὰξ τετρημένην κάθες εἰς τὸ οὖς· κατὰ δὲ τὸ ὑπερκείμενον μέρος, καλαμὶς ἐχέτω ἐλλύχριον καϊόμενον· οὕτω γὰρ πυριώμενον ὠφελεῖ λίαν· κλύζεται δὲ παραχοῆμα διὰ νίτρου καὶ ὕδατος· ποιεῖ καὶ γάρον, μέλι, ῥόδιον, ἴσα· ἢ ἀμυγδάλινον σὺν μέλιτι, ἢ ἔλαιον βαλάνινον μετὰ στέατος χοιρείου, δαφνίδων πίεσμα σὺν οἴνῳ καὶ ῥοδίῳ ἑνσταζόμενον, κεδρία σὺν ὑσσώπῳ, κρομμύου χυλὸς, κύμινον ἄγριον σὺν μυελῷ μοσχέῳ, καὶ πηγάνου χυλὸς, κύπρινον, ἴρινον, σούσινον<sup>25</sup> σὺν ὄξει καὶ πηγάνῳ καὶ ἀμυγδαλοῖς πικροῖς· νίτρον, ἀφρόνιτρον σὺν ὄξει καὶ λιβανωτῷ, πράσου χυλὸς, μέλι ἄττικόν σὺν ὄξει, περσέας τὸ ἐντὸς μετὰ ῥοδίνου γλιάρων ἑνσταζόμενον.

Κεφ. ξδ'. Δυσκωφίας δὲ θεραπεύει χρονίας χαλκοῦ ἄνθος λείον ἐμφυσώμενον εἰς τὸν πόρον διὰ σωληνίου· ἀσφο-

25) Moiban. loco vulg. σελγιόν.

aequas partes sumito, castorii parum et guttas aceti tres: haec simul trita et tepefacta instillato. Aut: corticis raphani succum tribus diebus infundito: quarto demum die eodem effuso, in aurem demittito arundinem utrinque pertusam, quae superiore sui parte accensum habeat ellychnium: eiusmodi siquidem focus strenue iuvat: elniture vero statim auris aqua et nitro. Conferunt et garum melli et rosaceo aequaliter mixtum, amygdalinum cum melle, oleum balaninum cum adipe suillo, lauri baccis expressus succus, cum vino et rosaceo instillatus, cedria cum hyssopo, cepae succus, cuminum agreste cum medulla vitulina, et rutae succus: unguenta cyprinum, irinum et susinum cum aceto, ruta et amygdalis amaris: nitrum spumaque nitri cum aceto et ture, porri succus, mel atticum cum aceto, perseae quod interius est tepidum, cum rosaceo instillatum.

Cap. LXIV. Aurium gravitati diuturnae medentur flos aeris contritus, per cannulam insufflatus, oleum, in quo

δέλου ῥίζα ἐν ἐλαίῳ ἐψημένη, τοῦ ἐλαίου ἐνσταζομένου· κρομμύου χυλὸς, σικύου ἀγρίου τῶν φύλλων χυλὸς ἐν ὄξει, οὖρον αἰγὸς ἐγκλυζόμενον συνεχῶς θερμὸν, καὶ τὸ διὰ σιγή-  
πewς καὶ νήτρου καὶ σύκου ἐντιθέμενον.

Κεφ. ξε'. Πρὸς δὲ τὰς τῶν ὑδάτων ἐναπολήψεις, κρομμύου χυλὸς ἐνσταζόμενος διακόπτει τὴν τοῦ πνεύματος ἐνστασιν· ἐκμύξαι δὲ τὸ ὕδωρ, καλαμίδα διαμπὰξ τετριμμένην ἐνθεῖς τῷ ὧτίῳ.

Κεφ. ξς'. Τὰ δὲ τεθλασμένα τῶν ὧτίων ἴωνται, μὴ ἱώντες διαπνύσκειν καὶ διαπνήσαντα διαφοροῦντες, βολβοὶ σὺν ἀλφίτῳ καταπλασσομένοι, σμύρνα σὺν κοκλίου σαρκί, θεῖον ἄπυρον σὺν σμύρνῃ καὶ οἶνῳ καὶ λιβάνῳ καὶ πίσσῃ καταχρίόμενον· ἐὰν δὲ ἐρυθρήματα ἢ καὶ φλεγμονὴ μεγάλη, σησάμῳ λείῳ κατάπλασσε, ἢ χόνδρῳ ἐν ὄξει ἐφθῶ.

Κεφ. ξς'. Ζῶον δὲ ἐμπεσόντος εἰς τὸ οὖς ἐνσταζόμενα ἀναβιβάζει ταῦτα· μαλάχης χυλὸς, κενταυρίου ἀφέψημα με-  
τὰ ὄξους, πευκεδάνου ὀπὸς, ἀψιθίου χυλὸς, νήτρον ἀλει-  
φθὲν, θεῖον ἄπυρον σὺν ὄξει, χολὴ μυδὸς καὶ βατράχου διει-

radix asphodeli decocta fuerit, instillatum, cepae succus, cucumeris agrestis foliorum succus in aceto, urina caprae calens frequenter infusa: denique inditum collyrium, quod e sinapi, nitro et ficu concinnatur.

Cap. LXV. Si aqua auribus interclusa fuerit, instillatus cepae succus flatuum obstaculum dissipabit: sed calamo utrinque perforato in aurem immisso aquam exsurgere par est.

Cap. LXVI. Contusas aures suppurare non sinunt, ac si suppuraverint, pus ipsum dissipando sanant bulbi, cum polenta cataplasmatibus in modum adhibiti, myrrha cum cochleae carne, sulphur ignem minime expertum, cum myrrha, vino, ture ac pice illitum. Quod si rubor et magna inflammatio adfuerit, sesamum tritum aut alicam in aceto decoctam more cataplasmatibus imponito.

Cap. LXVII. Illapsum in aurem animalculum haec instillata educunt: malvae succus, centaurii decoctum cum aceto, peucedani liquor, absinthii succus, nitrum inunctum, sulphur vivum cum aceto: fel muris, uti et ranae,

μέναι ὅξει, πράσου χυλὸς σὺν μέλιτι, θεῖον διεθὲν σὺν ἀφθόρου παιδίου οὕρω.

Κεφ. ξή'. Λιθαρίου δὲ, ἥ κυάμου, ἥ ἄλλου τινὸς ἐμπεπόντος, εἰλήσας ἔριον περὶ μηλωτίδα, καὶ βρέξας ῥητίνη, ἥ ταυροκόλλη, καθεὶς πραέως ἄπτου.

*Τὰ τῶν ὀδόντων καὶ οὖλων βοηθήματα.*

Κεφ. ξθ'. Πρὸς δὲ ὀδονταλγίας ἀρμόζει ἐσόμενα σὺν ὅξει καὶ ἀνακογχυλιζόμενα· δεῖ δὲ θερμοῖς αὐτοῖς χρᾶσθαι, καὶ ἐφ' ὅσον δύναται τις χρόνον διακρατεῖν ἐν τῷ στόματι κατὰ τὸν ἀλγούμενον ὀδόντα· ὕσκημου ῥίζα, πενταφύλλον ῥίζα, ἄλθαίαις ῥίζα, πύρεθρον, ὀνώνιδος ῥίζα, ἀρνογλάσσου ὁμοίως, δαδία καὶ μελάνθιον, σταφίς ἀγρία, ἐλλέβορος μέλας· καππάρεως ῥίζα, καὶ ὁ ἐκ τῶν ἀπίων αὐτῆς καρπός· ἐλάφου κέρας ὠμὸν ἢ κεκαυμένον, θεῖον ἄπυρον ὀλίγον σὺν ὀριγάνῳ καὶ δαδίῳ, μελισσόφυλλον, γλήχων, μορέας φύλλα καὶ ἡ ῥίζα, σίλφιον, ὀπόφυλλον μετὰ ὕσσώπου καὶ σύκου, πίτυος καὶ λεύκης

aceto dilutum: porri succus cum melle, sulphur denique, urina pueri venerem non experti solutum.

Cap. LXVIII. Sin lapillus, faba, aliudve quiddam in aurem inciderit, obvolutam specillo lanam resinae aut glutini taurino immergito, eaque leniter in aurem demissa, quidquid illud fuerit, contingito, quo facilius extrahas.

*Dentium et gingivarum remedia.*

Cap. LXIX. Dentium dolori conveniunt haec in aceto decocta et gargarizata, si modo actu calida ea oris parte, quam diutissime fieri poterit, contineantur, quam dens affectus occupat: hyoscyami radix, itemque pentaphylli et althaeae, pyrethrum, radix ononidis, similiterque plantaginis, taedae et nigella, staphis agria, helleborus niger, capparis radix, eiusdemque fructus, cornu cervinum, seu crudum, seu ustum, sulphuris vivi tantillum cum origano et taeda, apiastrum, pulegium, mori folia et radix, silphium eiusque semen cum hyssopo et ficu, pi-



φύλλα, σικύου ἀγρίου ῥίζα, σκορόδου ῥᾶγες σὺν λιβανωτῷ, τιθύμαλλος, μήλων περσικῶν ὀστᾶ, κηκίς μετὰ ἁλὸς καὶ κεδρίας· ἕκαστον τούτων μετ' ὄξους· ἢ κολοκυνθίδα κινώσας, καὶ ἐναποζέσας αὐτῇ ὄξος, δίδου διακλύζεσθαι· ἀποβάλλει δὲ τοῦτο καὶ τοὺς σαθροὺς αὐτῶν· ὠφελεῖ δὲ καὶ ἀγρώστειος τῆς ἐν Παρνασσῷ γινομένης ὁ χυλὸς σὺν ὀξάλμῃ, ἀρογλώσσου τῶν φύλλων ὁ χυλός. Σὺν οἶνῳ δὲ ἐψηθέντα πρὸς τὴν αὐτὴν χρῆσιν φλόμου ῥίζα, ἁλικακάβου ἀγρίου ῥίζα, ἀσπαράγου ῥίζα, νίτρον σὺν πεπέρει καὶ πηγάνῳ, πλατάνου σφαιρία, ὀξυμυρσίνης ῥίζα, ὁπὸς σιλφίου, ῥόδα ξηρὰ οἶνῳ ἐψηθέντα ἄχρι τρίτου· ἐπὶ δὲ τῆς χρείας δίδου ἀνακλύζεσθαι.

Κεφ. ο'. Διαμασσώμενα δὲ καὶ δηγθέντα τοὺς πεπονθότας ὀδόντας ὠφελεῖν πέφυκε ἀκάνθας λευκῆς ῥίζα, κηκίδος τὸ ἐντὸς, πυρέθρου ῥίζα. Ὁφελεῖ δὲ ὀδονταλγίας ἐνεργῶς τρυγότος θαλασσίας κέντρον τῷ ἄκρῳ παρατρίβων τὸν ἀλγοῦντα ὀδόντα· σήπεται δὲ τὸ πεπονθὸς μέρος τοῦ ὀδόντος· ἐνιοὶ δὲ ἐπὶ καλαμίδι ἐγκρύπτοντες αὐτὸ

nus et populi albae folia, cucumeris agrestis radix, allii nuclei cum ture: tithymallus, malorum persicorum ossa, galla cum sale et cedria. Aliud: acetum, quod in excavata colocynthide efferbuerit, colluendum exhibeto: hoc genus remedii putridos etiam cariososve dentes extrahit. Confert et parnassii graminis succus cum acida muria, uti et plantaginis foliorum succus. Vino autem incoquantur in eundem usum haec: verbasci radix et halicacabi agrestis, itemque asparagi, nitrum cum pipere et ruta, platani globuli, rusci radix, laser, rosae siccae in vino coctae. Ista, cum postulabit usus, colluenda, exhibeantur.

Cap. LXX. Commanducata et commorsa dentes affectos curare solent albae spinae radix, gallae pars interior, pyrethri radix. Porro dentium dolori efficaciter auxiliabitur, qui pastinacae piscis aculeo summo dentem dolentem affricuerit: sic enim pars dentis affecta corrumpitur. Nec desunt, qui eodem utantur aculeo intra cannam

οὕτω χρῶνται, ὑπολαμβάνοντες συμβάλλεσθαι καὶ τοῦτο πρὸς ἀπονίαν.

Κεφ. οα'. Εἰς δὲ τὸ βρῶμα ἐντιθέμενα, ἣ περιπλάσσομενα τῷ ὀδόντι, ὠφελεῖ τοὺς ὀδονταλγοῦτας· (ἐνία δὲ θρύπτει, ἢ σήπει·) ἀμόργη ἐψημένη μετ' ἐλαίου ὀμφακίνου, ἄχρις ἂν γένηται μελιτώδης· αὕτη καὶ περικυριωμένη τὸν ὀδόντα ἐκτινάσσει· βατραχίου ῥίζα ὁμοίως σκευασθεῖσα θραύει· ἀμπέλου δάκρυον ἐντιθέμενον μετ' ὀποπάνανος καὶ σιλφίου· ἄσφαλτος ὑγρὰ σὺν νίτρῳ πλασθεῖσα· πύρεθρον ταριχευθὲν σὺν ὄξει ἐπὶ ἡμέρας τεσσαράκοντα· ἐλαίας αἰθιοπικῆς δάκρυον, ῥοῦ τοῦ βυρσοδεψικοῦ δάκρυον· ὅπως συκῆς ἀγρίας καὶ ἡμέρου, τιθυμάλλου ὀπός· ἄνωθεν δὲ κηρὸν ἐπιτίθει πρὸς τὴ φράσσεσθαι τὸ βρῶμα· χαλβάνη καὶ περιπλάσσεται· κεδρία καὶ θραύει τὸν ὀδόντα· κηκίδος τὸ μέσον· μόρου τῆς ῥίζης ὀπός· ὀπὸς σιλφίου σὺν σαρκὶ σταφίδος καὶ περιπλάσσεται, ἢ σὺν ῥητίνῃ καὶ σὺν κηρῷ· σὺν δὲ θείῳ καὶ λιβανωτῷ ἐν ὀθονίῳ ἔγχριστος περιτίθεται· ὀποπάνανξ ὁμοίως ἐπιτηδεύθεις σὺν σανδαράχῃ, σῶρι αἰγύπτιον ῥητίνῃ ἀναληφθὲν,

occultato, existimantes, hoc ipsum etiam ad dolorem levandum conferre.

Cap. LXXI. Erosorum dentium cavis indita oblita-ve, dolori remedio sunt haec, quorum nonnulla eosdem etiam comminuunt aut putrefaciunt: amurca cum oleo omphacino ad mellis crassitudinem decocta: (haec etiam circumlita dentem excutit:) ranunculi radix eodem modo praeparata etiam frangit: vitis lacrima cum liquore panacis et silphii: bitumen liquidum nitro subactum: pyrethrum aceto conditum diebus quadraginta: oleae aethiopicae lacrima, rhois coriariorum lacrima, ficus tam domesticae quam sylvestris liquor, tithymalli liquor: superne vero imposita cera cavernam dentis obturato. Galbanum etiam denti circumdatur: cedria dentem quoque frangit, gallae pars media, mori e radice collectus liquor: laser cum uvae passae carne circumlinitur, aut cum resina et cera: cum sulfure autem ac ture linteolo inductum circumponitur: opopanax eodem adhibetur modo cum sandaracha: sori aegyptium resina excipitur. Prodest

σαύρας ἦπαρ ἐντεθέν· πευκεδάνου ὀπός, ἢ θεῖον, ἢ κηκίς  
 λεία μετὰ γλυκέως, περιπλαττόμενα μετὰ τὴν κάθαρσιν· ἢ  
 πέπερι καὶ κρόκος σὺν ῥητίνῃ τερμινθίνῃ ἀναληφθέντα· ἢ  
 ὄφειως γῆρας καύσας καὶ τρίψας μετ' ἐλαίου περίχρῃ, γλοιώ-  
 δη περιχαράξας πρότερον· ἢ κάρδαμον καὶ νάπυ ἐμπλασσε,  
 ἢ στυπτηρίαν μετὰ μέλιτος φορίμην ἐψήσας, διάτριβε τὸν  
 ὀδόντα· ἢ ὄφειως γῆρας ἐπιτίθει· ἢ κηκίδα λείαν καὶ σμύρναν  
 ἐψήσας μετὰ μέλιτος, ἐντίθει· ἢ ἄσφαλτον, πίσσαν, κεδρίαν,  
 στυπτηρίαν σχιστὴν ὁμοίως· χαλβάνην, πέπερι, κόκκον κνί-  
 διον· ἢ βατράχου ἦπαρ καὶ ῥοῦν βυρσοδεψικὴν ἐψήσας ἐν ὕ-  
 दाτι μέχρι τοῦ πάχους ἔχειν μέλιτος, εἴτα ἐναποζόψας τὰ σκύ-  
 βαλα, τὸ ἀπόθλιμμα ἔψει, ἕως ἐμπλαστῶδες γένηται, καὶ ἐν-  
 τίθει· ἢ πρόπολιν μαλάξας, περίπλασσε.

Κεφ. οβ'. Εἰς δὲ τὸ ἀντικείμενον οὗς τοῦ ἀλγοῦντος  
 ὀδόντος ἐνστάζεται ἀσφοδέλου χυλός· καρδάμου χλωροῦ χυ-  
 λός· κισσοῦ τοῦ χρυσοκορύμβου σφαιρία ἰε' θλασθέντα, καὶ  
 σὺν ῥοδίνῳ ἐν σιδίῳ ῥοιᾷς θερμανθέντα· σεύτλου χυλός μετὰ

et lacertae iecur inditum: item peucedani liquor, sulfur,  
 aut gallae pulvis cum passo denti prius expurgato cir-  
 cumdata: piper et crocum, resina terebinthina excepta.  
 Aliud: anguium exuvias ustas tritasque cum oleo circum-  
 line. exsculptis prius circumquaque viscidis sordibus, si  
 quae dentibus inhaeserint: aut nasturtium et sinapi illi-  
 nito: aut alumine liquido, quod phorimon dicitur, cum  
 melle decocto dentes infricato: aut senectam serpentis  
 imponito: aut gallae pulverem et myrrham cum melle  
 coctam inserito: aut bitumen, picem, cedriam et alumen  
 scissile eodem modo: galbanum itidem, piper et granum  
 cnidium: aut ranae iecur et rhoem coriariorum in aqua  
 decoque ad iustam crassitudinem: deinde, reiectis crassa-  
 mentis, id quod expresseris ad emplastri formam coqui-  
 to, dentique imponito: aut remollitam propolin circum-  
 linito.

Cap. LXXII. In aurem vero denti dolenti opposi-  
 tam instillantur succus asphodeli, nasturtii virentis suc-  
 cus, hederæ, quæ aureis est corymbis, acini quindecim  
 contusi, et cum rosaceo in cortice mali punici calfacti:

κυμίνου· ὅφρως γῆρας θλασθὲν, καὶ μετὰ ῥοδίνου ἐψηθέν. Εἰς δὲ τὸν ἀντικείμενον μυξωτῆρα ἐνσταῖται ὀφελίμως ἀναγαλλίδος χύλισμα. Περιεπτομένη ὀδόντος πόνον ἱστορεῖται παύειν λεπιδίου ῥίζα.

Κεφ. ογ'. Ἀρεῖς δὲ ἀπόνως, ἂν περιχαράξας περιπλάσης θείῳ, ἢ μολυβδαίναν λείαν κηρῷ ἀναληφθεῖσαν, ἢ πύρεθρον ὅξει ταριχεύσας ἐπὶ ἡμέρας μ' περιπλάσης, κηρῷ τοὺς ἄλλους ἀσφαλισάμενος· ἢ σῶρι μετ' ὅξους λειώσας, ἢ σώρεως < δ', μολυβδαίνης < ε', κεδρίας τῷ αὐτάρκει ἀναλαμβάναντε.

Κεφ. οδ'. Τὰς δὲ ἐπὶ τῶν παιδίων ὀδοντιάσεις καὶ κνημοὺς παύει βούτυρον διαχριόμενον καθ' ἑαυτὸ καὶ μετὰ μέλιτος, λαγωῦ ἐγκέφαλος ὀπτὸς παρατριβόμενος καὶ ἐσθιόμενος, μῦς οἱ κατοικίδιοι ἐσθιόμενοι· καὶ τὸν πολλὸν δὲ σίελον κωλύουσιν ἐπὶ τῶν παιδίων, ζῶντες προσαγόμενοι τοῖς στόμασιν αὐτῶν.

Κεφ. οε'. Αἰμωδίας δὲ τὰς ἐπὶ τῶν ὀδόντων παύει ἀνδράχνη διαμασσωμένη, ἔλαιον παρατριβόμενον.

betæ succus cum cumino: anguis senecta tusa et cum rosaceo cocta. Oppositæ quoque nari utiliter infunditur expressus anagallide succus. Sed et e collo suspensa lepidii radix dentium dolorem lenire fertur.

Cap. LXXIII. Sine vexatione dentes eximes, si circumscarificatos sulphure obduxeris, aut plumbaginem tritam cera exceptam circumleveris, aut etiam pyrethrum aceto conditum diebus XL, dentibus reliquis cera præmunitis. Alind: sori ex aceto tritum adhibeto: aut so-reos drachma iiij, plumbaginis drach. vj, cedria quanta sat erit excipito.

Cap. LXXIV. Infantium dentitiones gingivarumque pruritus sedant butyrum per se, et cum melle perunctum, cerebrum leporis assum, seu affricturn, seu in cibo sumptum: mures etiam domestici esitati: qui quidem copiosam infantium salivam arcent, si vivi ipsorum admoveantur ori.

Cap. LXXV. Dentium stuporem demulcent portulaca commanducata et ipsum etiam oleum affricturn.



Κεφ. ος'. Σμήχει δὲ τοὺς ὀδόντας ἀριστολογίας ῥίζα, ἐλάφου κέρας κεκαυμένον, μίγνυμένης ὀλίγης μαστίχης· ἄλλες λευκοὶ, φυραθέντες μέλιτι καὶ καέντες ἐν χύτρῳ, ἄχρως ἀνθρακωθῶσι· κήρυκες πληρωθέντες ἅλϊ καὶ καέντες, κίσση-  
 ρις ὀπτὴ οἶνῳ σβεσθεῖσα, κοχλίας χερσαῖος καὶς σὺν μέλιτι, λίθος ἀραβικὸς καὶς σὺν μέλιτι, μύακες συγκεκαυμένοι, ἡ σηπίας ὄστρακον κεκαυμένον· τούτων ἐκάστῳ ἡ εὐωδίας χά-  
 ριν μίγνυται νάρκτου στάχυος ὀλίγον, ἡ σχοίνου ἄνθος· ἡ ἔρια οἰσυντηρὰ κεκαυμένα λεῖτα, ὀλίγου ἁλὸς αὐτοῖς μίγνυ-  
 μένου.

Κεφ. ος'. Σειομένους δὲ ὀδόντας κρατύνει καὶ οὖλα πλαδῶντα, διακλυζόμενα καὶ διακρατούμενα ἐφ' ἱκανὸν ἐν στόματι, ἐλαίας τῶν φύλλων ἀφέψημα, γάλα ὄνειον, κολυμ-  
 βάδος ἐλαίας χυλὸς, σμύρνα σὺν οἶνῳ καὶ ἐλαίῳ διακλυζο-  
 μένη, γαγάτης λίθος σὺν οἶνῳ ἐψηθεῖς, πλατάνου φύλλα  
 σὺν ὄξει ἐψηθέντα, ὄξος σικιλητικόν, βάτος διαμασσώμενος,  
 μαλάχης ῥίζα ὁμοίως, ἰὸς σιδήρου προσεπτόμενος ξηρὸς, κύ-  
 τινος ὁμοίως, στυπτηρία σχιστὴ μγεῖσα σμύρνη, ἡ δίχα τῆς

Cap. LXXVI. Dentes abstergunt aristolochiae ra-  
 dix, cornu cervinum ustum, exigua mastiche admixta:  
 sal candidum melle subactum et in olla crematum, usque-  
 dum in carbones redigatur: buccina sale referta et com-  
 busta: pumex torrefactus, vino restinctus: cochlea terre-  
 stris cremata cum melle: lapis arabicus ustus cum melle:  
 mytuli combusti: sepiae denique testa cremata: quorum  
 singulis odoris gratia aut spicae nardi, aut floris iunci  
 non nihil adiicitur. Prosunt et lanae succidae crematae  
 et in pulverem tritae, addito pauco sale.

Cap. LXXVII. Mobiles dentes simul et gingivas  
 prae nimia humiditate flaccidas firmant roborantque  
 haec colluta et in ore diutine retenta: oleae foliorum de-  
 coctum, lac asininum, olivarum muria conditarum suc-  
 cus, myrrha cum vino et oleo, gagates lapis cum vino  
 coctus, platani folia in aceto cocta, acetum scilliticum,  
 rubus itidem commanducatus, et malvae radix eodem  
 modo: ferrugo sicca admota, similiterque cytinus, alumen  
 scissile mixtum cum myrrha, aut citra myrrham cum

σμύρνης σὺν ὄξει ἢ μέλιτι, σῶρι κεκαυμένον ὁμοίως, στύραξ σὺν ἁλσὶν ἐπιτιθέμενος· ἢ σμύρνα, πομφόλυξ, ἄμυλον, ἴσα, λεῖα, ξηρά· ἢ ῥόας λεπτόχανα, κηκίς, χάλκανθος, σὺν ὄξει δευθέντα, διακλυζόμενα· ἢ βάτραχοι ἰ', ἢ ὄξους ἡμίχους, χαλκάνθου < δ', μανδραγόρου ῥίζης < ε', ἐψόμενα μεχρι τρίτου καὶ διακλυζόμενα· ποιεῖ καὶ πρὸς ἀλγηδónας τοῦτο. Ἀλόης < δ', λιβάνου < α', σχιστῆς < δ', μέλιτι μιγέντα καὶ διατριβόμενα.

Κεφ. οἡ'. Πρὸς δὲ τὰ οἰδοῦντα τῶν οὖλων καὶ ἐκσαρκοῦντα ἢ σηπόμενα ἀρμόζει, διακλυζόμενα καὶ διακρατούμενα, ἀνδράχνης χυλὸς, ἀστραγάλου ῥίζης ἀπόζεμα ἐν οἴνῳ, ἐλαίας κολυμβάδος ἄλμη, ἐλαιον ὠμοτριβές, καὶ μήλινον, καὶ σκίνινον, διακρατούμενα· σμύρνα σὺν οἴνῳ καὶ ἐλαίῳ, κεδρία σὺν ὄξει ἢ ἀμόργῃ, καὶ κηκίδος ἀπόζεμα, μόρων φλοιοῦ καὶ φύλλων ἀπόζεμα, ὅξος σκίλλινον.

Κεφ. οθ'. Ξηρὰ δὲ λεῖα προσεπτόμενα ὠφελεῖ ἀριστολοχίας ῥίζα, ἀρνογλώσσου σπέρμα ξηρόν, ἀσπάλαθον

aceto vel melle: sory combustum ad eundem modum: styrax cum sale impositus: myrrha, pompholyx, amyllum, aequis partibus contrita in pulverem. Mali quoque punici tunicae, galla et chalcanthus, si aceto irrigaveris, collutione proderunt. Aliud: Ranas X, aceti sextarios tres, chalcanthi drach. iiij, radicis mandragorae drachm. vj coquito ad tertias pro collutione: facit et hoc ad dentium dolores. Aliud; aloës drach. iiij, turis drachmam j., aluminis scissilis drach. iiij. melli admisceto et affricato.

Cap. LXXVIII. Ad tumentes ac praeter modum luxuriantes putrescentesve gingivas utile fuerit ista colluere ac in ore detinere: portulacae succum, astragali radicis decoctum e vino, olivarum conditarum muriam: olea, omphacinum, quod ex immaturis olivis exprimitur, melinum et lentiscinum: myrrham cum vino et oleo: cedriam cum aceto aut amurca: gallae decoctum, mori corticis et foliorum decoctum, acetum denique scillicum.

Cap. LXXIX. Sicca vero et in pulverem redacta haec utiliter adhibentur: aristolochiae radix, plantaginis

ξηρόν, μαράθρου ῥίζα κεκαυμένη, διφρυγές, ἰὸς χαλκοῦ καὶ σιδήρου, χάλκανθος ὀπτῇ, κηκίς, κύπρος, κύτινοι, ῥόδων ἄνθος, λύκειον, μαστίχη ξηρὰ, μίσυ σὺν ὄξει, χαλκὸς κεκαυμένος σὺν ἀρσενικῷ ὀλίγω, σχίνου ξυλόρια χλωρὰ παρατριβόμενα τοῖς μεταξὺ τῶν ὀδόντων· ἀρμόζει δὲ καὶ μάλιστα ἐπὶ τῶν ἐκσαρκούντων, διὰ τοῦ ζεστοῦ ἐλαίου πυριᾶν· δεήσει δὲ ἔριον μηλωτίδι περιτιθέντα, καὶ ἀποβάπτοντα εἰς τὸ ἐλαιον προσάγειν, ἄχρις οὗ λευκὰ γίνηται τὰ οὖλα· στέλλεται γὰρ ὁ ῥευματισμὸς αὐτῶν, καὶ ἀναξηραίνεται.

Κεφ. π'. Τὰς δὲ ἐπουλίδας στέλλει στυπτηρία πᾶσα κεκαυμένη, ἢ σῶρι, ξηρὰ λεῖα προσεπτόμενα.

Κεφ. πα'. Τὰ δὲ γεγυμνωμένα οὖλα σαρκὸς ῥόδων ἄνθους μέρη β', καλάμου ἀρωματικοῦ μέρος ἓν, προσεπτόμενα.

Τῶν λοιπῶν περὶ τὸ στόμα καὶ τὴν φάρυγγα παθῶν βοηθήματα,

Κεφ. πβ'. Τὰς δὲ ἄφθας καὶ νομᾶς θεραπεύει μέλι,

semen, aspalathum, foeniculi radix usta, diphryges, rubigo aeris ac ferri, chalcanthum tostum, galla, cyperus, cytini, rosarum flos, lycium, mastiche trita, misy cum aceto, aes ustum cum arsenici momento. Prodest et virentes lentisci surculos mediis dentium spatiis affricare. Convenit praeterea, excrescentibus potissimum carne gingivis, fots ex fervente oleo. Oportebit autem obvolutam specillo lanam oleo immergere, tamdiuque gingivis admovere, donec albescant: sic enim cohibetur fluxio, ipsaeque resiccantur.

Cap. LXXX. Epulidas reprimunt, probe contrita et adhibita, aluminis genera omnia usta, itemque sory.

Cap. LXXXI. Nudatas carne gingivas explet adhibitum medicamentum ex floris rosarum partibus duabus et calami atomatici parte una.

*Ad reliquos oris fauciumque affectus remedia.*

Cap. LXXXII. Oris aphthas et depascentia ulcera

καὶ ὅσα πρὸς τὰ οἰδαλέα καὶ ἐκσαρκοῦντα τῶν οὕλων ἀνα-  
γέγραπται ἐκ περισσοῦ δὲ καὶ ἰδίως ταῦτα· ἄγνου ἢ κύπρου  
φύλλα σὺν μέλιτι διατριβόμενα, τριβόλου χυλὸς, ἀκακίας  
χυλὸς ὁμοίως, ὑποκιστίδος ἢ ῥοὸς βυρσοδεφικῆς χυλὸς ὁμοίως,  
ὀμφάκιον, ὀρίγανον ὁμοίως, ῥοῦς ὁ ἐπὶ τὰ ὄψα ὡσαύτως·  
βαλαύδιον ὁμοίως, καὶ ξηρὸν προσεπτόμενον, καὶ ἀτέψημα  
αὐτοῦ διακλυζόμενον· σανδαράχη σὺν ῥοδίῳ διακλυζομένη·  
ὁ, τε βεττονικῆς πόας χυλὸς, ἀγριελαιίας φύλλα ὁμοίως. Ἀρ-  
σενικοῦ μέρος α', χάρτου κεκαυμένου μέρος γ'· χρῶ δὲ ξηρῶ  
καὶ σὺν μέλιτι· γάρος ὁ ἐκ τῶν μαινίδων διακλυζόμενος, ἀρ-  
νογλώσσου χυλὸς διακλυζόμενος, κηκίς μετὰ μέλιτος διακλυ-  
ζομένη, στυπτηρία ὑγρὰ ὁμοίως.

Κεφ. πγ'. Τὰς δὲ ἐν τῷ στόματι σηπεδόνας ἴσῃσι  
μὲν καὶ τὰ πρὸς νομᾶς ἀναγεγραμμένα· ἰδίως δὲ ταῦτα·  
μαράθρου ἀγρίου ῥίζης κεκαυμένης ἢ τέφρα, ἢ μαινίδων κε-  
καυμένων μέρος β', ἀλόης μέρος α', ξηρὰ· ἢ ἀρσενικοῦ < δ',  
χάρτου κεκαυμένου < ιβ', ξηρὰ· ἢ σταφίς λεία χωρὶς τῶν

sanant mel et quaecunque ad tumentes luxuriantesque  
gingivas descripta sunt: multo vero praestat privatimque  
conveniunt, quae sequuntur: viticis aut cypri folia cum  
melle affricta: similiterque succi tribuli, acaciae, hypo-  
cistidis, rhois coriariorum et omphacium, origanum iti-  
dem et rhus obsoniorum eodem modo. Pariter et balau-  
stium, tum siccum adhibitum, tum et in decocto ad col-  
luendum os usurpatum: sandaracha colluta cum rosaceo,  
bettonicae herbae succus, et folia sylvestris oleae ad eun-  
dem modum. Sumito arsenici partem unam, chartae  
combustae partes tres: hoc remedio utere et sicco et cum  
melle. Prosunt et collutione garum e maenis, plantagi-  
nis succus, galla cum melle, et alumen liquidum eodem  
modo.

Cap. LXXXIII. Putrida oris ulcera cohibent, quae  
ad depascentia descripsimus: privatim vero haec: foeni-  
culi sylvestris e radice combusta cinis, pulvis e maena-  
rum ustarum partibus duabus et aloës parte una: sic et  
ex arsenici drach. iiij., chartae combustae drachm xij., uva



γιάρτων καταπλασθεῖσα, ἀμόργη ἐλαίου ἐψηθεῖσα καὶ κα-  
ταχοριμένη, βεττονικῆς πόας χυλός.

Κεφ. πδ'. Τὰς δὲ δυσωδίας τοῦ στόματος ἀπαλλάτ-  
τει ἀγαλλόχου ἀπόβρογμα ἢ ἀπόζεμα διακλυζόμενον· σμύρνη,  
σχοίνου ἄνθος, ἢ κιννάμωμον, διαμασσώμενα· μαλαβάθρου  
φύλλον ὑποτιθέμενον τῇ γλώσση· ὅξος σκίλλινον, ἢ ἀφέψη-  
μα κεδρίων ξύλων.

Κεφ. πέ'. Πρὸς δὲ τὰς τῶν παρισθμίων φλεγμονὰς  
χρώμεθα ἀναγαργαρίσμασι μελικράτου μετὰ ἀποζέματος πι-  
τύρων, ἢ ῥόδων, ἢ φακῆς· ἢ κοκκυμηλέας φύλλοις ἐν οἴνῳ  
ἐψηθεῖσιν. Καὶ πρὸς τὰ ἡλκωμένα δὲ παρίσθμια ἐλξίνης  
χυλίσμασι, ἄλῳγ, ἀμόργη ἐψημένῃ, βάτου τῷ χυλῷ ἐψημέ-  
νῳ, ἄλσιν ὁμοίως, λυκίῳ, πίσση ὑγρᾷ, μίσι, ὀριγάνου  
χυλῷ, χαλκοῦ ἄνθει, μόρων χυλῷ ἐψημένῳ σὺν μέλιτι καὶ  
στυπτηρίᾳ ὀλίγῃ· ποιεῖ δὲ καὶ ἀμυγδάλινον ζεστόν ἐγχεόμε-  
νον εἰς τὰ ὤτα.

Κεφ. πζ'. Τὰς δὲ κεχάλασμένας σταφυλὰς συστέλλει  
ἀναγαργαρίζόμενα μέλι, κνίδης χυλός, ὀξύκρατον, κοκκυμη-

passa sine vinaceis trita et imposita, amurca olei cocta et  
illita, bettonicae herbae succus.

Cap. LXXXIV. Oris gravecolentiam corrigunt agal-  
lochi dilutum decoctumve collutum, myrrha commandu-  
cata, odorati iunci flos similiter, itemque cinnamo-  
mum: malabathri folium linguae subditum: collutione  
denique acetum scilliticum, aut cedrinorum lignorum de-  
coctum.

Cap. LXXXV. Ad tonsillarum inflammationes gar-  
garismatis utimur e decocto furfurum, rosarum aut len-  
ticulae, in aqua mulsa, vel pruni foliis in vino coctis.  
Quod si eadem ulceratae fuerint, usurpamus helxines suc-  
cum, aloën, amurcam coctam, succum rubi decoctum,  
salem similiter, lycium, picem liquidam, misy, origani  
succum, aeris florem, mororum succum cum melle et  
paucis alumine coctum. Fuerit etiam utile, oleum amy-  
gdalinum fervefactum auribus infundere.

Cap. LXXXVI. Uvas relaxatas gargarizatione com-  
primunt mel, urticae succus, posca, pruni foliorum de-

λέας φύλλα ἀφεψημένα σὺν οἴνῳ, ὀριγάνου ἀφέψημα σὺν οἴνῳ. Διαχριόμενα δὲ ὠφελεῖ σὺν μέλιτι ἄλες, ὀμφάκιον, ὁπὸς σιλφίου, στυπτηρία, κηκίς μετὰ ἄλῃς καὶ πεπέρεως καὶ μέλιτος. Πρὸς ἀπτόμενα δὲ ξηρὰ ὠφελεῖ βαλαύστιον, χαλκοῦ ἄνθος, χαλκίτις λεία, στυπτηρία σχιστὴ, μίσυ, κηκίς, ὁπὸς παρθικὸς, ἐλαίας αἰθιοπικῆς, δάκρυον, αἰθάλη ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων, ἄλες.

Κεφ. πζ'. Συναγχικούς δὲ ὠφελεῖ, ὅσα δύναται ἀποσπᾶν ὑγρασίαν· χαλᾶται γὰρ οὕτως ἡ ξηρασία καὶ ἡ πύκνωσις τῶν μερῶν. Ἔστι δὲ τὰ ἀναγοραριζόμενα· ὕσσωπον μετὰ σύκου ἐν ὕδατι ἐψημένον· λιβανωτὸς σὺν γλυκῇ καὶ μέλιτι, ἢ ὀξυμέλιτι· ῥαφάνου σπέρμα λεῖον σὺν ὀξυμέλιτι· σιγήπεως ἐδωδίου κοχλιάριον σὺν μέλιτος θερμοῦ κυάθῳ ἐνί.

Κεφ. πη'. Διαχριόμενα δὲ, χελιδόνων κικαυμένων σποδία σὺν μέλιτι, χολὴ βοεῖα σὺν μέλιτι· ἰδίως δὲ ποιεῖ τῆς θαλασσίας χελώνης χολή, χρυσόκολλα μετὰ μέλιτος· κινεῖ δὲ καὶ ἔμετον· ἄλες μίγντες ὅξει καὶ μέλιτι καὶ νίτρῳ· ἐλα-

coctum in vino, origani itidem decoctum cum vino. Ad easdem conducunt, peruncta cum melle, sal, omphacium, laser, alumen: galla cum sale, pipere ac melle. Iisdem sicca utiliter adhibentur balaustium, flos aeris, chalcitis trita, alumen scissile, misy, galla, liquor parthicus, oleae aethiopicæ lacrima, fuligo e carbonibus, et sal.

Cap. LXXXVII. Angina laborantes adiuvant, quaecunque humiditatem revellere possunt: sic enim inducta siccitate, partium densitas relaxatur. Gargarizantur vero hyssopum cum figu in aqua decoctum: tus cum passo et melle, vel aceto mulso: raphani semen tritum cum aceto mulso, sinapeos esculenti cochlear cum mellis calentis cyatho uno.

Cap. LXXXVIII. Inunguntur autem crematarum hirundinum cinis cum melle, et fel bubulum cum melle. Privatim vero confert testudinis marinae fel, et chrysocola cum melle, (haec vero vomitum etiam concitat:) sal admixtum aceto, melli ac nitro, elaterium cum ve-

τήριον μετὰ ἐλαίου παλαιοῦ ἢ μέλιτος, ἢ χολῆς ταυρείας·  
 κρομμύου χυλὸς μετὰ ἐλαίου, κενταυρίου χυλὸς μετὰ μέλιτος,  
 ὄνοι οἱ ὑπὸ ταῖς ὑδρίαις σὺν μέλιτι πίσσα σὺν μέλιτι. Ἐπι-  
 τίθενται δὲ τῷ ἀνθερεῶνι καὶ τῷ τραχήλῳ ὠφελίμως ἄλλες  
 μετὰ πίσσης λαῖοι ἐν ὀθονίῳ.

Κεφ. πθ'. Ὁφελεῖ δὲ τοὺς συναγχικούς, ἐν ποτῷ διδο-  
 μένῃ, χελιδόνων ἐσκελετευμένων < α' σὺν ὕδατι κάμψη ξη-  
 ρὰ κοπεῖσα καὶ ποθεῖσα σὺν μελικράτῳ.

Κεφ. ζ'. Τὰ δὲ καταπινόμενα ὅστέα, ἢ ἀκάνθας, καὶ  
 πηγνύμενα τῷ στομάχῳ κομίσῃ, στέαρ ἡμίφθον ἐνάψας  
 λίνῳ, κατατρήσας, ἀναγκάσας τε καταπιεῖν, καὶ μετὰ τοῦτο  
 ἀνασπάσας ῥόθιον διὰ τοῦ ἀπηρητημένου λίνου· εἴωθε γὰρ  
 συνεφέλκεσθαι τὸ ἐρηρεικὸς ἢ πεπηγὸς· δύναται δὲ διὰ σπογ-  
 γίου ἀπαλοῦ, ἢ ἐρίου, ἢ κρεῶν ἐντετμημένων τὸ αὐτὸ γενέ-  
 σθαι· δεῖ δὲ σὺν ὕδατι καταπίνειν, ἢ ἄρτου ἀπαλοῦ τὸ ἐν-  
 τὸς διδόναι καταπίνειν, ἢ σῦκα ξηρὰ μεμασσημένα.

Κεφ. ζα'. Τοὺς δὲ ἀποκεκομμένους τὴν φωνὴν ὠφε-  
 λεῖ πρᾶσου χυλὸς καταρρόφούμενος· κράμβη ὠμὴ διαμασ-

tere oleo melleve, aut felle taurino, cepae succus cum  
 oleo, centaurii succus cum melle, aselli, qui sub vasis  
 aquariis degunt, cum melle, pix itidem cum melle. Uti-  
 liter vero sal cum pice tritus in linteolo parti gutturis  
 sub mento eminenti ac ipsi collo imponitur.

Cap. LXXXIX. Prodest quoque angina laboranti-  
 bus potui data hirundinum exsiccatarum drachma una ex  
 aqua, itidemque vermis, quem crucam nominant, siccus  
 tusus ac bibitus cum aqua mulsa.

Cap. XC. Spinas ossave devorata gulacque inhae-  
 rentia extrahes, si sebum semicrudum filo alligatum tra-  
 iectumve deglutire coëgeris, moxque per appensum filum  
 violenter ac subito retraxeris: sic enim quidquid haeret  
 infixumve est, simul et semel extrahitur. Idem deglutitis  
 ex aqua spongia molli lanave, aut incisis carnibus perfici  
 poterit. Aut medullae panis recentis buccellam devo-  
 randam, vel caricas mansas itidem deglutiendas exhibeto.

Cap. XCI. Quibus suppressa vox est, prodest porri  
 succus absorptus, item brassica cruda commanducata: in-

σωμένη, ὃ δὲ χυλὸς ἐπιδρόφούμενος σὺν μέλιτι· ῥοφήματα διὰ κυμίνου καὶ πράσου καὶ ἀλεύρου λαμβανόμενα· χαλβάνης μέγεθος ὅσον κύαμος, μίγνεν ἐπιμελῶς μέλιτι καὶ καταπινόμενον.

Κεφ. εβ'. Βρόγχον<sup>26</sup> δὲ ἀποκαθαίρει ὄξος σκυλλητικὸν ἀναγαργαριζόμενον, σίνηπι τοῖς βρώμασι σκευασθὲν ἀναγαργαριζόμενον· δεῖ δὲ μετὰ αὐτὰ ἀναγαργαρίζεσθαι μελικράτῳ· τοῦτο καὶ τοὺς τύλους τοὺς περὶ τὴν ἀρτηρίαν καὶ παρίσθμια θεραπεύει.

Κεφ. εγ'. Λαμπρύνει δὲ φωνὴν σκόροδον ἐφθόν τε καὶ ὠμὸν ἐσθιόμενον· πράσου καρπὸς κεφαλαιωτοῦ, στύραξ καταπινόμενος, σίλουρος ταριχηρὸς ἐσθιόμενος.

Κεφ. εδ'. Ἰᾶται δὲ τὰς μὲν χρονίας τραχύτητας αἰθιοπίδος ῥίζα σὺν οἴνῳ πινομένη, γλυκύῥοιζα καὶ σμύρνα ἀποχυλιζομένη, ὧν ὠμὸν ἀκροχλίaron ῥοφηθέν, σύμφυτον σὺν μελικράτῳ πινόμενον, πενταφύλλου ῥίζης ἀφέψημα ἀναγαργαριζόμενον.

26) Sic Sarac. loco vulg. ἤχον.

superque succus eiusdem cum melle sorbitione sumptus. Conferunt et sorbitiones e cumino, porro et farina sumptae, itemque galbanum fabae magnitudine melli accurate mixtum atque devoratum.

Cap. XCII. Fauces expurgat acetum scilliticum gargarizatum, itemque sinapi, quod ad escas praeparatur, eodem modo, sed postea gargarizandum ex aqua mulsa. Hoc idem etiam callos fistulae spiritalis tonsillarumque sanat.

Cap. XCIII. Vocem limpidam canoramque reddunt allium, seu coctum, seu etiam crudum in cibo sumptum, porri capitati semen, styrax devoratus, silurus denique sale conditus, in cibis sumptus.

Cap. XCIV. Diuturnis faucium asperitatibus medentur aethiopidis radix in vino pota, glycyrrhiza, dum manditur, sensim eliquescens, ac myrrha similiter, ovum crudum, quod exiguo calore tepeat, absorptum, symphytum cum aqua mulsa potum, ac denique quinquefolii e radice decoctum gargarizatum.



Τῶν κατὰ τὰς τρίχας παθῶν βοηθήματα.

Κεφ. ξέ'. Ἀλωπεκίας δὲ τὰς ἐν ταῖς κεφαλαῖς καὶ τῷ γενεῖω ἰᾶται ταῦτα καταχρίόμενα, προεκνιτρουμένων τῶν τῶν καὶ ἀποτριβομένων τῶν ἐπιλωμένων ὀθονίῳ σὺν ὄξει· ἀκόνης ναξίας τὸ ἀπότριμμα τοῦ πρὸς αὐτὴν σιδήρου μετὰ ἐλαίου ἀκονηθέντος, ἀλκυόνιον κεκαυμένον λεῖτον σὺν ὄξει ἢ οἶνῳ ἢ ἐλαίῳ, ἀπόπατος αἰγὸς ὁμοίως· μυόχοδον, ἢ αἰλούρου ἀφόδευμα μετὰ νάπυος καὶ πεπέρεως καὶ ὄξους· ἀδιάντον καταπλασθὲν ἐν ὀθονίῳ, ἀρσενικὸν ἢ σανδαράχῃ ἀναληφθεῖσα τερμινθίνῃ· ἄσπληνον<sup>27</sup>, ἀσφοδέλου ῥίζης καείσης ἢ τέφρα, προκατασχασθείσης τῆς ἀλωπεκίας· βατράχιον λεῖτον πρὸς ὀλίγον καταπλασθὲν, λεπίδιον ὁμοίως, ἔλαιον κίκινον μετὰ κηρύκων κεκαυμένων, ἐρίνου χερσαίου δέρμα κεκαυμένον καὶ ἐσβεσμένον πίσσῃ ὑγρᾷ, ἢ βατράχων κεκαυμένων τέφρα ὁμοίως, ἢ ἱππόκαμποι κεκαυμένοι ὁμοίως, ἢ θαψίας χυλὸς ἐπιχρίόμενος, ἢ ἰὸς σιδήρου σὺν ὄξει,<sup>1</sup> ἢ στέατι ἀρκείῳ, ἢ ἄξουγγίῳ· ἢ καλάμου κυπρίου φλοιὸς κεκαυμένος<sup>28</sup> σὺν ὄξει,

27) Sic Moibanus loco vulg. ὡς σπλήνιον.

28) Sic recte Sarac. loco vulg. χυλοῦ κεκαυμένον.

### *Ad pilorum affectus remedia.*

Cap. XCV. Alopecias, quae capiti et mento accidunt, emendant haec inuncta, si modo loca pilis nudata, nitro ante praeparata, linteoloque aceto madente perfricta fuerint: quod adiecto oleo e cote naxia exacuendo ferro deteritur: alcyonium ustum tritumque cum aceto vinove aut oleo: finus caprinus similiter, muscerda, aut felis stercus cum sinapi, pipere et aceto: adiantum ex linteolo illitum, auripigmentum aut sandaracha, si terebinthina excipiat: asplenium, asphodeli radiceis exustae cinis, prius tamen scarificata cute: ranunculus tritus exiguoque tempore impositus, itemque lepidium eodem modo: oleum cicinum cum buccinis crematis, crinacei terrestres corium combustum, piceaeque liquida exstinctum: similiterque ranarum combustarum cinis, hippocampi eodem modo exusti, thapsiae succus illitus, ferrugo cum aceto et adipe ursino vel axungia, calami cyprii cortex ustus cum aceto,

καρύου βασιλικού λέπυρον καὲν σὺν οἴνῳ· καὶ τὸ ποντικὸν δὲ ὅλον καὲν ὁμοίως, ἢ σὺν ἄξουγγίῳ, ἢ ἀρκείῳ στέατι· ἢ κρόμμυον λεῖον καταχρίόμενον ἢ καταπλασσόμενον, κυκλαμίνου ῥίζα ὁμοίως, σίνηπι μετὰ ὄξους, ὅπως σιλφίου μετὰ κρόκου καὶ οἴνου καὶ πεπέρεως, ὅπλαϊ αἰγὸς καεῖσθαι σὺν ὄξει, πισσέλαιον<sup>29</sup> σὺν ἀλεύρῳ κριθίνῳ καταπλασσόμενον, ῥαφάνου τὸ ἐκτὸς παρατριβόμενον, σκόροδον κεκαυμένον σὺν ναρδίνῳ μύρῳ καταπλασθὲν, σεύτλιον ὁμοίως· μυῶν κεφαλαὶ προστριβόμεναι, καὶ αὐταὶ δὲ ὅλαι, προεκνιτρωθέντος τοῦ τόπου, κάσσυμα κεκαυμένον λεῖον σὺν ὄξει.

Κεφ. 55. Τὰς δὲ ῥεούσας τρίχας ἀπὸ τῆς κεφαλῆς ἴστησιν ἀδιάντον λεῖον σὺν λαδάνῳ καὶ οἴνῳ καὶ οἰσύπῳ<sup>30</sup> καὶ μυρσίνῳ περιχρίόμενον· καὶ τὸ καλλίτριχον ὁμοίως· ἀλόη σὺν οἴνῳ μέλανι αὐστηρῷ, πορφύρας πώματα ἐν ἐλαίῳ ἐψηθέντα, ἐλαιοῖον μυρσίνινον, καὶ τὸ ἐξ ἀγρίας ἐλαίας, σμύρνα σὺν οἴνῳ καὶ λαδάνῳ καὶ μυρσινίνῳ, κάρδαμον λεῖον σὺν μυρσινίνῳ, ἢ πολύτριχον ἐψήσας ἐν οἴνῳ μέλανι ἐφ' ἱκανόν, καὶ

29) Sic Moiban. loco vulg. πίσσα, σόριος.

30) Sarac. loco vulg. ἰσσύπῳ.

iuglandis putamen ustum cum vino: nuces avellanae totae combustae, eodem modo adhibitae, vel cum axungia aut adipe ursino: cepa contrita illita, aut cataplasmatibus modo imposita, cyclaminis radix ad eundem modum, sinapi cum aceto: laser cum croco, vino ac pipere: ungulae caprinae ustae cum aceto, picis oleum cum farina hordeacea adhibitum, raphani cortex affricatus, allium ustum, cum nardino unguento pro cataplasmate impositum, beta eodem modo: affricata muscarum capita, vel ipsae integrae, loco prius nitro praeparato: soleae denique veteres crematae tritaeque cum aceto.

Cap. XCVI. Defluentes capillos continent adiantum tritum cum ladano, vino, oesypo et myrtino oleo inunctum: similiter et callitrichum, aloë cum vino nigro austero, purpurarum opercula in oleo cocta, myrtinum oleum, et quod ex olea sylvestri exprimitur, myrrha cum vino, ladano et myrtino. Aliud: Polytrichum in vino nigro diutine coquito: huius decocto admisceto calami

καύσας ἰδίᾳ κάλαμον ἀρωματικὸν μετὰ ξύλων ἰτεῖνων, μῖξον ὕδωρ ὀμβριον, καὶ ἀναδεύσας ὕλισον καὶ μῖξον τῷ ἀφεψήματι τοῦ πολυτρίχου, καὶ χρῶ· ἢ σπύραθον αἰγίαν κατακαύσας ἐπὶ ὀστράκῳ λείαν σὺν ἐλαίῳ ἄλειψε, ἐπιλωμένης τῆς κεφαλῆς. Πρὸς τρίχας, ἵνα μὴ ἀπορῥέωσιν, καύσας μελάνθιον, καὶ μετὰ ὕδατος τρίψας, κατάπλαττε, ἔνθα ἂν βούλῃ τρίχας φύεσθαι, μάλιστα ὀφρύων. Ἄλλο· Μελίσσας καύσας καὶ τρίψας, μετ' ἐλαίου κατάχρει.

Κεφ. εἴς. Ἐπὶ δὲ τῶν παιδίων ποιεῖ καλὰς καὶ πυκνὰς τρίχας ταῦτα· καρύου λέπυρον καὲν καὶ τριβὲν ἐν οἴνῳ καταχριόμενον, στέαρ ὕειον καταχριόμενον, κρόμβη ὠμὴ καταπλασθεῖσα, λωτοῦ δένδρου φύλλα, σφονδυλίου ῥίζα μετὰ τὸ ἀποσμηῆσαι περιχριομένη, ἀπόπατος καμήλου καῖσα σὺν ἐλαίῳ καὶ καταπλασθεῖσα καλῶς.

Κεφ. εἴη. Ξανθὰς δὲ ποιεῖ τρίχας θερμῶν λεπτόχανα ἀποβραχέντα σὺν νίτρῳ ἐπὶ ἡμέρας δέκα, καὶ μετὰ ταῦτα σμώμενα κύπρου φύλλα λεία σὺν στρουθίου χυλῷ ἐπιπλασσύμενα, λυκίου χυλὸς ἐν ὕδατι συνεχῶς σμώμενος, λωτοῦ

aromatici, separatim igni e salignis lignis succenso combusti, et cum aqua pluvia probe subacti expressionem, ac utitor. Aut fimo caprino in testa combusto tritoque cum oleo caput prius abrasum inungito. Ut ne capilli defluant, melanthium ustum et cum aqua tritum ei parti adhibeto, in qua pilum nasci volueris, maxime vero superciliis. Aliud: apes crematas tritasque cum oleo perungito.

Cap. XCVII. Pueris venustos densosque capillos haec efficiunt: iuglandis putamen ustum tritumque in vino et illitum, adeps suillus inunctus, brassica cruda adhibita, loti arboris folia, sphondylii radix loco prius absterso circumlita, cameli fimus crematus, et cum oleo cataplasmatismis in modum rite adhibitus.

Cap. XCVIII. Flavum faciunt capillum lupinorum cortices, nitro praemacerati diebus decem, posteaque affricati, cypri folia trita cum struthii succo imposita, lycii succus aqua solutus, et crebro infricatus, loti arboris ra-

τοῦ δένδρου ἀφέψημα τῶν πρισμαίων, ξάνθιον καταπλασ-  
σόμενον προεκνιτρωθεῖσων τῶν τριχῶν· καὶ τὸ στέαρ τὸ βόειον  
ποιεῖ ἐψόμενον μετὰ κονίας ἀπὸ δρυίνων ἢ φηγίνων ξύλων·  
εἴτα ἀναπλασσόμενον εἰς σφαῖρας, ἐπὶ δὲ τῆς χρήσεως λυό-  
μενον ὕδατι καὶ ἐγχερόμενον ἐν ἡλίῳ· ἢ τρυξ ὄξους κεκαυμένη  
μετὰ σχινίνου ἢ βαλανίνου ἐλαίου διὰ νυκτὸς καταχρισθεῖσα.

Κεφ. 59'. Μελαινὰς δὲ ποιεῖ τρίχας σμώμενα κηκίδος  
ἀπόβρεγμα, καὶ χαλκάνθου καὶ σιδίων· καὶ ἀκακίας χύλισμα,  
τὸ ἐκ τῶν κερατίων καὶ φύλλων τῆς ἀνάνθης, καὶ ὁ ἐκ τοῦ πε-  
πείρου αὐτῆς σπέρματος χυλὸς, ἐγχερόμενος· βάτου φύλλα ἐψη-  
θέντα καὶ σμώμενα, ὁ καρπὸς δὲ πέπειρος ἐψηθεὶς σὺν ἐλαίῳ  
ὀμφακίνῳ· οἶνος μυρτίτης σὺν ἐψήματι, ἐλελίσφάκου ἐψημα  
σμώμενον, ἐλάτης ὁμοίως, σμύρνα σὺν ἀκακίᾳ καὶ ὄξει καὶ  
κηκίδι· κισσοῦ κόρυμβοι· καὶ καππάρεως<sup>31</sup> ῥίζαι, μετὰ κυά-  
μων λεπύρων ἐψηθεῖσαι· καὶ φύλλα μελαίνης συκῆς καὶ ἀμ-  
πέλου σὺν ὀμβρίῳ ὕδατι· λάδανον μετὰ μυρσίνης ἀλείμματος·  
μύρτων μελάνων χυλὸς, καὶ τὸ ἀπόβρεγμα· ῥοῦς βυρσοδεψι-

31) Sarac. loc9 κηπαίας.

mentorum decoctum, xanthium impositum, pilis antea ni-  
tro prae paratis. Confert et adipem bubulum cum lixivio  
e quernis faginisve lignis coctum cogere in globulos, qui  
quidem usus tempore aqua dissolvantur, et ad solem il-  
linantur. Rufat et capillum faex aceti usta cum lentisci-  
no balaninove oleo tota nocte illita.

Cap. XCIX. Denigrant vero capillos haec affricta:  
gallae dilutum, itemque chalcanthi et malicorii: acaciae  
succus, tum qui ex siliquis simul et ipsius spinæ foliis,  
tum qui e maturo eiusdem semine exprimitur, illitus, ru-  
bi folia decocta et infricata, eiusdemque fructus maturus  
in oleo omphacino coctus, vinum myrtites cum sapa,  
salviae decoctum affricatum: similiter et elates, [hoc est  
palmarum involucri,] myrrha cum acacia, aceto et galla:  
hederæ corymbi, capparis radices cum fabarum cortici-  
bus decoctæ: nigrae tum fici, tum vitis folia cum aqua  
pluvia: ladanum cum myrtino unguento, baccarum myrti  
nigrarum succus, earumdemque dilutum: rhus coriario-



κῆ ἐψηθεῖσα, σκίνου ἀφέψημα μετὰ σώρειος, φλόμου τοῦ χροσανθέμου τὰ ἄνθη καὶ τὰ φύλλα καταπλασθέντα, πρίνου φλοιὸς τῆς ῥίζης ἀφεψηθεὶς ἐν ὕδατι, καὶ δι' ὅλης νυκτὸς καταπλασθεὶς, πρῶτ' διακνιζόμενος.<sup>32</sup>

Κεφ. ρ'. Βράδιον δὲ πολλοὶ τὸ ἐξ ἀγρίας ἐλαίας κατ' ἡμέραν ἀλειφόμενον· μᾶλλον δὲ ἂν μυρσίνην τις αὐτῷ ἐναποβρέξει· καὶ τὸ μυρσίνινον δὲ μίγν' τῷ λαδάνῳ.

Κεφ. ρά'. Σμήχει δὲ τρίχας νίτρον κεκαυμένον, τρὺς κεκαυμένη, ἄσβεστος, τῆλιν, ἀφρόνιτρον, γῆ μηλία<sup>33</sup>, γῆ αἰγυπτία, κέρατος ἐλαφείου ἀφέψημα, κίσσηρις λεία σὺν ὡοῦ τῷ λευκῷ.

Κεφ. ρβ'. Λεπτύνει δὲ τρίχας παρατριβόμενα λεῖα τέφρα κληματίνη, καὶ ἡ ἀπὸ τῶν γιγάρτων· κίσσηρις ὀπτῇ λεία, ἐλλέβορος λευκός, σηπίας ὄστρακον, κηκίς, νίτρον, λιθάργυρος, στυπτηρία σχιστή, ἀφοδος κυνεία ξηρά.

Κεφ. ργ'. Ψιλοῖ δὲ τρίχας καταχρίόμενα ἄσβεστος καὶ σανδαράχη μεθ' ὕδατος ἐψηθέντα, μίγνυμένης κιμωλίας,

32) Sarac. loco vulg. διαπονιζόμενος.

33) Moib. pro μιλησία.

rum decocta, lentisci decoctum cum sory: verbasci, quod aurco floret colore, tum flores, tum folia imposita: iligneae radices cortex in aqua coctus, et per totam noctem adhibitus, ac deinde mane scalpendo derasus.

Cap. C. Ne tam cito canescant capilli, praestat oleum sylvestris olivae quotidie inunctum, eoque magis, si quis myrtum in eo maceraverit: sic et myrtinum oleum ladanum admixtum.

Cap. CI. Pilos extergent nitrum ustum, faex usta, calx, foenum graecum, spuma nitri, terra melia, itemque aegyptia, cornu cervini decoctum, pumex tritus cum ovi albumine.

Cap. CII. Pilos attenuant trita et affrieta haec: cinis tum sarmentitius, tum et e vinaceis, pumex tostus tritusque, helleborus albus, sepiae testa, galla, nitrum, argenti spuma, scissile alumen, et caninum stercus aridum.

Cap. CIII. Auferunt vero pilos illita haec: calx viva et sandaracha in aqua coctae, addita terra cimolia:

φρύνου αἷμα· τιθυμάλλου χαρακίου ὀπός, δρυόπτερις σὺν τοῖς φύλλοις καὶ ῥίζῃ καταπλασσομένη, ἄχρις ἂν ἐξιονθίσωσι<sup>34</sup>, συνεχῶς ἀλλασσομένου τοῦ καταπλάσματος· κισσοῦ φύλλα καταπλασσόμενα· κυπέριδος ἰνδικῆς ῥίζα, (αὕτη δὲ καὶ παραχοῖμα ψιλοῖ·) λαγῶδος θαλάσσιος λείος καταπλασθεῖς, σαλαμάνδρα ἐν ἐλαίῳ ἐντακεῖσα· πιτυοκάμπαι ψυχθεῖσαι ἐπ' ὀλίγον, καὶ μετὰ μέλιτος καταχρισθεῖσαι· κυάμου λέπυρα καταπλασσόμενα, ἡ σκολόπενδρα θαλασσία ἐλαίῳ ἐνεψθηεῖσα.

Κεφ. ρδ'. Βράδιον δὲ ποιεῖ αὖξεσθαι τὰς ἐπὶ τῶν ἀνθρώπων τρίχας, καταχρίομενον ἀμπέλου δάκρυον σὺν ἐλαίῳ, καὶ τὸ ἀπὸ τοῦ χλωροῦ κλήματος καιομένου ἰδρούμενον ὑγρόν, κυάμινον ἄλευρον καταπλασσόμενον, ὑακίνθου ῥίζα μετὰ γλυκέως ἢ οἴνου λευκοῦ καταπλασθεῖσα.

Τῶν κατὰ τὸ δέσμα τῆς τε κεφαλῆς καὶ τοῦ λοιποῦ σώματος παθῶν βοηθήματα.

Κεφ. ρε'. Πρὸς ἀχῶρας δὲ ἢ πίτυρα καὶ ἐξανθήσεις ἐπι-

34) Sarac. loco vulg. ἐξιδρίσωσι.

rubetae sanguis, lacteus tithymali characiae succus: dryopteris cum foliis et radice adhibita, frequenter iterato renovatoque, quam diu renascentur pili, eodem cataplasmate: hederæ folia imposita: cyperidis indicæ radix, quæ quamprimum pilos abolet: lepus marinus tritus atque impositus, salamandra, quæ oleo intabuerit, erucæ pinorum paulisper exiccatae posteaque perunctæ, fabarum cortices impositi, itidemque scolopendra marina in oleo elixata.

Cap. CIV. Impuberibus ut serius excrescant pili, præstant lacrima vitis illita ex oleo, itemque liquor, qui ex accensis viridibus sarmentis exsudat, farina fabarum imposita, hyacinthi radix cum passo aut vino albo cataplasmatibus instar adhibita.

*Cutis in capite reliquoque corpore vitiorum remedia.*

Cap. CV. Ad achoras, furfures et exanthemata in  
DIOSCORIDES II. K

πολαίας ἐν τῇ κεφαλῇ, ἀδιάντου ἀφέψημα σμώμενον, ἢ συν-  
λειούμενον οἶνω καὶ ῥοδίνῳ, καὶ καταπλασσόμενον· ἀμύγδα-  
λα πικρὰ ἐγχριόμενα μετὰ μέλιτος, ἀνδράχνης χυλὸς σὺν οἶ-  
νῳ ἐγχριόμενος· βάτου χυλὸς σὺν ἐλαίῳ, βολβοὶ σὺν νίτρῳ  
σμώμενοι, τήλεως ἀφέψημα ὁμοίως, ἀρνόγλωσσον καταπλασ-  
σόμενον, ἀγριελαίας χυλὸς σμηχόμενος, μαλάχη λεία μετ' αἵ-  
ρας καταπλασσομένη, μελίλωτον σὺν τήλει καὶ οἶνῳ κατα-  
πλασσόμενον, οἶνος μυρτίτης σμώμενος, οὖρον ἀνθρώπου πα-  
λαιὸν ὁμοίως, πηγάνου χυλὸς καταχριόμενος, σκίλλα σὺν  
ἐλαίῳ ἐψηθεῖσα καὶ καταχριομένη, σκόροδον σὺν ὕδατι σμώ-  
μενον, σέντλου χυλὸς ὁμοίως, ἄλεις σὺν στέατι μοσχίῳ κα-  
ταχριόμενοι, συκῇ σὺν ὄξει λεία· ἐρεβίνθων ἀπόζημα, καὶ  
αὐτοὶ ἐφθοὶ καταπλασσόμενοι, θέρων ἀφέψημα σμώμενον,  
ἰτέας ἄνθη καὶ φύλλα καταπλασσόμενα λεῖα, κάλαμος ἀρω-  
ματίτης μετὰ ὕδατος καὶ σμύρνης ἐψηθεὶς σμώμενος, κρίνου  
ρίζα σμωμένη, λάδανον σὺν οἶνῳ καταχριόμενον, λιβανωτὸς  
σὺν νίτρῳ καὶ ὕδατι ὁμοίως, χαμαιάκτης χυλός.

Κεφ. ρς'. Πρὸς δὲ τὰ ἐξέρυθρα ἐξανθήματα ψιμύθιον

summa capitis cute haerentia faciunt haec: adianti decoctum infricatum, aut cum vino et rosaceo tritum et applicitum: amygdalae amarae cum melle illitae, portulacae succus cum vino illitus, itemque rubi succus cum oleo, bulbi cum nitro affricati, similiter et foeni graeci decoctum, plantago imposita, oleae agrestis succus affricatus, malva trita cum lolio adhibita, melilotus cum feno graeco et vino imposita, vinum myrtites infricatum: similiter et humana urina vetus, rutae succus perunctus, scilla in oleo cocta et adhibita, allium cum aqua affricatum, similiter et betae succus, sal cum adipe vitulino inunctus, fici folia cum aceto trita, cicerum decoctum, ac ipsi quoque elixi pro cataplasmate impositi, lupinorum decoctum affricatum, salicis flores et folia trita et adhibita, calamus aromaticus cum aqua et myrrha coctus et affricatus, lilii radix affricata, ladanum cum vino illitum, tus cum nitro et aqua eodem modo, ebuli denique succus.

Cap. CVI. Ad rubicunda vero exanthemata valent

σὺν δαφνίνῳ ἐλαίῳ καὶ θείῳ καταχριόμενον, πίτυος φλοιὸς  
σὺν κηρωτῇ, χαλκίτις μετὰ ὄξους, κιννάβαρι μετὰ κηρωτῆς,  
ὄστρακον ἐξ ἵπνου μετ' ὄξους, σεῦτλον ἐφθόν· ἐπαλείφειν  
δὲ δεῦ μετὰ τὰς χρίσεις<sup>35</sup> αὐτῶν τηλίνῳ ἐλαίῳ, ἢ μυρσινίνῳ,  
ἢ ῥοδίνῳ, ἢ οἶνανθίνῳ.

Κεφ. ρζ'. Τὰς δὲ τῆς κεφαλῆς καὶ ὅλου τοῦ σώματος  
φθειριάσεις γινομένας τοῦτοις θεραπευτέον συγχρίοντας, στα-  
φίδι ἀγρία ἢ σανδαράχῃ σὺν ἐλαίῳ, ἢ κισσοῦ χυλῷ σὺν μέ-  
λιτι, σινώπιδι σὺν ὄξει, κεδρίᾳ καθ' ἑαυτήν, ὕγρᾳ πίσσῃ  
μετὰ στυπτηρίας, δαφνίδων πιάσματι, ἐλαίῳ ῥαφανίνῳ, ἢ νί-  
τρῳ μετὰ σαμίας γῆς καὶ ἐλαίου, ἐλξίνης χυλῷ δι' ὅλης τῆς  
νυκτὸς καταχριόμενῳ· μυρίκης ἀφεψήματι, ἢ θαλάσσει θερ-  
μῇ λούοντας· ὠφελοῦνται δὲ πίνοντες κόριον λεῖον σὺν ὀρι-  
γάνῳ καὶ οἶνῳ.

Κεφ. ρη'. Σμήχει δὲ χρῶτα ὁπὸς συκῆς καὶ χυλὸς με-  
τὰ ἀλεύρου ξεργμίνου, ἀμύγδαλα πικρὰ μετὰ μέλιτος, τέφρα  
κληματίνῃ, καὶ ἡ ἐκ τῶν φηγίνων ξύλων σὺν ὕδατι· βέλ-

35) Moiban. loco vulg. μίξεις.

haec: cerussa cum laurino oleo et sulphure inuncta, pini  
cortex cum cerato, chalcitis cum aceto, cinnabaris cum  
cerato, testae fornacum cum aceto, beta denique elixa.  
Sed post haec inungendum oleum e foeno graeco, aut myr-  
tinum, aut rosaceum, aut oenanthinum.

Cap. CVII. Pediculari morbo in capite reliquoque  
corpore affectos curabis, inunctis hisce: uva taminia aut  
sandaracha cum oleo, hederæ succo cum melle, rubrica  
sinopica cum aceto, cedria per se, pice liquida cum alu-  
mine, expresso e baccis lauri succo, oleo raphanino, aut  
nitro cum terra samia et oleo, helxines succo per totam  
noctem inuncto, ablutione e decocto tamaricis aut aqua  
marina calente. Iuvantur et hausto coriandro trito cum  
origano et vino.

Cap. CVIII. Cutem extergunt ficulneus liquor et  
succus cum farina fabae fresae, amygdalae amarae cum  
melle, cinis sarmentitius, aut e esculis lignis cum aqua,  
sed potentius, quod ex iisdem cineribus paratur, lixi-



τιον δὲ ἡ ἐξ αὐτῶν γινόμενη κονία· μυροβαλάνου πίεσμα, ἄρου ρίζα, γῆ χία ἀντὶ νίτρου, ἀριστολοχία μετὰ νίτρου, γογγύλης ἀγρίας σπέρμα μετὰ ἐρεγμοῦ καὶ ὠοῦ τοῦ λευκοῦ, καὶ καθ' ἑαυτὸ τὸ λευκὸν τοῦ ὠοῦ, ἐρέγμινον ἄλευρον, ὀρόβινον, θέρμινον, πέπονος σὰρξ, σικύου χυλὸς σὺν τῷ σπέρματι μετὰ ἀλεύρου σητανίου, καὶ νίτρον ξηρανθὲν ἐν ἡλίῳ ἐν τοῖς ὑπὸ κύνᾳ καύμασι λεῖον, σικύου ἀγρίου ρίζα μετὰ ἐρεγμοῦ, βρυωνίας ρίζα ὁμοίως.

Κεφ. ρθ'. Τετανοῖ δὲ χρῶτα καὶ πρόσωπον βρυωνίας ρίζα λευκὴ ἢ μέλαινα, ἐψηθεῖσα ἐν ἐλαίῳ, καταχριομένου τοῦ ἐλαίου· ποιεῖ καὶ μετὰ σύκου πίονος καὶ ὀρόβου καταπλασσομένου, ὅσον στάδιον διελθεῖν, ψυχρῶ δὲ προσκλύζεσθαι μετὰ τὴν ἄρσιν αὐτῆς· κροκοδείλου χερσαίου ἄφοδος μεθ' ὕδατος, γῆ χία ὁμοίως, γῆ σελινουσία ὁμοίως, ἀκακαλίδος οἱ κόκκοι μετὰ κηρωτῆς λεῖοι καταχριομένοι, κρίνου ρίζα ἐν σμήγματι, κυκλάμινος ὁμοίως σὺν μαστίχῃ.

Κεφ. ρί'. Στιλβοῖ δὲ πρόσωπον ἐπιχριομένη γῆ χία,

vium: myrobalani expressus succus, ari radix: terra chia, loco nitri usurpari solita: aristolochia cum nitro, rapi agrestis semen cum faba fresa et ovi candido, ipsum etiam per se ovi candidum: fabae fresae farina, itemque ervina et lupinorum: peponis caro, cucumeris succus cum semine et trimestris tritici farina: nitrum siccatum in sole per aestum caniculae, deindeque tritum: cucumeris agrestis radix cum faba fresa, et bryoniae radix eodem modo.

Cap. CIX. Cutem faciemque erugat oleum, in quo bryoniae seu albae seu nigrae radix decocta fuerit, inunctum: idem facit et ipsa radix, si cum ficu pingui et ervo tanto tempore imponatur, quanto quis stadium conficiat: sed postquam amota fuerit, frigida cutis eluenda est. Convenit etiamnum terrestris crocodili stercus ex aqua: terra chia, itemque selinusia eodem modo, acacalidis grana trita cum cerato illita, lili radix in smegmate usurpata, similiterque cyclamen cum mastiche.

Cap. CX. Faciei vero nitorem inducunt illita terra

σελινουσία ὁμοίως, μαστίχη, τήλινον μῦρον<sup>36</sup>, ῥόδινον τὸ λευκαίνόμενον ἐπὶ τῷ ἡλίῳ ὁμοίως, πετέλας τὸ ἐν τοῖς θυλακίοις ὑγρὸν, ἔλαιον σικυώνιον.

Κεφ. ριά'. Εὐχροίαν δὲ ποιεῖ ἐρέβινθος ἐσθιόμενος ἐφθός· ἢ κόμμεως ἀκανθίνου, ἢ τοῦ ἐξ ἀμυγδάλων ἢ κερασίων, ἢ κοκκυμήλων, ὁλκὴ τριωβόλου μετὰ κράματος πινομένη.

Κεφ. ριβ'. Χρόαν δὲ τρέπει, ποθέντα καὶ ἐπιχρισθέντα, ἄμμι μεθ' ὕδατος, καὶ κύμινον ὁμοίως, ἄχυρα πύρινα, σμύρνον καταχρίόμενον, κύτινοι ῥοῖα ὁμοίως.

Κεφ. ριγ'. Τὰς δὲ ἐν ταῖς μασχάλαις δυσωδίας καὶ τοὺς τράγους καταπάσσειν δεῖ λείοις τούτοις· ἀγαλλόχῳ, βακχαρίδος ῥίζῃ, ῥόδοισιν, ἀπὸ τοῦ βαλανείου λείοις. Διαχρίειν δὲ σμύρνη μετὰ στυπτηρίας, ἢ κροκομάγματι, ἢ ὁμοίως κυπαρίσσου πρίσμασι μετὰ στυπτηρίας καὶ οἴνου εὐώδους, γῆ χία καίσει καὶ σβεσθείσει οἶνω<sup>37</sup>, ἱρίνῳ. Ποιεῖ δὲ καὶ σκόλμου ῥίζα ἐψηθεῖσα καὶ πινομένη.

36) Sarac. loco vulg. ἄλευρον,

37) Sarac. addit.

chia, itemque selinusia, mastiche, unguentum telinum, pariterque rosaceum, quod insolatione dealbatum fuerit: humor, qui in folliculis ulmi reperitur, ac denique oleum sicyonium.

Cap. CXI. Venustum colorem inducunt cicer coctum, in cibo sumptum, gummi spinae aegyptiae aut amygdali aut cerasi prunive, pondere trium obolorum ex vino potum.

Cap. CXII. Colorem mutant, seu bibita, seu etiam illita, ammi cum aqua, similiterque cuminum, acus tritici, smyrnium perunctum, et cytini mali punicae ad eundem modum.

Cap. CXIII. Ad hirscosam alarum graveolentiam inspergendi pulveres, agallochi, radice baccharidis, itemque rosarum, idque a balneo. Illinenda vero myrrha cum alumine, crocomagma, similiterque cupressi ramenta cum alumine et vino odorato, terra chia usta et vino restincta, et irinum unguentum. Tollit et id vitium scolymi radix cocta, etiam pota.

Κεφ. ριδ'. Οὐλὰς δὲ μελαίνας αἴρει ἐπιχρίόμενα βρυωνίας ῥίζης λευκῆς καὶ μελαίνης ἐφθῆς ἐν ἔλαιῳ ἄχρι χυλώσεως τὸ ἔλαιον ἐπιχρίόμενον, βάλανος μυρεψικὴ λεία σὺν οἴνῳ λευκῷ, βολβοὶ κεκαυμένοι μετὰ ἀλκυονίου σὺν οἴνῳ, καλαμίνθη σὺν οἴνῳ ἐφθῆ, λιθάργυρος πεπλυμένη σὺν ῥοδίνῳ λευκῷ, σικύου ἀγρίου ῥίζα σμηχομένη· εὐζώμου σπέρματα μετὰ λιθαργύρου λειωθέντα, καὶ χολῇ αἰγείᾳ ἀναληφθέντα εἰς κηρωτῆς πάχος, ἐπιχρίόμενα ὡφελεῖ.

Κεφ. ριέ'. Τὰς δὲ ἐκ λειγύνων οὐλὰς, καὶ τὰς ἄλλας δὲ, ὁμοχρόους ποιήσει ὄνειον στέαρ καταχρίόμενον· εὐζώμου σπέρμα λεῖον μετὰ χολῆς αἰγείας, ἢ προβατείας, ἢ βοείας καταχρίόμενον· εἴθ' ὅταν ξηρανθῇ ἀποτριβόμενον· καὶ ἐκ τοῦ λαχάνου δὲ τοῦ εὐζώμου χυλὸς ἐπιχρίόμενος σὺν λιθαργύρῳ· ἢ σικύου ἀγρίου ῥίζαν ἐψήσας ἐν μελικράτῳ καὶ λειάνας ὡς κηρωτῆν, περίχρει ὁμοίως· ἢ λιθαργύρου μέρος β', θείου ἀπύρου μέρος ἀναλαμβάνων εὐζώμου χυλῷ, ἐπίχρει· εἴτα

Cap. CXIV. Cicatrices nigras delent haec illita: oleum, in quo radix bryoniae tum alba tum etiam nigra incocta fuerit, usquedum succum reddat: glans unguentaria trita cum vino albo, bulbi cremati et cum alcyonio permixti ex vino, calamintha in vino cocta, argenti spuma lota cum rosaceo candido, cucumeris sylvestris radix affricata: iuvant et ervi semina cum argenti spuma contrita ad laevorem, et felle caprino excepta ad cerati usque crassitudinem, atque illita.

Cap. CXV. Tum ab impetiginibus relictas cicatrices, tum et alias quascunque reliquae cuti concolores reddent asininus adeps illitus, itemque erucae semen tritum cum felle caprino aut bubulo, et perunctum, si modo, postquam inaruerit, defricando extergeatur: eiusdem erucae succus, cum argenti spuma inunctus, idem praestat. Aut cucumeris sylvestris radicem coctam in aqua mulsa et contritam, donec cerati formam assequatur, eodem modo illine. Aut lithargyri partes duas, sulphuris vivi partem unam erucae succo excipito, atque illinito: deinde in

ἀπότριβε ἐν βαλανείῳ· καὶ μετὰ τὸ λούσασθαι ἐπίχρει λιθ-  
άργυρον σὺν εὐζώμου χυλῷ.

Κεφ. ρις'. Στίγματα δὲ αἶρει βατράχιον καταπλασθέν,  
καππάρεως φύλλων χυλὸς ὁμοίως, μανδραγόρας ἐπὶ ἡμέρας  
λ' παρατριβόμενος· ἢ τὰ φύλλα μανδραγόρου ταριχευθέντα  
ἐν ἄλμῃ καὶ ἐπιχρίόμενα ἐπὶ ἡμέρας μ' ἢ ν', ὁμοίως πόα  
καλουμένη στατική παρατριβομένη, ἢ σικύου ἀγρίου ῥίζα  
ἐψηθεῖσα ἐν μελικράτῳ λεία καὶ ἐπιχριομένη, ἢ ψιμύθιον ἐν  
ὄξει καταχρίομενον· χρονίσαντα δὲ αἶρει τοῦτο.

Κεφ. ρις'. Μώλωπας δὲ ταχέως ὁμοχρόους ποιῇ λεί-  
ρινον ἄλευρον ἐπαλειφόμενον συνεχῶς.

Κεφ. ριγ'. Ἀλφούς δὲ λευκοὺς καὶ λεύκας αἶρει ἐν ἡλίῳ  
καταχρίομενα, ἢ σμώμενα ἐν βαλανείῳ, δρακοντίου χυλὸς,  
ἄρου ῥίζα σὺν ὄξει καὶ ἀλεύρῳ κριθίνῳ, καππάρεως χυλὸς  
ὁμοίως, πήγανον σὺν κηρωτῇ καὶ πεπέρει, συκῆς μελαίνης  
κράδαι, ἢ ἀκρέμονες ἀπαλοὶ λείαι καταπλασθεῖσαι· καὶ τὰ  
φύλλα δὲ ὁμοίως· σεύτλου φύλλα καὶ ἡ ῥίζα καταπλασθεῖ-  
σα, τηλεφίου φύλλα ὁμοίως καταπλασσόμενα ἐπὶ ἡμέρας λ',

balneo deterito, et postquam laveris, lithargyrum cum eru-  
cae succo illinito.

Cap. CXVI. Stigmata delent ranunculus illitus, si-  
militerque capparis foliorum succus, mandragoras diebus  
XXX affrictus, eiusdemque folia muria condita inuncta-  
que diebus XL aut L: pariter et herba statice dicta, si  
affricetur: sylvestris itidem cucumeris radix cocta in aqua  
mulsa, deindeque trita et illita: cerussa denique cum  
aceto peruncta, quae quidem etiam inveterata stigmata  
delet.

Cap. CXVII. Vibices autem brevi reliquae cuti con-  
colores efficit liliaceum unguentum frequenter inunctum.

Cap. CXVIII. Vitiliginem albam et leucen abolent  
haec in sole peruncta, aut in balneo affricta: dracunculi  
succus, ari radix cum aceto et farina hordeacea, cappa-  
ris succus eodem modo, ruta cum cerato et pipere, fici  
nigrae ramuli tenellive surculi triti et impositi: similiter  
et eiusdem folia, betae folia et radix imposita, telephii  
folia simili modo adhibita diebus XXX ad senas horas



ἐκάστης ἡμέρας ἐπὶ ὥρας ε', ἀφαιρῶν δὲ ὡμῇ λύσει κατὰ-  
πλάσσει· ἄγνου σπέρμα λεῖον μετὰ ἀφρονίτρου καὶ ὄξους·  
ἀλθαίας σπέρμα ὁμοίως, ἀλκυόνιον σὺν ὄξει, βρυωνίας ῥίζα  
λευκῆς καὶ μελαίνης ἐψηθεῖσα σὺν ἐλαίῳ μέχρι χυλώσεως,  
ἀσφοδέλου ῥίζης χυλὸς, βάλανος μυρεψικὴ καταχριομένη, βολ-  
βοὶ λεῖοι σὺν ὀπτῷ νίτρῳ σμώμενοι καὶ καθ' ἑαυτοὺς κα-  
ταπλάσσόμενοι, ἐλλέβορος λευκὸς ἐψηθεὶς σὺν ὄξει καὶ σμη-  
χόμενος, καὶ ξηρὸς παρατριβόμενος μέχρις ἀνιδρώσεως· εἴτα  
καταχρίειν δεῖ σανδαράχην καὶ γῆν μηλιάδι· χαμαιλέοντος μέλα-  
νος ῥίζα μετὰ θείου καὶ νίτρου καὶ ὄξους· δεῖ δὲ προεκνι-  
τρῶσαι τοὺς τόπους· ἢ λιθαργύρου μέρη β', θείου μέρος α'  
μίξας ἀνάτριβε ἐν βαλανείῳ, καὶ μετὰ τὸ λούσασθαι κατὰ-  
χρειε λιθαργύρῳ μετὰ εὐζώμου χυλοῦ.

Κεφ. ριθ'. Τοὺς δὲ μέλανας ἀλφουὺς καὶ ὁμόχρους  
ποιεῖ γῆν μηλία καταχριομένη, ἐλλέβορος λευκὸς καὶ μέλας  
ἐψηθεὶς μετὰ ὄξους καὶ σμώμενος, κοχλίας χειρσαῖος καεὶς σὺν  
μέλιτι καταχρίόμενος καὶ σμηχόμενος, κρομίου χυλὸς σὺν  
ὄξει, κρίνου ῥίζα σμωμένη, κυάμινον ἄλευρον ὁμοίως, κύμι-

quotidie, ita tamen, ut his amotis hordeacea farina pro  
cataplasmate imponatur: viticis semen tritum cum spuma  
nitri et aceto, althacae semen simili modo, aleyonium  
cum aceto, bryoniae tam albae quam nigrae radix in oleo  
cocta, quousque succum reddat, asphodeli e radice suc-  
cus, glans unguentaria inuncta: bulbi triti, cum nitro  
torrefacto affricati, ac ipsi etiam per se impositi: hellebo-  
rus albus in aceto coctus et confricatus, eiusdem pulvis  
affricatus, dum sudor erumpat: sed post illinenda sanda-  
racha terraque melia: nigri chamaeleonis radix cum sul-  
phure, nitro et aceto, locis prius affricato nitro praeparatis.  
Aliud: spumae argenti partes II, sulphuris partem  
unam misceto, hisque laborantem in balneo perfricato, ac  
post lotionem inungito argenti spuma cum erucæ succo.

Cap. CXIX. Vitiliginem nigram reliquae cuti con-  
colorem reddunt terra melia peruncta, helleborus, tam al-  
bus quam niger, in aceto decoctus et affricatus: cochlea  
terrestris cremata, cum melle illita et affricata: cepae suc-  
cus cum aceto, lilii radix infricata, similiter et fabacea

νον σὺν ὄξει, κάχρους ὁμοίως, μυροβάλανος ἐν οἴνῳ, ἢ ναρ-  
κίσσου ῥίζα σὺν κνίδης σπέρματι καὶ ὄξει, σηπίας ὄστρακον  
σὺν ὄξει, ἢ σικίου ἀγρίου ῥίζα σμωμένη, τηλέφιον σὺν ὄξει  
καταχριόμενον, χονδρίλλης ῥίζα σὺν νίτρῳ κοπιῖσα ἐν σμή-  
γματι· λιθάργυρος, ἀρσενικόν, θεῖον, ἴσα μετὰ ἐλαίου ἐν βα-  
λανείῳ σμώμενα.

Κεφ. ρη'. Φακοὺς δὲ καὶ ἐφηλίδας καὶ ἰόνθους αἴρει  
ἐπιχρίσματα ἀδάρκης μεθ' ὕδατος, ἄκορος σὺν μέλιτι, κό-  
στος σὺν ὕδατι καὶ μέλιτι, ἄλυσσον σὺν μέλιτι, τιθυμάλλου  
ὀπὸς σὺν μέλιτι· (προςέχειν δὲ δεῖ· χρονίσαν γὰρ ἔλκοι διὰ  
βάθους·) ἀλκυόνιον σὺν ὄξει, ἀμπέλου ἀγρίας καρπὸς πέ-  
πειρος, λείος· βρυωνίας ῥίζα λευκὴ καὶ μέλαινα ἐψηθεῖσα  
μετὰ ἐλαίου ἄχρι χυλώσεως· αἴρει καὶ ἰόνθους ἀμυγδάλινον  
σὺν κηρωτῇ καὶ κρίνου ῥίζῃ.

Κεφ. ρκα'. Αἴρει τὰς ἐφηλίδας ἄρου ῥίζα μετὰ μέλι-  
τος, μυροβάλανος καταχριομένη σὺν οἴνῳ· βολβοὶ ὡμοὶ καθ'  
ἐαυτοὺς, ἢ σὺν ὠοῦ λεκύνθῳ καὶ σὺν ὄξει ἢ μέλιτι, ἢ κε-

farina, cuminum cum aceto, pariterque cachrys, glans  
unguentaria in vino, narcissi radix cum urticae semine  
et aceto, sepiae testa cum aceto, cucumeris agrestis radix  
affricta, telephium cum aceto illitum, chondrillae radix  
cum nitro tusa in smegmate: denique lithargyrum, arse-  
nicum et sulphur aequis portionibus cum oleo mixta, et  
in balneo affricta.

Cap. CXX. Lentigines, maculas solares et varos  
tollunt haec illita: adarces ex aqua, acorus cum melle,  
costus cum aqua et melle, alysson cum melle, tithymali  
liquor ex melle, (attamen cavendum, ne, si diutius re-  
linquatur, altius exulceret:) alcyonium cum aceto, vitis  
sylvestris fructus maturus tritus: bryoniae tam albae quam  
nigrae radix decocta cum oleo, usquedum succum reddat.  
Exerit et varos oleum amygdalinum cum cerato et lili  
radice.

Cap. CXXI. Vitia cutis a solis ardore contracta  
emendant ari radix cum melle, glans unguentaria illita  
cum vino: bulbi crudi per se, et cum ovi vitello, aceto

καυμένοι μετὰ ἀλκυονίου, μάλιστα ἐφηλιν ἀποκαθαίρουσιν·  
 χάλβανον σὺν ὄξει καὶ νίτρῳ μάλιστα φακούς αἶρει· κόμμι  
 σὺν νίτρῳ καὶ μέλιτι· καὶ ἰδίως δὲ μᾶλλον ἐφηλίδας αἶρει  
 ἔλλεβόρου λευκοῦ μέρη β' μετὰ μέλιτος, ἐλατήριοι κατα-  
 χριόμενον, κασσία σὺν μέλιτι, κιννάμωμον ὁμοίως, κράμβης  
 σπέρμα σὺν ὄξει, ὀρόβινον, ῥαφάνου φλοιὸς σὺν αἰρίνῳ ἀλεύ-  
 ρῳ· ἢ κάρδαμον καταπλασσόμενον δι' ὅλης νυκτὸς ἐπὶ ἡμέ-  
 ρας ε'· ἔωθεν δὲ ἀποπλύναντα καὶ κλύσαντα· θαψίας ῥίζα  
 σὺν μέλιτι, κισσοῦ φύλλα σὺν οἴνῳ ἐφθά, κρότωνος καρπὸς  
 καταπλασθεὶς ἐπὶ ἡμέρας γ'.

Κε φ. ρκβ'. Ἰδίως δὲ ἰόνθους αἶρει κρίνου ῥίζα σὺν  
 σμήγματι, κυκλαμίνου ῥίζα σὺν μέλιτι, ναρκίσσου ῥίζα ὁμοίως·  
 σηπίας ὀστράκου κεκαυμένου μέρη β', βαλάνου μυρεψικοῦ μέ-  
 ρος ἓν, λεία σὺν ὕδατι καταχριόμενα· καὶ καταξηραίνόμενα  
 δὲ νότιζε· μετὰ δὲ ἐξ ἡμέρας πυρία· ἄλευρον σητάκιον μετ'  
 ἐλαίου καταπλασθέν· γλήχων κηρωτῇ ἀναληφθεῖσα, σμύρνα  
 μετὰ κασσίας καὶ μέλιτος, κρομμύου χυλὸς σὺν σποδίῳ, μο-  
 λύβδαινα σὺν ὄξει, καὶ σῶρι σὺν ὄξει κεκαυμένον.

aut melle, vel cum alcyonio combusti, maculas solares  
 egregie repurgant: galbanum cum aceto et nitro lentigi-  
 nes potissimum abolet, uti et gummi cum nitro et melle.  
 Peculiariter vero maculas solares emendant hellebori albi  
 partes duae cum melle, elaterium inunctum, cassia cum  
 melle, et cinnamomum eodem modo, brassicae semen  
 cum aceto, ervi farina, raphani cortex cum lolii farina.  
 Aliud: nasturtium totis sex noctibus imponatur, et mane  
 eluatur. Eadem vitia corrigunt thapsiae radix cum melle,  
 hederac folia in vino cocta, ricini denique grana per tri-  
 duum imposita.

Cap. CXXII. Privatum autem varos tollunt lilii ra-  
 dix cum sapone, cyclaminis radix cum melle, narcissi  
 radix eodem modo. Testae sepiae crematae partes II, et  
 glandis unguentariae pars una terantur, et inungantur ex  
 aqua. Cum exaruerint, humectato: sex vero transactis  
 diebus, fomentum adhibeto. Tum et trimestris tritici fa-  
 rina cum oleo imposita, pulegium cerato exceptum, myr-  
 rha cum cassia et melle, ceparum succus cum spodio,  
 plumbago cum aceto et sori ustum cum aceto.

Κεφ. ρκγ'. Τοὺς δὲ ψωρώδεις καθ' ὅλου τοῦ σώματος ἢ περὶ μέρος κνησμοὺς θεραπεύει καταχριόμενα σταφίς ἀγρία μετὰ σανδαράχης καὶ ἐλαίου καὶ ὄξους προεψηθεῖσα καὶ λειοτριβηθεῖσα, στυπτηρία ὑγρὰ μετὰ μέλιτος ἐψηθεῖσα καὶ μετὰ σμύρνης καταχριομένη, ἅλεις σὺν ὄξει καὶ ἐλαίῳ συγχριόμενοι, ἄχρις ἂν ἐξιδρώσωσι, νάπυ μετ' ὄξους, μυροβαλάνου πίεσμα μετ' ὄξους καὶ ὀλίγου ἐλαίου· λαπάθου ἀγρίου τὸ ἀφέψημα, τῆς ῥίζης τῶ λουτρῶ μιννυμένης· καὶ ὄξος θερμὸν καταντλούμενον· ὀρόβου ἀφέψημα, ἢ ὀριγάνου, ἢ γλήχωνος καταντλούμενον, γάλα σχιστὸν πινόμενον.

Κεφ. ρκδ'. Τοὺς δὲ περὶ τὰ πυριωμένη αἰδοῖτα κνησμοὺς θεραπεύει θάλασσα, θεῖον ἐπιπασθὲν, νίτρον ἐν ἐλαίῳ καὶ ὄξει καὶ σταφίδι ἀγρία καὶ στυπτηρία σὺν ὕδρομέλιτι· συνεδρούμενον ἐν βαλανείῳ καταχριομένη, μάλιστα ἐπὶ τῶν διδύμων· καὶ τρὺξ ὄξους ξηρὰ τριβεῖσα, σὺν οἴνῳ καταχριομένη διδύμοις· ἐγκατάχριε δὲ μετὰ ταῦτα καὶ ὠοῦ τὸ λευκὸν μετὰ μέλιτος.

Κεφ. ρκε'. Πρὸς δὲ τὰ κνησμάδῃ ἐξανθήματα ἀρμόζει καταχριόμενα, διαφυγὲς σὺν ὄξει, συκαμίνου ῥίζα σὺν

Cap. CXXIII. Totius corporis scabiem aut partis cuiuspiam pruritus sanant haec illita: staphis agria cocta, deindeque cum sandaracha, oleo et aceto tenuiter contrita: alumen liquidum cum melle coctum, et addita myrrha inunctum: sal cum aceto et oleo illitus, donec sudor erumpat: sinapi cum aceto: quod ex unguentaria glande tusa expressaque reliquum est, cum aceto et paucō oleo: radicū lapathi agrestis decoctum lavacro mixtum, acetum calens affusum: decoctum ervi, aut origani, aut pulegii itidem affusum: lac denique scissile in potu sumptum.

Cap. CXXIV. Genitalium pruritus sanant aqua marina pro fotu adhibita, sulphur inspersum, sic et nitrum cum oleo, aceto et staphide agria: alumen ex aqua mulsa in balneo illitum, praesertim circa testes: faex etiam aceti arida tritaque cum vino testibus illita: sed postea albumen ovi cum melle inungendum est.

Cap. CXXV. Ad pruriginosas papulas haec peruncta conveniunt: diphryges cum aceto, mori radix ex



ὄξει, μίσυ σὺν ῥοδίνῳ, μολύβδαινα σὺν ὄξει· ὀπλαὶ αἰγῶν κεκαυμένοι σὺν ὄξει, στυπτηρία πᾶσα σὺν μέλιτι ἐψηθεῖσα, πήγανον σὺν ἅλσιν καὶ ἐλαίῳ, ἢ πήγανον σὺν κηρωτῇ μυρσινῇ τετραπλῇ, ψιμύθιον καὶ λιθάργυρος σὺν ὄξει, μυρσίνον ἔλαιον, δαφνίδων πῖσμα προσκλυζόμενον, μύρτα σὺν κηρωτῇ μυρσινῇ ἐν ὀθονίῳ ἐπιτιθέμενα, κιννάβαρις μετὰ κηρωτῆς, σμύρνη, νίτρον σὺν ὑεῖῳ στέατι, κισσοῦ φύλλα ἐφθὰ σὺν οἴνῳ καταπλασσόμενα, κριθαὶ κεκαυμένοι λεῖαι καταπλασσόμεναι, νίτρον σὺν θείῳ ἀπύρῳ, καὶ τρυξ σμωμένη.

Κε φ. ρκς'. Πρὸς δὲ τοὺς λειχήνας καὶ τὰ λεπρώδη καὶ ψωρώδη καταχρίομενα ἀρμόζει ἄγνου σπέρμα σὺν ἀφρονίτρῳ καὶ ὄξει, ἰχώρ ὁ ἀπορρέων ἐκ ξύλων ἀρχιελαίας ὑγρᾶς καιομένων· ὁμοίως καὶ ἐκ τῶν κραναΐων ξύλων· ἀγχούσης ῥίζα λεῖα σὺν ὄξει καταπλασσομένη, ἀδάρκης σὺν ὕδατι, ἐρυθροδάνου καρπὸς σὺν ὄξει, αἶρινον ἄλευρον σὺν ὄξει καταπλασσόμενον· ἀπίστησιν ἀγρίους λειχήνας πίτυρα σὺν ὄξει ἐψηθέντα, καὶ θερμὰ καταπλασθέντα· καὶ χόνδρος ὁμοίως.

aceto, misy cum rosaceo, plumbago cum aceto, ungulae caprarum ustae cum aceto, quodvis genus aluminis cum melle coctum, ruta cum sale et oleo, ruta cum cerato myrtino quadruplo, cerussa et lithargyrum cum aceto, myrtinum oleum, expressus baccarum lauri succus affusus, myrti baccae cum cerato myrtino in linteolo impositae, myrrha, nitrum cum adipe suillo, hederæ folia cum vino cocta et imposita: hordeum ustum tritumque, cataplasmatibus in modum adhibitum: nitrum cum sulphure vivo, faex denique affricta.

Cap. CXXVI. Ad lichenas seu impetigines ac leprae scabieque vitia faciunt haec illita: viticis semen cum spuma nitri et aceto, humor, quem sylvestris oleae ligna viridia, dum uruntur, exsudent, similiter et quae ex corni lignis accensis exstillat, anchusae radix trita cum aceto imposita, adarces cum aqua, rubiae semen cum aceto, loliacea farina cum aceto cataplasmatibus modo imposita. Feras autem impetigines tollunt furfures in aceto cocti et calentes impositi: similiter et chondrus.

Κεφ. ρκζ'. Πρὸς κνησμονήν ἐν λουτρῷ θέρμινον ἄλευρον μετὰ χαμαιμηλίνου ἐλαίου καὶ ὀλίγου ὄξους καταχρίεσθω ὁ πάσχων.

Κεφ. ρκη'. Λέπραν δὲ θεραπεύει αἶρινον ἄλευρον σὺν θείῳ καὶ ὄξει καταχρίομενον, βρυωνίας καρπὸς σὺν ὄξει καταπλασσόμενος· ἀσφάλτος μετὰ θείου καὶ ὄξους· τινὲς δὲ ἀντὶ ἀσφάλτου πίσσην· μυροβάλανον καταχρίομενον σὺν ὄξει· βατράχιον ἐπιπλασθὲν ἀφίστησι· σικύου ἀργίου ῥίζα σὺν ὄξει, σῶρι κεκαυμένον ὁμοίως, ἐλαίας αἰθιοπικῆς δάκρυον σὺν ὄξει· καλεῖται δὲ αἰθιοπικὴ ἐλαία ἢ ἀργία ἐλαία· ἐλλέβορος λευκὸς καὶ μέλας σὺν ὄξει καταπλασσόμενος, σμύρνα σὺν ὄξει, καὶ λίβανος ὁμοίως, ἀμμωνιακὸν ὁμοίως, ὅπως συκῆς ἐπιχρίομενος, ἐρέβινθος ἐφθὸς σὺν ὄξει ἐπιπλασσόμενος, ἀμύγδαλα πικρὰ σὺν ὄξει, ταυρόκολλα ὁμοίως, θαψίας χυλὸς καὶ ἡ ῥίζα σὺν ὄξει· θεῖον ἄπυρον σὺν ὄξει ἢ τερεβινθίνῃ ῥητίνῃ ἀναληφθὲν· θέρμων ἀφέψημα καταντλούμενον, ἰὸς διπλοῦς ἀναληφθεὶς ῥητίνῃ τερμινθίνῃ ἀπλῇ· εὐτονώτε-

Cap. CXXVII. Ad pruriginem lupini farina in balneo cum oleo chamaemelino et pauco aceto convenienter illinitur.

Cap. CXXVIII. Lepam vero sanant lolii farina cum sulphure et aceto illita, bryoniae fructus cum aceto more cataplasmatidis impositus, bitumen cum sulphure et aceto: (sunt qui pro bitumine picem usurpent:) glans unguentaria cum aceto illita: tollit et ranunculus impositus, cucumeris agrestis radix cum aceto, similiter et sory ustum: oleae aethiopicae (sic autem sylvestrem appellant) lacrima cum aceto: helleborus, tam albus quam niger, cum aceto impositus, myrrha cum aceto, ac tus eodem modo, pariterque ammoniacum, fici liquor illitus, cicer coctum ex aceto impositum, amygdalae amarae cum aceto, taurinum gluten eodem modo, thapsiae succus et radix cum aceto: sulphur vivum cum aceto aut subactum cum resina terebinthina: lupinorum decoctum affusum: aeruginis partes duae exceptae resinae terebinthinae parte una: (at efficacius redditur hoc remedium

ρον δὲ γίνεται τὸ φάρμακον, νίτρου ἢ χαλκάνθου μιγέντος ὀλίγου· καρδάμωμον ἢ κάρδαμον σὺν ὄξει, κληματὶς σὺν ὄξει καεῖσα καὶ καταπλασθεῖσα ἀφίστησι· καὶ κανθαρίς, βούπρηστις, πιτυοκάμπη ἀναληφθεῖσα, ῥήτινη καὶ πίσση μιγείσῃ· θαψίας ῥίζης κόμμι, ἀμυγδάλης πικρᾶς ἢ κερασίας, κοκκυμηλέας, ἢ ἀμπέλου σὺν ὄξει· κοχλίας χερσαῖος σὺν ὄξει κεκαυμένος, καὶ σὺν μέλιτι καταχριόμενος, λαπάθου ἀγρίου ῥίζα ὡμὴ καὶ μετὰ ὄξους ἐφθὴ λεία καταπλασσομένη· λειχὴν ὁ ἐπὶ ταῖς πέτραις, καταχρισθεὶς, ἢ σὺν ὄξει καταπλασθεὶς, χαμαιλέοντος μέλανος ῥίζα ἐψηθεῖσα σὺν ὄξει, μιγέντος τῷ ἀφειψήματι θείου καὶ ἀσφάλτου ἐγχριστομένη, ἢ δίχα τούτων· στέαρ φώκης καὶ χάλκανθος καὶ κέδρινον ἔλαιον μιγέντα, μελάνθιον μετὰ θείου ἀπύρου καὶ ταυροκόλλης καὶ ὄξους, ὁπὸς σιλφίου σὺν ὄξει.

Κεφ. ριθ'. Τὰς προσφάτους δὲ θεραπεύει τριφύλλου ῥίζα σὺν ὄξει καταπλασσομένη, ἢ πήγανον σὺν μέλιτι καὶ στυπτηρίᾳ ὁμοίως, πίσσα ὑγρὰ σὺν ἴσῳ κηρῷ καὶ ῥήτινῃ καὶ θείῳ τακεῖσα ὡς ἔμπλαστρος, πρασίῳ φύλλα ἐψηθέντα

addito nitri aut chalcanthi momento:) cardamomum aut nasturtium cum aceto. Clematis usta, et cum aceto imposita, lepras exterit. Idem praestant cantharides, buprestes, et pinorum erucac, resina et pice admixta: gummi radice thapsiae, amygdali amarae, cerasi, pruni aut vitis cum aceto: cochlea terrestris cremata cum aceto et melle illita: lapathi sylvestris radix, seu cruda, seu in aceto cocta, tritaque et imposita: lichen, qui petris innascitur, inunctus, aut cum aceto impositus, chamaeleonis nigri radix in aceto cocta sola per se, aut additis sulphure et bitumine inuncta: vituli marini adeps, admixtis chalcantho et oleo cedrino: melanthium cum sulphure vivo, glutine taurino et aceto: silphii denique liquor cum aceto.

Cap. CXXIX. Recentes vero lepras haec emendant: trifolii radix cum aceto imposita, similiter et ruta cum melle et alumine: pix liquida cum aequali portione cerae, resinae ac sulphuris ad emplastri formam redacta: mar-

σὺν ὄξει καὶ καταπρασθέντα, πτελέας φύλλα ἢ κλάδια ὁμοίως, ῥοιὰ σὺν ὄξει καταχριομένη, σκαμμωνίας ὁπὸς ἐψηθεὶς σὺν ὄξει, ἄχρως ἂν μελιτῶδης γένηται, καταχρίομενος, σκόροδον σὺν μέλιτι ὁμοίως, στρουθίου ῥίζα σὺν ἀλφίτῳ καὶ ὄξει καταπρασσομένη, στυπτηρία κεκαυμένη σὺν κράμβης χυλῷ, ἢ ὑγρὰ ἐψηθεῖσα σὺν μέλιτι καταχριομένη· τιθυμάλλου ὁπὸς καταχρίομενος, τρυῖ οἴνου κεκαυμένη, μετὰ συκῆς ἀφεψήματος καταχριομένη, χελιδονίου τοῦ μικροῦ ῥίζα καταπρασθεῖσα, γογγύλη λεία ἐπιτιθεμένη, ἱτέας φύλλα κεκαυμένα καὶ μεθ' ὕδατος ἐπιπρασσόμενα, ἄγχουσα ἀναληφθεῖσα βουτύρῳ, θεῖον ἄπυρον, μελάνθιον, ταυρόκολλα σὺν ὄξει καταχριομένη, ἀμμωνιακὸν σὺν ὄξει ὁμοίως, ἀμύγδαλα πικρὰ σὺν ὄξει ἐπιτιθέμενα, χαλκίτις ὠμὴ μετὰ κυπρίνης κηρωτῆς, μελίας φλοιὸς καὶς σὺν ἱρίνῳ ἢ κεδρίᾳ, ἢ πρόπολις ἐπιτιθέμενη ὡς ἔμπλαστρος.

Κεφ. ρλ'. Ὀνυχας δὲ ἀφίστησι λεπρούς ἐπιτιθέμενα ἀσφοδέλου ῥίζα λεία, ἄρου ῥίζα ὁμοίως, βατράχιον καταπρασθὲν, κανθαρίς, ἢ βούπρηστις, πιτυοκάμπη ἀναληφθεῖσα

rubii folia cum aceto cocta et imposita, ulmi folia et ramuli eodem modo: malum punicum cum aceto illitum, scammoniae liquor ad mellis crassitudinem in aceto coctus et illitus: pariter et allium cum melle, struthii radix cum polenta et aceto loco cataplasmatibus imposita: alumen ustum cum brassicae succo, aut ipsum liquidum cum melle coctum et inunctum: tithymali liquor illitus, faex vini usta et cum fici decocto adhibita, chelidonii minoris radix imposita, similiter et rapum contritum, salicis folia cremata et ex aqua illita, anchusa butyro excepta, sulphur vivum, melanthium, taurinum gluten cum aceto inunctum, simili modo et ammoniacum cum aceto, amygdalae amarae cum aceto impositae, chalcitis cruda cum cerato cyprino, fraxini cortex ustus cum irino aut cedria, propolis denique ceu emplastrum imposita.

Cap. CXXX. Ungues autem scabros detrahunt haec imposita: asphodeli radix trita, similiter et ari, ranunculus illitus: cantharis, aut buprestis, vel pityocampe, ex-



ρήτινῃ τερμινθίνῃ, ἢ πίσσης ὑγρᾶς μίγεισης· καὶ θαψίας ῥίζα καὶ σίνηπι σὺν ὄξει, ἢ ἀγριελαίας πυρήνων τὸ ἐντὸς ἀναληφθὲν στέατι, θείον ἄπυρον σὺν κηρῷ καὶ ῥήτινῃ, ἵππο-  
 λαπάθου ἢ ἀγρίου λαπάθου ῥίζα ὡμὴ καὶ ἐφθῇ σὺν ὄξει,  
 κάρδαμον σὺν ὄξει· κυπαρίσσου σφαιρία χλωρὰ καθεψηθέν-  
 τα σὺν ὄξει καὶ λεανθέντα σὺν θέρμοις πικροῖς· λινόσπερμον  
 σὺν καρδάμῳ καὶ μέλιτι, πίσσα ἐν ὄξει ἐψηθεῖσα καὶ ἐπιτε-  
 θεῖσα, πίσσα ὑγρὰ σὺν κηρῷ, σανδαράχῃ, ἄσβεστος, καὶ  
 τρυῖς κεκαυμένη σὺν πίσση ἢ ἱξῷ, στυπτηρίῳ σὺν ὕδατι, ἀρ-  
 σενικὸν σὺν ὄξει, ἢ ἱξὸς σὺν κονίᾳ.

Κεφ. ρλα'. Σμήχει δὲ ψώραν νίτρον, ἀφρόνιτρον, χο-  
 λὴ βοεία σὺν νίτρῳ καὶ κιμωλίᾳ, γῇ μηλία, κοχλίας χερσαῖος  
 κεκαυμένος σὺν μέλιτι· κρίνου ῥίζα ξηρὰ, λεία· μυροβάλανος  
 ὁμοίως, καὶ τὸ πῖσμα αὐτῆς.

*Τῶν κατὰ τοὺς μασθοὺς παθῶν βοηθήματα.*

Κεφ. ρλβ'. Πρὸς μασθοὺς, ὥστε μὴ γίνεσθαι μεγά-  
 λους, βοτάνην τὴν λεγομένην κρητικὴν, ἣν τινες καλοῦσιν

cepta resina terebinthina, vel admixta pice liquida: tha-  
 psiae radix et sinapi cum aceto, nucleorum olivae agre-  
 stis pars interior, excepta adipe, sulphur vivum cum  
 cera et resina: hippolapathi aut lapathi sylvestris radix,  
 seu cruda, seu cocta cum aceto: nasturtium cum aceto,  
 cupressi virentes globuli decocti cum aceto tritique cum  
 lupinis amaris, lini semen cum nasturtio et melle, pix in  
 aceto cocta et imposita, pix liquida cum cera, sandara-  
 cha, calx viva, faex usta cum pice aut visco, alumen ex  
 aqua, arsenicum cum aceto, aut viscum cum calce.

Cap. CXXXI. Scabiem tollunt nitrum, spuma ni-  
 tri, fel bubulum cum nitro, terra melia, cochlea terre-  
 stris cremata cum melle, lolii radix sicca trita, glans  
 unguentaria eodem modo, et succus, qui ex ea expri-  
 mitur.

*Remedia ad mammarum affectus.*

Cap. CXXXII. Mammæ cohibebis, quominus in magni-  
 tudinem excrescant, si herbam dictam, quam nonnulli ceticam

κώνειον αἶγυνον<sup>38</sup>, τρίψας μετὰ ψυχροῦ ὕδατος, κατάχρει-  
τους μασθοὺς. Δοκιμασία τοῦ φαρμάκου· αἰγιδίου μικροῦ  
κατάχρισον τὰ κέρατα, καὶ οὐκ αὖξουσι.

Κεφ. ρλγ'. Μασθοὺς δὲ οὐκ ἔα αὖξεσθαι, ἐπὶ παρ-  
θένων μάλιστα, καταπλασσόμενα κωνείου σπέρμα ἐγγυλον  
λεῖον, ὀθονίου προϋποτιθεμένου· καὶ ἡ πόα δὲ ὁμοίως·  
στυπτηρία ὑγρὰ σὺν μέλιτι, ἐπιμηλίδος φύλλα καταπλασσό-  
μενα ὁμοίως· ἀκόνης ναξίας τοῦ πρὸς αὐτὴν ἀκονηθέντος  
σιδήρου τὸ ἀπότριμμα, μετὰ ὄξους καταχριόμενον.

Κεφ. ρλδ'. Τὰς δὲ σπαργώσεις τῶν μασθῶν ἀποκαθί-  
στησι φακὸς ἐψηθὺς ἐν θαλάσῃ καὶ καταπλασσόμενος, ἡδύ-  
οσμον σὺν ἀλφίτῳ, στέμφυλα μετὰ ἁλῶν λείων, ἄλμη πε-  
πυρωμένη.

Κεφ. ρλέ'. Σβέννυσι δὲ γάλα καὶ μετὰ τοὺς τόκους  
ἄλευρον κυάμινον καθ' ἑαυτὸ καὶ σὺν ἀλφίτῳ καταπλασθὲν,  
κιμωλία σὺν ὄξει καταχριόμενη, ἢ ὕδατι καὶ ῥοδίνῳ· στυπτη-

38) Egregie iam Saracenus sic emendavit corruptelam. Vulgo τὴν  
λεγομένην κρητικὸν, ἣν τινες καλοῦσιν ἰριγέροντα.

dictam, quam nonnulli aegynon vocant, ex frigida con-  
triveris, et mammas illeveris. Probatio autem huius re-  
medii haec est: hoedi tenelli cornicula inungito, et non  
amplius crescent.

Cap. CXXXIII. Mammillarum, in virginibus po-  
tissimum, incrementum inhibent imposita haec: cicutae  
semen, dum succo plenum est, contritum, supposito prius  
linoleo. Idem et ipsa herba praestat eodem modo: alu-  
men liquidum cum melle, epimelidis folia similiter im-  
posita: denique quod e cote naxia exacuendo ferro de-  
teritur, ex aceto illitum.

Cap. CXXXIV. Turgentia lacteque distenta ubera  
compescunt lens in aqua marina cocta et more catapla-  
smatis imposita, mentha cum polenta, et vinacea cum sale  
trito: muria denique pro fomento adhibita.

Cap. CXXXV. Lac exstinguunt etiam post partum  
farina fabacea, tum per se, tum addita polenta imposita:  
cimolia cum aceto aut aqua et rosaceo illita: alumen li-

ρία ὑγρὰ σὺν ὕδατι, ὄξει, ῥοδίνου μιγνυμένου, γῆς σαμίας ὁ ἀστὴρ, γῆ μηλία ὁμοίως, γάλα γυναικείου μετὰ κωνείου χυλοῦ καταπλασσόμενον, τρυξ ὄξους ἢ αἰῖνου μετ' ἀλγίτου καταπλασθεῖσα· ὕοσκυάμου σπέρμα μετὰ οἴνου, λείον ὁμοίως· θάλασσα καταντλουμένη, κωνείου φύλλα καταπλασσόμενα, ἄλμη πυριωμένη, κάρυα βασιλικά καταπλασσόμενα.

Κεφ. ρλς'. Τοὺς δὲ χονδριῶντας μασθοὺς παύει πί-  
τυρα ἐν ὄξει καὶ πηγάνου ἀφειφήματι ζεσθέντα καὶ κατα-  
πλασθέντα, ἡδύοσμον σὺν ἀλγίτῳ, ἡμεροκάλλους φύλλα κα-  
ταπλασσόμενα, ἄλμη πυριωμένη, κάρυα βασιλικά σὺν μέλιτι  
καὶ πηγάνῳ, κρότιωνος φύλλα λεῖα, κρόκος σὺν γάλακτι  
καταχρίόμενος, κραταιόγονον καταπλασσόμενον, ἄλευρον κυά-  
μινον καθ' ἑαυτὸ, καὶ σὺν ἀλγίτῳ· λίθος γεώδης σὺν ὕδατι,  
λίθος ὀστρακίτης σὺν μέλιτι, κυδώνια ἐφ' ἃ σὺν μέλιτι κα-  
ταπλασσόμενα· σέλιγον καταπλασσόμενον.

Κεφ. ρλς'. Ὁφελεῖ δὲ καὶ τοὺς τεθρομβωμένους μα-  
σθοὺς, οὐκ ἔξ δὲ ἐπὶ τῶν τιθηνουσῶν γάλα τυροῦσθαι κη-

quidum cum aqua et aceto, addito rosaceo: terrae samiae  
aster, terra melia eodem modo, lac muliebre cum conii  
succo impositum, facx aceti aut vini adhibita cum po-  
lenta, similiter et hyoscyami semen cum vino tritum, ma-  
rinae aquae perfusio, conii folia imposita, muriae fomen-  
tum, nuces denique iuglandes impositae.

Cap. CXXXVI. Grumoso lacte turgentes mammas  
compescunt furfures in aceto et rutae decocto fervefacti  
et impositi, mentha cum polenta, hemerocallis folia im-  
posita, lotus ex muria, nuces iuglandes cum melle et ru-  
ta, ricini folia trita, crocus cum lacte illitus, cratacogo-  
num more cataplasmatismatis impositum, farina fabarum per  
se et cum polenta, lapis geodes ex aqua, ostracites cum  
melle, cotonea mala cocta cum melle, et in modum cata-  
plasmatis imposita, apium denique pari modo adhibitum.

Cap. CXXXVII. Distentis grumoso lacte mammil-  
lis prodest, praetereaque lac nutricum in casenum co-  
gi densarive prohibet cera candida, si eius grana de-

ροῦ λευκοῦ δέκα τὸν ἀριθμὸν κεγχριαῖα μεγέθη καθ' ἑκάστην ἡμέραν ἀντὶ καταποτίων διδόμενα.

Κεφ. ρλγ'. Κατασπᾶ δὲ γάλα πλεῖον ἵππομαράθρου ἢ μαράθρου ἀπέψημα μετὰ οἴνου πινόμενον· κέγχρος, ἐρέβινθος, ὠκιμον, μαλάχη, ἄνηθον, συνεψηθέντα ῥοφήματι· κηραΐας καρπὸς ὁμοίως· μελάνθιον ὀλίγον πινόμενον ἐφ' ἱκανὰς ἡμέρας, καὶ σὺν ῥοφήματι δὲ λαμβανόμενον· ὀνώνιδος ῥίζα σὺν ῥοφήματι ἐψηθεῖσα καὶ λαμβανομένη· γλανκὸς τῆς βοτάνης τοὺς κλάδους καὶ τὰ φύλλα καὶ τὰ ἄνθη ἐψήσας ἐν ῥοφήματι δίδου· ἀλίμου χυλίσματος, ἢ σόγχου, ἢ βουγλώσσου, ἢ θριδάκος δίδου κυάθους β', καὶ ὕδρομέλιτος κύαθον ἓνα ἐπὶ ἡμέρας ζ'· καὶ ἀφεψηθέντα δὲ τὰ λάχανα σὺν κυμίνου ἀλεύρῳ καὶ λαμβανόμενα ποιεῖ· πολύγαλον πινόμενον, καὶ πρασίου πόας τὰ φύλλα ἐσθιόμενα.

Κεφ. ρλδ'. Καταπλασσόμενα δὲ γάλα κατασπᾶ σὺν ἀλεύρῳ κριθίνῳ μάραθρον, μελάνθιον, κριθῶν βεβρεγμένων κυλὸς σὺν ἀνδράχνῃ· κηρὸς καὶ σμύρνα, καὶ στέαρ χήνειον

cem miliari magnitudine pilularum instar quotidie deglutiantur.

Cap. CXXXVIII. Lactis abundantiam faciunt hippomarathri seu ipsius sativi foeniculi decoctum ex vino bibitum, milium, cicer, ocimum, malva et anethum, incocta sorbitionibus: circaeae semen eodem modo: melanthium parcius bibitum plusculis diebus, et cum sorbitione sumptum: iusculum, cui radix ononidis incocta fuerit, sorbitione sumptum. Aliud: glaucis herbae ramulos, folia et flores coquito, et in sorbitione dato. Aut: succum halimi, aut sonchi, buglossive, aut lactucae, cyathorum duorum mensura, cum aquae mulsae cyatho uno diebus septem propinato. Idem praestant haec eadem olera cocta et cum cymini farina sumpta: polygalum quoque bibitum, et marrubii folia esitata.

Cap. CXXXIX. Lac uberius attrahunt mammis, imposita cum farina hordeacea, foeniculum et melanthium, hordei macerati cremor, et portulacae succus: cera, myr-



καὶ θαῖον μίγντα· πετέας φύλλα, τάυρου χολή καὶ ἡπαρ σπλὴν ὄνου σὺν ὄξει.

Κεφ. ρμ'. Τὰς δὲ φλεγμονὰς τῶν μασθῶν παρηγορεῖ ἀσφοδέλου ῥίζα καὶ τὰ φύλλα ἐν οἴνῳ ἐφθὰ καταπλασσόμενα· βακχάριδος φύλλα καταπλασσόμενα. Γυναικὸς ἐὰν οἱ μασθοὶ ὀγκωθῶσιν, αἰγὸς ἀφόδευμα ξηρὸν ἐψήσας μετὰ ἀκράτου κατάντησον, καὶ λύει τὴν φλεγμονήν.

Τῶν κατὰ τοὺς διδύμους παθῶν βοηθήματα.

Κεφ. ρμά. Τὰς δὲ τῶν διδύμων φλεγμονὰς ἴαται τρυγὸς οἴνου μεθ' ἁλῶν καταπλασθεῖσα, ὑοσκυάμου καρπὸς μετὰ οἴνου λείος· ἢ κιμωλία σὺν ὄξει καὶ ῥοδίνῳ γλοιώδῃ καταχρίόμενα· ὁμοίως ἀστὴρ σάμιος καταχρίόμενος, ἢ λίθος γεώδης σὺν ὕδατι, ἢ ἐρεβίνθου ἄλευρον ἐν ἀκράτῳ ἐψηθὲν, ἐρεβίνθοι ἐφθοὶ καταπλασσόμενοι, ἡριγέροντος ἄνθος σὺν γλυκεῖ, καὶ ἡ πόα καταπλασσομένη, καὶ οἱ πάπποι ὁμοίως· κορίου φύλλα σὺν σταφίδι, κρίνου ῥίζα σὺν ὑοσκυάμου φύλλοις καὶ ἀλεύρῳ πυρίνῳ, κυάμινον ἄλευ-

rha, adeps anserinus et sulphur simul mixta: ulmi folia, bovis fel et hepar, splen asini cum aceto.

Cap. CXL. Mammarum inflammationes mitigant asphodeli folia cum radice in vino cocta et imposita, similiter et baccharidis folia. Quod si mulieris mammae intumuerint, caprino stercore arido cocto cum meraco eas foveto, et sedabitur inflammatio.

### *Remedia ad testium affectus.*

Cap. CXLI. Testium autem inflammationibus medentur faex vini cum sale in modum cataplasmatism imposita, hyoscyami semen tritum cum vino: cimolia terra cum aceto et rosaceo ad strigmenti crassitudinem redacta et illita: aster samius simili modo illitus, geodes lapis ex aqua, ciceris farina in mero cocta, aut cicer ipsum coctum, cataplasmatism instar impositum: senecionis flos cum passo, et ipsa quoque herba imposita, nec non et eiusdem pappi similiter: coriandri folia cum uva passa, lilii radix

ρον ἐψηθὲν ἐν οἴνῳ σὺν κυμίνῳ καὶ σταφίδι, ἢ κηρίῳ, ἢ κηρωτῇ κυπρίνῃ, ἢ λινόσπερμον ἐν οἶνομέλιτι ἐφθῶ, ἢ μελίλωτον ἐν γλυκεῖ ἐφθόν, μυρσίνης φύλλα σὺν κηρωτῇ, σταφίς λευκὴ σὺν νίτρῳ ἢ ἀφρονίτρῳ. πῆγανον σὺν κλάδῳ δάφνης ἀπαλῆς, βράθυος φύλλα σὺν ὕδατι καταπλασσομένα, σπλάχνον τὸ καλούμενον βρούον ὁμοίως, ἢ τὸ θαλάσσιον βρούον ἄγρου σπέρμα μετὰ βουτύρου καὶ ἀμπέλου φύλλων, ἀκτῆς φύλλα ὁμοίως, ἀσφοδέλου ῥίζα καὶ φύλλα ἐψηθέντα ἐν οἴνῳ.

Κεφ. ρμβ'. Τὰς δὲ χρονίας φλεγμονὰς τῶν διδύμων λύσει ἄσσιος λίθος περιεπτόμενος ἐν ἐρίῳ ξηρῷ, ἀλθαίας ῥίζα ἐφθῇ καταπλασσομένη, ἐρύσιμον ἐφθόν λεῖον, νίτρον ὀπτὸν διεθὲν ἐν ἐλαίῳ, ὡς ἐλαιῶδες ἐπιτιθέμενον ἐν σπληνίῳ, ἄλευρον κριθινόν σὺν πίσσῃ ὑγρᾷ. Πυριῶνται δὲ ὡφελίμως κυπαρίσσου ἀφεψήματι.

Κεφ. ρμγ'. Τὰς δὲ ἐκσαρκώσεις τὰς ἐπὶ τῶν διδύμων τέφρα κληματίνῃ σὺν νίτρῳ φυραθεῖσα καὶ ὕδατι ἰᾶται καταπλασσομένη.

cum hyoscyami foliis et farina triticea: fabacea farina cocta in vino cum cumino et uva passa, aut favo, aut cerato cyprino: lini semen in vino mulso coctum, melilotus in passo coctus, myrti folia cum cerato: uva passa alba cum nitro aut spuma nitri, ruta cum lauri tenellae ramulo, sabinae folia ex aqua imposita: splachnon, quod bryon dicitur, eodem modo, aut etiam muscus marinus: viticis semen cum butyro et foliis vitigineis, sambuci folia simili modo, asphodeli denique folia cum radice in vino decocta.

Cap. CXLII. Diuturnas porro testium inflammationes haec solvunt: assius lapis appensus in lana sicca, althaeae radix cocta et cataplasmatibus modo imposita, erysimon coctum tritumque, nitrum torrefactum, oleo solutum, ovi oleosus humor in splenio impositus, farina hordeacea cum pice liquida. Utiliter etiam testes cupressi decocto foventur.

Cap. CXLIII. Testium excrescenti carni medetur cinis sarmentitius cum nitro et aqua subactus et more cataplasmatibus impositus.

Τὰ ποικίλων τῶν παρὰ φύσιν ὄγκων, τραυμάτων καὶ ἑλκῶν βοηθήματα.

Κεφ. ρμδ'. Δοθιῆνας δὲ συμπέσσει ταχέως καὶ ῥήσσει ὀρμίνου σπέρμα, ἢ τὰ φύλλα καταπλασθέντα μετὰ ἀλφίτου, ναρκίσσου ῥίζα λεία μετὰ ἀλεύρου καὶ ἐλαίου, ἄλεις σὺν στέατι βοεῖῳ καὶ σταφίδι, ὀρίγανον σὺν ζύμῃ καὶ ἄλσι, καὶ ἱξὸς σὺν ῥητίνῃ καὶ κηρῷ ἴσως τακείς, κάρδαμον σὺν ἄλμῃ, χαλβάνῃ καθ' ἑαυτὴν, τερμινθίνῃ ὁμοίως, λάδανον ὁμοίως, πρόπολις ὁμοίως, λεοντοποδίου ὁμοίως φύλλα σὺν ἀλφίτῳ, λινόσπερμον σὺν σικύου ἀγρίου ῥίζᾳ, ἄσσιος λίθος σὺν κηρωτῇ, νίτρον ἢ ἀφρόνιτρον σὺν ῥητίνῃ ἢ στέατι, συκῆς φύλλα ἢ κρόδαι ἀπαλαὶ σὺν κηρωτῇ, πυκνοκόμου φύλλα σὺν ἀλφίτοις συγκεκομμένα, ἢ σὺν νίτρῳ· ζύμῃ μεθ' ἁλῶν ἢ νίτρου, σταφίς μεθ' ἁλῶν, θεῖον καὶ πήγανον σὺν κηρωτῇ, ὑοσκυάμου φύλλα μετὰ βουτύρου.

Κεφ. ρμέ'. Πρὸς δὲ τὰς ἐν ἀρχῇ φλεγμονὰς παντὸς μέρους ἀρμόζει μετὰ ἀλφίτου λεῖα καταπλασσόμενα ἀεῖζων, ἀνδράχην, ἀμπέλου ἑλικίς καὶ φύλλα, καὶ ὁ ἀπὸ τῶν τελ-

*Variorum tumorum praeter naturam, vuln-  
rum ulcerumque remedia.*

Cap. CXLIV. Furunculos celeriter maturant et rumpunt homini semen, aut folia imposita cum polenta, narcissi radix trita cum farina et oleo, sal cum sebo bubulo et uva passa, origanum cum fermento et sale, viscum cum resina et cera aequali mensura liquatum, nasturtium cum muria, galbanum per se, similiterque resina terebinthina, ladanum eodem modo, sic et propolis, leontopodii folia cum polenta, lini semen cum cucumeris agrestis radice, lapis assius cum cerato, nitrum seu spuma nitri cum resina vel adipe, fici folia aut tenelli surculi cum cerato, pycnocomi folia cum polenta contusa, vel cum nitro, fermentum cum sale aut nitro, uva passa cum sale, sulphur et ruta cum cerato, hyoscyami denique folia cum butyro.

Cap. CXLV. Incipientibus cuiusvis partis inflammationibus conveniunt haec trita et cum polenta imposita: sempervivum, portulaca, vitium capreoli et folia, lens

μάτων φακός, κόριον, κράμβη μετὰ ἄρτου, καὶ ἐφθὴ μετὰ ἀλφίτου· ἴου φύλλα, στρύχνον, καλάμου φύλλα χλωρὰ, κεδρίδες λείαι, καὶ ἀρνόγλασσον, ἐλξίνη, ἡδύοσμον, θέρμινον ἄλευρον, κονύζης φύλλα, κολόκυνθα ὠμὴ, κοτυληδῶν, κραταιόγονον, κυπαρίσσου φύλλα καὶ σφαιρία χλωρὰ, μανδραγόρου ῥίζα, ξανθοῦ καρπός, πυκνοκόμου φύλλα σὺν ὀξυμέλιτι, ἄλευρον κρίθινον ἢ ζείνον ἐν ὄξει ἐψηθὲν, ἢ κυδωνίου ἀποζέματι· σόγχος καταπλασθεὶς, στυπτηρία σχιστὴ, καὶ πᾶσα σὺν μέλιτι· ἐρεβίνθου τὰ ἀπαλὰ φύλλα καταπλασόμενα.

Κεφ. ρμζ'. Τὰς δὲ ἐν μήνιγγι φλεγμονὰς ἰδίως στέλλει ἀκτῆς τῶν φύλλων ὁ χυλὸς ἐπιχριόμενος, βούτυρον πρόσφατον ἐπιτιθέμενον σὺν ῥοδίνῳ.

Κεφ. ρμζ'. Τὰ δὲ χρόνια οἰδήματα ἱᾶται καταπλασόμενα, ἀκάνθης λευκῆς ῥίζα λεία σὺν ὕδατι, καὶ τῆς ἀραβικῆς ἀκάνθης, σελίνου φύλλα καὶ τὸ σπέρμα μετὰ ἀλφίτου, ἀπόπατος τράγου ἢ αἰγὸς ἐν ὄξει θερμῷ, βηγίου φύλλα καθ' ἑαυτὰ, ναρκίσσου ῥίζα λεία μετὰ ἀλεύρου καὶ ἐλαίου, παρθενίου φύλλα, δαμασσωνίου ὁμοίως,

palustris, coriandrum, brassica cum pane et cocta cum polenta, violae folia, solanum, arundinis folia viridia, cedri fructus contriti, plantago, helxine, mentha, lupinorum farina, conyzae folia, cucurbita cruda, umbilicus Veneris, crataegonum, viridia cupressi folia et globuli, mandragorae radix, xanthii fructus, pycnocomi folia cum aceto mulso, farina hordei aut zaeae cocta in aceto aut cydonii decocto, sonchus impositus, alumen scissile omneque aliud cum melle, ciceris denique tenera folia cataplasmatibus instar imposita.

Cap. CXLVI. Meningis inflammationes peculiariter inhibet sambuci foliorum succus illitus, nec non et butyrum recens cum rosaceo impositum.

Cap. CXLVII. Diuturnis tumoribus seu oedematis haec medentur, more cataplasmatum imposita: spinae albae, seu etiam arabicae radix trita ex aqua, apii folia et semen cum polenta, fimus hirci aut caprae cum aceto calente, tussilaginis folia per se, radix narcissi trita cum



ἁλικακάβου ῥίζα ἐφθῇ, ἄρου φύλλα σὺν ἁλφίτῳ, ἀρκενθίδες λείαι· ἰσάτεως φύλλα ἀγρίου καὶ ἡμέρου, ἰτέας φύλλα, κάλαμος ἀρωματίτης λείος σὺν ἁλφίτῳ, δαφνίδες σὺν πάλῃ ἁλφίτου, δίκταμνον σὺν ἁλφίτῳ, ἐρυθροδάνου ῥίζαι ἐφθαί καὶ ὠμαί, ἐρύσιμον σὺν ὕδατι ἢ μέλιτι, σμυρνίου ῥίζαι, ζύμη μεθ' ἁλῶν, ἱξὸς σὺν ῥητίνῃ καὶ κηρῷ ἴσοις, πυρία ἢ διὰ θαλάσσης, κάρδαμον λείον, κριθινον μετὰ ἁλφίτου, λιβανωτίδος ῥίζα καὶ φύλλα, λινόσπερμον σὺν μέλιτι καὶ στέατι αἰγίῳ, μελάνθιον σὺν ὄξει, ἐρεβίνθου ῥίζα ἐφθῇ, στρατιώτης ὁ ἀπὸ τῶν ὑδάτων σὺν λιβανωτῷ, τραγορίγανον σὺν ἁλφίτῳ, τρῦξ οἴνου μετὰ ἁλφίτου ἢ κριθίνου καὶ μάννης ἐν οἴνῳ ἐψηθεῖσα, φλόμου φύλλα ἐφθαί, ψυλλίου σπέρμα λείον, σῦκα ζηρὰ σὺν νίτρῳ ἢ ἀσβέστῳ, ἢ ἰριδι, πενταφύλλου ῥίζα ἐν οἴνῳ ἐφθῇ· σκίλλα ὀπτῇ· διὰ τετάρτης δὲ δεῖ λύνειν· σικύου ῥίζα ἐφθῇ καταπλασσομένη, μυοσωτὶς μετὰ κηρωτῆς ῥοδίνης, ἐλξίνη ὁμοίως καὶ ὁ ἐπὶ τῶν τελμάτων φακὸς λείος.

Κεφ. ρμη'. Παρωτίδας δὲ λύει ἐν ἀρχῇ μὲν βούτυρον

farina et oleo, parthenii folia, similiterque damasonii, halicacabi radix cocta, ari folia cum polenta, iuniperi baccae tritae, isatidis folia, tam sativae quam sylvestris, salicis folia, calamus aromaticus tritus cum polenta, lauri baccae cum polentae polline, dictamnus cum polenta, rubiae radices, tum coctae, tum etiam crudae, erysimum cum aqua aut melle, smyrnii radices, fermentum cum sale, viscum cum aquis cerae resinaeque portionibus, fomentum ex aqua marina, nasturtium tritum, hordeacea farina cum polenta, libanotidis radix et folia, lini semen cum melle et sevo caprino, melanthium cum aceto, ciceris radix cocta, stratiotes aquaticus cum ture, tragoriganum cum polenta, faex vini cum polenta farinave hordeacea aut manna in vino cocta, verbasci folia cocta, psyllii semen tritum, caricae cum nitro aut calce viva aut iride, quinquefolii radix in vino cocta, scilla tosta, (sed haec quarto post die soluto vinculo removenda,) cucumeris radix cocta et imposita, muris auricula cum cerato rosaceo, helixine eodem modo, lens denique palustris trita.

Cap. CXLVIII. Parotidas solvunt butyrum inter

ἐν ἐρίῳ ἐπιτεθὲν, λινόσπερμον σὺν μέλιτι καὶ στέατι αἰγείῳ, κνίδης φύλλα σὺν ἄλσιν, ἀρνόγλωσσον λεῖον ὁμοίως, βαλλωτὴ σὺν στέατι χοιρείῳ παλαιῷ μετὰ ὄξους, ἐρύσιμον σὺν ὕδατι· πυρία δὲ διὰ θαλάσσης· ἱξὸς σὺν ῥητίνῃ καὶ κηρῷ, κυάμινον ἄλευρον σὺν τηλίνῳ ἀλεύρῳ καὶ μέλιτι, λαπάθου ῥίζα ἐν οἴνῳ ἐφθῇ, στρύχνου φύλλα μετὰ ἁλῶν, πήγανον λεῖον ἀναληφθὲν κηρωτῇ ῥοδίνῃ, θείον ἄπυρον ὁμοίως· ἢ ῥητίνης ὁμοίως μέρη β', χαλβάνης μέρος α', νίτρῳ ὥς ὅτι πλείστω συμμαλαχθέντα· ἢ πύρεθρον, ἢ ψιμύθιον, ἢ χάλκανθον σὺκῳ ἀναληφθὲν καὶ οἴνῳ, ἄσβεστος μετὰ μέλιτος, γαλῆς ζώσης καεῖσης τέφρα μετὰ κηρωτῆς ἱρίνης, γλαυκὸς τοῦ ὀρνέου ἐγκέφαλος καταχοριόμενος· ὄλυνθοι ἀπὸ ἀγρίας συκῆς ἐφθέντες, ἤγουν ἐψηθέντες ἐν οἴνῳ, λεῖοι καταπλασθέντες.

Κεφ. ρμδ'. Διαφορεῖ δὲ φύματα καταπλασσόμενα ἀδιάντον, ἀτράφαξις, ταύρου αἷμα σὺν ἀλφίτῳ, ἀκτῆς ῥίζα, ἐλξίνης ὁμοίως, ἀλθαίας ῥίζα ἐν οἴνῳ ἐψηθεῖσα, ὑοκνάμου φύλλα σὺν ἁλσὶ λεῖα, βρυωνίας ῥίζα λευκῆς καὶ μελαίνης μετὰ πάλης ἀλφίτου, σικύου ἀγρίου ῥίζα ὁμοίως, ἀμμωνια-

initia impositum in lana, lini semen cum melle ac sevo caprino, urticae folia cum sale, plantago eodem modo, marrubium nigrum cum adipe suillo vetere et aceto, erysimon ex aqua, fots ex aqua marina: viscum cum resina et cera, fabarum farina cum foeni graeci farina et melle, lapathi radix in vino cocta, solani folia cum sale, ruta trita, cerato rosaceo excepta, sulphur vivum ad eundem modum: resinae partes duae, galbani pars una cum nitro quamplurimo subactae: pyrethrum, cerussave, aut chalcanthum, si cum ficu et vino subigatur: calx viva cum melle, mustelae, quae viva cremata sit, cinis cum cerato irino, noctuae cerebrum illitum: grossi denique e capriflico cocti aut in vino decocti, deindeque triti, et pro cataplasmate impositi.

Cap. CLIX. Tubercula, quae phymata Graecis dicuntur, discutiuntur impositis hisce: adianto, atriplice, taurino sanguine cum polenta, sambuci radice, similiter et helxines, althaeae radice in vino cocta, hyoseyami foliis cum sale tritis, bryoniae tum albae tum nigrae radice

κὸν μετὰ μέλιτος μαλαχθὲν καὶ ἐπιτεθὲν, ἀπόπατος βοὸς ἐν ὄξει θερμανθεὶς καὶ ἐπιτεθείς, ἀρνόγλωσσον μετὰ ἁλῶν λείων, ἀσφοδέλου ῥίζα ἢ τὰ φύλλα ἐφθὰ ἐν οἴνου τρυγί, θύμος ἢ θύμβρα μετὰ πάλης ἀλφίτου, κιμωλία μετ' ὄξους ἐπιχριομένη, ἡρυγγίου ῥίζα καταπλασσομένη, ἢ ἱξὸς σὺν ῥητίνη καὶ κηρῷ, ἰτέας τὰ φύλλα ἀναληφθέντα κηρωτῇ, κορυζης φύλλα, σιλφίου ῥίζα σὺν κηρωτῇ, σκαμμωνίου ὁπὸς σὺν μέλιτι, στρουθίου ῥίζα λεία σὺν ἀλεύρῳ κριθίνῳ ἐψημένη, στέαρ ταύρειον σὺν μάννῃ· στέαρ χοίρειον παλαιὸν, πλυθὲν οἴνῳ, καὶ ἀναληφθὲν τέφρᾳ ἢ ἀσβέστῳ· συκαμίνου ὁπὸς μετὰ κηρωτῆς, θέρμινον ἄλευρον καταπλασθὲν εἰς μέλι ζέον, ἀσβεστοῦ μιγείσης, ἐπιτιθέμενον· κρόμβη ὠμὴ μετὰ ἀλφίτου, κυπαρίσσου σφαιρία μετὰ ὠοῦ κοπέντα.

Κε φ. ρν'. Ἐκπέττει φύματ' ἀβρότονον ἐψηθὲν σὺν ὠμῇ λύσει, ἄγνου σπέρμα ὁμοίως, σῦκα ξηρὰ μετὰ νίτρου, καὶ σῦκον ἐψηθὲν μελικράτῳ ὁμοίως· καὶ πύρινον καὶ ζείνον, λινόσπερμον, αἶρινον, καὶ σὺν περιστερεῶς κόπρῳ ἐψηθέντα καὶ νίτρῳ· λινόσπερμον μετὰ οἶνομέλitos ἐψηθὲν· γύρις με-

cum polline polentae, cucumeris agrestis radice eodem modo, ammoniaco cum melle subacto, fimo bubulo in aceto calfacto, plantagine cum sale trito, asphodeli radice foliisve in vini faece coctis, thymo vel thymbra cum polentae polline, cimolia terra cum aceto illita, eryngii radice apposita, aut visco cum resina et cera, salicis foliis cerato exceptis, conyzae foliis, silphii radice cum cerato, scammoniae liquore cum melle, struthii radice trita et cum farina hordeacea cocta, sevo taurino cum manna, suillo adipe antiquo, vino eloto et cum cinere aut calce viva subacto: mori liquore cum cerato: lupinorum farina cum ferventi melle in cataplasmatibus formam redacta, addita etiam calce viva: brassica cruda cum polenta, compressi denique globulis cum ovo tussis.

Cap. CL. Tubercula concoquunt abrotanum cum farina cruda coctum, viticis semen eodem modo, caricae siccae cum nitro, eadem in aqua mulsa coctae: tritici, zae, lolii ac seminis lini farinae cum fimo columbino et nitro coctae: lini semen cum vino mulso coctum:

τὰ πίσης καὶ ἐλαίου καὶ ὕδατος ἢ ὄξους ἐψηθεῖσα· ζύμη μετὰ ἀλῶν, θέρμοι ἐν ὄξει ἐφθοὶ καταπλασθέντες· χαλβάνη καθ' ἑαυτὴν, λινόσπερμον μετὰ θείου καὶ ἵρεως· ἄσσιος λίθος σὺν κηρωτῇ· ἐξικμάζει δὲ καὶ τὰ ὑπώπια.

Κε φ. ρνα'. Ῥήσσει δὲ φύματα θαψίας χυλὸς μετὰ θείου καταχρίομενος, ναρκίσσου ῥίζα σὺν μέλιτι καὶ αἰρίνῳ ἀλεύρῳ καταπλασθεῖσα, πρόπολις, θέρμοι μετὰ ὄξους ἐφθοὶ καταπλασθέντες, σικίου ἀγρίου ῥίζα ἀναληφθεῖσα ῥήτινῃ τερμινθίνῃ, καππάρεως ῥίζα ὁμοίως, νίτρον μετὰ ζύμης ἢ σύκων, ἄλεις ὁμοίως, κανθαρίς ἀναληφθεῖσα ῥήτινῃ.

Κε φ. ρνβ'. Τὰς δὲ ἐντὸς ἀποστάσεις ῥήσσει θάλασσα ποθεῖσα μετὰ μελικράτου.

Κε φ. ρνγ'. Καὶ σκληρίαν μαλάσσει λίθος πυρίτης κεκαυμένος, ἀναληφθεὶς ῥήτινῃ τερεβινθίνῃ, ἢ διαφογῆς ὁμοίως, ἄσσιος λίθος ὁμοίως, μόρου τοῦ δένδρου χυλὸς· ἐγκόπτεται δὲ ἰσχυρῶς ἢ ῥίζα, καὶ τῇ ὑστεραίᾳ εὐρίσκεται ἐπίπαγος· ξιφίου ῥίζα σὺν ὀξυμέλιτι, ὀνόβρυχis καταπλασσομένη, ὄξος

pollen cum pice, oleo et aqua aut aceto coctus: fermentum cum sale, lupini in aceto cocti et impositi, galbanum per se, lini semen cum sulphure et iride: lapis denique assius cum cerato, qui quidem hypopya etiam exsiccat.

Cap. CLI. Tubercula vero rumpunt thapsiae succus cum sulphure illitus, narcissi radix cum melle farinaque loliacea imposita, propolis, lupini in aceto cocti et more cataplasmatibus impositi, cucumeris agrestis radix, excepta resina terebinthina, capparis radix eodem modo, nitrum cum fermento aut ficubus, similiter et sal: cantharis denique cum resina subacta.

Cap. CLII. Internos autem abscessus rumpit aqua marina cum mulsa epota.

Cap. CLIII. Duritias emolliunt pyrites lapis ustus, resina terebinthina exceptus: diphryges eodem modo, sic et lapis assius, itemque lycium: mori arboris liquor, qui quidem altius incisa radice postridie concretus reperitur: gladioli radix cum aceto mulso, onobrychis imposita,



θερμὸν καταντλούμενον, σπόγγος ὅξει διερός, μάλιστα ἐπὶ τῶν ἐναίμων ἀποστημάτων, ὀρίανον σὺν μέλιτι, πολίου ῥίζα ὁμοίως, πίσσα ὑγρὰ σὺν κηρῷ τακεῖσα, πλατάνου φλοιὸς ἐξηθὸς καὶ τὰ φύλλα, ῥητίνη τερμινθίνη σὺν στέατι· σησαμοειδοῦς σπέρμα, γλόμου φύλλα, πενταφύλλου ῥίζα· σῦκον ξηρὸν λιπαρὸν, ἐν θαλάσῃ ἐψηθὲν, λεῖον.

Κεφ. ρηδ'. Χοιράδας διαφορεῖ ἄσβεστος μέλιτι ἢ γλοιῷ ἀναληφθεῖσα, ἢ ἐλαίῳ, ἢ ἄξουγγίῳ, καὶ ἐπιτεθεῖσα· ἄσφαλτος μετὰ γλοιῷ, ἀπόπατος αἰγὸς ἐν ὅξει ἢ οἴνῳ ἐψηθεῖσα, θερμὴ ἐπιτιθεμένη ὁμοίως, ἀρνόγλωσσον μετὰ ἁλῶν καταπλασσόμενον, ἀδιάντον ὁμοίως, ἁλθαία ἐν οἴνῳ ἐφθή· κρίθινον ἄλευρον ἐν πίσσῃ καὶ οὐρῷ παιδὸς ἀφθόρου καὶ ἐλαίῳ καὶ κηρῷ ἐψηθέντα· αἶρινον ἄλευρον μετὰ κόπρου περισσεῶς, καὶ λινόσπερμον ἐν οἴνῳ ἐψηθέντα· μανδραγόρου ῥίζα ὁμοίως, μελισσόφυλλον σὺν ἁλσίν· ἔχιν ἀποδήσας λίνῳ κρέμασον, ὅπως ἀποθάνῃ· εἶτα λύσας τὸ λίνον περιάψον τῷ τραχήλῳ· διαφορεῖ καὶ ἀμμωνιακὸν οἴνῳ διεθὲν καὶ ἐπιτεθέν· βαλλωτῇ, ἣν τινες μέλαν πράσιον καλοῦσι, σὺν ἁλσίν· ἀπα-

fotus ex aceto calente, spongia aceto madens, (sed huius potissimum est usus in cruentis apostematis:) origanum cum melle: similiter et polii radix, pix liquida, liquata cum cera, platani cortex coctus, itidemque folia: resina terbinthina cum adipe, sesamoidis semen, verbasci folia, quinquifolii radix: carica denique pinguis, cocta in aqua marina et contrita.

Cap. CLIV. Strumas discutiant calx viva, excepta melle, aut strigmento, oleove, aut axungia, et imposita: bitumen cum strigmento, finus caprinus in aceto aut vino coctus, calensque similiter impositus, plantago cum sale imposita, pariter et adiantum, althaea in vino cocta: hordei farina in urina pueri Venerem haud experti macerata, exceptaque pice, oleo et cera liquatis: lolii farina cum stercore columbino linique semine in vino cocta: similiter et mandragorae radix, nec non et apiastrum cum sale. Collo linum circumligato, quo praeligata vipera pependerit, donec exanimata fuerit. Dissipat et strumas ammoniacum vino dilutum et impositum: ballote, quam

ρίνη ὁμοίως, ἐλξίνη ὁμοίως· ὄνυχες βοῶν, ὄνων, ἢ ἵππων κεκαυμένοι, ἐλαίῳ φυραθέντες· ὄστρακον ἵππου κηρωτῇ ἀναλφθέν, πενταφύλλου ῥίζα ὁμοίως λεία σὺν λιβανωτῷ καὶ ἁλοῖν ὀλίγοις, πέπερι σὺν πίσσῃ, σιλφίου ῥίζα σὺν κηρωτῇ, σκίλλα ὀπτῇ σὺν κηρωτῇ· διὰ τετάρτης δὲ λίε· ὄλυνθοι ἄγριοι καὶ ἡμεροὶ ἐφθοὶ, λεῖοι καταπλασσόμενοι, καὶ πᾶσαν συστροφὴν διαφοροῦσι· στύραξ μαλαχθεὶς καὶ ἐπιτεθεὶς, ἀπαρίνη μετὰ ἄξουγγίου, ἴρις ἐφθῇ καταπλασθεῖσα, ἐρύσιμον σὺν ὕδατι ἢ μέλιτι, ἐχίδνη ἐφθῇ ἐσθιομένη, πυρία διὰ θαλάσσης, θέρμοι ἐφθοὶ λεῖοι, ἱξὸς σὺν ῥητίνῃ καὶ κηρῷ, καππάρεως ῥίζα καὶ τὰ φύλλα χλωρὰ λεία σὺν πάλῃ ἀλφίτου, καρκῖνοι ποτάμιοι κεκαυμένοι σὺν μέλιτι, κορίου φύλλα σὺν ἐρεγμῷ, κυάμων ἐλληνικῶν λέπυρα μετὰ σχιστῆς καὶ ἐλαίου καὶ πάλῃς ἀλφίτου, λαπάθου ἄγριου ῥίζα μετὰ οἴνου ἐφθῇ, λιβανωτίδος φύλλα, λινόσπερμον μετὰ νίτρου, ἢ ἁλὸς, ἢ κοινίας· λίθος πυρίτης κεκαυμένος, ἀναλφθεὶς ῥητίνῃ τερμινθίνῃ, ἄσσιος λίθος ὁμοίως, φακὸς ἐν ὄξει ἐψηθεὶς· καταχρίονται δὲ ὠφελίμως χοιράδες καὶ αἵματι γαλῆς. Ἄλλο·

nonnulli marrubium nigrum nominant, cum sale: simili modo et aparine, itemque helxine, ungulae bubulae, asininae, aut equinae ustae, et cum oleo subactae, testa fornacum cerato excepta. Similiter quinquefolii radix trita cum ture et exiguo sale, piper cum pice, silphii radix cum cerato, scilla tostata cum cerato, sed quarto post die resolvenda. Grossi, tam sylvestres quam domestici, cocti, triti et impositi, etiam qualemcunque collectionem dissipant: styrax remollitus atque impositus, aparine cum axungia, iris cocta et imposita, erysimum cum aqua aut melle, vipera cocta in cibis sumpta, fetus ex aqua marina, lupini cocti tritique, viscum cum resina et cera, capparis radix foliaque virentia trita cum polline polentae, canceri fluviatiles cremati cum melle, coriandri folia cum faba fresa: fabarum graecarum cortices cum alumine scissili, oleo et polentae polline: agrestis lapathi radix cum vino cocta, libanotidis folia, lini semen cum nitro, aut sale, aut lixivio, pyrites lapis ustus et resina terebinthina exceptus: assius lapis eodem modo: lens denique in aceto

πρὸς χοιράδας καὶ παρωτίδας καὶ σκληρίας πάσας ἢ διὰ ὀξους εἰργασμένη < α', ῥητίνης φρυκτῆς < α', κηροῦ πυρροῦ < α', χαλβάνης οὐγγίας γ', τῆξον ὁμοῦ πάντα, καὶ μαλάξας χρῶ. Ἄλλο· κράμβης φύλλα μετὰ χοιρείου στέατος κόψας, ὥστε γενέσθαι ὡς μυελόν, καὶ εἰς ῥάκος λινοῦν ἐμπλαστρώσας ἐπὶ τὸ πάθος. Ἰτέας γλοιὸν καύσας, καὶ τὴν τέφραν κοσκινίσας, καὶ μετὰ ὕδατος φυράσας, καὶ ποιήσας κολλύριον, ἐπίθεις ἐπὶ τῆς κορυφῆς τοῦ πάθους, καὶ ὅτε τρυπήσῃ, ἐπίθεις λινόσπερμον πεφρυγμένον καὶ κεκοπανισμένον. Ἄλλο δόκιμον· χαμαικίρατος πόα ἐστὶ μικρὰ, γυρομένη ἐνθα τὰ βλάχνα γίνεται, καὶ κατὰ καιρὸν ὅτε καὶ ὁ καρπὸς τοῦ δένδρου· καρποὺς δὲ ποιῇ β' ἢ γ' ὁμοίους κερασίῳ· ἀνθὴ δὲ εὐώδη λίαν, ὥσπερ μόσχος.<sup>39</sup> ταύτης δέσμη, διὰ γ' ῥιζῶν, φύλλων καὶ καρποῦ, σὺν οἶνῳ ἐφομένη καὶ ἀποτριτουμένη, ἀπαράβατόν ἐστι.

Κεφ. ρνέ. Περίαιπτον δὲ πρὸς χοιράδας ἀρογλώσσου

<sup>39</sup>) Moses Chorenensis saec. V. primus moschi mentionem fecit. (Geogr. ad calc. hist. armen. p. 365. 366.)

cocta. Sed et utiliter strumae sanguine mustelae perunguntur. Aliud: ad strumas, parotidas et quamvis duritiam valet quod praeparatur medicamentum ex aceti resinae frixae, cerae fulvae an. drachma una, galbani unc. iij: omnibus simul liquatis et in malagma redactis utitor. Aliud: brassicae folia cum adipe suillo tundito, usque dum evadat mixtura medullae similis: quam panno lineo inductam instar emplastri adhibe loco affecto. Aliud: cinerem e cremato salicis cortice cribratum cum aqua subigito, formatoque collyrium, quod summae parti affectae impones: hanc ubi perfoderit, lini semen frixum pistilloque tusum adhibeto. Aliud probatum: chamaecerasus herbula est, quae inter filices nascitur, ac eodem tempore, quo et fructus cerasi arboris. Fructus duos tresve producit cerasio similes, flores sunt perquam odorati moschi instar. Huius manipulus e radicibus tribus, foliis ac fructu in vino coquitur ad tertias, estque certissimum exploratissimumque remedium.

Cap. CLV. Ad strumas amuleti ratione alligantur

ρίζα, τῇ ἀριστερᾷ χειρὶ λαμβανομένη καὶ ἐνδεσμευομένη κυτίδι· λαπάθου ἀγρίου ρίζα ὁμοίως, ἀσφοδέλου ρίζα ὁμοίως, ἡρουγγίου ρίζα· πρόλεγε δὲ, εἰς ὃν λαμβάνεται, ἀφ' ἐσπέρας κατὰ σελήνην ἀπὸ ὀκτωκαιικοστῆς ἕως τριακάδος, καὶ οὕτω περιάπτε.

Κεφ. ρνζ'. Μελικηρίδας δὲ διαφορεῖ μελίλωτον καταπλασσόμενον σὺν ἀλεύρῳ τηλίνῳ ἢ πυρίνῳ, λαπάθου ἀγρίου ρίζα λεία καὶ τὰ φύλλα, ἀρνογλώσσου φύλλα ὁμοίως.

Κεφ. ρνζ'. Στεατώματα δὲ διαφορεῖ βουφθάλμου ἄνθη λεία σὺν κηρωτῇ, κυκλάμινος λεία καταπλασσομένη.

Κεφ. ρνη'. Βρογχοκήλας δὲ διαφορεῖ βδέλλιον σιάλω τοῦ πάσχοντος νήστεως<sup>40</sup> μαλαχθὲν καὶ ἐπιτεθέν· ἄσβεστος μετ' ἄξουγγίου διαφορεῖ, ἢ σαῦρα προσβληθεῖσα τῇ βρογχοκήλῃ, ἢ μάντις· ἔστι δὲ ὁμοιος ἀκρίδι Ἰνδικῇ· εἴτα κρέμασθεῖσα ἐν ᾧ κατὰκείται τόπω.

Κεφ. ρνθ'. Πολύπους δὲ ἐξεσθίει προελκωθέντας δρακοντίου ρίζα καταχρισθεῖσα, καὶ ὁ χυλὸς αὐτῆς διαχρίο-

40) Vulgo νηστικοῦ.

plantaginis radix, sinistra manu eruta et pelli illigata, lapathi agrestis radix eodem modo, uti et asphodeli radix, itemque eryngii. Pronuntiato vero prius eiusce nomine, cuius gratia exquiritur, erui debet sub vesperum, a vicesima octava luna usque ad tricesimam, itaque adaligari.

Cap. CLVI. Meliceridas autem discutiant melilotus imposita cum farina foeni graeci aut tritici, lapathi agrestis radix foliaque trita, similiterque folia plantaginis.

Cap. CLVII. At steatomata discutiant buphthalmi flores triti cum cerato, et cyclamen tritum et pro cataplasmate impositum.

Cap. CLVIII. Bronhocelas haec dissipant: bdellium laborantis ieiuni saliva emollitum et impositum, calx viva cum axungia, lacerta bronhocelae admota, aut mantis, quae indicae locustae similis est: suspendatur vero postea in eo, quo aeger decumbit, loco.

Cap. CLIX. Polypos prius exulceratos exedit dracontii radix illita, itemque succus eiusdem inunctus. Sic



μενος, ἐλελίσφακον καταπλασσόμενον· κυπαρίσσον σφαιρία κοπέντα, καὶ σύκου σαρκὶ ἀναληφθέντα, καὶ καταπλασσόμενα, καὶ ἐντιθέμενα· ὁπὸς σιλφίου μετ' ἰοῦ, ἢ χαλκάνθου· κόπρος κυεῖα λευκὴ, ὅξει λιοτριβηθεῖσα καὶ διαχριομένη, ἢ ἐγγυματιζομένη, ποιεῖ ἀκριβῶς.

Κεφ. ρξ'. Ὀζαίνας πραύνει ἀριστολογίας ῥίζα σὺν κυπρίδι, κισσοῦ κορύμβων χυλὸς ἐγκλυζόμενος, καὶ τὰς σηπεδόνας ἐκκαθαίρει· κιννάμωμον μετ' ἐλλεβόρου λευκοῦ καὶ στρουθίου, ἅμα τῇ πταρμικῇ προσαγόμενον· ἐλλεβόρος μετὰ καρδάμου ὁμοίως. Πταρμικὸν ἐπὶ ἡμέρας ἑ' πρόσαγε· εἶτα τῇ πολυείδου λεγομένη σφραγίδι διάχριε, ἄχρις ἂν πεπανθῶσιν· ἢ καλαμίνθης χυλὸν ἐγγυμάτιζε, ἢ ξηρὰν καλαμίνθην λείαν ἐμφύσα διὰ σιγῶνος, ἢ βατραχίου χυλῷ σὺν στυπτηρίᾳ διάχριε μετ' ὅξους, ἢ χαλκάνθῳ, ἢ ψωρικῷ μετὰ μέλιτος.

Κεφ. ρξά'. Πρὸς δὲ τὰ ἐν μυκτῆρσιν ἔληκ ποιεῖ ἀμόργη ἐλαίου ἐφθῇ διαχριομένη, λύκιον ὁμοίως, καὶ τὸ ἰνδικὸν οἶνω ἀνεθὲν καὶ διαχριομένον, σανδαράχη σὺν ῥοδίῳ γλοιοποιηθεῖσα. Λιθόργυρος, λιβανωτὸς, στυπτηρία σχιστὴ,

et salvia imposita: cupressi globuli tusi et carne ficus excepti, tum impositi, tum etiam inditi: silphii liquor cum aerugine aut chalcantho. Caninum denique stercus album, cum aceto tritum et inunctum, aut etiam infusum, eximie confert.

Cap. CLX. Ozacnas mitigant aristolochiae radix cum cyperide, hederaceorum corymborum succus infusus, qui putrida etiam ulcera expurgat: cinnamomum cum helleboro albo et struthio, id quod simul etiam sternutatorium est: similiter et helleborus cum nasturtio. Sternutatorium diebus adhibeto X: post polyidae dicta sphragide oblinito, donec ulcera maturentur: aut calaminthae succum infundito, aut aridam ipsam tritam insufflato per fistulam: aut ranunculi succo et alumine, aceto addito, inungito: aut chalcantho vel psorico cum melle.

Cap. CLXI. Ulceribus narium conferunt amurca olei cocta et illita, lycium simili modo, indicum vino solutum et illitum, sandaracha cum rosaceo ad strigmenti crassitiem redacta: argenti spumae, turis, aluminis

ψιμύθιον, ἴσα σὺν οἴνῳ καὶ ῥοδίῳ. Τὰ δ' ἐν αὐταῖς σαρκώματα στέλλει καὶ ἐλασσοῖ προσαγόμενα ἀρσενικὸν καὶ σανδαράχην, καὶ ἀσπαλάθου ῥίζα λεῖα, ὅπως σιλφίου μετ' ὠοῦ, χάλκανθον κεκαυμένον, μετὰ οἴνου γλοιωθέν.

Κε φ. ρξβ'. Τραύματα δὲ πρόσφατα καὶ ἀφεστῶτα κολλᾷ καὶ κόλπους καταπλασσόμενα λεῖα, αἰλῶον, λογχίτις, χαμαιπίτυς, ἥρακλεια, ἐλελίσφακον, ἐλιξ ἀμπέλου, ἀναγαλλίς, ἀνδρόςαιμον, ἀρνόγλωσσον, βάτου φύλλα· ἀλόη σὺν ὄξει μετὰ μοτῶν, καὶ καθ' ἑαυτήν· ἀμόρρη ἐψημένη μετὰ μοτῶν, ἀλθαίας ῥίζα σὺν οἴνῳ ἐψηθεῖσα, ἀγριελιάς φύλλα σὺν μέλιτι, ἀκτῆς φύλλα λεῖα, ἀριστολοχίας ῥίζα σὺν ὄξει, γλυκύρριζα πρόσφατος κοπιῖσα καὶ καταπλασθεῖσα, ἥ ἐψηθεῖσα ἐν ὕδατι· ἐλαφοβόσκου ῥίζα λεῖα· σμύρνα σὺν ὕδατι καταχρισθεῖσα καὶ ἐπιπασθεῖσα ξηρά· λίβανος ὁμοίως, σμυρνίου ῥίζα καταπλασσομένη, ἡριγέροντος ῥίζα σὺν ὄξει, ἰὸς σιδήρου λεανθεῖς ἐπὶ πολὺ μετ' οἴνου καὶ σμύρνης ἐν ἡλίῳ, λεῖος· ἱππούριδος φύλλα, ἰσάτεως φύλλα ἡμέρου καὶ ἀγρίας· κενταυρίου τοῦ μεγάλου χυλὸς τῆς ῥίξης, φύλλα κενταυρίου

scissilis et cerussae pares portiones cum vino et rosaceo. Carnes vero in naribus excrescentes reprimunt minuuntque admota arsenicum, sandaracha, radix aspalathi trita, silphii liquor cum ovo, chalcanthum denique ustum, cum vino ad visci crassitudinem redactum.

Cap. CLXII. Vulnere recentia hiantiaque, nec non et sinus glutinant haec trita et imposita: sempervivum, lonchitis, chamaepitys, Heraclea, salvia, vitium capreoli, anagallis, androsaemon, plantago, rubi folia, aloë ex aceto cum linamentis, aut per se, amurca cocta linamentisque excepta, althaeae radix in vino cocta, oleae agrestis folia cum melle, sambuci folia trita, aristolochiae radix cum aceto, glycyrrhiza recens contusa et imposita, aut in aqua cocta: pastinacae radix trita, myrrha ex aqua illita, itemque sicca inspersa: tus eodem modo, smyrnii radix pro cataplasmate imposita, senecionis radix cum aceto, ferrugo cum myrrha diutius in sole trita, equiseti folia trita, isatidis tum sativae tum sylvestris folia, centaurii maioris e radice succus, centaurii minoris folia vi-

τοῦ λεπτοῦ γλωρὰ λεῖα, κονύζης φύλλα· γῆς ἔντερα καὶ νέρων διακοπὰς κολλᾷ, λεῖα ἐπιτιθέμενα· κυκλάμιον σὺν ὄξει καὶ μέλιτι, κυπαρίσσου φύλλα λεῖα, λιβανωτίδος φύλλα γλωρὰ, λυσιμάχιος πόα, μυριόφυλλον καταπλασσόμενον, ὄρχεως τῆς σεραπιάδος ῥίζα, πενταφύλλου φύλλα μετὰ μέλιτος, περιστερᾶς αἷμα.<sup>41</sup>

Κεφ. ρξγ'. Πρὸς δὲ τὰ ἐπιπόλαια τραύματα πολύκνημον λεῖον, τὸ ἐν τοῖς θυλακίοις τῆς πτελέας ὑγρόν· καὶ ὁ φλοιὸς δ' αὐτῆς ἐπιθεόμενος, (ἔστι γὰρ ὡς φίλυρα,) κολλᾷ, καὶ ἀφλέγμαντα ποιεῖ· πρίνου χυλὸς, ῥᾶ λεῖον σὺν οἶνω, σύμφυτον λεῖον, σκόροδα καέντα καὶ καταπλασσόμενα. Παρὰδόξως δὲ τὰς διακοπὰς τῶν νέρων καὶ τὰ πρόσφατα τραύματα παρακολλᾷ ἄγχουσα καταπλασθεῖσα.

Κεφ. ρξδ'. Πρὸς δὲ τὰς τοῦ τραχήλου τῆς κύστεως διαιρέσεις, καὶ νέρων καὶ μηνίγγων, καὶ τὰς φλεγμονὰς ἄρ-

41) Περιστερεῶνος ὁμοίως, verbenacae similiter, mavult Moibanus.

ridia trita, conyzae folia. Terrestres lumbrici etiam praecisos nervos glutinant, si triti imponantur: cyclamen cum aceto et melle, cupressi folia trita, libanotidis folia viridia, lysimachia herba, millefolium impositum, orchcos serapiadis radix, folia quinquifolii cum melle, columbae denique sanguis.

Cap. CLXIII. Ad vulnera vero superficialia valent polycnemon tritum, humor, qui intra folliculos ulmi reperitur, quin et ulmi cortex, fasciae loco vulneribus superilligatus, (sunt enim illi tenues tunicae tiliae ad instar,) ea glutinat et ab inflammatione vindicat: ilicis contritae succus, rha tritum cum vino, symphytum tritum, allia usta et imposita. Sed prae ceteris anchusa imposita nervorum praesectiones recentiaque vulnera mirabiliter agglutinat.

Cap. CLXIV. Ad colli vesicae, nervorum ac meningum divisiones, earundemque partium inflammationes convenit butyrum impositum in linamento. Sed post cal-

μόζει βούτυρον επιτιθέμενον ἐν μοτῷ· ἐπὶ δὲ τῶν λιθοτομίων δειῖ ὀξάλμη παραχρῆμα καταντλεῖν.

Κεφ. ρξε'. Τὰς δὲ κατὰ νέρων τρώσεις ἀφλεγμάντους τηρεῖ καταπλασσόμενα κόκκος βαφικὴ λεία σὺν ὄξει καὶ μέλιτι, κραταιόγονον λῆον, κρίνου ῥίζα ἐφθῇ ἐν οἴνῳ λεανθεῖσα, ἢ ναρκίσσου<sup>42</sup> ὁμοίως, ὁπὸς σιλφίου μετὰ τινος τῶν θερμαντικῶν ἀποξημάτων επιτιθέμενος, νευράδος, ἣν καὶ ποτήριον καλοῦσι, ῥίζα· ἄγχουσα καταπλασθεῖσα.

Κεφ. ρξς'. Ἀνάγει δ' ὁστέα καὶ ἀφίστησι πάνακος ῥίζα ξηρὰ επιτιθεμένη, καὶ ἀριστολοχίας ὁμοίως, βρυωνίας λευκῆς ἢ μελαίνης ῥίζα ὁμοίως, ἱρις ξηρὰ, ὀρόβινον ἄλευρον· συκῆς φύλλα καὶ κρόαδι ἀπαλαί, σὺν μήκωνος ἀγρίας φύλλοις καταπλασσόμενα· λινόσπερμον σὺν ἀνίσῳ, ἱρις σὺν χαλκάνθῳ καὶ κενταυρίῳ, πευκεδάνου ῥίζα, χάλκανθος<sup>43</sup> σὺν ὑοσκυάμου σπέρματι, χαμαιλέων μέλας.

Κεφ. ρξζ'. Ἀκίδας δὲ καὶ σκόλοπας ἔλκει καταπλα-

42) Sarac. recte suadet loco νέρδῃ.

43) Sic Sarac. suadet; χαλκάνθης ῥίζα vulgo; λευκακάνθης ῥίζα Moiban.

culosorum incisionem muriam acidam quamprimum affundere oportet.

Cap. CLXV. Nervorum autem vulnera tuentur ab inflammatione imposita haec: granum tinctile tritum cum aceto et melle, crataegonum contritum, lilii radix in vino cocta tritaque, narcissi itidem radix eodem modo: sylphii liquor cum aliquo calfacientium decoctorum impositus: neuradis, quam et poterium vocant, radix: anchusa denique cataplasmatibus more imposita.

Cap. CLXVI. Ossa infracta extrahunt ac remouent inditi pulveres radices panacis et aristolochiae, itemque bryoniae, seu albae, seu etiam nigrae, nec non et iridis, ervi quoque farina, fici folia tenellique ramuli cum agrestis papaveris foliis impositi, lini semen cum aniso, iris cum chalcantho et centaurio, peucedani radix, chalcanthum cum hyoseyami semine, chamaeleon niger.

Cap. CLXVII. Infixa corpori spicula et aculeos ex-



σθέντα ὁρμίνου φύλλα, καὶ τὸ σπέρμα μετ' ἀλφίτου· ξιφίου ῥίζα σὺν ὕδατι, ἢ καὶ καθ' ἑαυτήν, ἢ σὺν λιβανωτῷ καὶ οἴνῳ· ἱρεως ῥίζα· λεοντοποδίου καρπὸς καὶ φύλλα μετ' ἀλφίτου· ἀμμωνιακὸν σὺν μέλιτι· ὄρχις ἢ βοτάνη καταπλασσομένη· ἀναγallis ὁμοίως· ἀριστολοχίας ῥίζα ὡσαύτως· καλάμου φραγμίτου ῥίζα, καὶ τοῦ μεγάλου τὰ φύλλα λεῖα· κοχλῖαι σὺν τῇ σαρκί· ναρκίσσου ῥίζα, ἢ βολβὸς σὺν μέλιτι σίγηπι μετὰ ζύμης· ὄξυακάνθου ῥίζα· δίκταμνον· τοῦτο δὲ φασιν ἐν Κρήτῃ νεμηθεῖσας, ὑπὸ τινων τοξευθεῖσας αἰγας, ἐκβάλλεν τὰ βέλη· πρόπολις ἐπιτιθεμένη, πυκνοκόμου καρπὸς λεῖος, σαύρας κεφαλὴ λεῖα, σιλούρου ταριχηροῦ σὰρξ, νεβροῦ πυτία, τράγιον πινόμενον.

Κεφ. ρξή. Ἐρυσιπέλατα δὲ ἰᾶται καταχοιόμενα ταῦτα, ὄξους καὶ ῥοδίνου μιννυμένων· ψιμύθιον, λιθάργυρος· ἢ γῆ κιμωλία, ἢ χία, ἢ σελινουσία. Μίγνυται δὲ χυλὸς ἀρνογλώσσου ἢ σέριδος, ἢ πολυγόνου, ἢ ἀγριελιάς, ἢ ἀνδράχνης, ἢ αἰζώου, ἢ στρύχνου, ἢ ὑοσκυάμου, ἢ κορίου, ἢ πηγάνου, ἢ σελίνου, ἢ ἐλξίνης, ἢ ἡδυόσμου. Ποιεῖ καὶ λιθ-

trahunt haec cataplasmatum instar imposita: hormini folia et semen cum polenta, gladioli radix cum aqua, aut etiam ipsa per se, vel cum ture ac vino: iridis radix, leontopetali semen et folia cum polenta, ammoniacum cum melle, orchis herba imposita, similiter et anagallis, itemque aristolochiae radix: arundinis phragmitis radix, et grandioris folia trita: cochleae cum sua carne, narcissi radix aut bulbus cum melle, sinapi cum fermento, acutae spinae radix: dictamnium, cuius quidem pastu aiunt etiam in Creta capras tela, quibus ictae sunt, excutere: propolis imposita, pycnocomi semen tritum, lacertae caput tritum, siluri salsi caro, hinnuli coagulum, tragium denique in potu sumptum.

Cap. CLXVIII. Erysipelata sanant illita haec, admixtis aceto et rosaceo: cerussa, lithargyrum, terra cimolia, vel chia, vel selinusia. Additur autem succus plantaginis, aut intybi, aut polygoni, aut oleae agrestis, aut portulacae, aut sempervivi, aut solani, aut hyoscyami, aut coriandri, aut rutae, aut apii, aut helxines, aut men-

ἀργυρος μετὰ ῥοδίνου λεῖος· ὥχρα μετ' ὄξους· ἰὸς σιδήρου  
 σὺν ὄξει καὶ ψιμυθίῳ καὶ θείῳ καὶ λιθαργύρῳ· λιθάργυρος  
 μετὰ πηγάνου χυλοῦ καὶ ὄξους καὶ ῥοδίνου· μηκώνειον σὺν  
 ἔξει· ἢ ἀκακία, διαφυγῆς ὀπτὸν, σχιστὴ, ἴσα μετ' ὄξους·  
 ἀκρως δὲ ποιεῖ τοῦτο.

Κε φ. ρξθ'. Καταπλασσόμενα δὲ μετ' ἀλφίτου πάλης  
 ποιεῖ πρὸς ἐρυσίπτελας ταῦτα· ἀρονόγλωσσον, κόριον, σέλι-  
 νον, ἀνδράχνη, αἰῖζων, μυδὸς ὦτα, στρύχνον, ὑοσκυάμου  
 φύλλα, ἐλξίνης, κάλυκος, τῆς καλουμένης ὀνοκλείας<sup>44</sup>, ῥίζα,  
 κοτυληδὼν, κράμβης φύλλα, κύπρου φύλλα, κυπαρίσσου  
 ὁμοίως, λυκάβου φύλλα, ὠκίμου φύλλα, κἀλάμου φλοιὸς  
 χλωρὸς λεῖος, κρότωνος φύλλα λεῖα καθ' ἑαυτὰ, ἢ μετ'  
 ὄξους· κρίνου ἄνθος καὶ φύλλα σὺν οἴνῳ· κύτινοι ἐφθοὶ  
 σὺν οἴνῳ λεῖοι σὺν φακοῖς καὶ ῥόδοις ξηροῖς· κώνειον  
 χλωρὸν λεῖον, μανδραγόρου ῥίζα σὺν ὄξει λεῖα, μαλά-  
 χης φύλλα ἐφθὰ μίγντα ἐλαίῳ, λευκανθέμου φύλλα καθ'  
 ἑαυτὰ, φακὸς ὃ ἐπὶ τῶν τελμάτων λεῖος, ἀκίνου φύλλα λεῖα

44) Diosc. 4, 23.

thae. Confert et lithargyrum cum rosaceo tritum: eadem  
 cum rutae succo, aceto et rosaceo: ochra cum aceto: ru-  
 bigo ferri cum aceto, cerussa, sulphure et lithargyro:  
 meconium cum aceto: acacia, diphryges tostum et alumen  
 scissile paribus portionibus cum aceto: et hoc quidem re-  
 medium eximie iuvat.

Cap. CLXIX. Faciunt vero haec ad erysipelata cum  
 polline polentae more cataplasmatum imposita: plantago,  
 coriandrum, apium, portulaca, sempervivum, auricula  
 muris, solanum, hyoscyami folia, itemque helxines: ca-  
 lycis seu anchusae, quam onocleam vocant, radix, um-  
 bilicus Veneris, brassicae folia, cypri folia, similiterque  
 cupressi, lycopsis folia, itemque ocimi, arundinis cortex  
 viridis contritus, ricini folia trita, per se, vel cum aceto,  
 lilii flores et folia cum vino, cytini cocti cum vino et  
 triti cum lentibus et rosis siccis, conium viride tritum,  
 mandragorae radix cum aceto contrita, malvae folia cocta,  
 oleo addito, leucanthemi folia per se, lens palustris trita,

σὺν περιστερεῶνος φύλλοις λείοις καὶ ὄξει, στρατιώτης ὁ ἐπὶ τῶν ὑδάτων, σήνους φύλλα, σεῦτλον ἐφθὸν σὺν οἴῳ καὶ ἐλαίῳ λείον· μελάμφυλλον, ὃ δὴ καὶ παιδέρωτα, οἱ δ' ἄκανθον καλοῦσι, καθ' ἑαυτὸ χλωρὸν λείον, καὶ σὺν ὄξει καὶ ῥοδίῳ καὶ σὺν ἄρτω, ποιεῖ ἄκρως· σποδὸς μετὰ κράμβης χυλοῦ καταντλούμενος.

Κεφ. ρο'. Ἐρπητας δ' ὠφελεῖ μὲν καὶ τὰ πρὸς ἐρυσιπέλατα ἀναγεγραμμένα, καὶ μάλιστα ὅσα ἐπιτεταμένως στυφει κατάχριστα καὶ καταπλάσματα· ἰσάτειος φύλλα λεῖα σὺν ὕδατι καταπλάσσόμενα, βάρου φύλλα ὁμοίως· ἀπόπατος αἶγος σὺν ὄξει ἐπιπλάσσόμενος, ἢ βηχίου φύλλα σὺν ὕδατι, μυρσίνης φύλλα σὺν ἀλφίτῳ, πενταφύλλου ῥίζα σὺν ἀλφίτῳ· σφονδύλιον λείον σὺν πηγάνῳ καὶ ὄξει· καταχρίεται δ' ὠφελίμως ἄσβεστος σὺν ὄξει ἐπὶ τῶν ἀνελκώτων· ἐὰν δ' ἡλκωμένοι ὦσι, σὺν κηρωτῇ, διφρυγὲς σὺν ὄξει. ἢ γῇ κιμωλία ὁμοίως, λύκιον, πίτυος φλοιὸς ἀναληφθεὶς κηρωτῇ κυπρίνῃ· πίτυος φλοιοῦ < β' μετὰ χαλκάνθου < α' σὺν κηρωτῇ· ἢ σηπεδόνα ξύλου λεάνας, καὶ μίξας ἄνισον λείον ἴσον καὶ

acini folia trita cum foliis verbenacae et aceto: stratiotes aquaticus, lentisci folia, beta cocta in vino et oleo tritaque: melamphyllum, quod alii paederota, alii acanthum vocant, per se virens tritum et cum aceto rosaceo et pane strenue iuvat: itemque spondium cum brassicae succo affusum.

Cap. CLXX. Ad herpetas prosunt, tum quae ad erysipelata sunt, tum vero maxime quae intense astringunt, seu illita, seu etiam cataplasmatibus in modum imposita, nempe isatidis folia trita, ex aqua adhibita, similiterque rubi folia, simus caprarum cum aceto impositus, tussilaginis folia ex aqua, myrti folia cum polenta, quinquefolii radix cum polenta, sphondylium tritum cum ruta et aceto. Utiliter autem illinitur calx viva in his, qui minime sunt exulcerati, cum aceto: si vero exulcerati fuerint, cum cerato: diphryges cum aceto, similiterque terra cimolia, lycium, pini cortex cerato cyprino exceptus, pini corticis drach. ij. cum chalcantli drach. i., cerato exceptae. Aliud: tritam lignorum cariem cum pari aniso

έλαιον, φύρα, καὶ ἐνδήσας ὀθονίῳ, καύσαι λείωσον, καὶ οὕτω κατάπασσε. Ποιεῖ καὶ σῶρι κεκαυμένον σὺν ὄξει, μίσι σὺν ὕδατι, μέλαν γραφικὸν σὺν ὄξει ἐπιτιθέμενον ἄνωθεν, κράμβης φύλλα· ἢ θείου γο. α', λιθαργύρου γο. β' μετ' οἶνου λεία κατάχρει· ἢ σκορόδων < α', καρύων πικρῶν < β', κρόκου < ἡμισυ συλλεάντας κατάχρει· κατάντλει δ' ὄξει ψυχρῷ.

Κεφ. ροα'. Τὰς δὲ ἐπινυκτίδας ἀγριελαίας ἀνθεσι κατάπλασσε, ἢ ῥάμνου, ἢ ἄγνου φύλλοις σὺν μέλιτι, ἀμυγδαλοῖς πικροῖς σὺν οἶνῳ, προβάτου κόπρῳ καθ' ἑαυτήν, ἀρνογλώσσῳ καθ' ἑαυτὸ, σταφίδι μετὰ πηγάνου, ἀσπινθίῳ σὺν ὕδατι, κορίῳ γλωρῷ λείῳ, σαμψύχῳ σὺν ὕδατι, σικύου φύλλοις ὁμοίως.

Κεφ. ροβ'. Πρὸς δὲ τὰ κήρια ἀρμόζει σταφίς μετὰ πηγάνου, συκῆς φύλλα ἀπαλῆς σὺν μέλιτι, κάρδαμον σὺν μέλιτι καὶ λινოსπέρμῳ, σικύου ἡμέρου ῥίζα σὺν μέλιτι, θεῖον ἄπυρον σὺν κηρώτῃ ὀλίγη ἢ ῥητίνη τερμινθίνη.

addito oleo subigito: hæc illigata linteolo urito, rursumque terito, itaque inspergito. Confert et sory ustum cum aceto, misy ex aqua, atramentum scriptorium cum aceto parte superiore adhibitum, brassicae folia. Aliud: sulphuris uncia j., lithargyri unc. ij. cum vino tere et illine. Aut: allii drach. j., amygdalarum amarum drach. ij., croci drach. semis simul conterito et illinito: frigido vero aceto perfundito.

Cap. CLXXI. Epinyctidibus agrestis oleae flores imponito, aut rhamni viticisve folia cum melle, amygdalas amaras cum vino, simum ovillum per se, plantaginem per se, uŕam passam cum ruta, absinthium ex aqua, coriandrum viride tritum, sampsuchum ex aqua, folia denique cucumeris eodem modo.

Cap. CLXXII. Favis autem ista conveniunt: uva passa cum ruta, fici tenellae folia cum melle, nasturtium cum melle et lini semine, cucumeris sativi radix cum melle, sulphur vivum cum cerato exiguo aut resina terebinthina.



Κεφ. ρογ'. Τὰ δὲ ἐκ τῶν ὑποδημάτων παρατροίματα ἐπώδυνα ὄντα ἄπονα ποιεῖ καὶ ἀφλέγμαντα πνεύμων χοίρειος ἢ ἄρνεος ἐπιτεθείς, κρόμμυον σὺν ὀρνιθείῳ στέατι λεῖον, ἢ ἀλφίτῳ· κασσύματα παλαιὰ καίόμενα καὶ ἐπιπασσόμενα.

Κεφ. ροδ'. Ἀφλέγμαντα δὲ τηρεῖ τὰ ἀποσύρματα ῥοῦς ἐρυθρὸς καταπλασσόμενος σὺν μέλιτι· σιδηρίτιδος, τῆς καὶ ἥρακλείας καλουμένης, τὰ φύλλα καταπλασσόμενα· σκόρδιον, σχοίνου κόμη καεῖσα σὺν μέλιτι καὶ ἐπιτεθείσα, στρατιώτης ὁ ἐν τοῖς ὕδασι σὺν ὄξει.

Κεφ. ροε'. Ἥλους δ' αἶρει βατράχιον ἐπιπλασθὲν, προαποξυσθέντος ἐπὶ βραχὺ τοῦ ἡλου. Ἀκριβῶς δ' ἐπιτιθέναι δεῖ, τὰ κύκλω μέρη στέατι ἢ κηρῷ παραπλασθέντα· διασθίει γὰρ καὶ τὰ ἀπαθῆ· αἶρει δὲ πρὸς ὀλίγον καταπλασθὲν τὸ βατράχιον καὶ θύμους καὶ ἀκροχορδόνας· σμαρίδος ταριχηρᾶς κεφαλὴ καεῖσα, ἰτέας φλοιὸς πρόσφατος καεῖς καὶ μετ' ὄξους ἐπιτεθείς, καὶ λάδανον σὺν ὀλίγῳ καστορέῳ, μελάνθιον σὺν οὖρῳ· σίλφιον μετὰ κηρωτῆς καὶ τύλους αἰ-

Cap. CLXXIII. Calceamentorum attritus dolorem inferentes a dolore simul et inflammatione vindicant haec: pulmo suillus aut agninus impositus, cepa trita cum adipe gallinaceo aut polenta, calceamentorum veterum soleae ustae et inspersae.

Cap. CLXXIV. Desquamata tuentur ab inflammatione rhus ruber cum melle impositus, sideritidis, quae et Heraclea dicitur, folia itidem imposita, scordium, schoeni coma cremata cum melle et imposita, stratiotes aquaticus cum aceto.

Cap. CLXXV. Clavos extrahit ranunculus impositus, ipso tamen clavo paulo ante deraso: est autem caute adhibendus, vicinis partibus subacta farina cerave praemunitis: alioqui sanas etiam partes exederet. Tollit et ad breve tempus impositus ranunculus thymos et acrochordonas. Valent et smaridis salitae crematum caput, recens salicis cortex ustus et ex aceto impositus, ladanum cum pauco castorio, nigella cum urina: silphium cum cerato

ρεϊ, ἢ ὁπὸς τοῦ σιλφίου σὺν ῥητίνῃ ὁμοίως· σαύρας κεφαλὴ  
λεία ἐπιπλασθεῖσα, ἢ ὁπὸς ῥητίνης· σαύρας αἷμα πρὸς-  
φατον ἐπισταζόμενον, καὶ ἐρίῳ διάβροχον ἐπιτιθέμενον. Ἀμ-  
μωνιακὸν νήστεως σιάλω ἀναμαλάξας, καὶ ἀποξυσθέντος  
ἐπὶ ποσὸν ἐπιτίθει βδέλλιον, ἡγουν φλοιὸν πτελέας κατὰ-  
πλασσε.

Κε φ. ρος'. Μυρμηκίας καὶ ἀκροχορδόνας καὶ θύμους  
αἴρει μετὰ κηρωτῆς ἄσβεστος λεῖος, διψάκου ῥίζα καταπ्ला-  
σομένη λεία, ἐλατήριον μεθ' ἁλῶν λεῖον προσφανόμενον, ἐ-  
ρεβίνθοι λεῖοι ἐφθοὶ καταπλασσόμενοι· φασὶ δ' εἴ τις κατὰ  
νεομηνίας ἐκάστης ἐξοχῆς ψαύων ἐν ἐρεβίνθῳ, καὶ τοῦτον  
ἐνδεσμεύων ὀθονίῳ, εἰς τοῦπίσω ῥίπτῃ, ἀποπίπτειν αὐτὰς  
αὐτομάτας ἢ ἀφανεῖς γίνεσθαι. Ποιεῖ καὶ ἡλιοτροπίου με-  
γάλου ὁ καρπὸς ἐν οἴνῳ καταπλασθεὶς, κλινοπόδιον μεθ' ὕδατος  
ἐψηθὲν καὶ ἐπιτεθὲν, πήγανον σὺν νίτρῳ περικαταπλασθὲν,  
λιβανωτὸς σὺν ὄξει ὁμοίως, ὅλυνθοι ὁμοίως μετὰ κηροῦ καὶ  
ἀλεύρου, καὶ ὁπὸς δὲ τῆς συκῆς καταχρίόμενος, σαύρας κεφα-  
λὴ λεία ἐπιτιθεμένη, σμαρίδος ταριχηρᾶς κεφαλὴ κατακαεῖσα

etiā callos eximit, similiter et lāser ipsum cum resinā:  
lacertae caput tritum et illitum, aut liquor resinae, la-  
certae sanguis recens instillatus, et ex lana, quae eodem  
imbuta sit, impositus. Ammoniacum ieiuni saliva emol-  
litum clavo aliquantulum deraso imponatur. Bdellium iti-  
dem aut ulmi corticem cataplasmatismore imponito.

Cap. CLXXVI. Myrmecia, pensiles verrucas thy-  
mosque tollunt haec: calx viva cum cerato, dipsaci radix  
trita et imposita, elaterium cum sale tritum, etiam leviter  
adhibitum, cicer coctum tritumque, et pro cataplasmate  
impositum. Aiunt etiam, si quis prima luna singulas ver-  
rucarum eminentias singulis cicerum granis contingat,  
haecque in linteo deligata post se abiiciat, fore ut ipsae  
verrucae sponte decidant aut evanescant. Proficit et he-  
liotropii maioris semen cum vino impositum, clinopo-  
dium ex aqua coctum et impositum, ruta cum nitro cir-  
cumlita, similiter et tus cum aceto, grossi eodem modo  
cum farina et cera, nec non et lacteus fici liquor illitus,  
lacertae caput tritum et impositum, smaridis salsae caput

καὶ ἐπιτεθεῖσα· θύμος ἢ θύμβρα<sup>45</sup> ἐπιπλασθέντα, ἰὸς σὺν μίσει κεκαυμένος, τιθυμάλλου ὁπὸς καταχριόμενος, ὠκίμου φύλλα μετὰ χαλκάνθου καταπλασσόμενα, ἀμπέλου κλημάτων χλωρῶν τὸ ἀφιδρούμενον ἐν τῷ καίεσθαι ἐπιχριόμενον, προβάτου ἀπόπατος μετ' ὄξους, χαμαισύκη λεία καταπλασθεῖσα, αἰγὸς ἀγρίας χολή ἢ τράγου καταχριομένη.

Κεφ. ροζ'. Ἀκροχορδόνas τὰς ἐν παντὶ τόπῳ αἶρει ἰχθὺρ πνεύμονος ὀπτωμένου καταχριόμενος, θεῖον, λιβανωτὸς, συκῆς φύλλα ἴσα τρίψας ἐπιτίθει, προκαταντλήσας πυρῶν ἀφεψήματι· ἢ πηλῷ, ὅπου ἐὰν κύων μέλας οὐρήσῃ, κατάχρει, ἢ χαμαιάκτη.

Κεφ. ροη'. Πυρίκανστα δ' ἐν ἀρχῇ ὠφελεῖ, ὥστε, εἰ παραχοῆμά τις χρῆσταιτο, μηδὲ φλυκταινοῦσθαι· κιμωλία μεθ' ὕδατος καταχρισθεῖσα, μέλαν γραφικὸν ἐν ὕδατι καταχριόμενον, στυπτηρία ὑγρὰ, στυπτηρία πᾶσα σὺν ὕδατι, μόρων φύλλα σὺν ἐλαίῳ· ναρκίσσου ῥίζα σὺν μέλιτι, ἀκτῆς φύλλα λεῖα· ἀρκτίου φύλλα καὶ ὁ καυλὸς, καὶ αἱ ῥίζαι σὺν οἶνῳ

45) Θύμον θρίμμα vulg.

crematum et impositum, thymus thymbrave imposita, aerugo usta cum misy, tithymali liquor illitus, ocimi folia cum chalcantho imposita, id quod e vitium sarmentis viridibus accensis exsudat illitum, fimus ovillus cum acceto, chamaesyce trita et imposita, sylvestris denique caprae hircive fel illitum.

Cap. CLXXXVII. Verrucas pensiles quavis in parte extuberantes tollit pulmonis inassati sanies illita. Sulphur, tus et fici folia aequis partibus contrita impone, tritici decocto prius affuso. Aut luto, quod canis niger perminxerit, illinito, vel ebulo.

Cap. CLXXXVIII. Ambustis in principio prosunt haec, adeo ut, si citra moram adhibeantur, etiam bullarum eruptionem arceant: terra cimolia ex aqua illita, atramentum scriptorium cum aqua illitum, alumen liquidum, aluminis omne genus ex aqua, mori folia cum oleo, narcissi radix cum melle, sambuci folia trita, arctii folia cum caule ac radicibus in vino cocta, verbasci

ἐψηθέντα· φλόμου ῥίζαι καὶ φύλλα ἐψηθέντα ὁμοίως, ἐλαίας φύλλα ἐφθὰ, ἄλεις σὺν ἐλαίῳ καταπλασθέντες, ἀνδρόσαιμον λεῖον, ἀρογλώσσου φύλλα, ὑπερικοῦ φύλλα πρόσφατα, μάλαχῃ λεία ἐφθῇ καὶ ὠμῇ καταπλασθεῖσα· ἐλαταὶ λευκαὶ ἐξ ἄλλης λείαι καταπλασθεῖσαι, καὶ μέλαιναι ὁμοίως· καὶ ἐλξίνῃ καταπλασσομένη, ἢ βάτος, ἢ σχοῖνος, ἢ μυρσίνη, ἢ ῥόδα, ἢ κύτινοι ὁμοίως, ἢ φύλλα σεύτλου ἐν οἴνῳ ἐπ' ὀλίγον ἐψημένα, μυροβάλανος μεθ' ὕδατος· ἐλιχρύσου φύλλα σὺν μέλιτι ἢ οἴνῳ, σμύρνα σὺν οἴνῳ καταχριομένη· κήρυκες πληρωθέντες ἅλσι, καὶ καέντες, καὶ καταπασθέντες· ἀποστρακοῦνται γὰρ ἄχρι ἐπουλώσεως· κάσσυμα καὲν καὶ καταπασσόμενον, ὡοῦ τὸ λευκόν, κόμμι μετὰ τοῦ λευκοῦ τῶν ὠῶν καταχριόμενον, ταυροκόλλα ὕδατι ἀνεθεῖσα θερμῷ· καὶ κρίνου φύλλα ἐν οἴνῳ ἐφθὰ, καὶ ἡ ῥίζα ἐφθῇ λεία σὺν ῥοδίῳ· λειμωνίου φύλλα ὁμοίως, λιβανωτὸς ἐπιχριόμενος σὺν ὕδατι, στίμμι σὺν στέατι νεαρῷ καταχριόμενον· πτελέας τὸ ἐν τοῖς θυλακίοις δάκρυον, καὶ τὸ ἀφέψημα τῶν φύλλων καλῶς ποιεῖ καταντλούμενον, λειχὴν ὃ ἐν ταῖς πέτραις λεῖος ἐπιτιθέμενος, συκαμίνων ἁώρων ὃ χυλός· ἢ ἀμόργη, καὶ μέλι, καὶ

radices foliaque similiter cocta, oleae folia cocta, sal cum oleo illitus, androsaemon tritum, plantaginis folia, hyperici folia recentia, malva trita, seu cocta, seu etiam cruda, more cataplasmatibus imposita: olivae sale conditae, tritae et impositae, seu albae, seu etiam nigrae: helxine cataplasmatibus instar imposita, similiter et rubus, schoenus, myrtus, rosae aut cytini, betae folia paulisper in vino cocta, glans unguentaria cum aqua, elichrysi folia cum melle aut vino, myrrha cum vino illita, buccina sale expleta cremataque inspersa, siquidem testae in modum indurantur, dum sit obducta cicatrix: veteres soleae ustae et inspersae: ovi albumen, gummi cum ovorum albumine illitum, gluten taurinum aqua calida solutum, lilii folia in vino cocta, eiusdemque radix cocta tritaque cum rosaceo. Similiter et folia limonii, tus ex aqua illitum, stibium cum recenti adipe inunctum, ulmi lacryma, quae in folliculis reperitur: foliorum etiam decoctum affusum benefacit: lichen, qui petris innascitur, tritus et impositus, mororum immaturorum succus, denique amurca, mel



λιθάργυρος, ἴσα τριβέντα καὶ ἐψηθέντα ἕως μέλιτος πάχους. Καταχρίόμενα δὲ μόλυβδος ἐν ἐλαίῳ ἐψημένος ἄχρι μέλιτος πάχους· σποδὸς συνκίνη μετὰ μέλιτος, πίσσα ὑγρὰ μετὰ μοτῶν. Ἀπουλοὶ δὲ τὰ πυρίκαυστα ἀγχούσης ῥίζα, μετὰ κηρωτῆς ῥοδίνης ἢ μυρσινίνης ἐψηθεῖσα, ἀπόπατος σὺν ῥοδίῳ κηρωτῇ προβατεία μιγεῖσα· περιστερᾶς κόπρος καεῖσα ἐν ὀθονίῳ καὶ σὺν ἐλαίῳ λεανθεῖσα· λιθαργύρου < α' καὶ ἐλαίου παλαιοῦ κοτύλη α' ἔψεται πυρὶ λαμπρῷ, ἕως ἂν πυροειδὲς γένηται, καὶ καταχρίεται· ἐπάνωθεν δὲ κισσοῦ φύλλα ἐπιτίθεται· ἢ κιννάβαρι μετὰ ψιμυθίου καὶ χριθῶν κεκαυμένων ἴσα μετὰ κηρωτῆς μυρσινίνης, λιθάργυρος μετὰ στέατος αἰγείου ἀναπλασθεῖσα, ἕως ἐμπλαστρῶδες γένηται, κυκλαμίνου ῥίζα ἐγγλυφεῖσα, ἐλαίου σὺν κηρῷ αὐτῇ ἐνεψηθέντος<sup>46</sup>, μαλάχης φύλλα ἐφθὰ σὺν ἐλαίῳ, μυρσίνης φύλλα κεκαυμένα σὺν κηρωτῇ· πίκτυος φλοιὸς ἢ πεύκης σὺν κηρωτῇ μυρσινίνῃ· καὶ λειὸς δὲ καθ' ἑαυτὸν ἐμπλασσόμενος, καὶ τὰ φύλλα δ' ἐν οἴνῳ ἐψηθέντα· σεῦτλον ἐφθὸν καταπλασσόμε-

46) Sarac. sic emendat textum corruptum: ἐγγλυρεῖσα ἐν κηρωτῇ ἐνεψηθέντα.

et lithargyrum, aequis portionibus contrita et ad mellis crassitiem cocta. Inuncta vero iuvant plumbum in oleo coctum ad mellis crassitudinem, cinis ficulneus cum melle, pix liquida cum linamentis. Cicatricem vero ambustis inducunt anchusae radix cum cerato rosaceo aut myrtino cocta, fimus ovillus cum cerato-rosaceo mixtus, fimus columbinus in linteolo ustus et cum oleo tritus. Lithargyri drach. j. in olei veteris cotyla una coquitur igne claro, usquedum ignescat, et illinitur: hederæ vero folia superimponuntur. Cinnabaris, cerussae et hordei usti æquæ portionēs cum cerato myrtino: lithargyrus cum adipe caprino conformata ad emplastri compagem: cyclaminis radix, cui incavatae oleum cum cera incoctum sit: malvæ folia cocta cum oleo, myrti folia usta cum cerato, pini seu piceæ cortex cum cerato myrtino, idem quoque tritus per se impositus, et earundem folia in vino cocta: beta cocta et imposita, calx viva oleo soluta,

νον· ἄσβεστος λελυμένη σὺν ἐλαίῳ· τοῦτο οὐκ ἐᾷ φλυκταινοῦσθαι, καὶ τὰ ἡλκωμένα ἀπουλοῖ.

Κεφ. ροθ'. Χίμετλα δὲ ἰᾶται καταντλούμενα κυκλαμίνου ῥίζης ἀφέψημα, ἀσφοδέλου ῥιζῶν ὁμοίως, γογγύλη ἐν θαλάσῃ ἢ ἐν ἄλμῃ ἀφεψημένη, βατράχιον σὺν ὕδατι, ἀρκτίου φύλλα καὶ καυλὸς καὶ ῥίζα ὁμοίως ἐν οἴνῳ ἀφεψόμενα καὶ αὐτὰ καταπλασσόμενα, μάδος <sup>47</sup> ἀπὸ βυρσοδεψῶν καταντλούμενος, σιλφίου ἀπόζεμα, ὀρόβου ἀφέψημα, θάλασσα καθ' ἑαυτήν.

Κεφ. ρπ'. Καταχριόμενα δὲ ὠφελεῖ, πρὸ τοῦ ἔλκωθῆναι τὰ χίμετλα, ἀκανία, πρασίου χυλὸς, ῥοὸς βυρσοδεψικῆς χυλὸς, λύκιον, ἀμόργη ἐψητὴ, κηροῦ πλατύσματα θερμὰ παρὰ μέρος ἐπιτιθέμενα ὡς πυρία, στυπτηρία μετὰ ψιμυθίου καὶ κηρωτῆς· ἢ βάτου κεκαυμένης τέφρα μετὰ κηρωτῆς· καταπλάσσεται δὲ πρὸ ἐλκώσεως γογγύλη ἐφθὴ ἐν ἄλμῃ.

Κεφ. ρπα'. Πρὸς δὲ τὰ ἡλκωμένα τῶν χιμέτλων ποιεῖ κηρωτὴ ἐν γογγύλῃ ὥμῃ ἐγγλυφεῖσιν ἐπὶ θερμοσποδιᾷ ἐψηθεῖσα, ἢ ἐν κυκλαμίνου ῥίζῃ ὁμοίως ἐγγλυφεῖσιν, δρακοντίου

47) Μάδος, τὸ ψιλωθρον, Hesych.

quae quidem et bullarum eruptionem arcet, et ulceratas partes ad cicatricem perducit.

Cap. CLXXIX. Perniones sanant haec fotuum vice affusa: cyclaminis radice decoctum, similiter et asphodeli radicum: rapum in aqua marina vel muria decoctum, ranunculus ex aqua coctus, arctii folia, caulis et radix, simili modo in vino cocta, et ipsamet impositae: depilatorium, quo utuntur coriarii, affusum silphii decoctum, itemque ervi, ac ipsa quoque aqua marina per se.

Cap. CLXXX. Pernionibus vero, priusquam exulcerentur, haec illita conveniunt: acacia, marrubii succus, rhois coriarii succus, lycium, amurca cocta, cerae laminulae calidae alternatim impositae pro fotu, alumen cum cerussa et cerato, rubi cremati cinis cum cerato: adhibetur et ante ulcerationem rapum in muria coctum.

Cap. CLXXXI. Exulceratis autem pernionibus ista conveniunt: ceratum in rapo crudo incavato super fermenti cinere coctum, aut in radice cyclaminis similiter

φύλλα ἐφθὰ, καρκίνοι ποτάμιοι κεκαυμένοι μετὰ μέλιτος, κο-  
τυληδῶν λεία, λιβανωτὸς σὺν στέατι ἄρκειῳ, λιθάργυρος σὺν  
κηρωτῇ μυρσινίνῃ, ἢ μολύβδαινα ὁμοίως, ἢ ὄνυχες ὄνων ἐπι-  
πασσόμενοι, πνεύμων θαλάσσιος λεῖος καταπλάσσόμενος, πρά-  
σιον λεῖον ὁμοίως καταπλάσσόμενον· σῦκα ξηρὰ μετὰ κηρω-  
τῆς, ἢ ὠμὰ μετ' ἐλαίου θερμοῦ λεῖα· φακὸς ὃ ἐπὶ τῶν τελ-  
μάτων, ἢ φακὸς ἐφθὸς μετ' ἐλαίου θερμοῦ λεῖος, κρίνου  
ρίζα ἐφθὴ λεία καταπλάσσομένη μετὰ στέατος χοιρείου ἀνά-  
λου, σίδια ἐν οἴνῳ ἐφθὰ, σίλφιον μετ' ἐλαίου λεῖον, στέαρ  
καὶ κηρὸς μετ' ἐλαίου μυρσινίνου θερμοῦ λεῖα.

Κεφ. ρββ'. Πρεσβυτικά δὲ ἀπουλοῖ ἔλκη ἀναγαλλίς  
μετὰ κηρωτῆς, ἄρου φύλλα ἐφθὰ ἐν οἴνῳ ἐπιτιθέμενα, κρι-  
θαὶ καεῖσαι, καὶ ψιμύθιον μετὰ κηρωτῆς μυρσινίνης τριπλα-  
σίονος· ὧν λέκνυθοι καὶ λιθάργυρος ὁμοίως, κηρωτῇ ἀνα-  
ληφθέντα, κηρωτὴ μετὰ μολύβδου κεκαυμένου, μυρσίνη, πί-  
τυος φλοιὸς ὁμοίως.

Κεφ. ργγ'. Τὰ δὲ παλαιὰ ἐπουλοῦ πίτυος φλοιὸς σὺν  
κηρωτῇ μυρσινίνῃ, ἢ διαφυγὲς λεῖον καταπασσόμενον, εὐπα-

incavata: dracunculi folia cocta, cancri fluviatiles usti  
cum melle, cotyledon trita, tus cum adipe ursino, lithar-  
gyrum cum cerato myrtino, plumbago simili modo: un-  
gulae asininae inspersae, pulmo marinus tritus et pro ca-  
taplasmate impositus, similiter et marrubium tritum im-  
positum, ficus siccae cum cerato, aut eaedem crudae cum  
oleo calido tritae, lens palustris, lens item e leguminum  
genere cocta cum oleo calido trita, lili radix cocta tri-  
taque, cum adipe suillo iusulso imposita, melicorium in  
vino coctum, silphium cum oleo tritum: adeps denique  
et cera cum oleo myrteo fervente teruntur.

Cap. CLXXXII. Senum ulceribus cicatricem obdu-  
cunt anagallis cum cerato, ari folia in vino cocta impo-  
sita, hordeum ustum, cerussa cum triplo cerato myrtino,  
ovorum vitelli et lithargyrus eodem modo cerato excepta,  
ceratum cum plumbo usto, myrtus, similiterque pini  
cortex.

Cap. CLXXXII. Ulcera vetera haec ad cicatricem  
perducunt: pini cortex cum cerato myrtino, diphryges tri-

τωρίου φύλλα λεία σὺν ἄξουγγίῳ, πτέριδος ῥίζα λεία, ἕξος σὺν λιβανωτῷ, ἰὸς μετὰ διφρυγοῦς ἴσου καὶ μετὰ κηρωτῆς μυρσινίνης, καθμία μετὰ κηρωτῆς, κενταύριον χλωρὸν λείον, κισσοῦ ἄνθη μετὰ κηρωτῆς, κρίνου ῥίζα λεία σὺν ῥοδίῳ, καὶ τῶν φύλλων καὶ αὐτὸς ὁ χυλὸς ἐψηθεὶς ἐν χαλκῷ ἀγρίῳ σὺν μέλιτι καὶ ὄξει, ἔμμοτος καλλίστη ὑγρὰ γίνεται· λάδανον καὶ σμύρνα καὶ μέλι σὺν κηρωτῇ μυρσινίνῃ, ἢ ἔλαιον παλαιὸν σὺν μοτῷ.

Κεφ. ρηδ'. Τὰ δὲ ἐν τοῖς ἀκρωτηρίοις δυσαλθῇ εἰς τάξιν ἄγεται καταπλασσόμενα πρόπολις ἐπιτιθεμένη, μύρτα σὺν οἴνῳ, σεραπιάδος ῥίζα καταπλασσομένη, σηπεδῶν καταπλασσομένη ξύλου, ἀρκτίου φύλλα καταπλασσόμενα, ἀσφοδέλου ῥίζα σὺν ἀλφίτῳ, ἀστραγάλου ῥίζα ὁμοίως, βαλλωτῆς φύλλα ὁμοίως, βράθειος φύλλα ὁμοίως, κράμβης φύλλα μετὰ τηλίνου ἀλεύρου καὶ ὄξους, λιβανωτίδος φύλλα καὶ ἡ πῶα, μελισσόφυλλον ἐπιπλασσόμενον, καὶ πευκέδανον, χαμαίδρους σὺν μέλιτι, περιστερεῶν ὁμοίως, σιδηρίτιδος τῆς Ἡρακλείας φύλλα σὺν μέλιτι.

tum et inspersum, eupatorii folia trita cum axungia, filicis radix trita, viscus cum ture, aerugo cum aequa diaphrygis portione cerato myrteo excepta, cadmia cum cerato, centaurium viride tritum, hederacei flores cum cerato, lilii radix trita cum rosaceo: quin et eiusdem foliorum succus in aeneo vase cum aceto et melle coctus, praestantissimum evadit medicamentum liquidum, quo imbuta concerpta linamenta ulceribus induntur: ladanum, myrrha et mel cum cerato myrteo: oleum denique vetus linamento exceptum.

Cap. CLXXXIV. Ulcera extremarum partium aegre sanabilia meliorem in statum reducunt imposita haec: propolis, myrti baccae, serapiadis radix, ligni caries inspersa, arcti folia pro cataplasmate imposita, radix asphodeli cum polenta, similiter et astragali radix, itemque ballotes et sabinæ folia, brassicae folia cum farina fœni graeci et aceto, libanotidis folia, totaque etiam herba, apiastrum impositum, itemque peucedanum, chamaedrys cum melle, verbenaca recta eodem modo, Heracleae denique sideritidis folia cum melle.



Κεφ. ρπέ. Σαπροκνήμους δ' ἰᾶται καππάριως ῥίζα καταπλασσομένη, κενταύριον τὸ λεπτὸν λεῖον, ὀρόβιον συν μέλιτι, ὄρχεως ῥίζα συν μέλιτι, πευκεδάνου ῥίζα ὁμοίως, πίσσα ὑγρὰ, ποταμογείτων ὠσαύτως, σάκχαρον ἐν μοτῶ, σηπεδῶν ξύλων χνοώδης ξηρὰ· σταφυλίνου ῥίζα ξηρὰ λεία συν μέλιτι καὶ ἀλφίτῳ, καῖσα ἐν ὀθονίῳ μέχρις ἀνθρακώσεως· σῦκα ξηρὰ μετὰ χαλκάνθου, ἰὸς, λεπὶς, τερμινθίνη, κηρὸς, ἴσα· συκῆς τῶν ἀπυλῶν κλάδων τὰ ἀποξύσματα ἐφθὰ συν ὕδατι μετ' ἀλεύρου πύρινου, ἄχρις ἃν ἐμπλαστρῶδες γένηται, ἐπιτιθέμενα ὡς σπληνίον· καὶ ἔα μένειν ἐπὶ ἡμέρας γ'.

Κεφ. ρπς. Καθαίρει δὲ ἔλκη πρᾶσιον μετὰ μέλιτος, κνίδης φύλλα μεθ' ἁλῶν, ἀριστολοχία συν μέλιτι, γεντιανή, ἴρις συν μέλιτι, κολυμβάδες καταπλασθεῖσαι, ἐλελίσφακος λείος, ἐχίνου θαλασσίου κεκαυμένα ὄστρακα, ναρκίσσου ῥίζα συν ὀρόβῳ καὶ μέλιτι· ἢ νίτρου ἄφρον μέλιτι μίξας καῦσον ἐν χύτρᾳ καινῇ, καὶ μίξας ἴριν στοχασμῶ, χρῶ· ἢ χάρτου κεκαυμένου < ἢ, ἀρσενικοῦ < δ' συν ῥοδίνῳ, ἢ μέλιτι, ἢ ξηρῶ.

Cap. CLXXXV. Putridis tibiarum ulceribus medentur capparidis radix more cataplasmatum imposita, centaureum minus tritum, ervi farina cum melle, orcheos radix cum melle, similiterque radix peucedani, pix liquida, similiter et potamogiton, saccharum linamento exceptum, caries lignorum sicca pulverata, pastinacae radix sicca tritaque cum melle ac polenta, et in lintecolo usta, dum in carbones redigatur: caricae cum chalcantho, aerugine, squama aeris, terebinthina et cera, aequalibus partibus; ramulorum fici tenellorum ramenta cocta in aqua cum farina triticea, usquedum emplastri compagem assequantur, ac imposita splenii in modum, relictisque triduo.

Cap. CLXXXVI. Ulcera expurgant marrubium cum melle, urticae folia cum sale, aristolochia cum melle, gentiana, iris cum melle, olivae conditae, more cataplasmatum impositae, salvia trita, erinacei marini testa cremata, narcissi radix cum ervo et melle. Aliud: nitri spumam melli admixtam in olla nova comburito, additaque, prout videbitur, iride utitor. Aut: sumito chartae combustae drach. viij., arsenici drach. iiij., misceto cum rosaceo aut melle, vel siccis utitor.

Κεφ. ρπζ'. Ἐσχάρας περιθήσεται τὰς ἀπὸ καύσεως ἐπιτιθέμενα ἱρίς, ὀνώνιδος φύλλα, ὄροβοι ἐφθοί, θέρμοι, ἀρογλώσσου φύλλα καὶ ἄνθη, πράσου κεφαλωτοῦ φύλλα μεθ' ἁλῶν καὶ ὄξους, ἱερὰ βοτάνη, θαλλία, μήκωνος κερατίτιδος φύλλα καὶ ἄνθη, σῶρι κεκαυμένον, τιθυμάλλου ὀπός, ῥίζα λεία ὁμοίως.

Κεφ. ρπη'. Πληροῖ δὲ τὰ ἔλκη βούτυρον, κηρὸς καὶ ῥητίνη, ῥόδιον, βουνίου ῥίζα καὶ τὰ φύλλα, ἀριστολογία καθ' ἑαυτήν, καὶ σὺν ἰριδι· καὶ πάνακος ῥίζα σὺν μέλιτι.

Κεφ. ρπθ'. Στέλλει δὲ ἔλκη ἄσβεστος, μάννα, λεπίς, ἴσα· ἐχίνος κεκαυμένος, σμάριδος ταριχηρᾶς κεφαλὴ καεῖσα, κεδρία, κηκίς, κήρυκες κεκαυμένοι, λίθος σάπφειρος· μόλυβδος κεκαυμένος, σπόδιον, στυπτηρία πᾶσα καεῖσα, σῶρι, ὃ καὶ τὰ πλαδῶντα ἀποτήκει· σκόρδιον λεῖτον· χαλκίτις, χάλκανθος, μίσυ, διφρυγές, ὀθόνιον κεκαυμένον.

Κεφ. ρς'. Πτερύγια δὲ θεραπεύει ἀκακίας χύλισμα καταχρίομενον, ἄλλοι ξηρὰ ἐπιπασσομένη, ἰὸς διπλασίῳν μετὰ

Cap. QLXXXVII. Ulcerum ab ustione crustas emarginant imposita haec: iris, ervum coctum, lupini, plantaginis folia et flores, porri capitati folia cum sale et aceto: verbenaca supina, oleae germina, papaveris corniculati folia et flores, sori ustum, lacteus tithymali liquor, similiterque radix ari contrita.

Cap. CLXXXVIII. Ulcera carne replent butyrum, cera et resina, rosaceum unguentum, bunii radix et folia, aristolochia per se et cum iride, panacis denique radix cum melle.

Cap. CLXXXIX. Excrescentes ulcerum carnes compescunt calx viva, manna et squama aeris, paribus mixta portionibus: erinaceus crematus, smaridis sale conditae caput ustum, cedria, galla, buccina cremata, sapphirus lapis, plumbum ustum, spodium, aluminis omne genus ustum, sori, (quod et carnes humore nimio flavescentes absumit,) scordium tritum, chalcitis, chalcanthum, misy, diphryges, linteolum ustum.

Cap. CXC. Pterygiis medentur ista: acaciae succus illitus, aloë sicca inspersa, aerugo dupla portione mixta

λιθαργύρου ἀπλῆς, πενταφύλλου ῥίζα καταπλασσομένη; τιθυμᾶλλου ὀπὸς ἐπιχριόμενος, γλυκύῥιζα ξηρὰ ἐπιπασσομένη, ἰὸς σιδήρου σὺν ὄξει, ῥίνισμα ἐλέφαντος ὁστέου ὁμοίως, πρᾶσιον σὺν μέλιτι, στυπτηρία σὺν ὕδατι· σῦκα ξηρὰ μετὰ σιδίων ῥοιᾶς ἐφθὰ καὶ μέλιτος, χαλκίτιδος καὶ λεπίδος μιγέντων καὶ ὥς ἐμπλαστρος ἐπιτιθεμένων· ἢ στυπτηρίαν σχιστὴν, σανδαράκην, ἄσβεστον, διφρυγές, ἴσα μίξας κατάπλασσε. Ἀναξηραίνει δὲ τὰ πτερόγρια λεπὶς κυπρία λεία ἐπιπασσομένη θυμαστώϊ.

Κεφ. ρςα'. Παρωνυχίας θεραπεύει λιβανωτὸς σὺν μέλιτι, μυρσίνη κεκαυμένη σὺν κηρωτῇ, ἢ τοῖς φύλλοις ὁμοίως κατάπλασσε, ἢ σταφίδι μετὰ μάννης.

Κεφ. ρςβ'. Ἀναστομοῖ δὲ τὰ μύσαντα τῶν τετυλωμένων καὶ χρονίων ἐλκῶν σκίλλης τὸ ἐντὸς σὺν μέλιτι.

Κεφ. ρςγ'. Ραγάδας τὰς ἐν αἰδοίῳ ὠφελᾷ ῥητίνη φρυκτὴ σὺν ῥοδίῳ λειωθεῖσα, ἄχρι γλοιωθῇ, μιγνυμένης καὶ ὠοῦ λεκύνθου ὀπτῆς, κισσοῦ φύλλων ξηρῶν κεκαυμένων ἢ τέφρα τριβεῖσα σὺν ἐλαίῳ ἐν μολυβδῇ θυεῖα. Ποιεῖ καὶ ἐπὶ τῶν περὶ τὸν δακτύλιον συρίγγων σὺν ἐρίῳ ἐντιθεμένη.

cum lithargyro, quinquifolii radix imposita, tithymali lacteus liquor illitus, glycyrrhizae pulvis inspersus, rubigo ferri cum aceto, similiter et scobs elephantini ossis, marrubium cum melle, alumen ex aqua: caricae cum mallicorio et melle coctae, additis chalcitide et squama aeris, ad emplastri compagem redactae et impositae. Aliud: alumen scissile, sandaracham, calcem vivam et dighryges aequis mixta portionibus adhibeto. Mirabiliter vero pterygia exsiccant aeris squama cypria trita et imposita.

Cap. CXCI. Paronychias sanant tus cum melle, et myrtus usta cum cerato: huius eiusdem folia similiter adhibe, aut uvam passam cum manna.

Cap. CXCII. Astrieta labia callosorum diuturnorumque ulcerum aperit scillae pars interna cum melle.

Cap. CXCIII. Rimis pudendorum confert resina cum rosaceo frixa tritaque ad strigmentitiam crassitudinem, addito etiam vitello tosto. Iuvat et aridorum hederæ foliorum ustorum cinis, cum oleo in mortario plumbeo tritus. Proficit idem et ad ani fistulas, cum lana inditus.

Κεφ. ρςδ'. Τὰ δ' ἔλκη τὰ ἐν αἰδοίῳ θεραπεύει βα-  
λαύστιον καταπλασσόμενον, ἀλόη, πίτυς φλοιὸς σὺν λιβα-  
τωτῷ, ἀσπαλάθου ξύλα, ἀκακίας χύλισμα, ἥ ῥοᾶς ἀγρίας  
χυλός.

Κεφ. ρςε'. Τὰ δὲ ἀλγήματα παύει οἶνος ἀθάλαστος,  
θερμὸς καταντλούμενος, καὶ χολὴ αἰγεία καταχοιμένη.

Κεφ. ρςς'. Νομὰς δὲ τὰς ἐν αἰδοίῳ ὠφελεῖ ἐγκλυζό-  
μενον μίσυ σὺν ὄξει, καὶ τὰ ἱστορηθησόμενα ἐπὶ νομῶν.

Κεφ. ρςζ'. Σκώληκας δὲ ἐκβάλλει τοὺς ἐπὶ τοῖς ἔλκεσι  
γενομένους ἀρνόγλωσσον λεῖον καταπλασθὲν, ἥ ἔρινέου κε-  
καυμένου τέφρα, καταπασσόμενα.

Κεφ. ρςη'. Πρὸς ἄνθρακας τριβόλου φύλλα χλωρὰ,  
καὶ τετηγανισμένα, καὶ στέαρ χοίρου λειῶσας ὁμοῦ καὶ κα-  
ταμαλάξας τὸ ἔλκος, ἐπιτίθει. Ἀνθρακας δὲ θεραπεύει κα-  
ταπλασσόμενα ἀγριελείας φύλλα μετὰ μέλιτος, καὶ ὁ καρ-  
πὸς πεφρυγμένος λεῖος σὺν μέλιτι· αἰέζωον καθ' ἑαυτὸ, ἀρ-  
νόγλωσσον ὁμοίως, αἶρινον ἄλευρον σὺν ῥαφάνῳ καὶ ἁλσί,  
βρυωνίας ῥίζα λεία μετ' οἴνου, ἄρου ῥίζα ὁμοίως, ὑὸς ἄφο-

Cap. CXCIV. Ulcera pudendorum sanant balaustium  
impositum, aloë, pini cortex cum ture, aspalathi lignum,  
expressus acaciae succus, mali denique punici sylvestris  
succus.

Cap. CXCV. Dolores autem pudendorum sedat vi-  
num aquae marinae expers, calens affusum, itemque fel  
caprinum perunctum.

Cap. CXCVI. Pudendi depascentibus ulceribus con-  
fert misy cum aceto infusum: nec non et ea, quae dein-  
ceps capite de nomis tradentur.

Cap. CXCVII. Vermes in ulceribus genitos eiicit  
plantago trita et inspersa, similiterque caprifici usti cinis.

Cap. CXCVIII. Ad carbunculos. Tribuli folia vi-  
rentia in sartagine frixa cum adipe suillo terito, ac ubi  
prius ulcus ipsum leniveris, imponito. Carbunculis prac-  
terea medentur haec imposita: oleae agrestis folia cum  
melle, fructus eiusdem frictus et cum melle tritus, sem-  
pervivum per se, plantago similiter, loliacea farina cum  
raphano et sale, bryoniae radix trita cum vino, similiter



δος, ξηρὰ καταπλασθεῖσα, περιστερεῖς ἄφοδος μετὰ λινოსπέρμου καὶ μέλιτος, ἀσπάλαθος λεῖος καταπλασσόμενος, σταφίς σὺν πηγάνῳ ἢ ὀπῶ· βράθυος φύλλα λεῖα σὺν μέλιτι, θέρμοι ἐφθοὶ λεῖοι, κάρδαμον χλωρόν καὶ τὸ σπέρμα.

Κεφ. ρςθ'. Πυοποιεῖ δὲ καὶ περιθρήσσει τοὺς ἀνθρώπους καρύου βασιλικοῦ παλαιοῦ καὶ προσφάτου τὸ ἐντὸς, στροβίλου τὸ ἐντὸς ὁμοίως, κορίου φύλλα μετὰ σταφίδος, μήκωνος κερατίτιδος φύλλα καὶ τὰ ἄνθη· ὁπὸς σιλφίου μετὰ πηγάνου καὶ μίλτου καὶ μέλιτος, ἢ καθ' ἑαυτόν· δεῖ δὲ ἄνωθεν ἀειζῶφ καταλαμβάνειν, ὥστε προσμένειν· ὄροβος λεῖος σὺν οἶνῳ, πίσσα ὑγρὰ σὺν σταφίδι καὶ στέατι, κράμβης φύλλα λεῖα σὺν ὕδατι.

Κεφ. ς'. Τὰς δὲ ἐπιγινόμενας νομὰς καὶ σηπεδόνας θεραπεύει ἀρσενικὸν καὶ ἄσβεστος μετὰ σανδαράχης καὶ χάριτος κεκαυμένου· νίτρον σὺν ἄσβεστῳ καὶ τρυγί, ἢ ὄξει, ἢ ὕδατι· στυπτηρία πᾶσα κεκαυμένη σὺν διπλασίοσιν ἁλσίν, σῶρι κεκαυμένον, λεπίς καὶ κίσσηρις κεκαυμένη ἴσα, ἅλεις ὥς ὅτι πλεῖστοι ἀναληφθέντες πίσση ὑγρᾷ, ἀριστολογίας ῥίζα

et ari radix, fimus suillus, siccus adhibitus, fimus columbinus cum lini semine ac melle, aspalathus tritus et impositus, uva passa cum ruta et lasere, sabinae folia trita cum melle, lupini cocti tritique, nasturtium virens eiusdemque semen.

Cap. CXCIX. Carbunculos vero ad suppurationem perducunt rampuntque iuglandis, seu veteris, seu etiam recentis, nucleus, strobili pars interna eodem modo, coriandri folia cum uva passa, papaveris corniculati folia et flores, silphii liquor cum ruta, nitro et melle, aut etiam per se: (sed insuper pars ita obtegenda est sempervivo, ut adhaerescat:) ervum tritum cum vino, pix liquida cum uva passa et adipe, brassicae denique folia trita ex aqua.

Cap. CC. Nomis putridisque ulceribus supervenientibus ista medentur: arsenicum et calx viva cum sandarachia et charta combusta, nitrum cum calce viva et faece vini, aut aceto vel aqua, aluminis genus omne ustum cum duplo sale, sori ustum, squamae acris pumicisque usti pares portiones, sal quamplurimus pice liquida ex-

σὺν ῥητίνῃ, ἀρονόγλωσσον καταπλάσθην, αἶρινον ἄλευρον σὺν ῥαφάνῳ καὶ ἄλσιν, ἀμύγδαλα πικρὰ σὺν μέλιτι, σταφῖς μετὰ πηγάνου, γαλίωψις μεθ' ἁλῶν, θαλία σὺν μέλιτι, σμαρίδος ταριχηρᾶς κεφαλὴ κεκαυμένη, ἰὸς σὺν μίσει κεκαυμένῳ, κηκὶς καεῖσα καὶ ὄξει σβεσθεῖσα, κήρυκες κεκαυμένοι· κύπρου ἄνθη καέντα καθ' ἑαυτὰ, καὶ σὺν μέλιτι καταπλάσθέντα· ἢ κυπάρισσος καθ' ἑαυτὴν καὶ σὺν ἀλφίτῳ, μόλυβδος κεκαυμένος λεῖος, λεπὶς σιδήρου σὺν ἐλαίῳ, ἄρου φύλλα καταπλάσσόμενα, σενθλον ἐφθὸν καταπλάσσόμενον· περιστρεφὼν σὺν μέλιτι, τιθυμάλλου ὀπὸς, χαλκὸς κεκαυμένος, φακὸς κεκαυμένος, φακὸς ἐφθὸς σὺν σιδίοις, θαλία σὺν ἄλμῃ καὶ μεθ' ἁλὸς λεία, ἢ σιδία καὶ ἄλες. Καταντλεῖ δὲ ἀφεψήματι κυτίνου, σκίνου, κυπαρίσσου, μυρσίνης, γάρῳ τῷ ἐκ σιλοῦρων ἢ ἰχθύων.

Κεφ. σα'. Γαγγραινας δὲ περιχαράσσει αἶρινον ἄλευρον σὺν ῥαφάνῳ καὶ ἄλσι καταπλάσσόμενον, βράθυος φύλλα, σταφῖς σὺν ῥαφάνου φλοιῷ, ἢ ῥαφάνου φλοιὸς σὺν μέλιτι, κάρυον βασιλικὸν παλαιὸν τὸ ἐντὸς, οἱ κύτινοι ἐφθοὶ μετὰ σιδίων, λί-

ceptus, aristolochiae radix cum resina, plantago cataplasmatibus instar imposita, loliacea farina cum raphano et sale, amygdala amara cum melle, uva passa cum ruta, galiopsis cum sale, oleae germina cum melle, smaridis salitae caput ustum, aerugo cum misy usto, calx usta et aceto exstincta, buccina usta, cypri flores cremati, per se et cum melle impositi: cupressus per se et cum polenta, plumbum ustum tritum, squama ferri cum oleo, ari folia cataplasmatibus instar imposita, itidemque beta cocta, verbenaca recta cum melle, tithymali lacteus liquor, aes ustum: lens usta, eadem cum malicorio: oleae tenellum germen cum muria et cum sale tritum: malicorium cum sale. Perfunde autem decocto lentisci aut cupressi vel myrti, aut garo et siluris aliisque piscibus.

Cap. CCI. Gangraenas emarginant loliacea farina cum raphano et sale imposita, fabinae folia, uva passa cum raphani cortice, aut raphani cortex cum melle, iuglandis vetustae nucleus, cytini cocti cum malicorio, lapis

θος ὀστρακίτης σὺν μέλιτι, μυρσίνης<sup>48</sup> φύλλα ἐφθὰ ἐν οἷνῳ  
 λεῖα μετὰ μέλιτος, ὄροβος σὺν μέλιτι· ἑσφάνου σπέρμα μετ'  
 ὄξους καταπλασθὲν τὰς ἐσχάρας ἄχρι ὁστέου ῥήσσει· πράσιον  
 σὺν μέλιτι, ὃ καὶ ἀνακαθαίρει· τιθυμάλλου ὀπὸς, ὃν κατα-  
 σχάσας ἐντίθει εἰς τὰς διαιρέσεις· ἢ ὀπὸς σιλφίου ὁμοίως·  
 κατάντλει δὲ θέρμων ἀποζέματι συνεχῶς, ἢ οὖρῳ ἀνθρω-  
 πείῳ, ἢ ὄξει.

Κεφ. σβ'. Τὰ δὲ τεθριωμένα ἔλκη ἰδίως στέλλει χα-  
 μαιλίων λεῖος, ὥχρα ἀττική κεκαυμένη· ἀρσενικὸν καὶ ἄσβε-  
 στος ἴσα πλυθέντα σὺν ὕδατι ὁμοίως ἐπὶ ἡμέρας λ', ἀπο-  
 χιομένου τοῦ ἐπιπάγου καθ' ἡμέραν.

Κεφ. σγ'. Πονηρευόμενα ἔλκη καὶ σκληρίας κακοήθεις  
 θεραπεύει βαλάνων δρυῖνων σάροξ λεῖα σὺν ἄξουγγίῳ ἐπιτε-  
 θεῖσα· δρακοντίου ῥίζης χυλὸς, καὶ ἡ ῥίζα ἐπιπλασθεῖσα·  
 ἄρου ῥίζης ὁμοίως, γαλίου φύλλα καὶ χυλὸς σὺν ὄξει, βρυ-  
 ωνίας λευκῆς καὶ δρακοντίου ῥίζα σὺν μέλιτι, ἐρέβινθοι ἢ  
 ὄροβοι σὺν μέλιτι· ἱξὸς σὺν λιβανωτῷ, καρκίνων ποταμίων

48) Sarac. loco μυρσίνης.

ostracites cum melle, myrti folia, in vino cocta, trita cum  
 melle, ervum cum melle, raphani semen cum aceto adhi-  
 bitum, (quod crustas etiam ad os usque rumpit,) marru-  
 bium cum melle: (hoc etiam expurgat:) tithymali lacteus  
 liquor, quem scalpello factis inter scarificandum vulneribus  
 indi par est: silphii liquor, qui eodem etiam modo usur-  
 pabitur. Frequenter autem perfunde lupinorum decocto,  
 aut urina humana vel aceto.

Cap. CCII. Efferata ulcera privatim inhibent chamae-  
 leon tritus et ochra attica usta: similiter et arsenicum et  
 calx viva, si aquis portionibus ex aqua laventur diebus  
 triginta, effuso quotidie, quod in summo concreverit.

Cap. CCIII. Fraudulentis ulceribus duritiisque ma-  
 lignis medentur ista: glandium quernarum caro trita, im-  
 posita cum axungia: dracunculi radice succus, ipsaque  
 radix per se imposita: similiter et ari radice succus ipsa-  
 que radix: galiopsis folia et succus cum aceto, bryoniae  
 albae et dracunculi radix cum melle, cicer aut ervum

ἡ τέφρα σὺν μέλιτι, κισσὸς λεῖος καταπλασσόμενος· ἄσσιος λίθος, ἡ τὸ ἄνθος αὐτοῦ καταπλασσόμενον, ἐπουλοῖ· σὺν μέλιτι δὲ, ἀποκαθαίρει· καὶ ὄνυξ δὲ ὁ ἐκ τῆς πορφύρας καταουλοῖ τὰ κακοήθη ἔλκη καταπλασσόμενος, πυροῦ ἀγρίου τῆς χελιδονίου λεγομένης ῥίζα ξηρὰ καταπλασσομένη· φιλειταιρίου ῥίζα καταπλασσομένη· περιστέριον<sup>49</sup> σὺν μέλιτι· θέρων ἀπόξεμα συνεχῶς καταντλούμενον.

Κεφ. σδ'. Πρὸς δὲ φαγεδαίνας ποιεῖ μὲν ὅσα καὶ πρὸς κακοήθη καὶ πονηρευόμενα ἔλκη ἀναγράφεται· ἀρμόζει δὲ καὶ ταῦτα· ἀσφοδέλου ῥίζα μετ' ἐλαίου ἐψηθεῖσα καὶ καταπλασθεῖσα, κνίδης φύλλα μεθ' ἁλῶν, ἄλεις σὺν μέλιτι καὶ ἀλφίτῳ καέντις ἐν ὀθονίῳ μέχρις ἀνθρακωθῶσι, βρυονίας λευκῆς καὶ μελαίνης φύλλα καὶ οἱ καυλοὶ μεθ' ἁλῶν καταπλασσόμενα, συκῆς φύλλα λεῖα ἐν οἴνῳ, ἰσάτεως φύλλα ἀγρίας καὶ ἡμέρου· κάρδαμον σὺν μέλιτι. Ἀνακαθαίρει δὲ ἄσσιος λίθος σὺν κηρωτῇ, ῥοὸς βυρσοδεψικῆς φύλλα σὺν μέλιτι, σταφυλίνου ἀγρίου ῥίζα ξηρὰ καταπλασθεῖσα, στυπτη-

49) Diosc. lib. 4. cap. 108.

cum melle, viscum cum ture, cancrorum fluviatilium cinis cum melle, hedera trita et cataplasmatibus instar imposita: assius lapis aut eiusdem flos inspersus ad cicatricem deducit, et cum melle expurgat. Sed et onyx, seu tegumentum purpurarum, inspersus maligna ulcera perducit ad cicatricem: tritici sylvestris, quod chelidonium minus appellatur, radix sicca et inspersa, itidemque philetaerii radix: fumaria cum melle, denique fots frequens e lupinorum decocto.

Cap. CCIV. Ad phagedaenas faciunt quidem, quaecunque ad maligna fraudulentaque ulcera modo conscripta sunt, sed et ista conveniunt: asphodeli radix cum oleo cocta et in modum cataplasmatibus imposita, urticae folia cum sale: sal cum melle et polenta in linteolo crematum, usque dum in carbones redigatur: bryoniae tam albae quam nigrae caules et folia cum sale adhibita, ficifolia trita in vino, isatis agrestis et domesticae folia, nasturtium cum melle. Repurgant vero assius lapis cum cerato, rhois coriarii folia cum melle, pastinacae sylvestris



ρία πᾶσα κεκαυμένη μετὰ κηκίδος καὶ τρυγὸς ὄξους· ποιῇ δὲ καὶ ὄξος συνεχῶς καταντλούμενον.

Κεφ. σέ. Ἐλεφαντιάσεις δὲ ὠφελεῖ ἀρνόγλωσσον καὶ μέλι ἐπὶ τῶν ἐξοιδούντων μερῶν, ἱερὰ βοτάνη ὁμοίως· χολὴ ἀγρίας αἰγὸς ἢ τράγου καταχρισθεῖσα ὠφελεῖ· καὶ γάλα σχιστὸν καταπινόμενον ἱκανῶς τοὺς ἐλεφαντιῶντας ὠφελεῖ· καὶ καλαμίνθη ἐσθιομένη, ἣ ὁ χυλὸς αὐτῆς πινόμενος, ὀφρύου γάλακτος ἐπιπινόμενον, καὶ κεδρία ἐκλειχόμενη· ποιῇ δὲ θαυμαστῶς ἵππειον στέαρ ἐπιχρίόμενον τοῖς οἰδηκόσι μέρεσι. Ἐν ἀρχῇ δὲ, ὅτε δειχθῇ ἐλέφας, ποιήσον οὕτως· λοῦσον αὐτὸν εἰς λουτρὸν ἡμέρας γ'. καὶ καθὼς ἐξέρχεται ἐκ τοῦ λουτροῦ, τρίβε τοὺς ὀσφύς αὐτοῦ καὶ τὰς παρειὰς ἁλσὶ καὶ νίτρω εὐτόνως· καὶ μετὰ τὰς γ' ἡμέρας ἔχε ἑτοιμον ἔλαιον ἀπὸ πεπόνων σπέρματος, καὶ αὐτὸ τρίβε ὁμοίως, καὶ ἐγγυμάτιζε.

Κεφ. σς'. Ραγάδας δὲ τὰς ἐν ποσὶ θεραπείαι ἐντιθέμενα σκίλλης τὸ ἐντὸς σὺν ἐλαίῳ ζεσθὲν, καὶ ῥητίνῃ τερμινθίνῃ συλλεανθέν· καρκίνοι ποτάμιοι καέντες λείοι σὺν μέλιτι, πολυποδίου ῥίζα καταπλασσομένη, κέρας αἰγίου κεκαυ-

radix sicca adhibita, aluminis genus quodvis ustum cum galla et aceti facce: proficit et acetum frequenter affusum.

Cap. CCV. Elephantiacos iuvat plantago cum melle partibus tumentibus imposita, similiter ex verbenaca supina: prodest et sylvestris caprae aut hirci fel illitum: lac schiston in potu sumptum multum iuvat elephantiacos: sic et calamintha in cibis sumpta, eiusdemve succus epotus, lactis sero superbibito: cedria in eclegmate sumpta. Mire vero proficit adeps equinus, tumidis partibus illitus. In principio autem, cum primum sese patefacit elephas, hominem in balneo triduo lavato, et in balnei exitu eius lumbos ac genas sale ac nitro valenter confricato. Triduo exacto in promptu sit oleum e semine perponum, quo similiter ipsum affrices atque perfundas.

Cap. CCVI. Rimis pedum haec indita medentur: scillae medulla in oleo fervefacta tritaque cum resina terbinthina, canceri fluviatiles usti, triti cum melle, polypodii radix cataplasmatibus instar imposita, cornu caprinum

μένον ἀναληφθὲν στέατι αἰγείῳ· ἢ μέλιτος λίτρα, κηρὸς καὶ ἔλαιον συντακέντα ἴσα, λιθαργύρου γο. δ' ἐψηθέντα, ἕως ἐμπλαστρος γένηται· δεῖ δὲ προκαθαίρειν τοὺς τύλους, καὶ χρῆσθαι τοῖς φαρμάκοις.

Κεφ. σζ'. Σύριγγας δὲ ἐκτῆχει καὶ καθαίρει ἰοῦ < ιβ', ἀμμωνιακοῦ θυμιάματος < β', κολλυριοποιηθέντα καὶ ἐντεθέντα ταῖς σύριγξι μετ' ὄξους ἢ ὕδατος, ἀμόργη ἐψημένη καὶ ἐγκλυζομένη· ἰριδος ῥίζης ἀπόζεμα ἐγκλυζόμενον καὶ πρὸς κόλπους ποιεῖ· ἄρου ῥίζα, ἅλιμος ἐντιθέμενος, καὶ ἡ ῥίζα δὲ αὐτοῦ καὶ τὰ φύλλα ὡς κολλύρια ἀναπλασσόμενα· ποιεῖ δὲ καὶ πρασίου ῥαβδίου ἀπαλὸν ἐντιθέμενον, κοτυληδὼν μετὰ μυελοῦ ἐλαφείου ἐντιθεῖσα, γεντιανῆς χύλισμα, διψάκου ῥίζα χυλισθεῖσα καὶ ἐντεθεῖσα, τιθυμάλλου ὀπὸς, χαλκίτις κεκαυμένη, ἀναληφθεῖσα ἀμμωνιακῷ ὡς κολλύριον, ἐλλέβορος μέλας ἐντεθεῖς καὶ μετὰ τρεῖς ἡμέρας ἐξαιρεθεῖς· κυπαρίσσου σφαιρία λεία μετὰ σύκου λείου ἐγκλυζόμενα σὺν ὄξει, ὥχρα ὁμοίως μετ' ὀλίγου κραματίου καὶ μέλιτος ἐγκλυζομένη, σῶρι ὠμὸν ἢ κεκαυμένον, καὶ σαρκὸς ὀμφάκιον ἐγκλυζόμενον,

ustum sevoque caprino exceptum. Aut mellis libram unam, olei et cerae simul liquatorum sana tantundem, lithargyri uncias quatuor coquito ad emplastri consistentiam. Sed callos prius repurgare oportet, sicque medicamentis uti.

Cap. CCVII. Fistularum callos exedunt easdemque purgant, quae sequuntur: aeruginis drach. xij, ammoniaci thymiamatis drach. ij, conformatae in collyrium, inditaeque fistulis cum aceto vel aqua: amurca decocta et infusa: iridis radicis decoctum infusum etiam ad sinus proficit, ari radix, halimus immissus, quin et eiusdem radix foliaque in collyria conformata. Facit et tenellum marubii virgultum inditum, umbilicus Veneris cum medulla cervina impositus, expressus e gentiana succus, dipsaci radix in succum soluta inditaeque, liquor tithymali lacteus, chalcitis usta, ammoniaco excepta in modum collyrii: hel-leborus niger immissus et post triduum exemptus, cupressi globuli triti cum ficu trita infusi ex aceto, ochra simili modo cum paucio vino diluto ac melle infusa, sori

πενταφύλλου φύλλα σὺν ἁλσὶ καὶ μέλιτι, κονία συνκίνη ἐγκλυζομένη, τηλεφίου φύλλα ἐμπλασσόμενα λεία, σφονδυλίου ῥίζα ξυσθεῖσα καὶ ἐντεθεῖσα· δεῖ δὲ προαναστομοῦν τὰς συριγγας σπογγίῳ ἢ παπύρῳ ἐσκελετευμένῳ, καὶ οὕτω κεκοῖσθαι τοῖς προειρημένοις.

Κεφ. σή'. Αἰμορροαγίας δὲ ἴσθησι τὰς ἐκ τῶν τραυμάτων αἰθιοπίδος ῥίζα λεία καταπλασθεῖσα σὺν ὄξει· λυσιμάχιος πόα ὁμοίως, ἀλόη λεία καταπλασθεῖσα, φλοιὸς ἀμπέλου λείος, καὶ τὰ φύλλα ξηρὰ λεία, ἀμύγδαλα, ἀνδρόσαιμον ἐμπλασθέν, ἀπαρίνης φύλλα ὁμοίως, ἀπόπατος αἰγὸς, ἢ ἵππου, ἢ ὄνου ἄκαυστος, ὡς ἄλφιτα ἐμπλασσόμενος, μοτῶν ὄξει βραχέντων καὶ ἐμπλασθέντων· ποιοῦσι δὲ κεκαυμένοι καὶ ἑαυτοὺς καὶ ὄξει ἀναληφθέντες, ἀρνόγλωσσον λείον, ἀράχνης ὕψος.

Κεφ. σθ'. Τὰς ῥήξεις τὰς ἐπιπολαίους στέλλει ἀστραγάλου ῥίζα καταπλασθεῖσα, ἄσφαλτος ξηρὰ, Ἀχιλλείου τῆς σιδηρίτιδος φύλλα καταπλασσόμενα, βατράχων καέντων ἢ τέτρα καταπασσομένη, ὀθονίου καέντος ὁμοίως, ἢ διφρυγούς

crudum ustumve, omphacium infusum etiam carne explet: quinquefolii folia cum sale et melle, lixivium ficulneum infusum, telephii folia trita illita, sphondylii radix circumrasa et indita: sed prius laxandae aperiendaeque fistulae spongia aut papyro exsiccata, tumque utendum antedictis.

Cap. CCVIII. Profluentem e vulneribus sanguinem sistunt haec: aethiopidis radix trita imposita cum aceto, lysimachia herba simili modo, aloë trita inspersa, vitis cortex tritus, et eiusdem folia sicca tritaque, amygdala, androsaemon impositum, similiter et aparines folia: simus caprae, aut equi, vel asini, citra ustionem instar polentae impositus, linamentis ex aceto madentibus superimpositis: faciunt et iidem simi usti per se et aceto excepti, plantago trita, aranei tela.

Cap. CCIX. Sanguinis per summam cutem eruptiones inhihent astragali radix more cataplasmatum imposita, bitumen aridum, Achilleae sideritidis folia imposita, ranarum ustarum cinis inspersus, lintei cremati eius, aut

καταπασθέντος, θαλία λεία, ἐλελίσφακον ὁμοίως· θεῖον ἄπυρον, ἰδαία ῥίζα, ἰὸς σιδήρου καὶ λεπίς, ἰσάτεως φύλλα ἀγρίας καὶ ἡμέρου, καδμία λεία, κηκίς λεία, κύπρος, κυπαρίσσου σφαιρία σὺν ὄξει, λίβανος, μάννα, λειχὴν ὃ ἐπὶ τῶν πετρῶν, μυρσίνη ξηρὰ καὶ ὑγρὰ, πενταφύλλου ῥίζα· στυπτηρία πᾶσα, ἥ δὲ ὑγρὰ καεῖσα· καὶ σπόγγος ἀραιὸς πίση βραχεὶς καὶ καεὶς λεῖος καταπασσόμενος.

Κεφ. σί. Τὰς δὲ ἐκ μυκτήρων αἰμορραγίας στέλλει ὀξύσχοινος ἐντιθεμένη λεία, κνίδης φύλλον χυλὸς ἐν μοτοῖς ἐντιθέμενος, καὶ αὐτὰ τὰ φύλλα λεία κατὰ τοῦ μετώπου ἐντιθέμενα, χαλκῆτις, χάλκανθον κεκαυμένον· ἢ ἀνθήλη κεκαυμένη ξηρὰ, ἐν μοτοῖς ἐντιθεμένη ὁμοίως, φλόμος ὃ εἰς τὰ ἐλλύχνια, καὶ ἐλελίσφακου φύλλα λεία, βολβοὶ λεῖοι κατὰ τοῦ μετώπου καταπλάσσόμενοι ἐν πράσου χυλῷ ἢ ὄξει, ὅνις ὁμοίως, γύψος σὺν ὕδατι, ἢ ὡσὺ τῷ λευκῷ καταχρισθὲν καθ' ὅλης τῆς κεφαλῆς ψιλωθείσης καὶ μετώπου· ἱππούριδος χυλὸς, ἢ περικλυμένου σὺν μοτῷ ἀναληφθείς·

diphrygis ad eundem modum inspersus, tenellum oleae germen tritum, similiterque salvia, sulphur vivum, idaea radix, ferri rubigo et squama, isatis tum agrestis tum sativae folia, cadmia trita, galla trita, cyprus, cupressi globuli cum aceto, tus, eiusdem manna, lichen petris innascens, myrtus tum virens tum sicca, quinefolii radix, quodvis genus aluminis, et liquidum quidem ustum: spongia rara imbuta pice, deindeque usta, trita et inspersa.

Cap. CCX. Profluentem e naribus sanguinem supprimunt ista: schoenus acutus tritus, naribus inditus, urticae foliorum succus linamentis exceptus et inditus, ac ipsa quoque folia trita fronti adhibita, chalcitis, chalcanthum ustum, flos phlei seu stoebeus ustus pulveratusque et in nares immissus, similiterque verbascum, quo ad lucernarum ellychnia utuntur, et salviae folia trita, bulbi triti frontique cataplasmatibus instar impositi cum porri succo vel aceto: stercus asininum simili modo, gypsum ex aqua aut ovi albumine toti capiti pilis nudato frontique inductum, equiseti succus aut periclymeni linamento ex-



κοχλίου σάροξ ἐν ὄξει, καὶ ὅλοι κοπέντες σὺν τῷ ὀστράκῳ καταπλασσόμενοι καὶ ὅλου τοῦ μετώπου ἢ τοῦ μυκτήρος, κύμινον σὺν ὄξει ἐντιθέμενον λεῖον, νάρθηκος τὸ μέσον σὺν ὄξει, πήρανον ἐντεθὲν λεῖον, κρόμμυον λεπισθὲν καὶ ἐντεθὲν ξηρὸν, πυτία λεανθεῖσα καὶ ἐμπλασθεῖσα· ἐπέχει καὶ τὰ ὦτα κηρῷ ἀπαλωτάτῳ ἐμπλασσόμενα ἐπιμελῶς, καὶ τῷ ἰνίῳ σικκῶσθαι αὐτοὺς, καὶ ἡ πόσθη ἀποδεδεμένη ῥάμματι· ἐνστάζεται δὲ ὠφελίμως καὶ εἰς τὸ οὖς ὕδωρ ψυχρόν· φασὶ δὲ ἐπέχουσαι τὰς ἐκ μυκτήρων αἰμορροαγίας μόρων<sup>50</sup> ἀνθρώπους μεμυκότες πρὸ τοῦ πεσεῖν ἐνδεομένου κυτίδι καὶ περιαιπτομένου τραχήλῳ· δεῖ δὲ λαμβάνειν τὸ πρῶτως ἐν ἐκείνῳ τῷ θέρει εὐρεθὲν ἢ ὀραθὲν.

Κε φ. σιά. Διαχεῖ δὲ θρόμβους τοὺς ἐκ τραυμάτων ἐν βάθει γινομένους, ἢ κοιλίᾳ, ἢ κύστει, κοιλία σικκῇ μετ' ὕδατος ποθεῖσα, θύμβρα ἢ θύμος ἐν ὀξύκράτῳ, ἐλιγρύσου ἀπόζημα ἐν οἰνομέλιτι, ἢ ὁπὸς σιλφίου λεῖος σὺν ὀξύκράτῳ ἢ ὕδατι πινόμενος.

50) *Suspicio mori amenta mueri haud facile possint.*

ceptus: cochlearum caro ex aceto trita, caedem integrae cum suis testis tusae et cataplasmatibus modo toti fronti naribusque impositae, cuminum tritum cum aceto inditum, ferulae medulla cum aceto, ruta trita indita, cepa decorticata siccaque indita, coagulum tritum et illitum. Cohibetur et sanguinis e naribus profluvium, si cera molliissima aures diligenter obturentur, occipitio cucurbitulae adhibeantur, et praeputium filo deligetur. Utiliter etiam frigida in aurem instillatur. Aiunt et cohiberi sanguinis e naribus eruptiones, si mororum (myrtorum) flos connivens, priusquam decidat, vasculo illigetur, et e collo suspendatur: sed cum florem sumi oportet, qui primum ea aestate inventus conspectusque fuerit.

Cap. CCXI. Dissolvunt vero sanguinis ex vulneribus grumos in imo, seu in ventre, seu in vesica concretos, lixivium ficulneum ex aqua bibitum, thymbra aut thymus in oxycrato, elichrysi decoctum in vino mulso: silphii denique liquor tritus, ex posca aquave potus.

Τῶν περὶ τὴν ἔδραν παθῶν βοηθήματα.

Κεφ. σιβ'. Ἐφίστησι δὲ πλεοναζούσας αἰμορροΐδας ἀλόη καταπλασσομένη, λεπίς σιδήρου, λιβανωτίδος φύλλα, λίθος ἀραβικός· (ἔστι δ' ὅμοιος ἐλέφαντι·) μόλυβδος κεκαυμένος, ὀξυκράτου ἀπαντλήσεις καὶ τῶν λοιπῶν στυμμάτων. Ἐπέχει δ' αἰμορροΐδας παραχοῆμα· ἀκακίας κισθῶς < δ', μολυβδαίνης < δ', τραγακάνθης < β', καθ' ἐν λειώσας ἕκαστον, εἴτα μίξας καὶ δεύσας ὕδατι ἔμπλασσε εἰς μοτὸν ἢ ἔριον, καὶ ἐπιτίθει. Προσκλύσματι δὲ χρῶ χαλκάνθω, ἢ κηκίδι καὶ στυπτηρίᾳ, ἴσοις λείοις, διεμένοις θερμῷ ὀξυκράτῃ καὶ ὕδατι, καὶ προσκλυζομένοις.

Κεφ. σιγ'. Ἀναστομοῖ δ' αἰμορροΐδας μυττωτὸν ἐσθιόμενον, ἀμαράκινον ἢ ἴρινον περιχριόμενον· ἐρεθίζει αὐτὰς καὶ χολὴ βοεία, ὡς βάλανος προστεθεῖσα· καὶ πρὸ τῆς χειρουργίας δὲ περιχρισθεῖσα, κατέχει καὶ οὐκ ἔξ' ἐκτρέπεσθαι αὐτὰς· ὁμοίως κυκλαμίνου χυλός.

Κεφ. σιδ'. Αἰμορροΐδας αἴρει θαυμαστῶς τοῦτο· κωνείου ξηροῦ < β', ὑοσκυάμου χυλίσματος < δ', στυπτηρίας

*Sedis affectuum remedia.*

Cap. CCXII. Haemorrhoidum abundantiam sistunt aloë imposita, squama ferri, libanotidis folia, lapis arabicus, qui quidem ebori similis est, plumbum ustum, fottus e posca ceterisque spissamentis. Hoc vero statim cohibet haemorrhoidas: acaciae fulvae et plumbaginis an. drach. iiij, tragacanthae drach. ij: seorsim tritas misceto et aqua irrigato, tandemque linamento aut lanae illinito, atque imposito. Proluito autem chalcanthi aut gallae et aluminis aequis partibus tritis, dilutisque calido oxycrato et aqua.

Cap. CCXIII. Haemorrhoidas autem aperiunt intritum ex allio, in cibis sumptum, et amaracinum aut irinum circumlitum. Provocat et ipsas fel bubulum, glandis instar subditum: quin et ante chirurgicam operationem circumlitum, eas cohibet, nec sinit inverti. Idem praestat et cyclaminis succus.

Cap. CCXIV. Haemorrhoides mirabiliter hoc tolluntur remedio: Conii aridi drach. ij, succi hyoscyamo

σχιστῆς < β', χαλκάνθου κεκαυμένου < β', σινώπιδος < α', ψιμυθίου < α', κηρωταρίῳ ῥοδίνῳ ἀναληφθέντα καὶ ἐπιτεθέντα· ῥόας ὀξείας<sup>51</sup> λεπὶς λεία σὺν ὄξει ἐπιπλασθεῖσα· ἂν δὲ ἐνδοτέρῳ ὦσιν, ὥς μᾶζιον ποιήσας, ἐντίθει· ποιεῖ δὲ καὶ τοῦτο θαυμαστῶς· σανδαράχης < ή, ἀρσενικοῦ χρ. < ή, ἐπιχρίσεις προεσχηματισμένῳ· ἀπονεκροῦται γὰρ καὶ ἀποπίπτει ἐν ἡμιωρίῳ ἀποξηρανομένη ἢ αἰμορροῖς καὶ ἐκ τῆς βάσεως ἀπολυομένη· ἀνείς δὲ στακτῇ κύκλῳ χρίεται κηρωτῇ· γίνεται δὲ ἐν ἡλίῳ ἢ παρὰ πυρὶ.

Κεφ. σιέ. Φλεγμονὰς δὲ τὰς τοῦ δακτυλίου ὠφελεῖ ἄρτος ἐκ μελικράτου καταπλασσόμενος, σόγχου χυλὸς ἐν ἐρίῳ προστεθείς, μαλάχῃ ἐφθῇ καὶ ὠμῇ καταπλασσομένη, ἀλθαίας ῥίζα, ἣν Ῥωμαῖοι ἐβίσκον καλοῦσιν, ἐν μελικράτῳ ἐφθῇ ὁμοίως, ἀμαράκινον περιχριόμενον, μελίλωτον σὺν ὑσώπῳ καὶ βουτύρῳ, σίλφιον σὺν ὄξει, καὶ μαγύδαρις ἐψημένη, πίσσα ὑγρὰ σὺν κηρῷ ἴσα, σιδήρου ἰὸς σὺν κηρωτῇ.

51) Λίπος λεῖον σὺν ὄξει ἐπιπλασθέν Moib.

expressi drach. iiij, aluminis scissilis, chalcanthi usti, an. drach. ij, rubricae sinopicae et cerussae, an. drach. j, cerato rosaceo excipiantur et imponantur. Aliud: mali punici acidi cortex tritus cum aceto imponatur. Quod si delitescant interius haemorrhoides, ex eodem medicamento corformatam massulam indito. Praeclare facit et hoc: sandarachae, auripigmenti, an. drach. viij: his lixivio stillatio dilutis aegrum prius apte compositum locatumque oblinito. Sic intra semihoram haemorrhoids arefacta et a radice sua quasi devoluta deperit exciditque. Interim vero circa haemorrhoida in orbem ceratum illinatur, fiatque id in sole vel ad ignem.

Cap. CCXV. Sedis inflammationibus ista conferunt: panis ex melicrato impositus, sonchi succus in vellere appositus, malva seu cocta, seu cruda adhibita, similiter et althaeae, quam hibiscum Latini vocant, radix in melicrato decocta, amaracinum circumlitum, melilotus cum hyssopo et butyro, silphium cum aceto, magydaris cocta, pix liquida cum aequali cerac portione, rubigo ferri cum cerato.

Κεφ. σιζ'. Τὰ δὲ ἀλγήματα ὠφελεῖ πευκεδάνου ὀπὸς ἐπιχριόμενος, σμύρνα σὺν μέλιτι, ῥιγέροντος ἄνθος σὺν οὔνῳ λευκῷ, κισσοῦ ἄνθος ὁμοίως, ἐλξίνη καὶ ἑαυτὴν καὶ σὺν ἄρτω.

Κεφ. σιζ'. Τὰ δὲ κονδυλώματα στέλλει ἐλαίας ἄνδη μεθ' ὕδατος καταπρασσόμενα, ἄλὴ σὺν γλυκεῖ καταχριομένη, βαλλωτῆς φύλλα καταπρασθέντα, βάτου φύλλα καὶ ὁ κυλὸς καταχριόμενος, καὶ σὺν ῥοδίνῳ κηρωτῇ ἐπιτιθεμένη· πενταφύλλου ῥίζα καταπρασθεῖσα, κύπρου φύλλα ὁμοίως· κυπαρίσσου φύλλα ὁμοίως σὺν ἀλφίτῳ, καὶ τῷ ἀφεψήματι δὲ αὐτοῦ πυρία· λιβανωτίδος φύλλα ὁμοίως· μελίλωτον σὺν οὔνῳ γλυκεῖ ἐψηθὲν, μιγείσας αὐτοῖς λεκύνθου ὠν· ἢ μελιλώτου καὶ σχοίνου ἄνθους μετὰ βουτύρου, ἢ λινοσπέρμου, ἢ σέρεως, ἢ τήλεως, ἢ κωδίων· ἢ κυδωνία ἐφθὰ σὺν ἄρτῳ ἢ ἀλφίτῳ, μυρσίνης φύλλα κεκαυμένα σὺν κηρωτῇ, λύκιον διαψόμενον, ἀμόργη ἐψημένη ὁμοίως, ἄλλη πυριωμένη· κατάχριε δὲ καὶ τῷ ἀφοῶ τοῦ ἐψημένου μέλιτος· ποιεῖ δὲ καὶ μελίλωτον, ἢ σχοῖνος ἀναπλασθεὶς σὺν βουτύρῳ.

Cap. CCXVI. Doloribus sedis subveniunt peucedani liquor illitus, myrrha cum melle, senecionis flos cum vino albo, hederæ flos eodem modo, helxine denique per se et cum pane.

Cap. CCXVII. Condylomata vero reprimunt oleo flores ex aqua impositi, aloë cum dulci vino peruncta, ballotes folia imposita, rubi folia et succus illitus atque cum cerato rosaceo impositus, quinquefolii radix adhibita, cypri folia eodem modo: similiter et cupressi folia cum polenta, et ex eorundem decocto fottus: libanotidis folia simili modo: melilotus cum vino dulci coctus, admixto ovi vitello: melilotus et flos schoeni cum butyro, aut lini semine, aut seride, aut foeno graeco, aut capitibus papperis: cotonea mala cocta cum pane aut polenta, myrti folia usta cum cerato, lycium confricatum, amurca decocta simili modo, fomentum e muria. Illinitur et spuma, quae effervescenti melli supernatat. Confert et melilotus aut schoenus cum butyro subactus, itemque plan-



καὶ ἄρογλώσσου φύλλα σὺν ἄλσι καταπλассόμενα, ἔρια οἰσπηρὰ κεκαυμένα καὶ ἀναληφθέντα ῥοδίνῳ καὶ στέατι χηνείῳ, πρόπολις προμαλασσομένη καὶ ἐπιτιθεμένη.

Κεφ. σιή'. Αἶρει δὲ κονδυλώματα καὶ τὰς σύκας ἄρσενικὸν ἐπιπλассθέν· βολβοὶ ἐν θερμῇ σποδιᾷ ὀπτηθέντες, καὶ λεῖοι καταπλассθέντες, μετὰ μαινίδων κεφαλῶν κεκαυμένων· ἄσβεστος καὶ τρυῖς ἱζῶ ἀναληφθέντα, καὶ ὡς σπλήνιον ἐπιτεθέντα.

Κεφ. σιθ'. Τὰς δὲ ὑπερμεγέθεις σύκας ἀποβάλλει λιβάνου ὑποκαπνισμὸς ἐπὶ ἡμέρας ε' ἐπιγενόμενος, ἰὸς σιδήρου σὺν οἶνῳ γλυκεῖ ἐπιχρισθεὶς, ἀνήθου σπέρματος κεκαυμένου ἢ τέφρα καταπассομένη, χάλκανθος καὶ σίδια σὺν ὄξει λεῖα, στυπτηρία ὑγρὰ σχιστὴ κεκαυμένη ὁμοίως σὺν ὄξει λεῖα, μελαντηρία σὺν ἄλσι, στυπτηρία ὑγρὰ μετ' ἄρτου καὶ οἶνου καὶ σελίνων.

Κεφ. σκ'. Σύκας δὲ ἀφαιρεθείσας καὶ θύμους καὶ κονδυλώματα θεραπεύει, καὶ οὐκ ἔῃ πάλιν αὐῆσθαι, τέφρα κλημάτων, ἢ καὶ ἂν ἐκ τῶν γιγάρτων γένηται, σὺν ὄξει καταπассομένη.

taginis folia cum sale imposita, lanae succidae crematae et exceptae rosaceo et adipe anserino, imposita denique propolis, prius emollita.

Cap. CCXVIII. Condylomata ficosque auferunt arsenicum illitum, bulbi in calidis cineribus torrefacti tritique, et cum ustis macnarum capitibus impositi, calx viva et faex visco exceptae splenique modo impositae.

Cap. CCXIX. Tollunt et ista praegrandes ficos: suffitus e ture sex diebus adhibitus, rubigo ferri cum dulci vino illita, anethi seminis usti cinis inspersus, chalcanthus et malicoria ex aceto trita: alumen liquidum aut scissile ustum, itidem ex aceto tritum: melanteria cum sale, alumen denique liquidum cum pane, vino et apio.

Cap. CCXX. Ablatos ficos, thymos et condylomata sanat, neque rursum pullulare sinit, cinis sarmentorum aut etiam vinaceorum ex aceto illitus.

Κεφ. σκα'. Τὰς δὲ ῥαγάδας θεραπείει διφρυγὲς σὺν ῥοδίῳ, ἀλόῃ σὺν γλυκεῖ καταχριομένη, διαβάκου ῥίζα λεία ἀναληφθεῖσα κηρωτῇ, καρκίνων ποταμίων καέντων ἢ τέφρα σὺν κηρωτῇ ῥοδίῳ ἐπιτεθεῖσα, ὕσσωπον σὺν μελιλώτῳ καὶ βουτύρῳ, πίσσα ὑγρὰ καὶ ἐαυτὴν, σέριδος χυλὸς σὺν μάννῃ· πορφύρας ὅστρακον καὲν καὶ σμύρνα, ἴσα κηρωτῇ ἀναληφθέντα ὑγρὰ· μελάνθιον μετὰ ῥοδίνου τριβὲν καὶ λείον ἐπιτεθέν.

Κεφ. σκβ'. Τὰς δὲ ἐντὸς τῆς ἔδρας ὠφελεῖ ἐλκώσεις ἀμόρη ἐψηθεῖσα καὶ ἐγκλυζομένη, ἀκοπον τὸ δυσῶδες διὰ ἐρίου ἢ ῥάκου<sup>52</sup> ἐντιθέμενον.

Κεφ. σκγ'. Σκώληκας δὲ καὶ ἀσκαρίδας φθείρει κεδρία προστιθεμένη, ἀξούγγιον παλαιὸν ὡς βάλανος ἐντιθέμενον.

Κεφ. σκδ'. Τὰς δὲ προπτώσεις τοῦ δακτυλίου στέλλει περιχριόμενα ἀκακίας χύλισμα, βάτου χυλὸς καὶ τὰ φύλλα καταπλασσόμενα· ἀναγallis ἢ τὸ κνάνεον ἄνθος ἔχουσα καταπλασθεῖσα· ἢ δ' ἐρυθρὰ ἐρεθίζει καὶ ἐκτρέπει· κηκίδος ἀφέψημα, ἢ κυδωνίων, ἢ μυρρίνης, ἢ σιδίων ἐγκαθι-

52) Gesner. loco vulg. ποίου ἄκους.

Cap. CCXXI. Rimas sedis sanant diphryges cum rosaceo, aloë cum passo illita, dipsaci radix trita, cerato excepta, cancrorum fluviatilium ustorum cinis cum cerato rosaceo impositus, hyssopus cum meliloto et butyro, pix liquida per se, seridis succus cum manna, purpuræ testa cum aequali portione myrrhæ cerato excepta liquidiore, melanthium cum rosaceo tritum et impositum.

Cap. CCXXII. Internis sedis exulcerationibus opitulatur amurca cocta et infusa, acopum foetidum ex lanna pannove impositum.

Cap. CCXXIII. Vermes et ascaridas necant cedria subdita et axungia vetus glandis instar indita.

Cap. CCXXIV. Precidentem sedem reprimunt illita hæc: expressus acacia succus, rubi succus et folia imposita, anagallis prædita caeruleo flore adhibita: (nam quæ puniceo est flore, sedem proritat evertitque:) decoctum gallæ, aut cotoneorum, aut myrti, aut malicorii, ad in-

ζόμενον, ἢ ὀξύκρατον· λιβανωτίδος φύλλα καταπλασσόμενα, κυδωνία ἐφθὰ λεία ἐπιτιθέμενα, μυρσίνη ὁμοίως καταπλασσομένη, ἢ νάρκη θαλασσία προστιθεμένη, οἰνάνθη ἀπὸ τῆς ἀγρίας ἀμπέλου, ἢ κύπρου φύλλα καταπλασσόμενα.

Κεφ. σκ'. Παρατρίμματα δὲ ἢ διηλεκωμένα χαλκίτις μεθ' ὕδατος τριβεῖσα καὶ ἐπιχρυσθεῖσα παρὰυτίκα ὠφελεῖ, μολύβδαινα σὺν ὄξει καὶ ῥοδίνῳ λεία, ἢ λιθάργυρος ὁμοίως.

Τῶν περὶ τὰ νεῦρα καὶ τὰ ἄρθρα παθῶν βοηθήματα.

Κεφ. σκζ'. Στρίμματα δὲ ἱᾶται καταπλασσόμενα ἄγνου σπέρμα σὺν ἄλσιν καὶ νίτρον καὶ κηρωτῇ, ἀγρούσης φύλλα σὺν μέλιτι καὶ ἀλφίτοις, ἀκάνθου τοῦ παιδέρωτος φύλλα, κνίδος φύλλα σὺν ἄλσιν πολλοῖς, ἄλες σὺν ἀλεύρῳ καὶ μέλιτι, ἀμόργη ἐψητὴ σὺν ἐρίῳ οἰσυνηρῶ ἐπιτεθεῖσα· τέφρα κληματίνη, καὶ ἐκ γιγάρτων μετ' ὄξους, ὕδρ' ἀφοδος ξηρὰ μετὰ κηρωτῆς, ἀρκείου ῥίζα, ἄσβεστος σὺν πίσση ἢ ἄξουγγίῳ παλαιῶ· βολβοὶ μετὰ μέλιτος, ἐνίοτε καὶ ἄρτου μιννυμένου,

sessus usurpatum, uti et oxycratum: libanotidis folia imposita, cotonea cocta tritaque et adhibita, myrtus similimodo imposita, torpedo marina apposita, flos vitis sylvestris, cypri denique folia imposita.

Cap. CCXXV. Intertrigines aut exulcerationes confestim iuvantur chalcitide trita ex aqua illitaque: similiter et plumbagine aut lithargyro ex aceto et rosaceo trita.

*Ad nervorum articulorumque affectus remedia.*

Cap. CCXXVI. Contortis seu luxatis medentur haec, more cataplasmatum imposita: viticis semen cum sale, nitro et cerato, anchusae folia cum melle ac polenta, acanthi paederotis folia, urticae folia cum plurimo sale, sal cum farina et melle, amurca decocta cum lana succida, cinis sarmentitius et e vinaccis cum aceto, fimum suillum aridum cum cerato, arcii radix, calx viva cum pice aut axungia vetere: bulbi cum melle, interdum etiam ad-

μάλιστα δ' ἐπὶ τῶν τρυφεροχρότων, ἄλευρον μετ' ὄξους ἐψηθὲν μετ' ἀφόδου ὑδὸς λεῖον, ἡλιοτρόπιον τὸ μέγα, καλὰμου φραγμίτου ῥίζα σὺν ὄξει· κάρυα βασιλικὰ σὺν πηγάνῳ καὶ μέλιτι, κρίνου ῥίζα ἐψηθεῖσα ἐν οἴνῳ ἢ λεανθεῖσα ἐν μέλιτι, τήλινον ἄλευρον σὺν ὠμῇ λύσει, ναρκίσσου ῥίζα λεία σὺν μέλιτι, νίτρον σὺν κηρωτῇ, ὄξυακάνθου ῥίζα ἐφθῇ, πολυποδίου ῥίζα ὁμοίως, σύμφυτον σὺν κηρωτῇ, τέφρα κληματίνῃ σὺν ἀξουγγίῳ παλαιῷ. Τὰ δὲ λίαν στρέμματα ἰᾶται ἀπόπατος θερμῇ καταπλασθεῖσα, κύπρου ἀφειψήματα καταντλούμενα.

Κε φ. σκζ'. Κεχαλασμένα δὲ ἄρθρα ἀκακίας χυλὸς ἀνεθεῖς ὕδατι καὶ καταντλούμενος, ἀκάνθης ἀφέψημα, ἢ βάτου, ἢ μυρσίνης, ἢ σχίνου, ἢ φηγοῦ, ἢ πτελέας τῶν ῥιζῶν τοῦ φλοιοῦ, ἐλάτῃ λεία μετὰ κηρωτῆς, ἔλαιον μυρσίνινον ἢ σχίνινον περιχρίόμενον συνεχῶς, σίδια καταπλασθέντα, μυρσίνης φύλλα σὺν κηρωτῇ μυρσινίνῃ ἐπιτιθέμενα.

Κε φ. σκη'. Κόπους λύει ἐπιτιθέμενον ἀμμωνιακὸν μετ'

mixto pane, in iis praesertim, quibus est tenella cutis: farina ex aceto cocta, cum stercore suillo trita, heliotropium maius, arundinis, quae phragmites dicitur, radix cum aceto, nuces iuglandes cum ruta et melle, lilii radix cocta in vino aut trita cum melle, foeni graeci farina cum hordeacea farina soluta hydrelaeo, narcissi radix trita cum cerato, oxyacanthae radix cocta, similiterque poly-podii radix, symphytum cum cerato, cinis sarmentitius cum axungia vetere. Vehementibus porro contorsionibus medetur stercus calens impositum, itemque cypri decoctum affusum.

Cap. CCXXVII. Ad relaxatos artus prosunt acaciae succus aqua dilutus et affusus, spinae aegyptiae decoctum, aut rubi, aut myrti, aut lentisci, aut fagi, aut radicum ulmi vel corticis: elate palmarum trita cum cerato, oleum myrtinum aut lentiscinum frequenter circumlitum, malicorium impositum, myrti denique folia cum cerato myrtino imposita.

Cap. CCXXVIII. Lassitudines dissolvit impositum



ὄξους καὶ κυπρίνου ἐλαίου, καὶ ὀλίγου νίτρου, ἀπίου σπέρμα μετ' ἐλαίου, δάφνινον ἔλαιον, κρόκινον, ἡμιψύχινον, ἀφρόνιτρον, νίτρον σὺν ἐλαίῳ καὶ οἴνῳ καὶ ὄξει. Φασὶ δὲ ἐν ταῖς ὁδοιπορίαις μὴ παρατρίβεσθαι τοὺς βουβῶνας, ἄγρου ῥάβδου ἢ τῆς ἀρτεμισίας<sup>53</sup> κρατουμένης.

Κεφ. σκδ'. Τετανικοῖς δὲ καὶ τοῖς ἄλλοις σπώμενοις ἀρμόζει ἐν ποτῶ γλήχων μεθ' ἁλὸς καὶ μελικράτου, ἵρεως < β' σὺν μελικράτῳ, σὰρξ ἐχίνου ἐσκελετευμένη ὁμοίως, κίπρινον, ἢ καστόριον· κράμβη ἐφθῇ ἐσθιομένη, ὄξαλίδος ῥίζα σὺν οἴνῳ, ὁπὸς σιλφίου περιπλασθεὶς κηρῶ ἀντὶ καταποτίου, σέσели, σταφυλίνου ἀγρίου ῥίζα καὶ σπέρμα· ἀκάνθης λευκῆς σπέρμα παιδίῳ σπώμενῳ βοηθεῖ· δαμασκηίου < α' τῶν φύλλων ἐν μελικράτῳ· βατράχων ζωὸς ἁλσι καὶ ἐλαίῳ ἡρτυσμένος καὶ ἐσθιόμενος, καὶ αὐτοὶ οἱ βάτραχοι, κροκίνου ζωὸς ὁμοίως, ξυλοβαλσάμου τριώβολον ἐν οἴνῳ· τοὺς δὲ προσφάτους σπασμούς θεραπεύει σέσели μετὰ μελικράτου πινόμενον.

53) Saraceni coniectura. Vulg. ἄγρου ῥάβδου ἢ τῆς θαλάσσης.

ammoniacum cum aceto et cyprino oleo exiguaeque nitro: sic et apii semen cum oleo, laurinum oleum, crocinum unguentum, sampsuchinum, spuma nitri, nitrum cum oleo, vino et aceto. Virgam porro viticis aut artemisiam qui manibus gestent viatores, negantur intertrigines inguinum sentire.

Cap. CCXXIX. Tetano laborantibus aliisque convulsis conveniunt haec in potu sumpta: pulegium cum sale et melicrato, iridis drach. ij. cum melicrato, erinaeei assiccata caro eodem modo, cyprinum, castorium, brassica cocta, in cibis sumpta, oxalidis radix in vino, laser, cera obvolutum, instar catapotii devoratum, seseli, sylvestris dauci radix et semen: spinac albae semen pueris, qui convelluntur, auxilio est. Confert et damasonii foliorum drach. j. cum melicrato, itemque ranarum ius, sale et oleo conditum, in cibis sumptum, ac ipsae quoque ranae: cancri iusculum eodem modo, xylobalsamum denique ternum obolorum pondere in vino. Sed recentes convulsiones sanat seseli cum melicrato potum.

Κε φ. σλ'. Συγχιρόμενα δὲ ἐπὶ τετάνου καὶ σπασμωδῶν τρόμων ἁρμόζει καστόριον σὺν ἐλαίῳ, ὑπερικὸν ὁμοίως, πευκεδάνου ὀπὸς, πισσέλαιον, σάμψυχον σὺν ὠμῇ λύσει, κοινία συκίνη σὺν ἐλαίῳ· ἁρμόζει καὶ ἔλαιον συνεχῶς καταχιόμενον κατὰ τοῦ αὐχένος, καὶ εἰς τὴν ἔμβασιν τοῦ ἔλαιου κατάβασις. Ἐπιμενούσης δὲ τῆς τάσεως ἐπὶ χρόνον ἱκανόν, ἀφελούνται καίόμενοι τὸ κατὰ τοῦ τένοντος δέσμα.

Κε φ. σλα'. Τρομώδεσι δὲ ἁρμόζει πινόμενα καστόριον μετὰ μελικράτου, λαγῶου ἐγκέφαλος ἐφθὸς ἐσθιόμενος, κράμβη ἐφθὴ ἐσθιομένη, ἀλθαίας ῥίζας ἀφέψημα, δαμασωνίου φύλλων < α' μετὰ μελικράτου· εὐπατώριον σὺν ὕδατι ἐπὶ πλεῖον πινόμενον.

Κε φ. σλβ'. Γλώσσης παραλυθείσης, ἁρμόζει ὀπὸς, καὶ ὀπόφυλλον μετὰ ῥοφήματος λαμβανόμενον, καὶ σταφίς ἀγρία καὶ πέπερι καὶ σίνηπι διαμασσώμενα.

Κε φ. σλγ'. Παραλυτικοῖς δὲ ποιεῖ ποτὰ καρδαμώμου < α' σὺν ὕδατι ἢ οἶνῳ· καππάρεως τοῦ ἐκ τῶν ἀπίων καρποῦ < β' σὺν οἶνῳ· τῆς ῥίζης ὁμοίως· καστόριον ἐν

Cap. CCXXX. Ista vero in tetano et convulsivis tremoribus convenienter inunguntur: castorium cum oleo, simili modo et hypericum, pencedani liquor, picinum oleum, sampsuchum cum farina hordeacea, lixivium ficulneum cum oleo. Convenit et frequens cervicis illitus ex oleo, et in ipsius olei solium descensus. Quod si tensio longiore tempore perseverarit, cutis iuxta tendinem ustio inuabit.

Cap. CCXXXI. Tremulis haec assumpta prosunt: castorium ex melicrato bibitum, coctum leporis cerebrum, in cibo sumptum, brassica cocta esitata, althaeae radice decoctum, foliorum damasonii drachma una cum melicrato, eupatorium denique ex aqua largius haustum.

Cap. CCXXXII. Linguae resolutae confert laser, itemque silphii semen in sorbitione sumptum: sic et staphis agria, piper et sinapi commanducata.

Cap. CCXXXIII. Paralyticos iuvant in potu sumpta cardamomi drachma una ex aqua aut vino, radice aut seminis capparis, quod pericarpis pyri formam refe-

ὑδατι, ἢ μελικράτῳ, ἢ οἴνῳ· πενταφύλλου ῥίζης χυλός· καὶ ἄρθριτικοῖς ἀριζόντα συγχρίσματα ἐπιτηδείως παραλαμβάνεται ἐπὶ παραλύσεως, κόστος σὺν ἐλαίῳ, καὶ τὰ θερμομαντικά τῶν ἀκόπων.

Κεφ. σλδ'. Ποδαγρικοῖς καὶ ἄρθριτικοῖς πινόμενα ὠφέλει ἀμώμου ἀφέψημα, ἀνδρόσακες μεθ' ὕδατος, κενταυρίου λεπτοῦ χυλίσμα, μήου ἀπόξεμα, πήγαρον ἄγριον σὺν ἀνήθῳ ἀποξεσθέν· ὀπόφυλλον καὶ ὀπὸς σὺν τροσῇ λαμβανόμενος· χαμαῖδρου ἀπόξεμα, βετονίκης πόα μετ' οἴνου πινόμενη· ὠφέλει καὶ ἐχιδνοφαγία.

Κεφ. σλέ'. Καταχρίόμενα δὲ ποδάγρας καὶ ἄρθριδας ὠφέλει, (ἢ κατάντλούμενα ἐπὶ τῷ τέλει τοῦ κεφαλαίου·) καταπλασσομένη ἄσβεστος λεία, ὅξει φρυαθεῖσα καὶ ἐπιτεθεῖσα· ἐπιχρίειν δὲ δεῖ ἐλαίῳ ἢ κηρωτῇ πρὸς τὸ μὴ ἐλκοῦσθαι· ἢ ἄσβεστον καὶ ὄστρακον ἴσα μετ' ὄξους καὶ ῥοδίνου ἀνελημένα, ἢ ἄξουγγίου· ὀπὸς μήκωνος μετ' ὄξους καὶ ῥοδίνου καταχρίόμενος· ποιεῖ δὲ δυσκαήτους καὶ βαρεῖς τοὺς πόδας· παραχρῆμα δὲ ποιεῖ ἀπόνους τοῦτο· φλόμου τὰ ἀπα-

rentibus continetur, drach. ij. in vino, castorium ex aqua aut melicrato, aut etiam vino: denique quinquifolii e radice succus. Porro, quae arthriticis conveniunt inunctiones, etiam in resolutione recte adhibentur. Benefacit et costus cum oleo, quaeque ex acopis calfaciendi vi pollent.

Cap. CCXXXIV. Podagricis et arthriticis haec assumpta subveniunt: amomi decoctum, androsaces cum aqua, succus e centaurio minore, mei decoctum, ruta sylvestris cum anetho fervefacta, silphii semen cum cibis sumptum, uti et eiusdem liquor, chamaedryos decoctum, betonica herba in vino pota. Iuvat et esus viperarum.

Cap. CCXXXV. Podagras et arthritidas iuvant, quae sequuntur, partim illinenda, partim cataplasmatum more imponenda, partim etiam affundenda, uti quae sub finem capitis commemorantur: calx viva trita, aceto subacta et imposita: inungi vero oportet oleo aut cerato, vitandae exulcerationis gratia: calx viva et testa aquis portionibus aceto et rosaceo exceptae aut axungia: liquor papaveris cum aceto et rosaceo inunctus dolores quidem quamprimum

λώτατα τῶν φύλλων, μετὰ βολβοῦ καὶ ἀλφίτου καὶ ὕδατος καταπλασσόμενα· καὶ κάππαρις, ἣν ἐσθίομεν, βραχεῖσα ἐν ὕδατι καὶ τριβεῖσα, εἴτα ἐγχρισθεῖσα μετ' ἐλαίου ὥς κηρωτῇ, καὶ ἐν ὁθονίῳ ἐπιτεθεῖσα· αἰγίλωψ, ἥ αἰῖζων σὺν κριθίνῳ ἀλεύρῳ καταπλασθὲν, πράσιον μεθ' ἁλῶν, βολβοὶ μετὰ μέλιτος, αἰγείρου φύλλα ἐν ὄξει ἐφθὰ, αἷμα καταμήνιον καταχρίομενον, ἀκτῆς καυλοὶ σὺν τοῖς φύλλοις λεῖοι μετὰ πρασίου καὶ στέατος, ὑοσκυάμου φύλλα, αἶες σὺν ἐλαίῳ, ἀμόργη ἐλαίου πρόσφατος θερμὴ μὲν, ἀνεψητὸς δὲ, καταντληθεῖσα, ἀμμωνιακὸν σὺν πίσσῃ ξηρᾷ μαλαχθὲν καὶ καταχρίομενον, ἀνδρόσακες καταπλασσόμενον, ἀπόπατος βοδὸς θερμὴ καταπλασσομένη· αἰγὸς ἀπόπατος λεῖος σὺν ἄξουγγίῳ, ἥ αἰγίῳ παλαιῷ στέατι· ἀφρόνιτρον καὶ λιβανωτὸς σὺν ἄξουγγίῳ· σμύρνα καὶ πευκέδανον, στύραξ, ὄπιον, ὑοσκύαμος, ἴσα σὺν κηρωτῇ· ἄρου ῥίζα σὺν βολβίτῳ καὶ ὄξει, περσικῶν φύλλα σὺν ἄξουγγίῳ, ἀσφοδέλου ῥίζα σὺν ἀλφίτῳ καὶ ῥοδίνῳ καὶ ὕδατι, κωνέου σπέρμα σὺν λιθαργύρῳ, λευκοῖου ῥίζα σὺν ὄξει ἐφθῇ, λιβανωτίδος φύλλα σὺν ὄξει καὶ αἰρίνῳ ἀλεύρῳ, λίθος

sedat, sed pedes et graves et ad motum ineptos reddit: verbasci tenerrima folia cum bulbo, polenta et aqua imposita: capparis, qua vescimur, in aqua macerata tritaque, dein cum oleo ad cerati consistentiam redacta, et ex linteolo imposita: aegilops aut sempervivum cum hordeacea farina impositum, marrubium cum sale, bulbi cum melle, populi nigrae folia in aceto cocta, sanguis menstruus inunctus: sambuci caules cum foliis triti, additis marrubio et adipe: hyoscyami folia, sal cum oleo: amurca olei recens calensque sed non cocta, affusa: ammoniacum cum pice arida emollitum et illitum, androsaces adhibitum, stercus bubulum calens impositum, stercus caprinum tritum cum axungia aut veteri caprillo adipe, spuma nitri et tus cum axungia: myrrha et pencedanum, styrax, opium et hyoscyamus aequis partibus cum cerato: ari radix cum simo bubulo et aceto, persicae mali folia cum axungia, asphodeli radix cum polenta, rosaceo et aqua, conii semen cum lithargyro, leucoii radix cum aceto cocta, libanotidis folia cum aceto et loliacea farina,



ἄσσιος λεῖτος ἐν ἑρεγμῷ· μήκωνος ὁπὸς σὺν γυναικίῳ γάλακτι καὶ κρόκῳ καὶ κηρωτῇ ῥοδίνῃ, μιγέντα καὶ ἐπιτεθέντα. Καὶ τὰ φύλλα δὲ καὶ αἱ κωδῖαι σὺν ἀλφίτῳ καταπλασσόμεναι, μιγνυμένων καὶ ὑοσκυάμου φύλλων· δεῖ δὲ αὐτὰ καὶ ἀλεύρῳ κριθίνῳ ἀναλαμβάνοντα ξηραίνειν ὥς τροχίσκους· ἐπὶ δὲ τῆς χρείας ὅξει διαλύειν. Ὀποπάνακες μετὰ σταφίδος ἐδωδίου· χελιδονίου, τοῦ καλουμένου πυροῦ ἀγρίου, ῥίζα λεία, σαγάπηνον σὺν ἐλαίῳ καταχρισθέν. Σέρις μετὰ πάλης ἀλφίτου, ἢ σέλινον, ἢ κικώριον, ἢ ἀνδράχνη, ἢ στύρχνον, ἢ περδικίον· ἢ σησάμινον ἔλαιον, σίκυος ἀγρίου ῥίζα ἐν ὅξει ἐφθῇ, σιδήρου ἰὸς ἐν ὅξει καὶ ῥοδίνῳ, σιδήρου σκωρία ὅξει ζεσθεῖσα καὶ καταντλουμένη, σκόρδιον μετ' ὅξους δοσιμέως καταχρισόμενον ἢ καταπλασσόμενον σὺν ὕδατι, στέαρ αἰγίου σὺν αἰγὸς σπυράθοις καὶ κρόκῳ καὶ στύρακι, ἢ σὺν κισσοῦ φύλλοις λείοις ἢ περδικίου, συκῆς ὁπὸς μετὰ σητανίου ἀλεύρου καὶ ὅξους, σταφίδες ἐκγεγραστισμέναι μετὰ γάλακτος, ἄσφαλτος περιχρισμένη μετὰ τῆς ὠμῆς λύσειως ἐφθῇ, τυρὸς ἁπαλὸς καταπλασσόμενος, κράμβης πικροτάτης τὰ φύλλα

assius lapis tritus cum farina fresa: papaveris liquor cum lacte muliebri, croco et cerato rosaceo mixtus et impositus: folia etiam papaveris, itemque capita cum polenta imposita, etiam additis hyoseyami foliis: hacc eadem excepta hordeacea farina redigenda in pastillos, qui exsiccandi sunt et, cum usus postulaverit, aceto diluendi: opopanax cum uva passa cibaria: chelidonii, quod sylvestre triticum appellatur, radix contrita: sagapenum cum oleo inunctum, seris cum polline polentae, aut apium, aut eichorium, aut portulaca, aut solanum, aut perdicium: sesaminum oleum: cucumeris sylvestris radix in aceto cocta: rubigo ferri cum aceto et rosaceo: scoria ferri in aceto fervefacta et affusa: scordium cum aceti illitum, aut cum aqua cataplasmatismore impositum: sebum caprillum cum baccis caprae, croco et styra-ce, aut cum hederac perdicivae foliis tritis: fici liquor cum trimestris tritici farina et aceto, uvae passae, quibus exempta sint vinacea, cum lacte, bitumen cum cruda farina hydrelaceo subacta coctum et illitum, caseus mollis pro cataplasmate impositus, brassicae amarissimae

καυθέντα καὶ ἀναληφθέντα κηρωτῇ κυπρίνῃ· ποιῇ λευκῶν  
 ἐλαιῶν χυλὸς καταντλούμενος, καὶ αἱ λευκαὶ ἐλαῖαι κατα-  
 πλασσόμεναι, γογγύλης ἐγκρυβείσης πυρὶ καὶ ὀπτηθείσης τὸ  
 ἔσωθεν καταπλασσόμενον λεῖον, μυροβάλανος καταπλασσο-  
 μένη σὺν ἀλεύρῳ αἰρίνῳ καὶ μελικράτῳ· φῦκος, ἢ βρῦον θα-  
 λάσσιον, μελισσόφυλλον, μανδραγόρου ῥίζα σὺν ἀλφίτῳ κα-  
 ταπλασσομένη, ἢ πήγανον, σίνηπι σὺν μέλιτι, βάλανος μυ-  
 ρεικῇ σὺν πάλῃ ἀλφίτου, γάλα γυναικῶν μετὰ κωνίου,  
 γαλῆς καείσης ἢ τέφρα μετ' ὄξους, γλήχων μετ' ἀλφίτου,  
 ἐλξίνη σὺν τραγίῳ στέατι ἢ κηρωτῇ, ἡλιοτροπίου τοῦ με-  
 γάλου τὰ φύλλα σὺν τοῖς καυλοῖς· θαψίας χυλὸς καταχρίο-  
 μένος πρὸς ὀλίγον, ἐφ' ὧν τὴν ἐπιφάνειαν βούλῃ ρευματί-  
 σαι· θεῖον ἄπυρον σὺν ὕδατι καὶ νίτρῳ ὁμοίως, καστόριον  
 σὺν ἐλαίῳ συγχριόμενον, κολοκύνθης ξύσματα λεῖα κατα-  
 πλασσόμενα, κράμβης ὥμῃς χυλὸς μετὰ τηλίνου ἢ φακίνου  
 ἀλεύρου ἢ ὄξους, ἀχράδες σὺν ἀλεύρῳ κριθίνῳ καὶ ὄξει, αἰ-  
 ρινον ἄλευρον φυραθὲν ἀφεψήματι κωδίων. Καταντλεῖται δὲ  
 ὠφελίμως ἐπ' αὐτῶν γογγυλίδων σὺν ἄλμῃ ἐψηθεῖσων τὸ

folia usta exceptaque cerato cyprino: benefacit et oliva-  
 rum albarum succus affusus, ac ipsae quoque olivae al-  
 bae pro cataplasmate appositae, rapi sub cineribus cocti  
 pars interior trita et imposita, glans unguentaria cum fa-  
 rina lolii et melicrato adhibita, fucus muscusve marinus,  
 apiastrum, mandragorae radix imposita cum polenta, ru-  
 ta, sinapi cum melle, glans unguentaria cum polline po-  
 lentae, lac muliebre cum conio, mustelae crematae cinis  
 cum aceto, pulegium cum polenta, helxine cum hircino  
 adipe vel cerato, heliotropii maioris folia cum caulibus:  
 thapsiae succus iis paulisper illitus, in quibus fluxionem  
 ad summam cutem evocare placet: sulphur vivum cum  
 aqua et nitro similiter, castorium cum oleo illitum, cu-  
 curbitae ramenta trita et adhibita, brassicae crudae suc-  
 cus cum foeni graeci lentiumve farina et aceto: pyra  
 sylvestria cum farina hordeacea et aceto, lolii farina  
 subacta cum decocto capitum papaveris. Ista etiam utili-  
 ter fots vice affunduntur: raporum in muria elixorum

ἀφείψημα, θάλασσα θερμή, ἱτέας φύλλων καὶ γλοιοῦ ἀφείψημα.

Κεφ. σλζ'. Πώρους δὲ τοὺς ἐπὶ ποδαγρικῶν, καὶ τὰς συστροφὰς τῶν νέρων λύει ἀμμωνιακὸν σὺν πίσση ξηρᾷ ἐπιτεθὲν, βδέλλιον σιέλῳ ἀσίτου μαλαχθέν, κάνναβις ἀγρία καταπλασθεῖσα, στύραξ μαλαχθεῖσα ἐν σιέλῳ, σήσαμον καταπλασθέν.

Κεφ. σλζ'. Ἰσχιαδικούς δὲ ὠφελεῖ πινόμενα ἐλιχρῶσου ἀφείψημα, ἐρυθροδάνου σὺν οἶνῳ· (ἀγρί δὲ αἷμα δι' οὖρων· λούειν δὲ δεῖ καθ' ἡμέραν τὸν πίνοντα·) ἐρύσιμον σὺν οἶνῳ· σμυρτίου σπέρμα ὁμοίως, καρδάμου < α' σὺν οἶνῳ, ὑπερικόν· καππάρεως τοῦ ἐκ τῶν ἀπίων καρποῦ < β'. αἷμα δὲ ἄγουσιν· ἢ τῆς ῥίζης τοῦ γλοιοῦ < α' ὁμοίως· μήκωνος κερατίτιδος τῆς ῥίζης, ἢ τῆς πόας ὀξίβαφον ἐψηθὲν σὺν ὕδατι κοτύλαις δ' εἰς τὸ ἡμισυ· ἰρεως ῥίζα σὺν γλυκεῖ· πήγανον ἀγρίον καὶ ἡμέρον σὺν ἀνθήθου ἀγεψήματι < α' σὺν οἶνῳ· σπαρτίου τὰς ῥάβδους σὺν τοῖς φύλλοις ἐν ὄξει βορέων πλείο-

decoctum, aqua marina calens, salicis foliorum et corticis decoctum.

Cap. CCXXXVI. Tophos podagricorum nervorumque collectiones seu nodos dissolvunt haec: ammoniacum cum arida pice impositum, bdellium ieiuni saliva emollitum, cannabis sylvestris imposita, styrax saliva emollitus, sesamum denique adhibitum.

Cap. CCXXXVII. Ischiadicis auxilio sunt haec in potu sumpta: elichrysi decoctum itemque rubiae cum vino: (sed hoc sanguinem per urinas educit: bibentem vero quotidie lavari oportet:) cysimon cum vino, smyrnii semen eodem modo, nasturtii seminis drachma cum vino, hypericum, seminis capparis, quod pericarpis pyri formam referentibus continetur, drach. ij: (ducunt vero sanguinem:) cortex radices capparis drach. j. pondere simili modo: papaveris cornuti radix herbaceae acatbuli mensura decocta in aquae heminis quatuor ad dimidias: iridis radix cum passo, rutae sylvestris et domesticae drach. j. cum aucthi decocto aut vino: succus e spartii ramulis simul et

νας ἡμέρας, ἔπειτα κόψας καὶ χυλίσας, καὶ πιεῖν δὲς ἓνα κύαθον· σύμφυτον πετραῖον ἐψηθὲν σὺν ὕδρομέλιτι, πενταφύλλου ῥίζης ὁ χυλός· ἄβροτόκου ἀφέψημα, καὶ τοῦ καρποῦ < α' μετ' οἴνου· ἀγαρικοῦ < α' μετ' οἴνου, αἰθιοπίδος ἀφέψημα μετ' οἴνου, πολύγονον μετ' οἴνου, ἀρκτίου ῥίζα μετ' οἴνου καὶ τὸ ἀφέψημα, κενταυρίου ἀπόζεμα, ἁλθαίας ῥίζης ἀφέψημα· ἀμμωνιακοῦ < α' σὺν μελικράτῳ ἢ ὕδατι· ἄγχι δὲ αἶμα δι' οὖρων· ὑπερικοῦ ἢ ἀνδρσαίμου < β' σὺν μελικράτῳ κο. γ'. ἄγουσι δὲ κόπρον πολὺν καὶ φλέγμα· ἀρκευθίδες μετ' οἴνου, ἀσπαράγου ῥίζης ἀφέψημα καὶ ὁ καρπὸς, ἀσφαλτος ἀντὶ κατὰποτίου λαμβανόμενη, βαλσάμου καρποὶ ἕξ σὺν μελικράτῳ, χαμαικίσσου φύλλα τρία ἐπὶ ἡμέρας μ'. χαμαίπευκης < β' μετ' οἴνου· σαγαπηνοῦ < β' μεθ' ὕδατος ἐπὶ ἡμέρας γ' λαμβανόμεναι.

Κε φ. σλῆ'. Κλυσμοὶ δὲ ἀρμόζουσιν ἐπ' ἰσχιαδικῶν γάρως ἕξ ἰχθύων ταριχηρῶν καὶ σιλούρων, ἱρεως ἀπόζεμα, κενταυρίου τοῦ λεπτοῦ, κολοκυνθίδος, ἀριστολογίας ῥίζης

foliis plusculis diebus in aceto maceratis moxque tuis expressus, cyathi unius mensura bibitus: symphytum petraeum coctum in aqua mulsa, quinquifolii e radice succus: abrotani decoctum, eiusdemque seminis drach. j. cum vino: agarici drach. j. cum vino, aethiopidis decoctum in vino, polygonum cum vino: arctii radix cum vino, ac eius decoctum, centaurii decoctum, itidemque althaeae radicis: ammoniaci drach. j. cum melicrato vel aqua: (sanguinem vero per urinas educit:) hyperici aut androsaemi drach. ij. cum heminis aquae mulsae tribus: (copiosum stercus ac pituitam educunt:) iuniperi baccae cum vino, asparagi radicis decoctum ac semen ipsum, bitumen instar catapotii devoratum, balsami fructus cum melicrato, hederæ terrestris folia terna diebus quadragenis sumpta, chamaepeuces drach. ij. cum vino, sagapeni binae drachmae ternis diebus sumptae cum aqua.

Cap. CCXXXVIII. Ischiadicis etiam ista commode clysteribus infundantur: garum e piscibus salitis, item e siluris: decocta iridis, centaurii minoris, colocynthidis,



ὁμοίως σὺν ὕδατι, θλάσπιος σπέρμα λεῖον ἐνεθὲν ἢ καὶ ἐψηθὲν ἐν ὕδατι, λεοντοπετάλου ῥίζα ἀγειρηθεῖσα ἐν ὕδατι, ἄλεις ἢ νίτρον σὺν μελικράτῳ, ἄλεις σὺν πτισάνης χυλῷ, σπάρτον θαλάσση βρέξας ἐφ' ἱκανὰς ἡμέρας, εἶτα ἐγκόψας καὶ χυλίσας, ἔντες· αἷμα δὲ ἄγει· κολοκυνθίδος ἐντεριῶναι ἐν πιτύρων ἀφειψήματι ἀποβραχεῖσαι· ὠφελοῦνται δὲ λίαν, εἰ προκλύσας τις αὐτοὺς ἐξ οἴνου κλύσματι, σικύους ἀγρίους ἐναποθλήρη τῷ δακτυλίῳ· αἷμα γὰρ ἄγουσι.

Κεφ. σλθ'. Μετὰ τὸ κλύσαι ποιεῖ τὸ νάπυ μέχρι πυρώσεως ἐντιθέμενον μετὰ κηρωτῆς τοιαύτης· κηροῦ λίτρ. α', κυπρίνου λίτρ. γ', ὀποπάνακος γο. β'. [ἐν ἄλλῳ γο. α'.]

Κεφ. σμ'. Καταπλάσσεται δὲ ἐπ' ἰσchiadicῶν πύρινον ἢ κρίθινον ἄλευρον ἐψηθέντα μετ' ὀξύκράτου καὶ πίσεως, αἰρίνον ἄλευρον ἐφθὸν μετὰ μελικράτου, καὶ λινοσπέρμου, καὶ νίτρον, καὶ συκῶν ἐφθῶν· ἢ σισυμβρίου σπέρμα, κολοκυνθίς ἴσα· μυροβάλανος σὺν μελικράτῳ καὶ αἰρίνῳ ἀλεύρω, τῆλιν μετ' αἰρίνου ἀλεύρου, καὶ ὁπὸς συκῆς μετ'.

similiterque radicis aristolochiae ex aqua: thlaspios semen tritum inditum, aut etiam in aqua decoctum: leontopetali radix decocta ex aqua, sal seu nitrum cum melicrato, sal cum ptisanæ cremore, succus e sparto pluribus diebus aqua marina macerato deindeque tuso expressus iniectusque, qui quidem sanguinem ducit: colocynthidis medullae in furfurum decocto maceratae. Plurimum etiam iuvantur ischiadici, si quis, infuso prius enemate ex vino, eorum sedi expressum sylvestrium cucumerum succum immittat: siquidem sanguinem etiam ducunt.

Cap. CCXXXIX. Post infusa enemata praeclare faciet sinapi, quousque fervorem excitet, adhibitum cum eiusmodi cerato, e cerae lib. j., cyprini lib. iij., opopanacis unc. ij. [in alio exemplari unc. j.]

CCXL. Ischiadicis cataplasmatum more imponuntur ista: triticea hordeaceae farina cocta cum posca et pice: loliacea farina cocta cum aqua mulsa, lini semine, nitro et ficibus coctis: sisymbrii seminis et colocynthidis pares portiones: glans unguentaria cum aqua mulsa et lolii farina, foenum graecum cum farina loliacea, fici lacteus liquor cum

ὄξους, πίσσα σὺν ὄξει ἐν ὀθονίῳ, καὶ γῶρις ἐφθῇ, καλάμου  
φραγμίτου ῥίζα μετ' ὄξους· καλαμίνθη μετ' οἴνου· ἐπιπλάει  
δὲ τὴν ἐπιφάνειαν· λεπίδιον ὁμοίως, ὡς τέταρτον ὥρας ἐπι-  
τιθέμενον· δεῖ δὲ θερμῷ ὑποκλύζειν αὐτούς· ποιεῖ δὲ καὶ  
κάρδαμον σὺν ὄξει καὶ ἁλσὶν ἴσοις, σελίνου φύλλα σὺν οἴνῳ  
ἐψηθέντα· θερμινον ἄλευρον σὺν ὄξει. Τὰς δὲ ἀρχομένας  
ισχιάδας ναρθηκισμὸς<sup>54</sup> θεραπεύει ἄχρις ἀπαλλαγῆς· καὶ τὸ  
σύγχοισμα τοῦτο· σμύρνης, ἀφρονίτρου, πεπέρεως, ἱρίνου  
ὑποστάθμης, ὄξους αὐτάρκεις· ἢ σῦκον, νάπυ, νίτρον, κολο-  
κυνθίς, ἴσα ἀφεψηθέντα καὶ συντεθέντα· ἢ θύμον, ἢ θύμ-  
βρα μετ' οἴνου καὶ ἀλφίτου, ἢ κολοκυνθίδος χλωρᾶς ὁ χυλὸς  
ἀναμισγόμενος· σίλφιον λεῖον, ἢ πευκέδανον σὺν ἐλαίῳ ἀνα-  
τριβόμενον· σκαμμωνίας ῥίζα σὺν ἀλεύρῳ κριθίνῳ καταπлас-  
σομένη· σπάρτον ἐν ὄξει βραχὲν ἐφ' ἱκανὰς ἡμέρας, καὶ κο-  
πὲν, καὶ χυλισθὲν, καὶ μιγὲν νίτρῳ, καὶ συναλειφόμενον· ποιεῖ  
καὶ πρὸς τὰ συντεταμένα τῶν νέρων· ποιεῖ καὶ ὁ τῶν σω-  
ματεμπόρων δρώπαξ, συνεχῶς προστιθέμενος· ἔστι δὲ πίσσα

54) Galen. meth. med. lib. 14. c. 16. p. 998.

aceto, pix cum aceto inducta linteolo, pollis decoctus,  
arundinis phragmitis radix cum aceto: calamintha cum vino,  
(summam cutem autem adurit:) lepidium similiter ad ho-  
rae quartam partem impositum: (sed aegros deinde aquae  
calidae balneo immergi oportet.) Facit et nasturtium cum  
aceti et salis pari quantitate, apii folia in vino decocta,  
lupinorum farina cum aceto. Incipientes ischiadas sanant  
ad liberationem usque ferulis inflicta verbera, itemque  
hoc linimentum, e myrrha, spuma nitri, pipere, unguenti  
irini sedimento et aceti modo sufficienti. Aut: ficus, si-  
napi, nitrum, colocynthis aequis partibus decoquantur,  
fiatque medicamentum. Aut: thymus thymbrave cum vi-  
no et polenta, aut admixto colocynthis virentis succo  
usurpentur. Confert etiam silphium tritum aut peucedan-  
um cum oleo affricum, scammoniae radix imposita cum  
farina hordeacea, expressus spartio in aceto pluribus die-  
bus macerato tusoque succus, addito nitro inunctus: (hic  
etiam facit ad nervorum distentionem.) Prodest et dro-  
pax mangonum frequenter adhibitus, qui quidem constat

υγρὰ μετὰ ξηρᾶς πίσεως ἐψημένῃ πρὸς ἴσῃν· μήκωνος ἀγρίας φύλλα καὶ κωδίαὶ σὺν ἀλγίτῳ καταπλάσσόμενα· δεῖ δὲ καὶ ξηραίνειν αὐτὰ μίσγοντα ἄλευρον, καὶ ποιοῦντα τροχίσκους, ἀποτιθέναι, ἐπὶ δὲ τῆς χρείας ὅξει ἀναλύειν· ποιεῖ δὲ καὶ κρίθινόν ἄλευρον μετ' ἀφειρήματος κωδίων ἢ μελικράτου.

Κεφ. σμα'. Πυρίαι δὲ ἰσχυιάδος καὶ τῶν ἄλλων ἀλγυμάτων ἱκανῶς ἐνεργοῦσαι· βοὸς νομάδος πρόσφατον ἀπόπατον ἐνείλησας φύλλοις, καὶ θερμάνας ἐν θερμοσποδιᾷ, ἐμπλάσας εἰς ὀθόνιον ἐπίθεις· ἄλλες φρυκτοὶ ἐν σάκκῳ, ἢ κέγχρος, ἢ ἀμφοτέρω μίγνεντα, ἢ ἔλυμος ὁμοίως· ἢ πίτυρα ἐφθὰ σὺν δάφνης φύλλοις καὶ ἄλῃ, ἢ θαλάσση, ἢ μελικράτῳ, ὁμοίως εἰς σάκκον βαλλόμενα ἐκ πυκνοῦ πεποιημένου ῥάκους.

Κεφ. σμβ'. Καύσεις δὲ ἰσχυαδικῶν ὠφέλοῦσιν αὗται· σπυράθους αἰγὸς πυρῶσας ἐπιτίθει ἐπὶ τὸ μεταξὺ μέρους<sup>55</sup> τοῦ ἀντίχειρος κοῖλον, ἔλαιον προῦποχέας, ἢ ἔριον ἐλαίῳ βρέξας καὶ ὑποθεῖς, πύρῳσον, ἕως ἂν οὗ διὰ τοῦ βραχίονος

65) Vulg. τῶν οὐρῶν.

e liquidae simul et aridae picis aequis partibus coctis: sylvestris papaveris folia simul et capitula imposita cum polenta: eadem etiam admixta farina siccanda et in pastillos redigenda, qui reponantur, usuque postulante aceto dissolvantur. Facit et hordeacea farina cum decocto caputum papaveris aut aqua mulsa.

Cap. CCXLI. Fomenta, quae tum in ischiade, tum in doloribus aliis auxilii plurimum afferunt: armentalis bovis fimum foliis involutum et cinere ferventi calfactum inducito linteolo, atque imposito. Fetus etiam vicem praestant sal torrefactus, saccellis inditus, et milium, seu per se, seu etiam simul mixta adhibeantur: similiter et panicum. Sunt et usui furfures cum lauri foliis et muria aquave marina vel aqua mulsa cocti, saccis e densiore panno paratis similiter inditi.

Cap. CCXLII. Conferunt et ischiadicis ustiones huiusmodi: fimi caprini ferventes pilulas imposito ei cavo, quod est inter pollicem et indicem, infuso tamen prius oleo, aut substrata prius lana oleo imbuta: atque sic urito, donec ustionis sensus per brachium ad coxendicem

αἰσθήσις ἐπὶ τῷ ἰσχυρῷ ἔλθῃ· ἢ πῆλινον κυκλικόν ποιήσας μέγεθος ἀσσαρίου, βάθος δὲ δακτύλου, ἐπίθεις ἐπὶ τὸν ἀλγοῦντα τόπον· ἔρειδε δὲ κατ' αὐτοῦ πεφυρακτωμένον βακτήριον, ἄχρῃ αἰσθήσεως δυσανασχέτου· ἢ ἀποτείνας τὸ δέρμα κατὰ τὸν ἀλγοῦντα τόπον, διαίρει γραφίδι πεφυρωμένη ἐκ διδακτυλίου διαστήματος. Λίβυες δὲ πυραμίδα ποιήσαντες ἐκ λωτοῦ πρισμάτων καὶ θείου ἀπύρου καὶ ἐλατηρίου, ἐπιτιθέασιν ἐπὶ τὸ ἀλγοῦν μέρος, προὔποτιθέντες διπλοῦν ὀθόνιον, ἢ ταινίδιον, ἢ λεπτὸν ὄστρακον, ἐφ' ὧν ἐπιτιθέασιν ἡμμένην τὴν πυραμίδα· Μαρμαρίδες<sup>56</sup> ὑγροῖς ξύλοις ἐλαίνοις περιεχυμένοις καίουσι θερμαίνοντες αὐτὰ, ὥστε μὴ καίεσθαι, θερμὰ δὲ καὶ ἔνικμα γίγνεσθαι. Πάρθοι δὲ μολυβδοῦν σωλῆνα ποιήσαντες ἀπύθμενον, ἔχοντα ὦτα, ἐπὶ τὰ ἀλγοῦντα ἐπιτιθέασιν, προὔποχρίσαντες τὴν βάσιν τοῦ σωλῆνος στατὶ πρὸς τὸ μὴ παρεκρυῆναι τὸ ἔλαιον· περιβάλλουσιν δὲ ἱματίοις ἐπιμελῶς, πρὸς τὸ μὴ βλάπτεσθαι ὑπὸ τῶν ἀποθρομένων ῥανίδων· ἔπειτα καθιᾶσι ζεστὰ καυστήρια μ' ἢ ν', ἄ-

56) Cf. Diosc. lib. 2. c. 204.

perveniat. Aut: e luto formatum orbiculum assis magnitudine, digiti vero crassitie, dolenti loco imposito, huicque bacillum candentem apprimito, quoad aeger ustionem amplius tolerare vix possit. Aut protensam protractamve longius cutim loco affecto vicinam ignito stylo dividito, interiecto duorum digitorum intervallo. Afri incensam pyramidem e loti ramentis, sulphure vivo et elaterio conflata dolenti parti applicant, substrato prius duplici linteo fasciave, aut tenui testa. Marmaridae ustionem administrant, circumpositis parti humentibus lignis oleaginis, quae non quidem incendunt, sed ita calfaciunt, ut humorem exsudent, qui deinde in partem affectam guttatim exstillet. Parthi vero plumbeum tubulum utrinque pertusum et ansatum dolentibus locis imponunt, obducta prius ipsius tubuli basi subacta farina, ut ne oleum, quod tubulo indendum est, praeterfluat: vestibis vero ipsum diligenter circumtegunt, ut ne guttis destillantibus partes vicinae laedantur. Tum postea ferventia cauteria quadraginta aut quinquaginta subinde immittant, dum circa partem me-



χρὶς ἂν οὐ αἰσθησίς τις περὶ τὸν τόπον γένηται· περιμά-  
 τουσι δὲ καὶ τὸ πρόσωπον ψυχρῷ ὕδατι, διὰ τοὺς ἐκ τῆς  
 θερμασίας ἐπιγενομένους ἰδρωτάς· καὶ διὰ τοῦτο περιβεβλή-  
 σθαι δεῖ, καὶ μὴ λίαν πληροῦν τὸν σωλήνα· ὑπερχεῖται γὰρ  
 ἐν τῇ ζέσει. Καὶ περὶ μὲν τούτων ἐπὶ τοσοῦτον. Τὰ δὲ  
 λοιπὰ ἐν τῷ ἑξῆς διελευσόμεθα.

diocrem aeger senserit ustionem: sed et interim frigida  
 faciem illius abstergunt, ob sudores ex fervore superve-  
 nientes. Porro et iccirco circumicetis vestibis probe mu-  
 niendae vicinae partes, neque nimium implendus oleo tu-  
 bulus, ut ne id effervescens parte superna refundatur, il-  
 lasque adurat. Et de his quidem hactenus: reliqua pro-  
 xime sequenti libro prosequemur.

---

[ΠΕΔΑΝΙΟΥ ΔΙΟΣΚΟΡΙΔΟΥ  
ΑΝΑΖΑΡΒΕΩΣ]

ΕΥΠΟΡΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΛΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ  
ΒΙΒΛΙΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ.

---

Τὴν τῶν ἀπλῶν φαρμάκων ἐνέργειαν ἐν δυσὶ καταχωρήσαντες βιβλίοις, τιμιώτατε Ἀνδρόμαχε, καὶ ἀμφοτέρῳ σοὶ ἀναθέντες, ἐπελθόντες τε ἐν τῷ πρὸ τούτου βοηθήματα ἁρμόζοντα τοῖς περὶ κεφαλὴν καὶ ὀφθαλμοὺς καὶ ἀρτηρίας καὶ τὴν λοιπὴν ἐπιφάνειαν συνισταμένοις πάθεισιν, ἐν τούτῳ περὶ τῶν λειπομένων διευκρινήσομεν· ἄρξάμενοι ἀπὸ τῶν περὶ τὸν στόμαχον συνισταμένων παθῶν, προδιαστειλάμενοι, ὅτι ἐπὶ

---

[PEDANII DIOSCORIDIS  
ANAZARBEI]

DE FACILE PARABILIBUS SIMPLICIBUSQUE  
MEDICAMENTIS LIBER POSTERIOR.

---

Quoniam, spectatissime Andromache, morborum curationes per simplicia medicamenta duobus libris distinximus, quorum utrumque tibi dedicavimus, et priore quidem auxilia capitis, oculorum, faucium, ac summae cutis extremarumque partium affectibus conférentia complexi sumus: iam superest, ut in hoc posteriore de reliquis agamus, a stomachi vitiis facto initio. Sed prius lectorem monitum velim, quotiescunque iis, quae ore sunt assumenda, certam

τῶν πινομένων, ἔφ' ὧν τὰς ποσότητας οὐ προσγράφομεν, ἥ μὲν ἐλαχίστη πόσις ἐστὶ τριώβολον· ἥ δὲ μέση δραχμὴ μία· ἥ δὲ τελεία δραχμαὶ δύο.

Τὰ τῶν περὶ τὸν στόμαχον καὶ τὰ ὑποχόνδρια συνισταμένων παθῶν βοηθήματα.

Κεφ. α'. Τοὺς χρονίως καυσουμένους τὸν στόμαχον ὠφελεῖ ἅμα καὶ δίψαν παύει γλυκυρρίζης χυλὸς πινόμενος, καὶ ἡ ρίζα σὺν ὕδατι· ἐλίκων ἀμπέλου ἀπόβρεγμα, ἀνδράχνης χυλὸς καὶ αὐτὴ ἐσθιομένη, σέριδος χυλὸς καταρρόσου-μενος· πολυγόνου χυλὸς ὁμοίως. Ἐπὶ δὲ τῶν ἐξ ἀσθενείας ἀναλαμβάνοντων δίψαν παύει κράμβη ἐσθιομένη ἔνωμος, σῦκα ἀπαλὰ, στρόβιλοι ἐσθιόμενοι, σίμηγτον πετραῖον διαμασσώμενον. Καταπλασσόμενα δὲ ὠφελεῖ στομάχους καυσουμένους καθ' ἑαυτὸ καὶ σὺν ἀλγίτῳ αἰκῶνι ρίζα, κοτυληδόνης φύλλα, κύπρου φύλλα, πολύγονον, σέρις, σόγχος, σέλινον, στρόχρον κηπαῖον, ἑλικες ἀμπέλου καὶ τὰ φύλλα, ἀνδράχνη μετ' ἀλγίτου ἢ ἄρτου, φύλλα ἀμπέλου καθ' ἑαυ-

definitamve quantitatem minime adscribimus, minimam quidem eorum dosin esse debere trium obolorum, maximam drachmarum duarum, mediam vero drachmae unius.

*Ad stomachi et hypochondriorum affectus remedia.*

Cap. I. Stomachi diutino ardore conflictatis prosunt simul et sitim pellunt glycyrrhizae succus epotus, et radix ipsa ex aqua bibita, capreolorum vitis dilutum: portulacae succus, ac ipsa etiam in cibis sumpta: seridis succus absorptus, similiterque polygoni succus. Eorum vero, qui convalescunt ex morbo, sitim compescunt brassica cruda esitata, ficus recentes, strobili in cibis sumpti, symphytum petraeum commanducatum. At imposita, seu per se, seu cum polenta, stomachos aestuantes haec iuvant: sempervivi radix, cotyledonis et cypri folia, polygonum, seris, sonchus, apium, solanum hortense, vitium capreoli et folia, portulaca cum polenta vel pane, vitium folia per se ex aqua frigida, elate palmarum trita

τὰ ἐξ ὕδατος ψυχροῦ, ἐλάτῃ λεία σὺν ἀλγίτοις· ἢ φύλλα κράμβης ὡμὰ τρίψας μετὰ μέλιτος ἐπιτίθει.

Κεφ. β'. Τοὺς δὲ καυσουμένους τὴν ἐπιφάνειαν ὥφελει κολοκύνθης ξυσμάτων ὁ χυλὸς μετὰ ῥοδίνου, ἢ ὄμφακος χυλὸς σὺν ῥοδίνῳ· ἀψινθίου φύλλων ἀποζέματος ποτήριον ἐν κατὰ πρωῒ, ἢ ἐπίθυμον μετὰ γάλακτος ὀρθροῦ πέντε ἢ ε' φορὰς τὸν μῆνα.

Κεφ. γ'. Χολὴν γεννῶντας μέλαιναν, καὶ ἐμφυσωμένους στόμαχον καὶ ἔντερα ὥφελει γλήχωνος ἀπόξεμα ἢ ἀπόβρεγμα πινόμενον, καὶ ὕδωρ τὸ ἀπὸ τοῦ πεπυρωμένου σιδήρου, ἐν ᾧ σίδηρος σβέννυται· ἀρμόζουσι δὲ καὶ σπόγγοι ἐξ ὅσους ἐπιτιθέμενοι, μάλιστα κατὰ τὴν ἐμφύσησιν<sup>57</sup> τῶν ἐντέρων καὶ τῆς διανοίας τὴν παρατροπὴν· εἰ δὲ ἐπιμένει, στυπτηρίαν ὑγρὰν μετὰ χαλκάνθου καὶ ἀλόης καὶ μέλιτος ἐπιτίθει, κηρωτῇ μίξας· ἢ κισσοῦ φύλλα ἐφθὰ σὺν οἴνῳ κατάπλασσε, ἢ ἀρνόγλωσσον λείον σὺν ἀλσίν, ἢ βοδὸς ἀγελείας-βόλβιτον ξηρὸν ἐν οἴνῳ ἐψημένον, ἢ πράσιον μετ' ἄρτου καὶ ῥοδίνου· καὶ βολβοὶ (ποιοῦσι) μετὰ στυπτηρίας λείοι.

57) Paull. 3, 37. p. 93. ἐν ταῖς ἐντάσεσιν.

cum polenta: brassicae denique folia cruda tritaque cum melle imponuntur.

Cap. II. His, quibus aestuat ventriculi superficies, opitulatur succus e cucurbitae ramentis cum rosaceo, itemque uvae acerbae succus cum rosaceo. Absinthii foliorum decocti poculum mane haustum, epithymum cum sero lactis potum quinque sexve vicibus per mensem.

Cap. III. Iis, qui bilem atram gignunt, quique stomachi ac intestinorum inflatione vexantur, auxilio sunt haec: pulegii decoctum dilutumve bibitum, et aqua, in qua candens ferrum extinctum sit. Spongiae quoque ex aceto impositae conveniunt, maxime in inflatione intestinorum et mentis alienatione. Sin perseveret affectus, alumen liquidum cum chalcantho, aloë ac melle imposito, cerato admixto. Aut hederæ folia cocta in vino cataplasmatibus instar imposito: aut plantaginem tritam cum sale: aut fimum bovis armentariae siccum in vino coctum, aut marrubium cum pane ac rosaceo, bulbi denique (expediunt) cum alumine triti.



Κεφ. δ'. Ἐπὶ δὲ τῶν λυγμῶν ἀρμόζει πινόμενα ἀλύσου τῆς πόας ἀφέψημα, καὶ αὐτὴ κρατηθεῖσα· ἀνήθου σπέρμα πινόμενον καὶ ἀποσφραγισμένον, ἀριστολογίας ῥίζα μετ' ὕδατος, ἀσπληνος πόα μετ' ὀξυκράτου, ἡδυόσμου κλωνία σὺν ῥοιᾷς ὀξείας χυλῶ, καστόριον σὺν ὄξει, κύμινον σὺν ὄξει, ῥᾷ σὺν ὕδατι, σισυμβρίου, τῆς καρδαμίνης λεγομένης, χυλὸς καὶ τὸ σπέρμα, παταρικοῦ προσαγωγή. Τὸν δὲ διὰ ψυχροῦς λυγμὸν λύουσιν ἄκραι χεῖρες εἰς θερμὸν ὕδωρ καθιέμεναι, ὕδατος θερμοῦ καταρρόφησις, σπόγγος ἐκ ζεστοῦ ὕδατος προσαγόμενος τῷ στομάχῳ, ἔλαιον σικυώνιον, ἀνατριβομένων τῶν ἄκρων.

Κεφ. ε'. Πρὸς δὲ τὰ ἀλγήματα τοῦ στομάχου ποιῇ γάλα γυναικῆον, ἢ βόειον, ἢ ὄνειον θηλαζόμενον, ἢ πινόμενον, κόχλαξι συναφεισόμενον· γεντιανῆς < α' μετ' ὕδατος· μαστίχης κοχλιάριον ἐν καθ' ἡμέραν πινόμενον, ἢ διαμασσωμένον, τοῦ χυλοῦ καταπινομένου· ἡδυόσμου κλωνίων τριῶν φύλλα σὺν ὀξείας ῥοιᾷς χυλῶ καταρρόφούμενα, γλήχων μετ' ὀξυκράτου.

Cap. IV. In singultu conveniunt haec in potu sumpta: alyssi herbae decoctum, aut ipsa etiam herba manibus detenta, anethi semen potum et olfactum, aristolochiae radix ex aqua, asplenium herba cum posca, menthae ramuli cum acidi punici succo, castorium cum aceto, cuminum cum aceto, rha cum aqua, sisymbrii, quod cardamine dicitur, succus et semen, sternutatorium denique adhibitum. Ortus vero a frigore singultus solvitur summis manibus in calentem aquam demissis, aqua calida absorpta, spongia ex aqua ferventi stomacho adhibita, extremis denique partibus oleo sicyonio confricatis.

Cap. V. Ad stomachi dolores faciunt lac muliebre, bubulum, aut asininum, e papilla suctum, aut bibitum, ubi per ignitos silices fuerit decoctum: gentianae drach. j. cum aqua, mastiches cochlear unum quotidie bibitum, aut succus ex eodem commanducato deglutitus, trium menthae ramulorum folia cum acidi punici succo absorpta, itemque pulegium ex posca bibitum.

Κεφ. ε'. Πρὸς δὲ τοὺς δηγμοὺς τοῦ στομάχου· τερμίνθου φύλλα ἀφεψόμενα, ὁμοίως σκορδίου χύλισμα· σόγχου χυλὸς μετὰ στροβίλων καὶ καρύων πικρῶν καὶ σικύου σπέρματος, κῶνοι ἐσθιόμενοι καθ' ἑαυτούς.

Κεφ. ζ'. Καταπλασσόμενα δὲ ὠφελεῖ ἀλγήματα στομάχου μελίλωτον ἐν οἴνῳ ἐφθὸν μετὰ τηλίνου ἀλεύρου ἢ γύρεως, κυδώνιον ἐφθὸν σὺν ἄνθει, ἢ πήγανον σὺν μέλιτι.

Κεφ. η'. Πρὸς δὲ τοὺς τὴν τροφὴν ἀποβάλλοντας ἐπιτιθέμενος ὠφελεῖ σπόγγος ἕξ ὄξους δοσιμέως ἄχρι φλυκταινώσεως, ἐπὶ τε τοὺς πόδας καὶ βραχίονας· ἐπὶ δὲ τοῦ θώρακος καταπλασσόμενος τυρὸς νεαλῆς μετ' ἀλφίτου, ἢ σελίνου φύλλα, ἢ σέριδος μετ' ὄξους καὶ ἀλφίτων, ἢ ἀνδράχνης ὡς αὐτῶς, ἢ κολοκύνθης ξύσματα ὁμοίως.

Κεφ. θ'. Τοὺς δὲ ναυτιῶντας καὶ πλαδῶντας ὁμοίως τὸν στόμαχον καὶ ἐξεμουῖντας ἴστησι πινόμενα ἄλφιστα σὺν οἴνῳ, ἀμύγδαλα γλυκέα πρόσφατα σὺν τῷ λέπει ἐσθιόμενα, ἀγρώστεως τῆς ἐν Παρνασσῷ σπέρμα, κύμινον αἰθιοπικόν, ἀνήθου σπέρμα, πολυγόνου χυλὸς, καὶ κικώριον ἐσθιόμενον·

Cap. VI. Ad oris ventriculi morsus valent terebinthi folia decocta: similiter et succus e scordio: sonchi succus cum nucleis pineis, amygdalis amaris et semine cucumeris: pinei etiam nuclei per se in cibis sumpti.

Cap. VII. Stomachi dolores imposita levant melilotus in vino coctus cum farina foeni graeci aut polline, cotoneum cum flore coctum, ruta denique cum melle.

Cap. VIII. Cibus reiicientibus prodest spongia acris aceto [calente] imbuta, pedibus et brachiis adhibita, quoad pustulae excitentur. Conferunt vero, adhibita pectori, caseus recens salitus cum polenta, folia apii aut seridis cum aceto et polenta, similiter et portulacae folia aut cucurbitae ramenta.

Cap. IX. Nauseam, stomachi ex nimia humiditate languorem ac vomitum ista cohibent: polenta in vino bibita, amygdalae dulces recentes cum suo putamine esitatae, graminis parnassii semen, cuminum aethiopicum, anethi semen, polygoni succus, cichorium in cibis sumptum,

καὶ σέρις, καὶ ὁ χυλὸς πινόμενος· σισύμβριον, ἡ καρδαμίνη λε-  
γομένη, πινομένη, θέρμοι γλυκεῖς λείοι σὺν ὄξει ποθέντες·  
θριδάκες ἄπλυτοι ἐσθιόμεναι, καὶ τὸ σπέρμα πινόμενον μεθ'  
ὑδατος· σόγχου ὁμοίως, τοῦ ἄνθος μεθ' ὑδατος, κόστου <  
α' μετ' οἶνου. Κοκλίου χερσαίου λιβυκοῦ σὰρξ ὅλη καταπο-  
θεῖσα νήστεσι καὶ ἀλγήματα παύει στομάχου· προεσθιόμενοι  
δὲ ἔνωμοι δύο ἢ τρεῖς ἡμέρας, τὸ αὐτὸ ποιοῦσι· ποιεῖ δὲ  
καὶ σὺν τῷ ὀστράκῳ ὅλος καταποθεῖς, τοῦ ὀστράκου περι-  
πασθέντος. Γίγαρτα φρυκτὰ ἀντὶ ἀλγείων ἐσθιόμενα, γλή-  
χων καταπλασθεῖσα ἐξ ὀξυκράτου, κύμινον σὺν ὀξυκράτῳ πι-  
νόμενον ἢ σὺν ὄξει, λαπάθου σπέρμα ὀβολοῖς δύο ἢ τρισίν,  
ἀκακία μεθ' ὑδατος, λίθος ὁ ἐν τῇ σαμίᾳ γῇ εὗρισκόμενος·  
μαράθρου σπέρμα ἢ χύλισμα, μάλιστα τοῖς ἀποξύνουσιν ἢ  
ἐμοῦσι τὴν τροφήν.

Κεφ. ι'. Τοὺς δὲ ρευματισμοὺς τοῦ στομάχου ἴσῃσι  
βαλαύστιον μετ' ὄξους ποθέν, βάτου χυλὸς φύλλων καθ'  
ἑαυτὸν καὶ μεθ' ὑδατος, ὕδωρ τὸ ἀπὸ σιδήρου πεπυρωμέ-  
νου θερμοανθέν· ὄξος σκυλλητικὸν καταρρόφούμενον· (δεῖ δὲ

sicuti et seris, eorumque succus epotus: sisymbrium, aut  
quod cardamine dicitur, potum: lupini dulces triti, cum  
aceto bibiti, lactucae illotae in cibis sumptae, earumque  
semen ex aqua potum, similiter et sonchi semen et flos  
violae ex aqua, costi drachma j. cum vino. Cochleae ter-  
restris africanac caro tota ieiuno devorata etiam dolores  
stomachi sedat. Idem praestant cochleae duae tresve quo-  
tidie ante cibos alios assumptae: devorata etiam tota pro-  
ficit cum sua testa, hac circum adpersa: tosti acinorum  
nuclei polentae vice in cibo sumpti, pulegium cum posca  
impositum, cyminum ex posca vel aceto potum, lapathi  
semen duum triumve obolorum pondere, acacia cum  
aqua, lapis, qui in samia terra reperitur, foeniculi deni-  
que semen, aut expressus eo succus, ac iis maxime, qui-  
bus acescit cibus, aut vomitu reiicitur.

Cap. X. Stomachi fluxiones inhibent balaustium ex  
aceto potum, rubi foliorum succus, vel per se, vel ex  
aqua, aqua igniti ferri iniiectione fervefacta, acetum scil-  
liticum absorptum: (oportet autem ab exigua quantitate

ἀπ' ὀλίγου ἄρχεσθαι καὶ πίνειν ἄχρι κυάθου·) ῥοιὰ μεθ' ὕδατος ψυχροῦ, σκάνδυκος ἀφέψημα, σκίλλης ἐφθῆς τριώβολον ἐν ὀξυκράτῳ, ὑποκιστίδος < α' ἐν ὕδατι· φακὸς πεφωγμένος ἀντὶ ἀλφίτου ἐπιπασσόμενος· φακοὶ ἐπιτισμένοι λ' καταπινόμενοι· ῥόδων ἄνθος ἐπιπασσόμενον τῷ πόματι. Ἐμβρέχειν δὲ δεῖ τοὺς ῥευματιζομένους στομάχους ἐρίοις οἰσυπηροῖς σὺν ῥοδὸς ἀφεψήματι.

Κεφ. ια'. Ἀνατροπὰς δὲ στομάχου θεραπεύει στρουθίων διαχώρημα διδόμενον ἐν ποτῶ.

Κεφ. ιβ'. Κρατύνει δὲ τοὺς πεπλαδηκότας στομάχους, ἐπιτιθέμενα μετὰ κηρωτῆς μυρσινίνης ἢ ῥοδίνης, βάτου φύλλα, ἀψίνθιον, κυπαρίσσου φύλλα, κόριον, κάρχου, φοίνικες, μηλοκυδώνιον, ἐλάτη μετὰ φοινίκων.

Κεφ. ιγ'. Στομάχου δὲ ἐμπνευματώσεις ὠφελεῖ πινόμενα, καὶ τοὺς βραδυπεπτοῦντας μάλιστα, ἀγαλλόχου < α' σὺν οἴνῳ, ἀριστολογίας < α' σὺν οἴνῳ, σμυρνίου σπέρμα σὺν οἴνῳ, ἀκάνθης λευκῆς ῥίζα σὺν οἴνῳ· ἀγαρικὸν διαμασσηθὲν, ἐπιῤῥόφουμένου ἀκράτου. Πρὸς τὰς ἐμπνευματώσεις

incipiendo bibere ad cyathum usque unum.) Punicum malum cum aqua frigida, scandicis decoctum, scillae coctae tres oboli cum posca, hypocistidis drach. j. ex aqua: lenstosta, polentae loco imposita, eiusdem decorticata grana XXXX devorata: rosarum denique flos inspersus potui. Ceterum tentatum fluxione ventriculum irrigare oportet rhois decocto, lana succida excepto.

Cap. XI. Stomachi subversionibus medetur passerulorum stercus potui datum.

Cap. XII. Languentes ex nimia humiditate stomachos roborant haec, cum cerato myrtino aut rosaceo imposita: rubi folia, absinthium, cupressi folia, coriandrum, cachry, palmula, cotoneum malum, elate cum palmulis.

Cap. XIII. Inflationibus stomachi, et his maxime, qui tarde concoquunt, auxilio sunt haec in potu sumpta: agallochi drach. j. cum vino, aristolochiae drach. j. cum vino, smyrnii itidem semen cum vino, spinae albae radix cum vino, agaricum commanducatum, superbibito mero.



τοῦ στομάχου, ῥάμνου τῆς ἀκανθώδους φύλλα λειώσας, ἀνά-  
πλασον τριωβολιαῖα, καὶ δίδου ἐν τοῖς μὲν πυρέσσουσι μεθ'  
ὑδρομέλιτος κεκραμένου κοτύλην α', ἀπυρέτοις δὲ μετ' οἴνου  
κεκραμένου· ποιεῖ δὲ καὶ πρὸς εἰλεώδεις καὶ πᾶν ἄλγημα  
πνευματικόν· θαυμαστῶς γὰρ δι' ἐρυγῶν καὶ φουσῶν ὑγιεῖς  
γίνονται.

Κεφ. ιδ'. Πένεις δὲ ποιεῖ ἀγαρικὸν διαμασσώμενον  
καὶ καταπινόμενον ἀπὸ δείπνου, χωρὶς τοῦ ἐπιθόσφειν τι·  
ἀλόης < α' σὺν ὕδατι, καὶ πρὸ τροφῆς· ἀρκευθίδες λείαι  
σὺν οἴνῳ, μήου ἀπόβρεγμα, ξυλοβαλσάμου ἀπόξιμα μετὰ  
σεσέλεως, ἢ νάρδου κελτικῆς μετ' ὀξυδίου ληφθὲν, σχοίνου  
ἄνθους ἀπόξιμα μετὰ ῥόδων ἄνθους πινόμενον, σέσελις πι-  
νομένη. Εὐπεψίαν δὲ ποιεῖ σέριδος χυλὸς καταθόσφούμενος.

Κεφ. ιε'. Ῥώννυσσι δὲ στόμαχον στάφις, σκίλλα ἐφθῇ  
σὺν μέλιτι ἐκλειχομένη.

Κεφ. ις'. Τὰς δὲ κισσώσας ὠφελεῖ ἀνδράχνη ἐσθιομέ-  
νη, ἐλίων ἀμπέλου ἀπόβρεγμα πινόμενον, κεδρόμηλα ἐσθιό-  
μενα.

Ad inflationes stomachi rhamni spinosi folia trita redige  
in massulas triobolares, e quibus unum exhibeto febrici-  
tantibus cum hydromelitis diluti hemina una: iis vero, qui  
febre carent, cum vino diluto. Facit etiam ad ileosos et  
quosvis dolores a flatu: malo siquidem mirum in modum  
per ructus flatusque resoluti sanescunt.

Cap. XIV. Coctiones promovent agaricum a coena  
commanducatum devoratumque, nullo liquore insuper ab-  
sorpto: aloës drach. j. ante cibum ex aqua sumpta, iuni-  
peri baccæ tritæ cum vino, mel infusum, xylobalsami  
decoctum cum seseli, nardi celticæ decoctum cum aceti  
momento sumptum, iunci odorati decoctum cum rosarum  
flore haustum, seseli potum. Coctionem denique adiuvat  
seridis succus absorptus.

Cap. XV. Ventriculum confirmant uva passa et scil-  
la cocta cum melle delincta.

Cap. XVI. Pica laborantibus mulieribus auxilio  
sunt portulaca in cibis sumpta, vitis capreolorum dilutum  
potum, citria mala esitata.

Κεφ. ιζ'. Ὑποχόνδρια δ' ὠφελεῖ ἐσκληρωσμένα παθόντα χρονίως μάρμαρον πινόμενον. Καὶ καταπλασσόμενα ἀψίνθιον σὺν κυπρίνῃ κηρωτῇ ἢ φοίνικιν, λευκανθέμου φύλλα, σκόρδιον σὺν κηρωτῇ, τῆλιν ἢ λινόσπερμον σὺν μελικράτῳ, ἢ σάμψυχον ἐν κηρωτῇ.

Τὰ τῶν πυρεσσόντων βοηθήματα.

Κεφ. ιη'. Γλώσσης δὲ τραχύτητας ἐκμαλάσσει ἡδύοσμον λαῖον σὺν μέλιτι· ῥοῦς ἐρυθρὸς ὁμοίως, ῥόδιον σὺν μέλιτι ἢ καθ' ἑαυτό.

Κεφ. ιθ'. Τοὺς δὲ κατὰ περίοδον πυρετοὺς κεχρονισμένους θεραπεύει χαμαῖδρου φύλλα λαῖα πρὸ μιᾶς ὥρας τῆς ἐπιλήψεως πινόμενα, καὶ ὅσα ἐπὶ τριταϊκῶν αὐτίκα ἱστοροῦμεν.

Κεφ. κ'. Πρὸς δὲ τοὺς τριταϊκοὺς ἀρμόζει πόματα λαμβανόμενα πρὸ μιᾶς ὥρας τῆς ἐπισημασίας, προερχομένων καὶ ἀνατριβομένων τῶν ἄκρων· τριφύλλου σπέρματος κοκκία τρία κηρῷ καταπλασθέντα καὶ καταποθέντα ἐπὶ τρεῖς, τὰ

Cap. XVII. Hypochondriis affectu diuturno induratis auxilio est foeniculum bibitum. Imponuntur vero cataplasmatum more absinthium cum cerato cyprino aut palmulis, leucanthemi folia, scordium cum cerato, foenum graecum aut lini semen cum aqua mulsa, sampsuchum denique cerato exceptum.

*Febricitantium remedia.*

Cap. XVIII. Linguam scabram asperamve emolliunt ac laevigant mentha trita cum melle, tus rubra, rosaceum cum melle, aut per se.

Cap. XIX. Diuturnas febres, quae [quotidianis] redeunt circuitibus, sanant chamaedryos folia ante accessionem hora una pota, et quaecunque mox in curandis tertianis commemorabimus.

Cap. XX. Tertianis febribus haec conveniunt, hora una ante accessionem assumpta, prius tamen unctione frictioneque partium extremarum adhibita: trifolii seminis grana cera obvoluta novem, nempe terna ternis devorata

πάντα ἐννέα· ἀρογλώσσου ῥίζαι ἅδραὶ τρεῖς μετ' οἴνου πι-  
νόμεναι, ἱερᾶς βοτάνης τὸ τρίτον γόνυ ἀπὸ τῆς γῆς ἀφαιρε-  
θὲν, καὶ διδόμενον· ποιεῖ καὶ σίλφιον κηρῶ περιπλασθὲν  
λευκῶ καὶ καταποθὲν· ἐπιρῥοφείτωσαν δὲ ὕδωρ θερμὸν ἢ  
οἶνον· ἡλιοτροπίου τοῦ μεγάλου κόκκοι τρεῖς σὺν οἴνω, ὀνό-  
βρυχis σὺν οἴνω, πενταφύλλου φύλλα γ', μετ' οἴνου ἢ ὑδρομέλιτος  
ποτιζόμενα, πέπερι λεῖον μεθ' ὕδατος πινόμενον. Περιαρθεν-  
τα δὲ ὠφελεῖ τριταίους· λειγὴν ἵππου περιαρθεῖς, ἢ ἀράχνας  
τὰ ζῶα τρία συναναμαλάξας ἐμπλάστρωσον ἐπιθεῖς ἐν ὀθο-  
νίῳ κατὰ τοῦ μετώπου καὶ τῶν κροτάφων.

Κεφ. κα'. Τεταρταῖκους δὲ ὠφελοῦσιν ἀρογλώσσου  
ῥίζαι ἐν οἴνω πινόμεναι· ἱερᾶς βοτάνης τέταρτον γόνυ ἀπὸ  
τῆς γῆς ἀφαιρεθὲν καὶ τριβὲν λεῖον σὺν οἴνω καὶ δοθὲν,  
ἀσφάλτου < α' μετὰ καστορίου ὀβολοῦ, γλυκυρρίζης < β'  
μεθ' ὕδατος κο. α', ἡλιοτροπίου τοῦ μεγάλου κο. δ' σὺν  
οἴνω, κόρες οἱ τῆς κλίνης δ', ἐντεθέντες εἰς τὰ τῶν κυάμων  
βρώματα καὶ καταποθέντες, πενταφύλλου φύλλα δ' μεθ'  
ὑδρομέλιτος ἢ οἴνου, ὑπερικοῦ τοῦ κόρεως λεγομένου τὸ

vicibus: plantaginis radices succulentae tres in vino po-  
tae, verbenacae supinae tertium a terra geniculum de-  
cerptum et exhibitum. Confert et silphium, cera candi-  
da obvolutum ac devoratum, superbibita tamen aqua ca-  
lida aut vino: heliotropii maioris grana tria cum vino,  
onobrychis cum vino, quinquefolii folia trita cum vino  
aut aqua mulsa pota: piper denique tritum ex aqua po-  
tum. Sed et amuleta tertianis febribus auxilio sunt, uti  
lichen equorum appensus, itidemque aranei tres contriti,  
linteolo inditi, frontique ac temporibus adhibiti.

Cap. XXI. Contra quartanos circuitus auxilio sunt  
plantaginis radices quatuor in vino bibitae: verbenacae  
supinae quartum a terra geniculum decerptum, cum vino  
tritum et exhibitum: bituminis drach. j. cum castorei  
obolo, glycyrrhizae drachmae duae cum aquae hemina  
una, heliotropii maioris grana quatuor cum vino, cimi-  
ces e cubilibus quatuor cavis fabarum inditi ac devorati,  
quinquefolii quatuor folia ex aqua mulsa aut vino, hy-

σπέρμα μετ' οἴνου· ἱστορεῖται δὲ καὶ οὖρον ὠφελεῖν τὸ ἴδιον πινόμενον κυάθων δ' πληθὺς προεμεμκόσι· δεῖ δὲ φυλάσσειν αὐτὸ ἐν σταμνίῳ. Τὸ αὐτὸ δὲ ποιεῖ καὶ παιδὸς οὖρον ἀφθόρου μέχρι πέντε πόσεων. Τετάρταϊον δὲ παύει πρὸ τῆς ἐπισημασίας ὀξυπόρου χρίσις καθ' ὅλον τὸ σῶμα, καὶ μετὰ τούτου πόσις τοῦ αὐτοῦ φαρυμάκου· ἢ λιβανωτίδος ῥίζης < α' ζ'. ἐν οἴνου ἡμικοτυλίῳ μικρῷ πρότερον τῆς ἐπιλήψεως· καὶ συμπεριβάλλων ἄφες ἡσυχάσαι, καὶ ἵνα μὴ ῥιγώσῃ, προαναλειφένθω λίπει, καὶ ἰδρώσει πολὺ.

Κεφ. κβ'. Κοινῶς δὲ πρὸς πάσας περιόδους καὶ εἴγη ποιεῖ, κινουῖντα ἰδρωτάς, σμυρνίου σπέρμα μετ' οἴνου, ὁπὸς σιλφίου ἀγρίου καὶ ἡμέρου μέλιτι ἐφθῶ περιχριόμενος καὶ καταπινόμενος, πηγάνου ἀγρίου καὶ ἡμέρου σπέρμα σὺν οἴνῳ, ἀριστολοχίας ῥίζης < α' σὺν οἴνῳ· σμύρνης ὅσον κύαμος, πέπερι σὺν οἴνῳ, ἱριδος < β' σὺν οἴνῳ, ἵπποσελίνου σπέρματος < α' μετ' οἴνου, ὑπερικοῦ ὁμοίως, καλαμίνθης ἀπόζεμα σὺν καστορέῳ, ὁποῦ φύλλα σὺν καρδάμῳ καὶ ὠῶ, ἢ πε-

perici, coris appellati, semen cum vino: pota quoque urina cuique sua cyathorum quatuor mensura vomitu prius evacuatos invare traditur: sed illam in fictili vase asservari oportet. Idem facit impubis pueri urina quinques hausta. Quartanas finit oxyporon aliquod ante accessiones toti corpori illitum, poto deinde generis eiusdem medicamento. Aliud: radice libanotidis sesquidrachmam in vini dimidia hemina paulo ante febrilem accessum exhibeto: ac ut ne rigore prehendantur aeger, aliquo pingui praeunctum et undique coopertum quiescere sinito, dum copiosus erumpat sudor.

Cap. XXII. Ad omnes in communi circuitus ac rigores faciunt haec sudores moventia: smyrnii semen cum vino, silphii agrestis ac domestici liquor melle cocto circumlitus ac devoratus, rutae sylvestris et sativae semen cum vino, radice aristolochiae drach. j. cum vino, myrrha ad fabae magnitudinem, piper cum vino, iridis drach. ij. cum vino, hipposelini semen drach. j. pondere cum vino: similiter et hyperici, calaminthae decoctum cum castorio, silphii semina cum nasturtio et ovo, vel pipere



πέρει καὶ πηγάνω· ὀποπάνακος < α', ἢ πάνακος < β', σέ-  
σελι μετὰ πάνακος καὶ πεπέρεως σὺν οἴνῳ ποθέν, νάρθηκος  
σπέρμα ὁμοίως, φλόμου ῥίζα ἐν οἴνῳ, πενταφύλλου ῥίζης  
χυλὸς σὺν οἴνῳ, κόπρος κυνεῖα ξηρὰ μετ' ὄξους πινομένη.

Κεφ. κγ'. Πρὸς δὲ τοὺς χρονίους καὶ ἀτάκτους πυρε-  
τοὺς ἀρμόζει ἀλεκτρυόνης παλαιοῦ ζωμὸς, ἀλαῶν εἰς τὴν γα-  
στέρα αὐτοῦ ἐπαγαγόντων, ἢ ταρίχους, καὶ συνεψηθέντων,  
πινόμενος.

Κεφ. κδ'. Συγγχριόμενα δὲ μετ' ἐλαίου λεία ἐπὶ τῶν  
μετὰ ῥίγους περιοδικῶν πυρετῶν ὠφελεῖ πρὸ τῆς ἐπισημασίας  
θάλποντα τὸ σῶμα, καὶ ἰδρωτὰς κινούντα· ἄγνου σπέρμα,  
λιβανωτίδος σπέρμα, ἄλὸς ἄνθος, συκίνη κονία· νίτρον ἢ  
ἀφρόνιτρον, δαφνίδες, πύρεθρον, σμυρνίου τοῦ ἵπποσελίνου  
καλουμένου σπέρμα, ὑπερικόν, καλαμίνθη, κάχρυ ὀλίγον,  
καστόριον, κόνυζα, κόστος, σαγάπηνον, κνίδιος κόκκος μετὰ  
νίτρον καὶ ἐλαίου καὶ ὄξους, λύκαπος σὺν ὕδατι θερμῷ,  
σαμψύχινον, ἱρίνον, μετώπιον, γλεύκινον, κύπρινον, χαμαί-  
δρους, χαμαίπιτυς, συκαμίνου ὀπὸς, σταφίς ἀγρία.

ac ruta, opopanax drach. j., vel panacis drach. ij., seseli  
cum panace ac pipere in vino potum, ferulae semen si-  
mili modo, verbasci radix in vino, radicis quinquefolii  
succus cum vino: caninum stercus siccum ex aceto bi-  
bitum.

Cap. XXIII. Diuturnis et inordinatis febribus con-  
venit epotum ius e vetere gallinaceo, cuius ventri sal  
salsamentumve inditum incoctumque fuerit.

Cap. XXIV. Febribus cum rigore certo statoque cir-  
cuitu redeuntibus ista conferunt ex oleo trita, et ante ac-  
cessionem illita, quippe quae corpus excalfaciant sudores-  
que cieant: viticis semen, libanotidis semen, salis flos,  
lixivium siculneum, nitrum aut spuma nitri, baccae lau-  
ri, pyrethrum, smyrnii, quod hipposelinum dicitur, semen,  
hypericum, calamintha, cachryos momentum, castorium,  
conyza, costus, sagapenum: granum cnidium cum nitro,  
oleo et aceto: lycopsis cum aqua calida: unguenta sam-  
psuchinum, irinum, metopium, glaucinum, cyprinum:  
chamaedrys, chamaepitys, sycomori liquor, et staphis agria.

Κεφ. κέ'. Μιγνύμενα δὲ κόπους ὠφελεῖ ἄλεις, νίτρον, ὀνόβρυχis, σισύμβριον, χαμελαία, ἀμμωνιακὸν, πράσιον, ὀρίγανον, καππάρειως ῥίζα, σικύου ἀγρίου ῥίζα· τέφρα κληματίνη, ὄστρακον ἀπὸ ἵπνου, ἀριστολογίας πάλη, ὀποβάλαμον, κικανυμένος χαλκός, λεπίς χαλκοῦ καὶ τὰ δοιμέα ἀρώματα, βολβοὶ λείοι καταχριόμενοι σὺν πεπέρει καὶ ἀμμωνιακῷ, ἢ κηρωτὴ ὑγρὰ κυπρίνη, κομανικὸς<sup>58</sup> λίθος εἰς ἔλαιον ἀποτριβόμενος καὶ συγχριόμενος.

Κεφ. κς'. Ἀτροφοῦντας δὲ ὠφελεῖ ὀρόβου φουκτοῦ μέγεθος ὅσον κάρυον ποντικὸν ἐν μέλιτι πρὸ τῆς τροφῆς διδόμενον.

Κεφ. κζ'. Ἰστησι δὲ ἰδρωῶτας ἐπὶ τῶν διαφορουμένων καταπασσόμενα γῆ σαμία, γύψος, λιθάργυρος, κηκίς, σχιστὴ, μυρρίνη, θεῖον ἄπυρον, ἔλαιον τὸ ἐξ ἀγριελείας, μυρσίνιον, τερμίνθιον, οἰνάνθιον, ῥόδιον, μήλινον, σχίνιον. Καταχριόμενα δ' ἴστησι μάννα καὶ ἄμυλον σὺν ὠοῦ τῷ λευκῷ· ἢ ὠοῖς λείοις σὺν πεπέρει καὶ κνίδος σπέρματι, καὶ κη-

58) Τὰ Κόμανα ἐν Ἀντιταύρω τῆς Καππαδοκίας Strab. lib. 12. pag. 16..

Cap. XXV. Lassitudinibus conferunt mixta haec: sal, nitrum, onobrychis, sisymbrium, chamelaea, ammoniacum, marrubium, origanum, capparis radix, cucumeris agrestis radix, cinis sarmentitius, testa fornacea, aristolochiae pollen, opobalsamum, aes ustum, squama aeris, et aromata acria, bulbi triti, illiti cum pipere et ammoniaco, ceratum cyprinum liquidius, lapis comanicus in oleum detritus et inunctus.

Cap. XXVI. Cibum non sentientibus, quippe quorum corpora non aluntur, auxilio est ervum tostum in nucis avellanae magnitudinem melle collectum, et ante cibos exhibitum.

Cap. XXVII. Sudores in iis, qui exsolvuntur, cohibent inspersa haec: terra samia, gypsum, argenti spuma, galla, scissile alumen, myrtus: sulphur vivum, oleum agrestis oleae, myrtinum, terebinthinum, oenanthinum, rosaceum, melinum et lentiscinum. Eosdem haec illita sistunt: manna et amyllum cum ovi albumine: bulbi triti

ρῶ ὀλίγω, καὶ κόμμει, καὶ ὀνώνιδος σπέρματι, καὶ νίτροῳ ὀλίγω.

Κεφ. κη'. Καρδιακούς δὲ ὠφελεῖ, καταπλασσόμενα κατὰ τοῦ στομάχου, βάτου φύλλα μετὰ κηρωτῆς ὀλίγης ἢ ἄρτου, μυρσίνης φύλλα ἢ μύρτα, ἢ ἑλικες ἀμπέλου, ἢ ἀρνόγλωσσον σὺν ἄρτῳ ἢ κηρωτῇ ὀλίγῃ, μῆλα κυδώνια, φοίνικες, σέρις ἀγρία καὶ ἡμερος. Καὶ ἐνέματα δὲ ὠφελίμως παραλαμβάνεται πτισάνης χυλὸς καθειρημένος, ἀκροκωλίων ἢ ποδῶν μετ' οἴνου (ἀφέψημα), ἢ ὡὰ ὡμὰ σὺν οἴνῳ. Καταχρίεται δὲ αὐτῶν τὰ ἄκρα ὠφελίμως κηρωτῇ ὑγρᾷ μετὰ γάπυος λείου ἢ ξηρᾷ διεθείσῃ οἴνῳ.

Τῶν περὶ τὸν πνεῦμονα καὶ θώρακα παθῶν  
βοηθήματα.

Κεφ. κθ'. Αἵματος δὲ ἀναγωγὴν θεραπεύει πινόμενα ἀγαρικοῦ τριώβολον ἐν οἴνῳ, ἀδιάντου χυλὸς καταρρόσούμενος ἐν ὄξει, ὅσον κύαθος ἅ, καὶ ἐκ διαστήματων πολλῶν, ἢ πολυγόνου χυλὸς, ἢ αἰζώου, ἢ ἀρνόγλωσσου χυλὸς ὁμοίως,

cum pipere et urticae semine, cerac momento, gummi, ononidis semine et paucio nitro.

Cap. XXVIII. Cardiacos iuvant haec, stomacho in modum cataplasmatibus imposita: rubi folia cum paucio cerato vel pane, myrti folia aut baccac, vitium capreoli, plantago cum pane aut cerato modico, mala cotonea, palmulae, intubus agrestis et sativus. Quin et utiliter infunduntur enemata e ptisanæ decoctae cremore, e partium extremarum pedumve decocto in vino, aut ex ovis crudis cum vino. Sed et aegrorum extremae partes commode inunguntur cerato liquido cum trito sinapi, aut sicco, quod vino dissolvatur.

*Pulmonis thoracisque affectuum remedia.*

Cap. XXIX. Sanguinis reiectioni medentur in potu sumpta haec: agarici trium obolorum pondus in vino, adianti succus cum aceto, cyathi unius quantitate per intervalla multa absorptus: similiter et succi e polygono,

ἢ βάτου, ἢ ἀνδράχνης, ἢ ἐλίκων ἀμπέλου, ἢ βαλαύστιον σὺν ὀξυκράτῳ, ἢ ἡδυόσμου χυλὸς καθ' ἑαυτὸν καὶ σὺν ὀξυκράτῳ ἢ ὕδατι, περικλυμένου χυλοῦ τριώβολον μεθ' ὕδατος, κυπαρίσσου σφαιρία μεθ' ὕδατος λεῖα πινόμενα, λυσιμάχιος πόα καὶ ὁ χυλὸς αὐτῆς, μυρίκης καρπὸς λεῖος καὶ φλοιὸς αὐτῆς, νάρθηκος ἐντεριώγη, οἰνάνθη ξηρά.

Κεφ. λ'. Πρὸς δὲ τὰς πολυχρόνιους ἀναγωγὰς ἰσχύει πράσου καρπὸς, μύρτου σπέρμα μεθ' ὕδατος ποθὲν, μᾶλλον δὲ μετὰ μύρτων χυλοῦ, ἄγνου τριώβολον μετ' ὀξυκράτου, ῥόδων κεφαλαὶ λεῖαι μεθ' ὕδατος, σύμφυτον πετραῖον καὶ ὁ καρπὸς, ἀκάνθης λευκῆς ῥίζης < ἅ μετ' ὀξυκράτου, ἀλθαίας ῥίζης ἀφέψημα· κόλλα ἀπὸ ζεῖα εἰσηθεῖσα, ὥς εἰς βιβλία, ἐκλειχομένη· ἀρμόζει καὶ σὺν ἡδυόσμῳ· ἢ ἀλείρου κριθίνου κυάθ. ἤμισυ χυλίσας δι' ὀθονίου καὶ μίξας ἡδυόσμον δίδου· ὑποκιστίδος χυλὸς μετὰ λιβάνου ὀλίγου, ἀμύγδαλα πινόμενα μεθ' ὕδατος ψυχροῦ, ἀμύγδαλα πικρὰ μετ' ἀμύλου καὶ ἡδυόσμου πινόμενα μεθ' ὕδατος, ἀνδράχνη ἐσθιομένη, ἀρκτίου ῥίζης τριώβολον μετ' ὀξυκράτου καὶ στροβίλου

sempervivo; plantagine, rubo, portulaca aut vitium capreolis: balaustium cum posca, menthae succus per se et cum posca vel aqua, periclymeni succus trium obolorum ex aqua, cupressi globuli ex aqua tritae et potae, lysimachia herba eiusdemque succus, myricae fructus tritus eiusdemque cortex, ferulae medulla et oenanthe sicca.

Cap. XXX. Diuturnas autem reiectiones sistunt porri semen, myrti semen potum ex aqua, vel potius myrti baccarum succo, vitex trioboli pondere cum posca, rosarum capita trita ex aqua, symphytum petraeum eiusdemque semen, spinae albae radix drach. j. pondere cum oxycrato pota, althaeae radice decoctum: glutinum e zea coctum, quale librarium est, delinctum: confert et cum mentha. Aliud: farinae hordeaceae per lintecolum in succum solutae dimidium cyathum, addita etiam mentha, exhibeto. Valent et hypocistidis succus cum turis momento, amygdala pota cum aqua frigida, amygdala amara cum amylo et mentha ex aqua bibita, portulaca in cibis sumpta, arctii radix trium obolorum pondere cum posca



κόκκων· ἀσπαλάθου χυλὸς μετ' ὀξυκράτου, βάτου χυλὸς, γῆς  
 σαμίας τὸ ἀστέριον σὺν ὕδατι· δρυὸς τὸ μετὰ τοῦ πρέμνου  
 καὶ τοῦ γλοιοῦ ὑμενώδεις ἀποξεσθέν· ἢ ὁ περὶ τὴν βάλανον  
 ὑμὴν ὁμοίως ἀποξεσθείς· κέρας ἐλάφου κεκαυμένον σὺν ὀξυ-  
 κράτῳ, καστάνων ἀφέψημα, ἱτέας καρπὸς σὺν οἴνῳ, κενταυ-  
 ρίου τοῦ μεγάλου ῥίζης < β' σὺν οἴνῳ, κέστρου φύλλων <  
 β' σὺν οἴνῳ, κοραλλίου<sup>59</sup> δραχμὴ μεθ' ὕδατος, λευκογραφί-  
 δος<sup>60</sup> < α' ὁμοίως, αἱματίτης λίθος σὺν χυλῷ ῥοιᾶς, ὀ-  
 στρακίτου λίθου < α' μεθ' ὕδατος, μαστίχη διαμασσωμένη  
 καὶ τοῦ χυλοῦ καταπινομένου, κυδωνίων ἄνθος μετ' ὀξυκρά-  
 του λεῖον, μίλτου ληνρίας < α' σὺν ὄξει, τραγάκανθον ὑ-  
 ποχυλιζόμενον, τραγίου καρπὸς μετ' οἴνου, πενταγίλλου  
 τῆς ῥίζης ὁ χυλὸς σὺν ὀξυκράτῳ, φέλλος ὁ ἐκ τῶν παλαιῶν  
 καττυμάτων κεκαυμένος, ἢ ἄκαυστος λεῖος μετ' ὀξυκράτου πι-  
 νόμενος, κορία πινομένη, γάλα θηλαζόμενον γυναικῆιον, καὶ  
 μάλιστα ἐπὶ τῶν ὑποθινόντων. Ἐπιτίθεται ἰδὲ ὡφελίμως  
 κατὰ τοῦ θώρακος ἐπὶ τῶν αἱμοπτοϊκῶν σπόγγος ἐξ ὀξυ-

59) Moiban. sic loco vulg. κορίον.

60) Diosc. lib. 5. c. 152.

et pincis nucleis, aspalathi succus cum oxycrato, rubi suc-  
 cus, samiae terrae aster ex aqua: membranaceum id, quod  
 in quercu inter caudicem et corticem medium interiacet,  
 fervefactum: aut pellicula, quae glandem proxime con-  
 tegit, similiter fervefacta, cornu cervi ustum cum posca,  
 castancarum decoctum, salicis fructus cum vino, centaurii  
 maioris radix drach. ij. pondere cum vino, betonicae fo-  
 lia drach. ij. pondere cum vino, corallii drach. j. ex  
 aqua, leucographidis tantundem simili modo, lapis haema-  
 tites cum succo punici, ostracites lapis drach. j. pondere  
 cum aqua, deglutitus e commansa mastiche succus, coto-  
 neorum flos ex posca tritus, rubricae lemniae drach. j.  
 ex aceto, liquescens e tragacantha linguae subdita succus,  
 fragii semen cum vino, quinquifolii e radice succus cum  
 posca, suber e veteribus calceamentorum soleis, seu ustum,  
 seu etiam non ustum, tritum et e posca bibitum, lixi-  
 vium potum, lac denique muliebre ex ipsa mamma su-  
 ctum, id quod praecipue tabescentibus confert. Foris  
 vero sanguinem excreantium pectoribus utiliter imponitur

κράτου, εἰ πολὺς εἴη ὁ ῥευματισμός· ἢ τὰ στύφοντα, οἷον ἂν εἴη σέρεις, πολύγονον, ἀνδράχνη, κυδωνία, βάτος, φοίνικες, σίδια, μυρσίνη· ταῦτα μετ' ἄρτου ἢ ἀλφίτου (ἐπιτίθεται.)

Κεφ. λα'. Τὰς μὲν βῆχας προσγάτους ἀσύμφορόν ἐστι θεραπεύειν· δι' ὑδροποσίας γὰρ καὶ οἰκίου τροφῆς τῆς διὰ ῥοφήματος εὐχερές ἐστι θεραπεύειν. Χρονιζούσας δ' ἴσται ταῦτα πινόμενα· ἀκάνθης ῥίζης < ἂ' μετὰ μέλιτος, ἀρκευθίδες ε', ἢ ε', ἢ ζ', ἢ ἠ'. κεδρίδες πινόμεναι σὺν οἴνῳ ἢ μελικράτῳ, ἀσφοδέλου ῥίζης < ἂ' μετ' οἴνου, ἄσφαλτος ἀντὶ καταποτίου λαμβανομένη, βαγχάριδος ἀφέψημα σὺν ὕδατι, βαλσάμου καρποῦ δραχμὴ σὺν οἰνομέλιτι, δακτύδες δύο λεῖαι σὺν ὕδατι, ἐλξίνης χυλὸς καταρροφούμενος ὅσον κύαθος, σμύρνης κλάμου μέγεθος καταπινόμενον, σμυρνίου ῥίζα καταπινομένη· θύμου, ἢ θύμβρας, ἢ ὑσσώπου ἀπόζεμα ἢ ἀφέψημα μετὰ μέλιτος καὶ σύκων ξηρῶν· ἱππούριδος χυλὸς ἢ ἀφέψημα, ἢ ἰσοπύρου μετὰ μελικράτου, ἢ κάρυα πόντικα πινόμενα μετὰ

spongia ex posca, siquidem vehemens est fluxio: sic et adhibentur astringentia, qualia fuerint intubus, polygonum, portulaca, cotonea, rubus, palmulae, cortices mali punici, myrtus: haec autem cum pane polentave imponuntur.

Cap. XXXI. Tusses quidem recentes curare supervacaneum est, cum et aquae potu et conveniente cibo, qui in sorbitionibus offertur, iis mederi sit facile. Dinturnis autem tussibus haec assumpta medentur: acanthi radice drach. j. cum melle, iuniperi baccae quinque, sex, septem octove: cedri fructus poti cum vino aut aqua mulsa, asphodeli radix drach. j. pondere cum vino, bitumen catapotii, instar devoratum, baccharidis decoctum ex aqua, balsami fructus drach. j. pondere cum vino mulso, lauri baccae binae tritae cum aqua, helxines succus mensura cyathi absorptus, myrrha fabae magnitudine deglutita, smyrnii radix devorata: thymi, thymbrae, aut hyssopi infusum decoctumve cum melle et caricis: equiseti succus aut decoctum, isopyri decoctum ex aqua mulsa, nuces

μελικράτου καὶ πιπερέως, κακαλίας<sup>61</sup> ῥίζα μασσωμένη, χαλ-  
βάνη ἀντὶ καταποτίου, κενταυρίου τοῦ μεγάλου ῥίζης < β'  
σὺν οἴνῳ, κόμμι ἀμυγδαλῆς πικρᾶς, ἢ κεράσου, ἢ κοκκυμηλέας  
μετὰ κράματος. λάδανον σὺν στύρακι ἀντὶ καταποτίου, καὶ  
αὐτὸς ὁ στύραξ καθ' ἑαυτὸν, λυκίου ἰνδικοῦ κύαμου τὸ μέ-  
γεθος ὁμοίως· μηκύνιον σὺν στύρακι καὶ σμύρνη ἴσοις ἀνα-  
πλασσόμενα εἰς ὀροβιαῖα μεγέθη, ἀναλαμβάνόμενα μετὰ τρο-  
φὴν γ'. ἐπιρρόφουμένου ὕδατος εἰς κοίτην ἀβλαβῶς δίδεται·  
μαστίγη λεία ποιῆ, καταπινομένου τοῦ χυλοῦ, οἰνάνθης τῆς  
πόας καρπὸς καὶ φύλλα καὶ καυλὸς σὺν οἴνῳ ἢ σὺν οἰνομέ-  
λιτι, ὀπόφῦλλον μετὰ πράσου καὶ ὄξους, ἢ θειὸν ἄπυρον, ἢ  
σαγάρηνον, ὁπὸς σὺν ὧν ῥοφητῶ λαμβανόμενος, ἐλελίσθα-  
κος ἐν ῥοφίματι λαμβανόμενος· ἄρου ῥίζα ἐφ'θ' ἐν ῥοφίματι,  
καὶ καθ' ἑαυτὴν ἐφ'θ' ἐσθιομένη· ἢ δρακοντίου ῥίζα ὁμοίως,  
σταγίδες ἐκγίγασθαι καὶ ἐσθιόμεναι, μέλι ἐφ'θὸν ἀντὶ  
καταποτίου λαμβανόμενον, ὄξος σκίλλινον καταρρόφούμενον·  
τὰς δὲ προσφάτους ἐρεθίζει τὸ ὄξος· πάνακος ἢ πευκεδάνου

61) Vulg. *κανκαλίδος*.

avellanae in aqua mulsa potae, adiecto pipere: cacaliae ra-  
dix commanducata, galbanum catapotii instar assumptum,  
centaurii maioris radix drach. ij. pondere cum vino:  
gummi amygdali amarae, aut cerasi, aut pruni cum vino  
diluto: ladanum cum styrace instar catapotii sumptum,  
atque ipse etiam styrax per se: similiter et lycium indi-  
cum fabae magnitudine. Meconium cum styracis et myr-  
rhac partibus aequis in pastillos ervi magnitudine con-  
formatur, e quibus tres a cibo sub horam somni aqua  
superbibita tuto exhibentur. Confert mastiche trita, de-  
glutito inde succo: item oenanthes herbae folia, semen et  
caulis cum vino aut oenomelite: silphii semen cum porro  
et aceto, sulphur vivum, aut sagapenum, laser in ovo sor-  
bili sumptum, salvia in sorbitione hausta, ari radix cocta  
in sorbitione, ac eadem etiam per se in cibo sumpta: si-  
mili quoque modo dracunculi radix, uvae passae detractis  
vinaceis esitatae: mel coctum instar catapotii devoratum:  
acetum scilliticum absorptum, (sed recentes tusses ace-  
tum irritat:) panacis aut peucedani e radicibus decoctum,

ρίζης ἀφέψημα, ἢ ὁπὸς ὁ τούτων καταπινόμενος· πρασίου ἀπόζημα σὺν μέλιτι, πράσον ἐφθὸν ἐσθιόμενον, καὶ τὸ χύλισμα αὐτοῦ καταπινόμενον· σανδαράχη σὺν κηρῷ ἀντὶ καταποτίου, σέσели σὺν οἴνῳ πινόμενον, σκίλλης ἐφθῆς < ἁ σὺν ὀξυμέλιτι ἢ οἰνομέλιτι, σκόροδον ἐφθὸν καὶ ὠμὸν ἐσθιόμενον, σῦκα ξηρὰ ὀπτηθέντα ἐπ' ἀνθράκων ἐμπεπασμένα πεπέρει, χαμαίδρουος ἀφέψημα, καρυωτοὶ βραχέντες ἐν οἴνῳ, ἔπειτ' ὀπτώμενοι, ἐπιπασθέντος πεπέρεως· βρουωνίας ῥίζα λευκή, ξηρὰ, λεία, καὶ ὀλίγῳ μέλιτι ἐφθῶ ἀναληφθεῖσα ἀντὶ καταποτίου· ἔστι γὰρ δοιμεῖα· τήλως κύαθος ἐψηθεὶς μεθ' ὕδατος καὶ πινόμενος ἐπὶ ἡμέρας ἰε'. ἐρύσιμον ἢ κάρδαμον προβραχὲν ἡμέραν ἁ', εἶτα ἐν πτισάνῃ ἐψηθὲν καὶ ῥοφούμενον. Ἄλλο πρὸς βηχίον. Γλήχωνα δίδου διαμασσήσασθαι, ὕσσωπον μετ' οἴνου χλιαροῦ δίδου πιεῖν νήσται, καὶ κοιτασάσθω· ἢ κισσοῦ κοκκίοις, ἢ ξύλῳ, ἢ φύλλοις κάπνιζε τὸν βηχικὸν καὶ συρρόεοντα, καὶ ἰᾶται· ἢ ῥήτινῃ σὺν οἴνῳ παλαιῷ πότιζε, ἢ ἀγριοκαννάβειως σπέρμα πότιζε μεθ' ὕδατος, ἢ κεδρίαν πότιζε νήσταις μετ' οἴνου, ἢ ἀρσενικὸν μετ' ὠοῦ

aut eorundem liquor devoratus: marrubii infusum cum melle: porrum coctum in cibo sumptum, ex eodem succus expressus haustus: sandaracha cum cera instar catapotii assumpta, seseli cum vino potum, scillae coctae drach. j. cum aceto mulso aut vino mulso, allium, seu coctum, seu crudum, in cibo sumptum, caricae super prunis assatae, insperso pipere, chamaedryos decoctum, palmarum, caryotae in vino maceratae, deindeque tostae, superinsperso pipere: bryoniae radix alba in pulverem contrita et pauco melle cocto excepta, instar catapotii devorata: est enim acris: foeni graeci decoctum ex aqua diebus quindecim cyathi mensura potum: erysimum aut nasturtium diei unius spatio praemaceratum, deindeque in ptisana coctum et absorptum. Aliud ad tussiculam: pulgium praebe manducandum: aut hyssopum ex vino tepido propinato ieiuno, et superdormiat. Aliud: hederac acinis, ligno, aut foliis tussi fluxionique obnoxium fumigato, et sanabitur: aut resinam cum vino vetere, aut cannabis agrestis semen ex aqua propinato: aut cedriam cum



ῥοφητοῦ δίδου φαγεῖν, ἢ θεῖον ἄπυρον ὁμοίως, ἢ τῆλην, ἢ ὑσσωπον, ἢ γλήχωνα μετ' ὀξυκράτου ἐψήσας δίδου πιεῖν ἡ-  
σται· ἢ ἐλαίας φύλλα καὶ δάφνης κόψας καὶ λειώσας δὺς πιεῖν,  
γ' ἡρώας κοχλ. γ'. Τὰς δὲ μετὰ ρευματισμοῦ πολλοῦ ὠφελεῖ  
ἀφρός ἵππειος μεθ' ἡμιζουλίου ὕδατος πινόμενος. Τὰς δὲ  
σφοδρὰς ἐκπτώσεις ἐν τοῖς βηχικοῖς ὠφελεῖ οἶνος ἐν σκίλλῃ  
γλυφείῃ διανυκτερεύσας, καὶ διδόμενος κατὰ τὰς ἐπιτάσεις  
τῆς βηχός· σίφωνι δὲ λαμβανέσθω, καὶ ὀλίγος διὰ τὴν δρι-  
μύτητα· ὠφελεῖ καὶ ὄξος σκίλλινον καταρροφούμενον. Ἄλλο  
βηχικόν· πᾶσι δὲ τοῖς βήττουσιν ἀρμόζει βούτυρον μετὰ μέλι-  
τος καὶ κυμίνου βραχέως· ἔψεται δὲ τὸ βούτυρον ἴσον τῷ μέ-  
λιτι, τοῦ πλήθους τοῦ μέλιτος προαφρίζομένου, καὶ οὕτω προς-  
βάλλεται τὸ κύμινον· ποιεῖ δὲ τοῦτο καὶ ἐπὶ φθισικῶν.

Κεφ. λβ'. Ἐκλειχόμενα δὲ ὠφελεῖ δρακοντίου ῥῖζα  
ἐφθῇ μετὰ μέλιτος, ἀμύγδαλα πικρὰ μετ' ἐλελισφάκου σὺν  
μέλιτι θερμαινόμενα· ἢ θίμβρα, ἢ ὑσσωπον, ἢ στοιχὰς σὺν  
μέλιτι· λινόσπερμον λεῖον σὺν ἰριδι καὶ καρβοῖς πικροῖς καὶ

vino ieiunis potui dato, aut arsenicum cum ovo sorbili  
exhibeto, aut sulphur vivum simili modo. Aut foenum  
graccum, hyssopum aut pulegium, ex posca decoquito, et  
ieiuno propinato. Aut: oleae laurique folia tusa tritaque  
tribus matutinis ternum cochlearium mensura potui dato.  
Tusses, quae cum vehementi sunt defluxione, iuvat equi-  
na spuma pota cum aquae dimidia hemina. Validas tus-  
sientium excreationes adiuvat vinum in excavata scilla  
per noctem relictum et urgente tussi exhibitum: sumatur  
vero per cannulam et parciore quantitate, propter acri-  
moniam: confert et acetum scillinum absorptum. Omni-  
bus porro tussientibus convenit butyrum cum melle et cu-  
mini exiguo: coquitur vero butyrum aequali quantitate  
cum melle prius despumato, tandemque cuminum adiei-  
tur: hoc genus remedii etiam phthisicis opitulatur.

Cap. XXXII. Haec vero delincta iuvant: dracunculi  
radix cocta cum melle, amygdalae amarae cum salvia in  
melle fervefactae: thymbra, hyssopus, aut stoechas cum  
melle: semen lini tritum cum iride, amygdalis amaris et

μέλιτι, κνίδης σπέρμα ὁμοίως· πίσσα, πισσελαιον ὁμοίως, πράσιον ξηρόν ἢ καὶ ὑγρὸν λεῖον σὺν μέλιτι· ἢ ῥητίνη πικρὴ ὑγρὰ, ἢ τερμινθίνη ἐκλειχομένη, σκόρδιον σὺν καρδάμῳ, ἢ ῥητίνη καὶ μέλιτι· στρουθίου κοχλιάριον σὺν μέλιτι· τραγορίγανον σὺν μέλιτι· τραγάκανθον ὑποχυλίζομενον, φλόμου ῥίζα σὺν μέλιτι, μελάνθιον λεῖον βεβρεγμένον, ἀναληφθὲν σταφίδος σαρκί, ἢ φοινίκων γλυκέων.

Κεφ. λγ'. Ὑποθυμώμενα δὲ ὠφελεῖ χρονίας βήχας, καὶ διὰ καλαμίνου σίφωνος καὶ ἄμβικος τετρημένου κατὰ τὸν πυθμένα, δι' οὗ καὶ ὁ σίφων καθιέμενος ἀναπέμπει εἰς τὸ στόμα τὸν ἀτμόν· ἄρσενικόν, σανδαράχη λεία, βραχέντα ὕδατι καὶ πλασθέντα τῷ τετρημένῳ ἄμβικί, περιτιθεμένου τῷ πυρὶ τοῦ ἄμβικος· βηχίου φύλλα θυμωόμενα, θεῖον ἄπυρον, κάλαμος ἀρωματίτης καθ' ἑαυτὸν καὶ σὺν ῥητίνη τερμινθίνη, πρόπολις, σανδαράχη σὺν ῥητίνη τερμινθίνη, ἄσφαλτος, λιβανωτὸς σὺν ῥητίνη, σκίλλα ξηρὰ, ἐρύσιμον, ἔλαιον κέδρινον, κενταυρίου ῥίζα, μαράθρου καρπός.

melle: urticae semen eodem modo, pix, similiterque picinum oleum, marrubium siccum aut etiam virens tritum cum melle, resina pinea liquida aut terebinthina delincta: scordium cum nasturtio, aut resina et melle: struthii cochlearium unum cum melle, tragoriganum cum melle, liquescens e tragacantha linguae subdita succus, verbasci radix cum melle, melanthium tritum maceratumque et exceptum carne passularum aut palmarum dulcium.

Cap. XXXIII. Tusses porro diuturnas adiuvant suffumigata, quae sequuntur, ita ut ex iis vapor in os recipiatur per arundineum canalem ollulae in fundo pertusae foramini insertum. Haec vero sunt illinenda ollulae pertusae: arsenicum seu auripigmentum et sandaracha trita et aqua irrigata, ac ipsi ollulae undique adhibendus ignis. Prosunt et suffitu tussilaginis folia, sulphur vivum, calamus aromaticus per se et cum resina terebinthina, propolis, sandaracha cum resina terebinthina, bitumen, tus cum resina, scilla sicca, erysimum, oleum cedrinum, centaurii radix, foeniculi semen.

Κεφ. λδ'. Ῥήγματα δὲ καὶ σπάσματα ἰᾶται πινόμενα  
 ἄβροτόνου ἀπόξιμα, καὶ τοῦ καρποῦ λείου < α' μεθ' ὕδα-  
 τος ἀγαρικὸν μεθ' ὑδρομέλιτος, αἰζώου χυλὸς, ἀκάνθου  
 τοῦ παιδέρωτος ῥίζα. ἀκόρου ῥίζης ἀπόξιμα, καὶ αὐτὴ ἡ  
 ῥίζα ξηρά. πολυγόνου χυλὸς, χαμαίδρου ἀπόξιμα, νάρδου  
 ἀγρίας ῥίζα ὁμοίως, κενταυρίου τοῦ μεγάλου ῥίζα, μαλάχης  
 ῥίζα μεθ' ὕδατος. κλεώρικον<sup>62</sup> μετ' οἴνου, σεσέλιος καρπὸς  
 καὶ ῥίζα μετ' οἴνου, ἀλθαίας ῥίζα. ἀλκέα ἐν μελικράτῳ,  
 πήγανου ἀγρίου σπέρμα ἐν οἴνῳ. ἀλίμου ῥίζης < α' ἐν με-  
 λικράτῳ, βρυωνίας ῥίζης χυλὸς ἐν μέλιτι ἐκλειχόμενος, ὕος  
 ἄφοδος ὅξει διεθεῖσα καὶ ποθεῖσα. ἀριστολοχίας ῥίζα μετὰ  
 πήγανου, ἀρκιούθιδες εἰ, ἢ ε', μέχοι ἢ, πινόμεναι σὺν μελι-  
 κράτῳ, ἀσφοδέλου ῥίζης < α' σὺν οἴνῳ, βακκάριδος ἀφέ-  
 ψημα ἐν ὕδατι, βολβοὶ ὅποιοι ἐσθιόμενοι σὺν ἐλαίῳ, φλόμου  
 ῥίζα σὺν οἴνῳ, γεντιανῆς ῥίζης < β', ἢ χυλοῦ < α', σὺν ὕ-  
 दाτι. ἑλενίου ῥίζης ἀπόξιμα. ἐλιχούσου, ἢ ἐρπύλλου, ἢ ἱπ-  
 πουρίδος ῥίζαι καὶ φύλλα σὺν ὕδατι ἢ οἴνῳ. καλάμου ἄρω-

62) Diosc. lib. 5. c. 99.

Cap. XXXIV. Ruptis et convulsis medentur in potu  
 sumpta haec: abrotani infusum, eiusque semen tritum ex  
 aqua drach. j. pondere: agaricum cum aqua mulsa, sem-  
 pervivi succus, acanthi paederotis radix, acori radicis in-  
 fusum et ipsa quoque sicca, polygoni succus, chamae-  
 dryos decoctum, nardi sylvestris radix similiter, centau-  
 rii maioris radix, malvae radix ex aqua, clinopodium  
 cum vino, seseleos semen et radix in vino, althaeae ra-  
 dix, alcea in melicrato, rutae agrestis semen in vino,  
 halimi radicis drach. j. in melicrato, radicis bryoniae suc-  
 cus ex melle delinctus, finus suillus aceto solutus et po-  
 tus, aristolochiae radix cum ruta, iuniperi baccae quin-  
 que sexve ad octo usque potae cum aqua mulsa, aspho-  
 deli radicis drach. j. cum vino, baccharidis decoctum in  
 aqua, bulbi assati in cibo sumpti cum oleo, verbasci ra-  
 dix cum vino: gentianae radicis drach. ij. aut succi drach.  
 j. cum aqua: helenii radicis infusum, elichrysi, aut ser-  
 pylli, aut equiseti radices et folia cum aqua aut vino, ca-

ματίτου ὀβολοὶ δύο σὺν οἴῳ, καλαμίνθης ἀπόζεμα, χαλβά-  
νη ἀντὶ καταποτίου, κενταυρίου ῥίζης < β' σὺν οἴῳ, κε-  
δρίδες ὁμοίως, κέστρου φύλλων < α' μεθ' ὑδρομέλιτος, κλι-  
νοποδίου ἀπόζεμα, κόστου < α' μετ' οἴνου καὶ ἀψινθίου,  
κρίνου ῥίζα σὺν μέλιτι, λιβανωτίδος ῥίζα, λίθος σάπφειρος  
πινόμενος, ἰρεως ῥίζα σὺν γλυκεῖ, ὁπὸς σιλφίου μετὰ κονίας  
ὑλιστιῆς· ὁποάναξ μετὰ πρασίου ἢ ὀριγάνου ἀποζέματος,  
μῶλυ λεῖον σὺν πεπέρει καὶ ὀλίγῃ σμύρνῃ μετ' οἴνου ὀλίγου  
ἢ ὕδατος, σαγαπήνου δραχμὴ σὺν ὑδρομέλιτι· σέσελι σὺν  
οἴῳ, σκόρδιον σὺν ῥήτινῃ καὶ καρδάμῳ καὶ μέλιτι.

Κεφ. λέ'. Πλευριτικούς δὲ ὠφελεῖ πινόμενα ἀγαλλόχου  
< α' μεθ' ὑδρομέλιτος, αἰθιοπίδος ῥίζα ἐν μελικράτῳ ἐψη-  
θεῖσα, ἀκόρου ῥίζης < α' μετὰ τριφύλλου καρποῦ τοῦ ἴσου  
ὁμοίως, κενταυρίου ῥίζης < α' ὁμοίως, ἀβροτόνου ἀπόζεμα  
μεθ' ὑδρομέλιτος, σαγαπήνου < α' ὁμοίως, κνίδης σπέρμα  
σὺν μέλιτι ἐκλειχόμενον, βρυωνίας ῥίζα σὺν μέλιτι ὁμοίως,  
ἀποκύνου σπέρμα ποθὲν σὺν ὕδατι· ὑὸς ἄφοδος ἀνεθεῖσα

lami aromatici oboli duo cum vino, calaminthae deco-  
ctum, galbanum instar catapotii devoratum, centaurii ra-  
dicis drach. ij. cum vino, cedri fructus eodem modo, be-  
tonicae foliorum drach. j. cum aqua mulsa, clinopodii  
infusum, costi drach. j. cum vino et absinthio, lilii ra-  
dix cum melle, libanotidis radix, sapphirus lapis in potu  
sumptus, iridis radix cum vino passo, silphii liquor cum  
lixivio colato, opopanax cum marrubii aut origani infu-  
so: moly tritum cum pipere exiguo myrrhae, addito pau-  
co vino aquave: sagapeni drach. j. cum aqua mulsa, se-  
seli cum vino, scordium cum resina, nasturtio et melle.

Cap. XXXV. Pleuriticis haec subveniunt in potu  
sumpta: agallochi drach. j. cum aqua mulsa, aethiopidis  
radix in melicrato cocta: similiter et acori radices drach.  
j. cum trifolii seminis pari quantitate: centaurii radices  
drach. j. simili modo, abrotani infusum cum aqua mulsa,  
sagapeni drach. j. eodem modo, urticae semen cum melle  
delinctum, bryoniae radix cum melle simili modo, apo-  
cyni semen potum ex aqua: suillum stercus aqua solutum



ὑδατι καὶ ποθεῖσα καὶ τὰ λίαν χρόνια ἀλγῆματα λύει· ἀριστολογίας ῥίζα ποθεῖσα μεθ' ὕδατος, ἄρου ῥίζα ἐφθῇ ἐσθιομένη, δρακοντίου ὁμοίως, ἀσφοδέλου ῥίζα μετ' οἶνου· ἐπὶ δὲ τῶν κεχροτισμένων, βαλσάμου καρποῦ < σὺν μελικράτῳ· κενταυρίου τοῦ μεγάλου < β' τῆς ῥίζης σὺν οἶνῳ, λευκανάνθης ῥίζης χυλοῦ κύαθ· α' σὺν μελικράτῳ, ῥίζα πευκεδάγου ἐκλειχόμενη σὺν μέλιτι· πετροσέλινον ὁμοίως· πηγάνου ἀπόξιμα, ἀνήθου, ἢ στοιχάδος, ἢ συμφύτου σὺν μελικράτῳ· τριφύλλου καρπὸς καὶ τὰ φύλλα σὺν μελικράτῳ· τραγορίανος ἀποβρεχθεῖσα καὶ περιπνευμονικοὺς ὠφελεῖ μεθ' ἰδρῶμελιτος· ψευδοβουνίου κλωνία τρία ὁμοίως, σαγαπηνοῦ < α' μετὰ πηγάνου ἀποξίματος. Καταπλασσόμενα δὲ ὠφελεῖ τοὺς πλευριτικοὺς κρίθινον ἄλευρον σὺν μελιλώτῳ καὶ κωδίας μήκωνος ἐψηθὲν ἐν μελικράτῳ· χαλβάνη ἢ ῥήτινη τερμινθίνῃ ἐπιτεθέντα καθ' ἑαυτὰ ἀντὶ μαλάγματος· ῥίζα κράμβης καεῖσα σὺν τοῖς καυλοῖς, ἀναληφθείσης τῆς τέφρας ἀξουγγίῳ παλαιῷ καὶ ἐπιτεθείσης· κυπάρισσος σὺν πηγάνου φύλλοις· σαγαπηνὸν ἀναληφθὲν κηρωτῇ μύρσινῃ, πράσιον ὁμοίως,

potumque etiam diuturnos admodum dolores solvit: aristolochiae radix ex aqua pota, ari radix cocta, in cibis sumpta, similiterque dracunculi, asphodeli radix cum vino. Inveterato autem affectu, balsami semen drach. j. pondere cum aqua mulsa: centaurii maioris radicum drach. ij. cum vino, leucacanthae e radice succus cyathi unius mensura cum aqua mulsa, radix peucedani delineta cum melle, similiter et petroselinum: decoctum rutae, anethi, stoechadis, aut symphyti cum aqua mulsa: trifolii semen et folia cum melicrato: tragoriganum maceratum etiam peripneumonicos adiuvat cum aqua mulsa: pseudobunii ramuli tres eodem modo, sagapeni drach. j. cum rutae decocto. Cataplasmatum vero more imposita haec pleuriticis auxilio sunt: hordeacea farina cum meliloto et papaveris calycibus cocta in melicrato, galbanum aut resina terebinthina, imposita per se pro malagmate: brassicae radice una cum caulibus exustae cinis vetere axungia exceptus et impositus: cupressus cum rutae foliis, sagapenum cerato myrtino exceptum, marrubium simili modo,

τέφρα κληματίνῃ σὺν ἄξουγγίῳ, κυπαρίσσου φύλλα ἀπαλά, καὶ σῦκα, καὶ ἄξουγγιον, ἴσα· ἢ θαψίας χυλῶ τὸν θώρακα κατὰ χριε πρὸς ὀλίγον· μάλιστα δὲ ποιῇ ἐπὶ τῶν περιπνευμονικῶν κώδιον περιχρισθὲν πίσσῃ ὑγρᾷ, καὶ θείου ἀπύρου ἐπικαταπασθέντος τῇ πίσσῃ, καὶ ἐπιτεθέν· δεῖ δὲ τὰ μέσα τοῦ κωδίου χρίειν, ἵνα μὴ διαρῥυῇ ἡ πίσσα· καὶ ὁ τῶν σωματεμπόρων δὲ δρώπαξ ὀφελεῖ καταχριόμενος· καὶ κονία ἄσβεστος ὅξει γλοιωθεῖσα καὶ ἀναληφθεῖσα κηρωτῇ κυπρίνῃ· σπύραθοι αἶγχοι σὺν ὅξει, μιγέντος ὁποῦ μηδικοῦ ὀλίγου.

Κε φ. λζ'. Περιπνευμονικοὺς δὲ ὠφελεῖ δρακοντίου ῥίζα ἢ ἄρου ἐφθῇ ἐσθιομένη σὺν μέλιτι, κνίδης σπέρμα σὺν μέλιτι ἐκλειχόμενον· ἀμύγδαλα πικρὰ σὺν ὕδατι πινόμενα, ἢ ἐκλειχόμενα σὺν ῥήτινῃ τερμινθίνῃ· βαλσάμου καρποῦ < α' μεθ' ὕδατος· ἀψινθίου ἀπόξεμα ποθὲν μετ' ἰριως, ἢ ὑσσώπου ὁμοίως· κνίδης φύλλα μετὰ πηγάνου ἀποξέματος, ἢ σὺν μέλιτι ἐκλειχόμενα· πολυγόνου χυλὸς καταρρόφούμενος συνεχῶς, ἢ μελίκρατον πινόμενον ἀπεξεσμένον.

Κε φ. λζ'. Ἐπὶ δὲ τῶν λεγομένων ἀναφορικῶν ἄγει τὰ

sarmentitius cinis cum axungia: tenellorum cupressi foliorum, ficuum et axungiae pares portiones. Aliud: thapsiae succo thoracem ad breve tempus illinito: hoc genus remedii peculiariter confert peripneumonicis. Iuvat et ovina pellis oblita pice liquida, cui sulphur vivum inspersum fuerit, et adhibita. Pellis vero medias tantum partes illini oportet, ut ne pix distillet. Prodest et mangonum dropax perunctus, itidemque calx viva cum aceto ad strigmenti crassitudinem redacta et cerato excepta cyprino: stercus denique caprinum cum aceto, admixto etiam paucō liquore medico (silphii.)

Cap. XXXVI. Peripneumonicis auxilio sunt ista: dracunculi aut ari radix elixa et cum melle in cibis sumpta, urticae semen cum melle delinctum, amygdala amara cum aqua pota, aut delincta cum resina terebinthina, balsami fructus drach. j. pondere cum aqua, absinthii decoctum cum iride potum, hyssopi similiter, polygoni succus frequenter absorptus, aqua mulsa fervefacta in potu.

Cap. XXXVII. Qui vitiosa pectore reiiciunt, his

ἐκ θώρακος σκίλλη ὅπτῃ σὺν μέλιτι ἐκλειχόμενη· σκόροδον ἐφθὸν καὶ ὀπτὸν, καὶ τὸ ἐξ αὐτοῦ μυτιωτόν· πευκεδάνου ῥίζης ὁπὸς ἐκλεικτός· πράσον κεφαλωτόν, καὶ πόδες ὕειοι συνεψόμενοι ῥοφήμασιν· ἢ πόλιον ὁμοίως· στοιχάδος ἀφέψημα· συμφύτου πετραίου ἀφέψημά σὺν μελικράτῳ· σῦκα ξηρὰ βρωθέντα σὺν ὑσσώπῳ, καὶ τὸ ἀπόζεμα αὐτῶν μεθ' ὑσσώπου· χρυσοκόμης ἀφέψημα μεθ' ὑσσώπου. Ἄνυει δὲ καὶ τὰ πρὸς τοὺς περιπνευμονικοὺς ἀναγεγραμμένα, καὶ ταῦτα· στρόβιλος ὅλος νέος σὺν τῇ περὶ αὐτὸν ῥητίνῃ θλασθεὶς ἐπιμελῶς, καὶ ἐψηθεὶς ἐν γλυκεῖ, (καλλίων δὲ ὁ σκυβελίτης<sup>63</sup> ἀντὶ τοῦ γλυκέως,) καθ' ἐκάστην ἡμέραν λαμβανόμενος· ἢ γλήχων σὺν μέλιτι, κάρδαμον φωκτὸν ὁμοίως· θύμον, θύμβρα, ὕσσωπον ἀποξεσθέντα σὺν ὕδατι· χαλβάνῃ ἀντὶ καταποτίου· ἄλευρον κυάμινον μετὰ δρακοντίου ῥίζης, ἢ ἀμυγδάλων ἐν ῥοφήματι λείων, ἢ σὺν μέλιτι ἐκλειχόμενον· ὄρχεως τῆς σεραπιάδος ἢ ῥίζα πινομένη, πίσσα ὑγρὰ σὺν μέλιτι ἐκλειχόμενη, σαγαπηνὸν σὺν μελικράτῳ· σκορδίου ῥίζα ὁμοίως, καὶ τοῦ καρποῦ < ἄ σὺν οἴνῳ.

63) Aët. lib. 9. c. 24.

prosunt: scilla tosta cum melle delincta, allium elixum tostumque, et quod ex eo paratur, intritum, peucedani e radice liquor delinctus, porrum capitatum et pedes suilli una cocti in sorbitionibus, polium eodem modo, stoechadis decoctum, symphyti petraei decoctum cum aqua mulsa, caricae cum hyssopo esitatae, earundem infusum cum hyssopo, chrysocomes decoctum cum hyssopo. Proficiunt etiam tum quae ad peripneumonicos praescripsimus, tum et ista: strobilus integer ac recens cum adhaerente resina diligenter contusus et in passo decoctus, quotidie sumptus: (fuerit vero satius passi vice vinum sponte defluens accipere:) pulegium cum melle, nasturtium tostum simili modo: thymus, thymbra, hyssopus, decocta in aqua: galbanum instar catapotii devoratum: farina fabacea cum dracunculi radice, aut amygdalis in sorbitione tritis, aut cum melle delincta: orcheos serapiadis radix bibita, pix liquida cum melle delincta, sagapenum cum aqua mulsa, scordii radix simili modo: eiusdemque seminis drach. j. cum vino.

Κεφ. λη'. Φθισικοῖς δὲ ἀρμόζει ποτὰ ἀγαρικοῦ ὀβολοὶ δύο μετὰ γλυκέως, ἀκάνθου τοῦ παιδέρωτος ῥίζαι μετὰ μελικράτου· ἀρνογλώσσου χυλὸς, καὶ ἡ πόα ἐσθιομένη ἐφθή· ἀρκίου ῥίζης < α' μεθ' ὕδατος καὶ στροβίλων μ' πινομένη· γάλα γυναικεῖον θηλαζόμενον· ἢ αἷγιον, ἢ προβάτειον, ἢ βόειον πινόμενον· δαφνίδες λεῖαι σὺν μέλιτι ἐκλειχόμεναι· ἐρύσιμον ὁμοίως φωκτὸν σὺν μέλιτι, ἢ πτισάνης χυλῶ καθεψηθέν· θαψίας ῥίζης ὅπου ὀβολοὶ β', πινόμενοι μετ' οἴνου, ἢ ἐν ἐψήμασιν λαμβανόμενοι· καρκῖνοι σὺν τῷ ζωμῶ ἐφθοὶ ἐσθιόμενοι, βάτραχοι ὁμοίως, κραταιογόνου ῥίζα σὺν μέλιτι, μυρρίδος ῥίζα μετὰ ῥοφήματος, πίσης ὕγρας κυάθου πλήθος ἐκλειχόμενον, πράσου χυλὸς, ἢ πράσιον ἐκλειχόμενον, ῥᾶ σὺν ὕδατι, ἐλάφου στέαρ νεαρὸν καθεψηθέν ἐν ῥοφήματι, βούτυρον σὺν μέλιτι ἐφθόν.

Κεφ. λθ'. Δυσπνοίας καὶ ἄσθματα καὶ ὀρθοπνοίας (ὠφελει) ποτὰ ἀβροτόνου < α' σὺν ὕδατι χλιαρῶ, ἀδιάντου ἀφέψημα σὺν ὕδατι· περικλυμένου < α' ἐπὶ ἡμέρας μ' σὺν οἴνω,

Cap. XXXVIII. Phthisicis conveniunt in potu haec: agarici oboli duo cum passo, acanthi paederotis radices cum aqua mulsa: plantaginis succus, atque ipsa herba in cibis sumpta: arcii radix drach. j. pondere cum pineis nucleis XI ex aqua pota: lac muliebre suctum e papilla, aut caprinum vel ovillum bubulumve bibitum: lauri baccae cum melle delinctae: similiter et erysimum tostum cum melle aut ptisanæ cremore decoctum, liquoris e thapsiae radice oboli duo ex vino bibiti, aut cum sapa sumpti, cancri elixi cum suo iure in cibis sumpti, similiter et ranae, crataegoni radix cum melle, myrrhidis radix cum sorbitione, pix liquida cyathi unius mensura delincta, porri succus, marrubium delinctum, rha cum aqua, cervinus adeps recens in sorbitione coctus, butyrum denique cum melle coctum.

Cap. XXXIX. Spirandi difficultati, anhelationi et orthopnoeae conferunt haec ore sumenda: abrotani seminis drachma cum aqua tepida, adianti decoctum ex aqua, periclymeni semen drachmae pondere ad dies XI cum



κνίδης καρπὸς σὺν μέλιτι, ἀλώπεκος πνεύμονος ξηροῦ < γ' σὺν μελικράτῳ, βρυωνίας ῥίζης χυλὸς < μετὰ μέλιτος, ἀμμωνιακοῦ < α' σὺν ὀξυμέλιτι, ἀναγύρου φύλλων < α' ἐν γλυκεῖ, ἀριστολογίας < α' τῆς ῥίζης μετὰ μέλιτος ἐκλειχόμενη, ἀρνόγλωσσον ἐφθὸν ἐσθιόμενον, ἄσφαλτος ἀντὶ καταποτίου λαμβανομένη, βακχάριδος ἀφέψημα ἐν ὕδατι, βαλσάμου καρποῦ < α' σὺν ὀξυμέλιτι· βότρυς, ἣν ἀμβροσίαν καλοῦσιν ἔνιοι, μετ' οἴνου· στρουθίου κοχλιάριον μετὰ μέλιτος, σφονδύλιον ὁμοίως· δαφνίδες δύο λείαι σὺν μέλιτι, καὶ τὰ ἅπαλά τῶν φύλλων ὁμοίως· δρακοντίου ῥίζαι ἢ ἄρου ἐσθιόμεναι ἐφθαῖ, ῥοφουμένου καὶ τοῦ ἀφεψήματος· πνεύμονος ἐλαφείου, ἀλώπεκος ἥπατος, στοιχάδος, ἴσα σὺν ὕδατι· ἢ καστόριον ἰδίᾳ μετὰ μέλιτος· ἱρις σὺν ὑσώπῳ καὶ μελικράτῳ ἐν καταποτίῳ διδομένη· ἐλενίου ἀπόζεμα, σμύρνης κυάμου μέγεθος ἐν καταποτίῳ λαμβανόμενον, σμυρνίου ἀπόζεμα· θαψίας ὁποῦ ὀβ. α', ἢ χυλοῦ < α', θεῖον ἐν ὣῳ διδόμενον· θύμου, ἢ θύμβρας, ἢ ὑσώπου ἀπόζεμα, ἢ αὐτὰ λεία μετὰ μέλιτος ἐκλειχόμενα· ἱππούριδος χυλὸς, καλαμίν-

vino, urticae semen cum melle, vulpini pulmonis exsiccati drach. iij. cum melicrato, bryoniae radice succus drach. j. pondere cum melle: ammoniaci drach. j. cum aceto mulso, anagyri folia drachmae pondere in passo posita, radice aristolochiae drach. j. cum melle delincta, plantago elixa in cibus sumpta, bitumen catapotii vice assumptum, baccharidis decoctum ex aqua, balsami fructus drach. j. pondere cum aceto mulso: botrys, quam ambrosiam nonnulli appellant, cum vino: struthium cochlearis mensura cum melle, sphondylium eodem modo, lauri baccae duae tritae cum melle: dracunculi vel ari radices elixae, in cibus assumptae, iure decocti simul etiam absorpto: pulmonis cervini, iecoris vulpini et stoechadis pares portiones ex aqua: castorium privatim cum melle, iris cum hyssopo et mulsa, catapotii instar exhibita, helenii infusum, myrrha fabae magnitudine instar catapotii deglutita, smyrnii infusum: liquoris thapsiae obolus unus, aut succi eiusdem drach. j., sulphur in ovo exhibitum: thymi, thymbrae, aut hyssopi infusum, aut eadem trita cum melle delincta: equiseti succus, calaminthae infusum,

θης ἀπόζεμα· χαλβάνη ἀντὶ καταποτίου, κενταυρίου μεγάλου ῥίζης < β' σὺν οἴνῳ, κέστρου < α' σὺν οἰνομέλιτι, φοίνικος < α' μετ' οἰνομέλιτος, κισσανθέμου < α' μετ' οἴνου, κυπαρίσσου σφαιρία σὺν οἴνῳ, περικλύμενον σὺν ὄξυκράτῳ· χαμαισύκη πινομένη παύει τοὺς παροξυσμούς· μελάνθιον πινόμενον μετ' ἀνήθου· ἡ μελισσοφύλλον χυλὸς ἐκλειχόμενος, ἡ κυδωνίων πεπείρων χυλὸς· ὀπόφυλλον μετὰ πράσου καὶ ὄξους· οὖρον παιδὸς ἀφ' ὁροῦ καταρροοφούμενον, πευκεδάνου ῥίζης ἀπόζεμα καὶ ὀπὸς, περικλυμένου φύλλων χυλὸς, πηγάνου ἀγρίου σπέρμα μετὰ μελικράτου, πίσσα ὑγρὰ μετὰ μέλιτος ἐκλειχόμενη, πισσέλαιον ὁμοίως, πρασίου ἀφέψημα, ῥαφάνου γλοιοῦ χυλὸς ἐκλειχόμενος σὺν μέλιτι, σανδαράκη σὺν ῥητίνῃ τερμινθίνῃ ἐκλειχόμενη, σκίλλης ὀπτῆς < α' μετ' ὄξυμέλιτος· πάνακος ἀφέψημα, ἀβροτόνου ὁμοίως· γάλα ὄνειον πινόμενον, θεῖον ἐν καταποτίῳ· ὄνοι κατοικίδιοι πινόμενοι ἰ μεθ' ἡμικτυλίου ἐλαίου νήστευσιν· ἡ ἐλατηρίου < α', νίτρον < α' ὁμοίως, σινήπεως < α' καταπότια ποιήσας, δύο δίδου· ἡ εὐζώμου σπέρμα σὺν μέλιτι· ποιεῖ

galbanum instar catapotii deglutitum, centaurii maioris radix drach. ij. pondere cum vino, betonicae drach. j. cum vino mulso, palmulae drach. j. cum vino mulso, cissanthemi drach. j. cum vino, cupressi globuli cum vino, periclymenon cum posca: chamaesyce pota solvit paroxysmos: melanthium cum anetho potum, melissophylli succus delinctus, similiterque cotoneorum maturorum succus, laserpitii semen cum porro et aceto, urina pueri impubis absorpta, peucedani radicis decoctum et liquor, periclymeni e foliis succus, rutae agrestis semen cum melicrato, pix liquida cum melle delincta, oleum picinum simili modo, marrubii decoctum, raphani e cortice succus delinctus cum melle, sandaracha cum resina terebinthina delincta, scillae assatae drach. j. cum aceto mulso, panacis decoctum, itidemque abrotani, lac asininum haustum, sulphur catapotii vice sumptum, millepedae numero X ieiunis potae ex dimidia olei hemina. Aliud: ex elaterii, nitri, sinapeos, an. drach. j. catapotia conformato, e quibus bina exhibeantur. Valet et erucacae semen cum melle, nec non et ferri candentis

καὶ σιδήρου πεπυρωμένου ἐναποσβεσθέντος ὅξει πινόμενόν τὸ ἀπόβρογμα. Ὑποθυμιᾶται δὲ ὠφελίμως πρὸς ἀσθματικούς, ὅσα καὶ ἐπὶ τῶν χρονίως βητιόντων ὑπεδείξαμεν διὰ τοῦ ἁμβικος.

Τῶν περὶ τὰ ἐντερα παθῶν βοηθήματα.

Κεφ. μ'. Πρὸς δὲ τοὺς στροφουμένους χρονίως ἀρμόζει πινόμενα ἀγαρικοῦ ὀβ. β' μεθ' ὕδατος θερμοῦ· ἀγρώστεως τῆς ἐν Παρνασσῷ τῆς ῥίζης ἀφέψημα, καὶ αὐτὴ ἡ ῥίζα ξηρὰ ἐν οἴνῳ ἢ μελικράτῳ· γλυκυσίδης ῥίζα σὺν οἴνῳ ἢ μελικράτῳ, χαμαιπίτυος ἀπόζυμα, χελιδόνιον σὺν οἴνῳ, ἢ λιβανωτίδος σπέρμα σὺν οἴνῳ, σεσέλειως καρπὸς καὶ ῥίζα σὺν οἴνῳ, δαμασωνίου < α' μετ' οἴνου, κύμινον αἰθιοπικόν καὶ ἄγριον μετ' οἴνου, ἴρις ἐκλειχόμενη σὺν μέλιτι, ἔλαιον πινόμενον μετὰ πηγάνου ἀφειρήματος κυάθων ἕξ σὺν νίτρον καὶ μελικράτῳ· ἐρπύλλου ἀπόζυμα, ἡρουγγίου ῥίζης < α' μετ' οἴνου, καλαμίνθης ἀπόζυμα, καστόριον σὺν ὀξει, κενταυρίου τοῦ μεγάλου τῆς ῥίζης < β' σὺν οἴνῳ· κέστρου φύλλων δρα-

in aceto extincti dilutum bibitum. Sunt et anhelatoribus utiles iidem suffitus, quos tussi diuturna infestatis per olululam adhibendos antea praescripsimus.

*Ad intestinorum affectus remedia.*

Cap. XL. Iis, qui diuturnis cruciantur torminibus, conveniunt in potu agarici oboli duo ex aqua, radicis graminis parnassii decoctum, et ipsa quoque radix sicca in vino vel melicrato, paeoniae radix cum vino aut melicrato, chamaepityos decoctum, chelidonium cum vino, libanotidis semen cum vino, seseleos semen et radix cum vino, damasonii drachma una cum vino, cuminum aethiopicum et sylvestre cum vino, iris delincta cum melle: oleum cum ruta coctum, cyathorum sex mensura potum, additis nitro et melicrato: serpylli decoctum, eryngii radix drach. j. pondere cum vino, calaminthae decoctum, castoreum cum aceto, centaurii maioris radix drach. ij. pondere cum vino, betonicae foliorum drach. j. cum

χμὴ α' σὺν οἴνῳ, λιβανωτίδος ῥίζα σὺν οἴνῳ· λιγυστικὸν σὺν ὕδατι, καὶ ἡ ῥίζα αὐτοῦ ὁμοίως· μῆου ἀπόβρογμα, μελισσόφυλλον σὺν οἴνῳ, νάρθηκος σπέρμα σὺν οἴνῳ· πευκεδά-  
νου ῥίζα ὁμοίως, ἢ ἀπόζεμα, ἢ ὀπός· νίτρον ἢ ἀφρόνιτρον μετὰ πηγάνου, ἢ κυμίνου, ἢ ἀψινθίου ἀποζέματος, ἢ μετ' ἐλαίου καὶ ὕδατος καὶ οἴνου· ὀπόφυλλον πινόμενον, σαμψύ-  
χου ἀπόζεμα, σισυμβρίου σπέρμα, σκίλλης ὀπτῆς < α' σὺν ὀξυμέλιτι· χαμαιδάφνης ἀλεξανδρίνης φύλλα σὺν οἴνῳ πο-  
θέντα· ψευδοβουνίου κλωνία δ' μετὰ ὕδατος, πετροσελίνον σὺν οἴνῳ, πέπερι μετὰ δάφνης φύλλων, ἀνήθου ἀπόζεμα·  
τῆλιν μετὰ κνίκου σπέρματος ἀφειψηθεῖσα πινομένη, δαφνί-  
δες ἀφειψημέναι ι' (ἐν ἄλλῳ ζ') ἐν οἴνου κυάθοις δυσὶ, πά-  
νακος ἀπόζεμα μετὰ οἴνου καὶ ἐλαίου, καὶ πινόμενον.

Κεφ. μα'. Πρὸς δὲ τοὺς ἐμπνευματωμένους μετὰ ἀλ-  
γῆματος ποσοῦ καὶ διατάσεως ἀρμόζει πινόμενον ἄμμι σὺν  
ἀνήθου σπέρματι ξηρῷ μετὰ μελικράτου, καὶ τοῦ ξηροῦ αὐ-  
τοῦ τὸ ἀπόζεμα· λαπάθου ἀπόζεμα ἐν ὕδατι, ἀσκληπιάδος  
ῥίζα μετὰ οἴνου· ἀψινθίου ἀπόζεμα δοθὲν μετὰ σισέλεως καὶ

vino, libanotidis radix cum vino, ligusticum cum aqua,  
eodem modo et ipsius radix, mei infusum, apiastrum  
cum vino, ferulae semen cum vino: similiter et peuce-  
dani radix infusumve aut liquor: nitrum aut spuma nitri  
cum infuso rutae, cumini, aut absinthii, vel cum oleo,  
aqua et vino: silphii semen potum, sampsuchi decoctum,  
sisymbrii semen, scillae assatae drach. j. cum aceto mul-  
so, chamaedaphnes alexandrinae folia in vino pota, pseu-  
dobunii ramuli quatuor ex aqua, petroselinum cum vino,  
piper cum lauri foliis, anethi infusum, foenum graecum  
cum cnici semine decoctum potumque, lauri baccae de-  
cem [in alio septem] cum duobus vini cyathis, panacis  
infusum cum vino et oleo potum.

Cap. XLI. Inflatibus cum dolore quodam ac distensio-  
ne ista conveniunt: ammi cum sicco anethi semine po-  
tum ex melicrato, aut eiusdem sicci infusum, lapathi de-  
coctum ex aqua, asclepiadis radix cum vino, absinthii  
decoctum exhibitum cum seseli et nardo celtica, aut cum



νάροδου κελτικῆς ἐν ὄξει ἢ ὕδατι· ξυλοβαλσάμου ἀφέψημα, ἢ τοῦ καρποῦ σὺν οἴνῳ· ἑλενίου ἀπόξιμα, ῥογγίου ῥίζης < α' μετ' οἴνου καὶ ἀψινθίου· λιγυστικὸν σὺν ὕδατι· καστόριον σὺν ὄξει, κέστρου φύλλων < α', κόστου < α' μετ' οἴνου καὶ ἀψινθίου· καὶ ἡ τῶν πταρμικῶν προσαγωγή.

Κεφ. μβ'. Πρὸς δὲ τὰς δῆξεις τῶν ἐντέρων ἀρμόζει ἀνδροάχνη ἐσθιομένη, καὶ ὁ χυλὸς πινόμενος· καὶ μαλάχη ἐσθιομένη· ἐγκλυζόμενα δὲ ὠφελεῖ τὰς δῆξεις ἀφειψηθέντα χυλὸς ὀρύζης, ἢ χόνδρου, ἢ τράγου, ἢ πτισάνης, ἢ μαλάχης, ἢ τήλεως, ἢ λινοσπέρμου.

Κεφ. μγ'. Καταπλασσόμενα δὲ ὠφελεῖ τοὺς στροφουμένους κύμινον λεῖον ἱκανὸν μίγν' ὀροβίνῳ ἀλεύρῳ ὠμηλύσεως τρόπον· ὠφελεῖ δὲ καὶ τοῦτο, κάρυον βασιλικὸν πυρωθὲν σὺν τῷ κελύφει, καὶ περιειληθὲν ἐρίῳ, ἢ ὀθονίῳ, καὶ ἐπιτεθὲν κατὰ τοῦ ὀμφαλοῦ· πίτυρα σὺν πηγάνου ἀποξέματι καὶ ὄξει· τῆλιν ἢ λινόσπερμον σὺν μελικράτῳ· τέφρα θερμῇ βληθεῖσα εἰς τρυβλίον, ξεσθεῖσα ὄξει· δεῖ δὲ περιτε-

aceto vel aqua, balsami ligni fructusve decoctum in vino, helenii infusum, eryngii radix drach. j. pondere cum vino et absinthio, ligusticum cum aqua, castorium cum aceto, betonicae foliorum drach. j., costi drach. j. cum vino et absinthio: ea denique admota, per quae sternutamenta evocantur.

Cap. XLII. Faciunt ad intestinorum morsus portulaca comesta et eiusdem succus epotus, malva esitata. Per eadem vero infusus iuvat cremor decoctae oryzae, aut chondri, aut tragi, aut ptisanae, aut malvae, aut foeni graeci, aut seminis lini.

Cap. XLIII. Torminosos haec iuvant pro cataplasmate adhibita: cuminum sat copiosum tritum, et farinae ervi admixtum malagmatis in modum, quod e cruda farina paratur: inglans ignita cum suo putamine lana linteolove obvoluta et umbilico imposita, furfures cum rutae infuso et aceto, foenum graecum aut lini semen cum aqua mulsa: cinis calens in aceto fervefactus et

θέντας ὠμόλινον, διπλοῦν περικαθάπτειν τὸ τρυβλίον τῷ ἀλγοῦντι μέρει.

Κεφ. μδ'. Κωλικούς δὲ θεραπεύει πινόμενα ἄμμι μετ' οἴνου, ἀλεκτορίδων ἄφοδος φωκτὴ μετ' οἴνου, ἀρκευθίδες ἐσθιόμεναι καὶ πινόμεναι, ἱτέας καρπὸς καὶ τὰ φύλλα μετ' οἴνου καὶ ὀλίγου πεπέρεως, ἢ τὸ ἀφέψημα τῶν φύλλων, πετροσελίνου, ἢ πολίου ἀφέψημα μετὰ ὕδατος, κοχλίας λιβυκὸς σὺν τῷ ὀστράκῳ λεῖος μετὰ σμύρνης ὀλίγης καὶ πεπέρεως, μετὰ οἴνου ποθεῖς, τήλεως ἡλεσμένης κοχλιάρια β' μεθ' ὕδατος.

Κεφ. μέ'. Εἰλεώδεις δὲ ὠφελεῖ ἐνιέμενα ἔλαιον, πηγάνου αὐτῷ ἐναφεψηθέντος ἢ ἀψινθίου· σῦκα ξηρὰ μετ' ἐλαίου καὶ πηγάνου ἐψηθέντα, κύμινον σὺν ἐλαίῳ ἐψηθέν. Τοὺς δὲ χρονίους ὠφελεῖ κολοκυνθὶς ἀφεψηθεῖσα σὺν ὕδατι καὶ ἐγκλυσθεῖσα, ἀσφάλτου < δ' μετὰ ὕδατος ὁμοίως ἐγκλυσθεῖσαι. Ὁφελοῦνται δὲ οἱ εἰλεώδεις, ἱρίνω μύρω ποτιζόμενοι, ἀσφάλτῳ μεθ' ὕδατος καὶ νίτρου· πάνακος < ἡ, νίτρου < α', κυμίνου < β', μέλιτι μίξας, δίδου καρύου ποντικῷ τὸ μέγεθος σὺν ὕδατι θερμῷ.

catino inditus, qui quidem duplici linteo circumdatus ad dolentem partem accommodetur.

Cap. XLIV. Colicis medentur haec assumpta: ammi cum vino, fimus gallinaceus tostus cum vino, iuniperi baccae in cibo potuve sumptae: salicis semen et folia cum vino et paucō pipere, aut foliorum decoctum: petroselini aut polii decoctum ex aqua: cochleā africana cum sua testa contrita, e vino pota, addito exiguo myrrhae et piperis: foeni graeci moliti cochlearia duo ex aqua.

Cap. XLV. Ileosos iuvant, per sedem infusa, oleum, cui sit incocta ruta vel absinthium, caricae cum oleo et ruta decoctae, cuminum cum oleo coctum. Diuturno vero malo infestatis prosunt colocynthidis decoctum ex aqua per clysterem infusum, bituminis drach. iiij. ex aqua similiter infusae. Hisce porro etiam propinatis iuvantur ileosi: unguento irino, bitumine cum aqua et nitro. Itidem panacis drach. viij., nitri una, cumini duae melle excipiuntur: dosis avellanae magnitudo cum aqua calida.

Κεφ. μξ'. Κωλικοῖς ἐν αὐτοῖς τοῖς παροξυσμοῖς δίδου διαφανές, καύσας καὶ λειώσας κοχλιάριον ἐν δι' ὕδατος θερμοῦ, ἢ ἐχίνων θαλασσίων καέντων ὁμοίως· ἢ κόπρον κυνείαν λευκὴν καὶ νίτρον, διαλύσας δι' ὕδατος θερμοῦ, πεπέργως ὀλίγον ἐπιπάσσω· ἢ χελιδόνων κόπρον λειώσας ὁμοίως.

Κεφ. μζ'. Κοιλίας δὲ ῥεούσας χρονίως ἐφίστησι, πινόμενα σὺν οἴνῳ, ἄγνου σπέρματος < α', ἀγρώστεως τῆς ἐν Παρνασσῷ ῥίζης < α', ἀγχοῦσης φύλλα, ἀδιάντου χύλισμα, αἰεῖζου χυλὸς σὺν λιβανωτῶ, ἀκακίας χυλίσματος < α', ὑποκιστίδος < α', ῥοὸς χυλοῦ < α', ἀκάνθης λευκῆς < α', ἀκάνθου παιδέρωτος ῥίζα, ὑακίνθου σπέρμα, ἄκορον λείον, λαγώπους, πολυγόνου χυλὸς σὺν οἴνῳ, μαλάχης ῥίζα, βάτος ἐναφεψηθεῖσα μετὰ φοινικοβαλάνων, δαμασωνίου φύλλων < α', ἄμωμον· γίγαρτα φωχθέντα ἀντὶ ἀλφίτου λῆα, ἄνισον, ἄνηθον, περιστερᾶς ἄφοδος φωκτὴ, κυνὸς ἄφοδος ξηρὰ λευκὴ· ἀρνογλώσσου σπέρμα καὶ ὁ χυλὸς, ἢ τῆς πόας μέρη β', κυδωνίων πεφωγμένων μέρος ἐν, εἰς ὕπνον πινόμενον μετὰ

Cap. XLVI. Colicis in ipsis paroxysmis exhibeto lapidis specularis usti tritique cochlearium unum ex aqua calida, similiter et echinorum marinorum ustorum cinerem, aut stercus caninum album cum nitro ex aqua calida dissolutum, insperso modico pipere, aut fimus hirundinum contritum simili modo.

Cap. XLVII. Alvi diuturna profluvia sistunt haec in vino pota: viticis semen drach. j. pondere, radix graminis parnassii drach. j. pondere, anchusae folia, adianti succus, sempervivi succus cum ture, succi acaciae drach. j., hypocistidis drach. j., rhois succi tantundem, spinae albae tantundem, acanthi paederotis radix, hyacinthi semen, acorum tritum, lagopus, polygoni succus cum vino, malvae radix, rubus decoctus cum phoenicobalanis, damasonii foliorum drach. j., amomum, acinorum nuclei tosti tritique polentae vice, anisum, anethum, fimus columbinus tostus, stercus caninum album aridum: plantaginis semen et succus: aut herbae ipsius partes duae cum malorum cotoneorum tostorum parte una ex vino diluto

κράματος· μινύοις δ' ἂν ἐνίοτε καὶ ἄλφιστα· ἀρκευθίδες μετ' οἴνου, ἀσπαλάθου ἀπόζεμα, ἀσφαλτον ἀντὶ καταποτίου, ἀστραγάλου ῥίζης < α', ἀχράδος ξηρᾶς τὸ ἄλφιστον ἐπιπασσόμενον, ἢ πινόμενον τὸ ἀφέψημα· πενταφύλλου τὸ ἀφέψημα, γῆς σαμίας < α' σὺν βαλαυστίῳ ἢ κρόκῳ κιλικίῳ, γλυκυσίδης ῥίζης ἀφέψημα· δρυῖνου, ἢ τοῦ περὶ τὴν βάλανον ὑμενίου τὸ ἀφέψημα· ἔλυμόν φωχθὲν ἀντὶ ἄλφίτου, κέρατος ἐλαφείου κεκαυμένου < γ', σμύρνα ἀντὶ καταποτίου λαμβανομένη, μαράθρου σπέρμα καὶ ῥίζαι, ἱτέας φύλλων χυλὸς, καστανείου φλοιοῦ ἀπόζεμα, κηκὶς λεῖα ἐπιπασσομένη ὕδατι ἢ οἴνῳ αὐστηρῷ· κονία συνίη μετὰ ὄξους ζεσθεῖσα καταρρόφουμένη, πετρολαπάθου <sup>64</sup> ῥιζῶν ἀφέψημα· κονίας κυ. β', ἐλαίου ἡμικύαθος (κόγχη α'), ὄξους κυ. α', θερμὰ καταρρόφούμενα· ἀριστολογίας < γ', κυτίνων < α' μετ' οἴνου.

Κεφ. μῆ'. Δυσεντερικοὺς ὠφελεῖ μὲν καὶ τὰ πρὸς κοι-  
λιακοὺς ἀναγεγραμμένα, ἰδίως δὲ μετ' οἴνου λαμβανόμενα,

64) Cum nusquam πετρολαπάθου mentio fiat, Moibani lectio τοῦ τετάρτου λαπάθου forte praefenda. Diosc. lib. 2. c. 140.

propinentur: poteris et interdum polentam addere. Conferunt et iuniperi baccae cum vino, aspalathi decoctum, bitumen instar catapotii deglutitum, astragali radice drach. j., pyra sylvestria sicca tritaque inspersa potioni sorbitivae, aut potum eorundem decoctum: quinquifolii decoctum, terrae samiae drach. j. cum balaustio vel croco cilicio, paeoniae radice decoctum, mediani querni corticis aut eius pelliculae, quae glandem proxime contegit, decoctum, panicum tostum loco polentae, cornu cervini usti drach. iij., myrrha in modum catapotii deglutita, foeniculi semen et radices, salicis foliorum succus, castanearum corticis decoctum, galla contrita, inspersa aquae aut vino austero, lixivium e cinere ficulneo cum aceto fervefactum et absorptum, radicum rumicis in petris nascentis decoctum. Lixivii cyathi duo, aceti unus, olei dimidius misceantur, calidique sorbeantur. Sic et aristolochiae drach. iij., cytinorum drach. j. ex vino bibantur.

Cap. XLVIII. Dysentericis prosunt, tum quae ad coeliacos facientia praescripsimus, tum vero peculiariter



ἢ στύμματος τινος, ἄρμόζει ἀγαλλόχου < α', ἐλελίσφακος·  
 εὐπατωρίου χυλὸς καὶ ἡ πόα· πενταφύλλου χυλὸς καὶ ἡ ῥίζα  
 ξηρά, ὑποκιστὶς, πρασίου χυλὸς, σιδηρίτιδος τῆς Ἡρακλείας  
 φύλλα καὶ ἡ ῥίζα, ἱτέας ῥίζα· συμφύτου ῥίζα, καὶ ὁ καρπὸς, καὶ  
 φύλλα· ὄξαλίδος ὁ καρπὸς, νυμφαΐας καρπὸς, ἀλθαΐας ῥίζης  
 ἀφέψημα, Ἀχιλλείου πόας ἀφέψημα, βάτου χυλὸς καὶ τὸ ἀφέ-  
 ψημα τῶν καυλῶν, γάλα ἐφθὸν αἰγείου, ἀλκίας ῥίζα, γνα-  
 φάλιον σὺν οἶνῳ αὐστηρῳ, ἐλατίνῃ μετὰ λινოსπέρμου ἐψηθεῖσα  
 καὶ πινομένη· ἐλάτης μυρεψικῆς ἀπόζεμα, εὐπατωρίου σπέρ-  
 ματος < α' σὺν οἶνῳ, κέρατος ἐλαφείου < α' μετ' οἴνου καὶ  
 μέλιτος προαφεψημένου ἐκλειχόμενη· ἵππομαράθρου σπέρμα-  
 τος < α' ἢ β', ἄνθη λευκοῦ κισσοῦ σὺν οἶνῳ, πινώμενα δις  
 τῆς ἡμέρας· μυρσίνης καρπὸς σὺν οἶνῳ· περικλυμένου χύλισμα·  
 λωτοῦ πρισμάτων ἀφέψημα σὺν οἶνῳ, μίλτου λημνίας ἢ σι-  
 νωπικῆς < α' ἐν οἶνῳ· οἰνάνθη ξηρὰ πινομένη ἀντὶ ἀλφί-  
 του, ὀλοσχοίνου καρπὸς πεφωγμένος, φιλεταιρίου ῥίζα σὺν  
 οἶνῳ, χονδρίλλης χυλὸς, ἴρις <sup>65</sup> μετ' οἴνου, φλόμου ῥίζης < β',

65) Iam Gesnero suspecta: Saracenus mavult κηκίς aut κηρός.

haec, cum vino aut astringente quopiam decocto sumpta:  
 agallochi drach. j., salvia, eupatorii succus, et herba ipsa,  
 quinquefolii succus, siccaeque radix, hypocistis, marrubii  
 succus, sideritidis Heracleae folia et radix, salicis radix:  
 symphyti radix, semen et folia: oxalidis semen, nym-  
 phaeae semen, althaeae e radice decoctum, Achilleae her-  
 bae decoctum, rubi succus et caulium decoctum, lac ca-  
 prinum coctum, alcaeae radix, gnaphalium cum vino au-  
 stero, elatine cum lini semine decocta et pota, elates un-  
 guentariae decoctum, eupatorii seminis drach. j. cum vino  
 et melle prius excocto delincta: hippomarathri seminis  
 drachma una aut altera, hederæ albae flores cum vino  
 bis in die poti, myrti fructus cum vino, periclymeni suc-  
 cus, loti ramentorum decoctum in vino, rubricae le-  
 mniae aut sinopicae drach. j. in vino, oenanthe sicca [tri-  
 taque], polentae vice pota, holoschoeni semen tostum,  
 philetaerii radix cum vino, chondrillae succus, iris cum  
 vino, verbasci radicis drach. ij., psyllii drach. j. ex aqua,

ψυλλίου < α' ἐν ὕδατι, κυνεία κόπρος ξηρὰ ἐπιπασθεῖσα  
οἴνῳ, λαγωῦ πυτίας < α' ἐν ὕδατι.

Κεφ. μθ' Ἐν προσφορᾷ δὲ μέρει ὠφελίμως δίδονται  
κοιλιακοῖς καὶ δυσεντερικοῖς μαλάχαι ἀναλτοι, ὡς μελιχία.<sup>66</sup>  
ἐλαῖαι πρόσφατοι πέπειραι· ἡ αἷμα τράγου, ἡ αἰγὸς, καὶ ἐλάφου,  
καὶ λαγωῦ ἀπὸ πηγάνου ἐσθιόμενον· σταφυλὴ σὺν στεμφύλοις·  
ἀσταφίδες ὀμφακίτιδες κοπεῖσαι, καὶ σὺν ἀλεύρῳ ἄρτοποιη-  
θεῖσαι· καὶ ἄρτος μετὰ ὠοῦ λεκύθων φρυαθεῖς, καὶ ὀπτη-  
θεῖς· καὶ αὐτὴ δὲ ἡ ἀσταφὶς ἐσθιομένη σὺν τοῖς γιγάρτοις·  
ἄμυλον σὺν χόνδρῳ ἐφθῶ καὶ σὺν γάλακτι· ἀρνογλώσσου  
φύλλα ἐφθὰ μετ' ὄξους καὶ ἐλαίου· καὶ κηκὶς, ἡ ῥοῦς ἐπι-  
πασσόμενα τοῖς ὄφοις, ἡ ζεὰ πεφωγμένη, ἡ φανὸς πεφω-  
γμένος λείος ἀλφιτηδὸν πινόμενος· ἡ γίγαρτα ὁμοίως, ἡ ἄλ-  
φιστα, ἡ κέγχροι· βάτου ἀκρέμονες ἐφθοῖ, δι' ὀξελαίου λαμ-  
βανόμενοι· ὁμοίως ἀρνογλώσσον· βάτου καρπὸς πέπειρος  
ἐσθιόμενος· καὶ ἄωρος δὲ ξηρανθεῖς ἀντὶ ῥοὸς λείος ἐπιπάσ-  
σεται τοῖς προσοψήμασι· κηκὶς ὀμφακίνη μετὰ πόλτου ἐψη-  
θεῖσα ἐν τῷ ὕδατι, ἡ γίγαρτα ὁμοίως, ἡ σταφίδες, εἴτ'.

66) Vulg. μίλητος: Gesnerus suasit ὡς λάχανον.

caninum stercus aridum vino inspersum, coaguli denique  
leporini drach. j. ex aqua.

Cap. XLIX. Coeliacis et dysentericis in cibis utili-  
ter exhibentur malvae sine sale, ut blandimenta, olivae  
recentes maturae: sanguis hirci, vel caprae, vel cervi, aut  
leporis, inassatus sartagine et assumptus, uvae cum olivis  
trititis, uvae passae, immaturae tusae et cum farina in pa-  
nes coactae, panis cum vitellis ovorum subactus et tostus,  
uva passa cum suis nucleis esitata, amyllum cum chondro  
cocto et lacte, plantaginis folia cocta cum aceto et oleo, gal-  
la vel rhus inspersa opsoniis, zea tosta: lens tosta et trita,  
instar polentae pota: similiter et uvarum nuclei, aut po-  
lenta, aut milium: rubi tenelli surculi cocti, ex aceto et  
oleo in cibo sumpti: plantago simili modo: rubi fructus  
maturus esitatus, vel immaturus siccatus tritusque pro  
rhoë inspersus opsoniis: galla omphacitis cum pulte cocta  
ex aqua, similiter et uvarum nuclei, aut uvae passae, ita

ἔξενεχθέντα ἐκ τοῦ πόλτου ἐσθιομένου· ἑλένιον ἐφθὸν ἐσθιόμενον· πόλτος ἐξ ἑλύμου, ἢ κέγχρου, ἢ ζειᾶς, ἢ χόνδρου πεφωγμένου, ἢ ὀρύζης· ἢ σμύρνιον ἐφθόν· κάρυα βασιλικά· κεράτια ξηρά καὶ τὰ ἀπὸ στεμφύλων· κηκίς λεία μετὰ ὠοῦ ῥοφηθεῖσα, καὶ οἶνω δὲ ἐπιπασθεῖσα· κορωνόποδος ῥίζα ἐσθιομένη, κύαμος ἑλληνικός καθεψηθείς ἐν ὀξυκράτῳ σὺν τῷ λέπει ἐσθιόμενος, λινόςπερμον φρυγὲν καὶ μετὰ μέλιτος ἐφθοῦ ἐσθιόμενον· λωτοῦ καρπὸς ἐσθιόμενος· μέλι ἐφθὸν καταπινόμενον καθ' ἑαυτὸ, καὶ σὺν σιδίοις κεκομμένοις καὶ σεσησμένοις· μέσπιλα, μῆλα κυθώνια πέπειρα ἐφθὰ μετὰ μέλιτος· ἢ διατεμὼν τὰ κυθώνια καλάμῳ, καὶ ἑναποβρέχων ὕδατι, δίδου πίνειν τὸ ἀπόβρεγμα· μυρτίτης οἶνος πινόμενος, καὶ μύρτα ξηρὰ χυλιζόμενα· οὗα ξηρὰ ἀποζεννύμενα, καὶ πινόμενον τὸ ἐξ αὐτῶν ἄλευρον ἀντὶ ἀλφίτων<sup>67</sup>, ἢ ἀρχάδων ὁμοίως· σέριδες ἐφθαί, μετ' ὄξους λαμβανόμεναι, ἀρνόγλωσσον ὁμοίως· σελίνου καυλοὶ ὁμοίως· φακὸς μετὰ ἀρνογλώσσου, ἢ ἀνδράχνης, ἢ σέριδος, ἢ κικωρίων, ἢ ῥοιᾶς λεπυχάνων, ἢ φοινίκων θηβαϊκῶν ἐψημένος· στέαρ ἐλάφειον νεαρὸν σὺν τυρῷ

67) Dioscor. lib. 1. c. 173.

tamen ut, cum puls editur, reiiciantur: helenium coctum, in cibo sumptum: puls e panico, vel milio, aut zea, vel chondro tosto, vel oryza: smyrnium decoctum, iuglandes, siliquae siccae et quae vinaceis condiuntur, galla trita, tum sorpta cum ovo, tum etiam vino inspersa, coronopodis radix in cibo sumpta: faba graeca decocta in posca, una cum cortice suo esitata: lini semen frixum et cum melle cocto sumptum, loti fructus esitatus: mel coctum, vel per se devoratum, vel cum malicorio tuso cribratoque: mespila, mala cotonea matura cocta cum melle: aut e malis cotoneis dissectis arundine et in aqua maceratis infusum propinatum: vinum myrtites haustum, e myrti baccis extractus succus, decoctum e sorbis siccis epotum et ex iisdem farina polentae loco sumpta, uti et e pyris sylvestribus, intyba cocta cum aceto, et plantago eodem modo, nec non et apii cauliculi: lens cocta cum plantagine, aut portulaca, aut intybo, vel cichorio, aut punici corticibus, palmulisve thebaïcis: adeps cervinus recens cum

ἢ ἀλφίτῳ ἐψημένον· ἥπαρ ὀπτὸν αἰγὸς, ἢ τράγου, ἐν μέλιτι ἐπιτηγανισθέν· ἐγκέφαλος ὁμοίως· τυρὸς ἀπαλὸς ἀποξεσθεὶς<sup>67α</sup>, ἔπειτα ἐν μέλιτι τηγανισθεὶς· χελιδόνων νεοττοὶ ὅπτοι ἐσθιόμενοι ἀντὶ συκαλίδων· καὶ λόγου ῥίζα ἐψημένη σὺν φακῷ· κηρὸς ἢ μελίκηρον ἐγκαθεψόμενον τοῖς ῥοφήμασι· κράμβη δις ἐφθῇ ἐσθιομένη· θριδάκης ἀπλυτοὶ ἐσθιόμενοι, μάλιστα ἐπὶ τῶν ἀνορέκτων· πυτία νεβροῦ, ἢ λαγωῦ, ἢ ἐρίφου, διεθεῖσα ὕδατι καὶ ποθεῖσα.

Κεφ. ν'. Καταπλάσσεται δὲ πρὸς κοιλιακοὺς καὶ δυσεντερικοὺς ὠφελίμως ἀγριελαίας ἄνθος σὺν ὠμῇ λύσει χλιαρᾷ· βάτου φύλλα σὺν μήλῳ κυδωνίῳ καὶ κηρωτῇ· μυρσίνης φύλλα λεῖα σὺν οἴνῳ καὶ ὀμφακίνῳ ἐλαίῳ γλοιώδη γενόμενα, καὶ ἐν ἐρίῳ ἐπιτιθέμενα· κρίθινον ἄλευρον σὺν οἴνῳ καὶ βάτῳ, ἢ ἀχράσιν, ἢ σιδίοις, ἢ κυδωνίων ἄνθει· καὶ σὺν κηρωτῇ δὲ τὰ τῶν κυδωνίων ἄνθη· ῥόας λέπη ἐψημένα ἐν οἴνῳ λεῖα σὺν κηρωτῇ· ῥοῦς βυρσοδεψικὴ σὺν κηρωτῇ· φοινικοβάλανοι, ἢ οἱ κερυωτοὶ σὺν μήλῳ κυδωνίῳ καὶ κηρωτῇ.

67α) Vulg. ἀποξανθεὶς καὶ ἀποξεσθεὶς; quod defendi nequit.

caseo vel polenta coctus, hepar tostum caprae vel hirci, cum melle in sartagine frixum, cerebrum simili modo: caseus recens derasus, posteaque cum melle in sartagine frixus: hirundinum pulli assati et pro ficedulis in cibo sumpti, viticis radix cocta cum lente: cera, aut favus, si sorbitionibus incoquantur, brassica his cocta comesta: lactucae illotae in cibis sumptae, ab iis praesertim, qui cibum fastidiunt: coagulum hinnuli, aut leporis, aut hoedi, in aqua dissolutum et potum.

Cap. L. Coeliacis et dysentericis utiliter cataplasmatibus instar imponuntur haec: oleastri flos cum cruda farina hydrelaeo mixta eaque tepente, rubi folia cum malo cotoneo et cerato, myrti folia trita cum vino et oleo omphacino, dum viscidum lentorem contraxerint, et ex velle imposita: hordeacea farina cum vino et rubo, aut pyris sylvestribus, aut malicorio, aut cotoneorum floribus: itemque cotoneorum flores cum cerato: punici mali cortices in vino cocti, tritique cum cerato: rhus coriariorum cum cerato, phoenicobalani, aut caryotides cum malo co-



οἰνάνθη, ἢ στυπτηρία σὺν ἄλῳ, καὶ ἀκακία, καὶ φοῖνιξ σὺν αἰζώου σπέρματι· περιστεῖρας κόπρος ξηρὸς σὺν σύκοις ἐψημένοις ἐν οἴνῳ· ἢ μελάνθιον σὺν κυμίνῳ καὶ θέρμοις πικροῖς καὶ νίτρον καὶ μέλιτι· ἢ κάρδαμον σὺν σιδίοις ἐφθὸν καὶ κηρῷ καὶ ἀμόργῃ.

Κεφ. νά. Ἐνίεται δὲ ἐπὶ κοιλιακῶν συμφερόντως καὶ δίδεται δὲ ἀμπέλου φύλλον χυλὸς, ἢ ἀνδράχνης, ἢ ἀκακίας, ἢ ὑποκιστίδος, ἀρνογλώσσου χυλὸς, βαλαύστιον, μίλτος σινωπικὴ μετὰ τινος τῶν στυφόντων ἀφεψήματος· λωτοῦ ἢ φηγοῦ πρισμαίων ἀφέψημα· ῥόδος βυρσοδεψικῆς χύλισμα, καὶ τὸ ἀφέψημα τῶν φύλλον· φακὴ μετὰ ῥόδων ἀφεψηθεῖσα· πτισάνη σὺν βάτου ἀφεψήματι, ἢ μυρσίνης, ἢ σφαιρίων κυπαρίσσου· καὶ καθ' ἑαυτὰ δὲ τὰ ἀφεψήματα χωρὶς πτισάνης ἐνίεται ὡφελίμως.

Κεφ. νβ'. Ἐπὶ δὲ δυσεντερικῶν ἀρμόζει μὲν καὶ τὰ πρὸς κοιλιακοὺς ἐνέματα, ἰδίως δὲ ἐπὶ τῶν περιωδυνούντων, βούτυρον καθ' ἑαυτὸ πρόσφατον· ἢ μαλάχης, ἢ τήλεως, ἢ λινοσπέρμου, ἢ χόνδρου πτισάνης, ἢ ὀρύζης, ἢ τράγου ἐψη-

toneo et cerato: oenanthe, aut alumen cum aloë et acacia, palmulis et sempervivi semine: stercus columbinum aridum cum ficibus coctis in vino: nigella cum cumino, lupinis amaris, nitro ac melle: nasturtium denique cum malicorio coctum, cera et amurca.

Cap. LI. Coeliacis per sedem utiliter infunduntur et intus exhibentur: vitis foliorum succus, aut portulacae, aut acaciae, aut hypocistidis, aut plantaginis: balaustium, rubrica sinopica cum aliquo astringente decocto, loti aut fagi ramentorum decoctum, expressus rhoë coriaria succus, ac eiusdem foliorum decoctum, lens cum rosis decocta: ptisana cum decocto rubi, aut myrti, vel globulorum cupressi. Ipsa etiam horum decocta per se citra ptisanam commode infunduntur.

Cap. LII. Dysentericis eadem conveniunt enemata, quae coeliacis: privatim vero iis, qui vehementiore dolore conflictantur, ista: butyrum recens per se: malvac, aut foeni graeci, chondri ptisanae, oryzae, vel tragi de-

θέντων καὶ τορυνηθέντων ὁ χυλὸς· ἐπὶ δὲ τῶν δίχα ἀλγη-  
δόνος ρευματιζομένων ἀρμόζει ἄλμη μετὰ οἴνου, κέρας ἐλά-  
φειον κεκαυμένον σὺν οἴνῳ καὶ ῥοδίνῳ· ἀρθρῆνικόν σὺν χάσῃ  
κεκαυμένον διπλάσιον καὶ οἴνῳ· μολύβδου σκωρία, ἢ μο-  
λύβδαινα μετὰ μυρσινίνου· ἄσφαλτος σὺν πτισάνῃ τακῆσα,  
στοίβης ἀπόξεμα σὺν οἴνῳ· γάρρος ὁ ἀπὸ τῶν ἰχθύων ἐνιέ-  
μενος ἐπὶ τῶν μετὰ νομῶν, καὶ ὁ ἀπὸ τῶν σιλούρων· κονία  
συκίνη στακτὴ· οὖρον παλαιόν· κυάμου ἐλληνικοῦ τοῦ λε-  
πτοῦ τὸ ἀφέψημα σὺν αἰγείῳ στέατι· λυσιμαχίου χυλὸς, λω-  
τοῦ ἢ φηγοῦ πρισμάτων ἀφέψημα σὺν αἰγείῳ στέατι. μελισ-  
σοφύλλου χυλὸς, μίλτος σινωπικὴ σὺν ἀποξέματι στύφοντι ἢ  
ὀξάλμῃ.

Κεφ. νγ'. Ἀποθεραπεύει δὲ τὰς ἐκ τῶν ἐπιτεταμένων  
ἐνεμάτων δῆξεις γάλα ἐγχυματιζόμενον, ἢ βούτυρον, ἢ χόν-  
δρου ἀφέψημα· ἢ ταύρειον στέαρ τεθεραπευμένον σὺν πι-  
σάνης χυλῷ· ἢ ὀρνίθειον ὁμοίως, ἢ χήνιον, ἢ ἐλάφειον· ἢ  
μυελὸς ἐλάφειος, ἢ μόσχειος καθ' ἑαυτὸν χλιαρὸς, ἢ σὺν χυ-  
λῷ πτισάνης.

coctorum tudiculaque agitatorum cremor. Iis vero, qui  
citra dolorem fluxione infestantur, haec infusa conve-  
niunt: muria cum vino, cornu cervinum ustum cum vino  
et rosaceo, arsenicum duplum crematum cum charta et  
vino, plumbi scoria aut molybdaena cum myrtino oleo,  
bitumen cum ptisana liquatum, stoebe infusa vino: garum  
tum aliorum piscium, tum etiam silurorum, iis infusum,  
quibus sunt depascentia ulcera: lixivium e ficu stillati-  
tium, urina antiqua, fabae graecae minoris decoctum cum  
sevo caprino, lysimachiae succus, loti aut fagi ramento-  
rum decoctum cum adipe caprino, apiastri succus, rubri-  
ca sinopica cum decocto astringente aut acida muria.

Cap. LIII. Morsus intestinorum a vehementioribus  
acrioribusve clysmatibus excitatos leniunt ac mitigant lac  
infusum, aut butyrum, aut chondri decoctum, aut sebum  
taurinum cum ptisanae cremore curatum. Similiter et  
paratus gallinaceus adeps, anserinus, aut cervinus: medulla  
itidem cervina aut vitulina, seu per se tepida infusa, seu  
etiam cum cremore ptisanae.

Κεφ. νδ'. Ἐγκαθίσματα δὲ ἐπὶ τῶν κοιλιακῶν καὶ δυσεντερικῶν ἐστὶ ταῦτα· σιλούρων ἢ ἰχθύων γάρρος μετ' ὄξους κραιθίς, ῥοὸς βυρσοδεψικῆς ἀφέψημα, ῥοιᾶς λεπῶν ἀφέψημα· στεμφύλων ὁμοίως, καὶ πάντα τὰ τῶν στυφόντων ἀφεψήματα· ἀρμόζει δὲ θερμοῖς ἐγκαθίζειν ἐπανιέντας τὸν δακτύλιον, καὶ ἐγχρονίζοντας, καὶ διαστέλλοντας τὴν πυγὴν.

Κεφ. νε'. Πρὸς δὲ τὸ μὴ συνεχῶς ἐρεθίζεσθαι δεήσει κατάδημά τι, βάλλοντας εἰς ἔλαιον ζέον, ἢ ὄξος, ἢ ὕδωρ, παρατιθέναι.

Τῶν περὶ τὴν κύστιν χοληδόχον, ἥ πάρ τε καὶ τὸν σπλῆνα παθῶν βοηθήματα.

Κεφ. νς'. Ἰκτεριῶντας δὲ ποτίζειν ἀδιάντου ἀποζέματι ἐν οἴνῳ, ἀγχούσης ῥίζης < α' μετ' οἴνου, ἀτραφάξεως, ὑπερικοῦ κόγχῃ<sup>68</sup> σὺν μέλιτι καὶ οἴνῳ, πράσιον μετ' οἴνου, πέπλιον, σφονδυλίου ῥίζα καὶ τὸ σπέρμα μετ' οἴνου, ἐρροδάνου ῥίζης < α' μετ' οἴνου, ἀλόης < α' σὺν ὕδατι,

68) Mensura est, itaque κόμη, quod Gesnerus substituere suasit, haud opus est.

Cap. LIV. Tum coeliacis, tum etiam dysentericis insessus parantur huiusmodi: e siluris aliisque piscibus garum aceto temperatum, rhois coriariae decoctum, malicorii decoctum, itemque vinaccorum et quorumvis astrigentium. His porro decoctis calentibus insidendum relaxato ano diductisque natibus, ac diutius immorandum.

Cap. LV. Porro ut ne frequentes egerendi conatus sollicitent, ligamentum aliquod ferventi oleo, aquae, aut aceto immersum sedi adhibendum.

*Vesicae felleae, hepatis ac splenis affectuum remedia.*

Cap. LVI. Ictericis potui danda, quae sequuntur: adianti decoctum in vino, anchusae radicis drach. j. cum vino, atriplicis, hyperici semicyathus cum melle et vino, marrubium cum vino, pepalum, sphondylii radix et semen cum vino, rubiae radicis drach. j. cum vino, aloës

ἀνθέμιδος ῥίζα καὶ τὰ ἄνθη μετ' οἴνου· σπύραθοι αἰγῶν,  
καὶ μάλιστα ἀγρίων, μετ' οἴνου, καθ' ἑαυτὰς καὶ σὺν ἀρώ-  
μασιν· ἱερᾶς βοτάνης τῶν φύλλων < ἅ μετὰ λιβανωτοῦ  
τριωβόλου σὺν οἴνου παλαιοῦ κόγχαις β' νήσται ἐπὶ δ' ἢ ε'  
ἡμέρας· μάραθρον μετ' οἴνου· ἀσπαράγου ῥίζης ἀφέψημα,  
καὶ τὸ σπέρμα πινόμενον ὁμοίως· ἀψίνθιον ὠμοτριβὲς σὺν  
Ἰνδικῇ νάρδῳ ἢ κελτικῇ, ἢ σελίνῳ, ἢ ἀδιάντῳ· βουφθάλμου  
τὰ φύλλα σὺν οἴνῳ μετὰ βαλανεῖον εὐχροίαν πρὸς καιρὸν  
ποιεῖ· βουνιάδος σπέρματος < δ' σὺν οἴνῳ, γλυκυσίδης <  
ἀ' σὺν οἴνῳ, κέρατος ἐλαφείου κεκαυμένου < ἀ' σὺν μέλιτι·  
ἐρέβινθοι μέλανες ἐσθιόμενοι, καὶ οἱ λευκοὶ δέ, καὶ τὸ ἀπό-  
ζημα πινόμενον· ἐρύσιμον σὺν μελικράτῳ· θείου ἀπύρου κο-  
χλιάριον ἐπιπασσόμενον ὕδατι καὶ ῥοφούμενον· ἵππομαρά-  
θρου ῥίζα, ἢ καρπὸς πινόμενος· καλαμίνθης ἀπόζημα, κέ-  
στρου < ἀ' μετ' οἴνου, κονύζης φύλλων < ἀ' μετ' οἴ-  
νου, κυκλαμίνου < γ' μεθ' ὕδατος· κατὰκλιναι δὲ ἐν  
θερμῷ οἴκῳ, καὶ πλείοσιν ἱματίοις χρῶ· χολώδη γὰρ

drach. j. ex aqua, anthemidis radix et flores cum vino;  
fimus caprarum, maximeque sylvestrium, cum vino, per  
se, vel cum aromatibus: verbenacae supinae, quam sacram  
herbam nominant, foliorum drach. j. cum turis obolis  
tribus ex vini veteris conchis duabus ieiuno ventriculo  
bibita quaternis senisve diebus: foeniculum cum vino:  
asparagi radice decoctum, ac ipsum quoque semen simi-  
liter potum: absinthii succus expressus cum indica aut  
celtica nardo, aut cum apio, vel adianto: buphthalmi fo-  
lia in vino a balneo pota coloris bonitatem aliquantisper  
conciliant: seminis napi drach. iiij. cum vino, paeoniae  
radice drach. j. cum vino, cornu cervini usti drach. j.  
cum melle: cicer nigrum aut etiam album esitatum, ac  
eorundem etiam infusum potum, erysimon cum aqua  
mulsa, sulphuris vivi cochlearium aquae inspersum et  
sorptum, hippomarathri semen aut radix in potu, cala-  
minthae infusum, betonicae drach. j. cum vino, conyzae  
folia drach. j. pondere cum vino: cyclaminis drach. vj. ex  
aqua: (aegrum autem oportet loco calido decumbere, plu-  
ribusque stragulis contegi: sic enim sudor colore felleus



ἰδρωῖτα ἐκκρινεῖ· λιβανωτίδος ἀπόζεμα μετὰ περίπατον σὺν  
 ξεβίνθοις· καὶ ἡ ῥίζα σὺν οἴνῳ· λειχήν ὃ ἐπὶ τῶν πε-  
 τρῶν διαχριομένος· ὄξυμυρσίνης ῥίζης ἀπόζεμα σὺν οἴνῳ,  
 μυρίκης ἀπόζεμα σὺν οἴνῳ· ὄνοι οἱ ὑπὸ ταῖς ὑδρίαις σὺν  
 οἴνῳ, ὄξαλίδος ῥίζαι ἐψηθεῖσαι σὺν οἴνῳ, ὀπόφυλλον σὺν  
 ταρίχει καὶ οἶνομέλιτι ἐσθιόμενον, σεύτλου ῥίζαι ἐφθαι ἢ  
 ὀπταὶ ἐσθιόμεναι· πενταφύλλου τῶν φύλλων χυλὸς πινόμε-  
 νος ταχέως ὑγιάζει· πόλιον ἐν οἴνῳ λευκῷ, σκίλλης ἐφθῆς  
 < α' σὺν ὄξυμέλιτι ἐκλειχομένης, καὶ πινόμένης μετὰ μελι-  
 κράτου· στρουθίου ῥίζα σὺν μέλιτι ἐκλειχομένη, καὶ πινόμέ-  
 νη μετὰ μελικράτου· στρύχνου τοῦ χαμαιζήλου, λεγομένου  
 ἀλικακάβου, χυλὸς πινόμενος μετὰ οἴνου· ὑακίνθου καρπὸς  
 σὺν ἀβροτόνῳ πινόμενος, χαμαιπίτυος ἀφέψημα σὺν ὕδατι,  
 χαμαικίσσου < α' μετὰ οἴνου ἐπὶ ἡμέρας ε' ἢ ζ', αἷμα σκύ-  
 λακος κυνὸς σὺν ὄξυκράτῳ πινόμενον· τοῦτο δὲ καὶ ὕδρω-  
 πικοὺς ὠφελεῖ· βρύον τὸ ἐπὶ τῶν κέδρων ἢ λευκῶν, κα-  
 ρύου βασιλικοῦ μέγεθος μετ' οἶνομέλιτος, πινόμενον πλήθος  
 κυάθ· ε' ἐπὶ ἡμέρας γ'. Ἄλλο, καὶ τοῦτο καλῶς ποιοῦν·  
 ἀφρονίτρου < β' βρέξας οἴνῳ ἀμιναίῳ κυ. β', καὶ πρὸ ἡμέ-

elicietur:) libanotidis infusum cum cicere post deambula-  
 tionem, eiusdem radix cum vino. Iuvat et lichen petris  
 innascens illitus: rusci radicis infusum cum vino, myri-  
 cae infusum cum vino, aselli, qui sub vasis aquariis re-  
 periuntur, cum vino, oxalidis radices in vino decoctae,  
 silphii semen cum salsamento et vino mulso comestum,  
 betae radices elixae vel assae, in cibis sumptae: quinque-  
 folii e foliis succus bibitus confestim sanat: polium cum  
 vino albo, scillae coctae drachma una cum aceto mulso  
 delincta, aut pota cum aqua mulsa, struthii radix cum  
 melle delincta, vel pota cum aqua mulsa, solani humilis,  
 quod halicacabum dicitur, succus cum vino potus: hyacin-  
 thi semen cum abrotano potum, chamaepityos decoctum  
 in aqua, chamaecissi drach. j. cum vino ad dies sex se-  
 ptemve, sanguis catelli cum oxycrato potus: (is etiam  
 hydropicos adiuvat:) muscus, qui cedris albisve populis  
 innascitur, magnitudine iuglandis e vini mulsi cyathis sex  
 triduo potus. Aliud, quod eximie proficit: spumae nitri  
 drach. ij. in vini aminaei cyathis duobus sub dio macera-

ρας ἔξαιθριάσας δίδου νήσται ἐπὶ ἡμέρας β' ἢ γ'. Θερα-  
πείη δὲ καὶ ἄρκτου χολῆς κυάμου ἑλληνικοῦ τὸ μέγεθος κα-  
ταπνόμενον· μελίας καρποῦ < α' σὺν οἴνῳ· συλλέγεται δὲ  
φθινοπώρου καὶ ἀποτίθεται· δαφνίδων ἢ σμύρνης < α' σὺν  
οἴνῳ· κρόκου < α' μετὰ μέλιτος ἐκλειχόμενη· ἑλξίνης ἀπό-  
ξεμα ἢ χυλὸς σὺν οἴνῳ· χελιδονίου χυλὸς ἢ ἀφέψημα σὺν  
οἴνῳ· λιβανωτίδος, τῆς ῥοσμαρίνου ῥωμαίστι καλουμένης,  
ἀφέψημα μεθ' ὕδατος.

Κεφ. νζ'. Εἰς δὲ τοὺς ῥώθωνας ἐγγεόμενα, ἐπὶ ἰκτε-  
ρικῶν καθαίρει κυκλαμίνου χυλὸς κατεχόμενος ἐν ἡλίῳ,  
ὥστε χολὴν ἄγειν· ἐλατήριον μετὰ γάλακτος, ἐν βαλανείῳ  
ὄντος, ἢ ἐν τῇ ἐμβατῇ τοῦ πάσχοντος, ἐγγεόμενον· προ-  
σίου χυλὸς ἐν μελικράτῳ ἐγγεόμενος ταῖς ῥίσι· μελάνθιον κε-  
κομμένον καὶ ὄξει βεβοηγμένον, ἐκπιεσθέντος τοῦ χυλοῦ, καὶ  
εἰς τὰς ῥίνας ἐγγεόμενον. Λουέσθωσαν δὲ, ὀξάλμης, ἢ  
ὀριγάνου, ἢ ὀσίρεως ῥίζης ἀποξέματος τῷ λουτρῷ μίσγον-  
τες· ἀλειφέσθωσαν δὲ ἀμυγδαλίνῳ, καὶ λαχάνων ἀπεχέ-  
σθωσαν.

Κεφ. νη'. Ἑπατικούς δὲ χρονίους ὠφελεῖ, πινόμενα

tas ieiuno ante lucem propinato ad biduum triduumve.  
Facit et praeclare ursinum fel, fabae graecae magnitudi-  
ne deglutitum. Itidem fraxini seminis drach. j. cum vi-  
no: (colligitur id autumnno atque reponitur:) baccarum  
lauri aut myrrhae drach. j. cum vino, croci drach. j. cum  
melle delincta, helxines decoctum vel succus cum vino,  
chelidonii succus vel decoctum cum vino: libanotidis,  
quam rosmarinum Latini vocant, decoctum ex aqua.

Cap. LVII. Naribus infusa ictericos purgant haec:  
cyclamini succus retentus in sole, donec bilem educat, cla-  
terium cum lacte infusum, insidente aegro balneo solio-  
ve: marrubii succus cum melicrato naribus infusus, ni-  
gella tusa et aceto irrigata expressus succus, infusus na-  
ribus. Ceterum ictericorum balneis aut acidam muriam,  
aut origani radicisve osiridis infusum admisceri oportet:  
ipsi vero amygdalino inungendi: oleribus autem interim  
abstineant.

Cap. LVIII. Dinturna hepatis imbecillitate laboran-

μεθ' ὑδρομέλιτος, ἀγαρικοῦ ὀβολοὶ δύο καθ' ἡμέραν, ἀδιάν-  
του ἀφέψημα, ἀκόρου ἀπόζεμα, χαμαιπίτυος ὁμοίως, σφον-  
δυλίου ῥίζα σὺν οἴνῳ πινομένη· ἐπιπακτίδος τῆς ἐλλεβορίνης  
καλουμένης ἀπόζεμα, ἄμωμον, κασία, ἀμύγδαλα πικρά σὺν  
ἐλελισφάκῳ καὶ μελικράτῳ, ἀναγαλλίδος χυλός, καὶ ἀνθέμιδος  
ῥίζα καὶ ἄνθη πινόμενα, ἄσαρον σὺν ὕδατι, γεντιανῆς ῥίζης <  
ἀ' σὺν ὕδατι, ἀριστολογίας ῥίζης ὁμοίως· γλυκυρρίζης χυλοῦ <  
ἀ' σὺν ὕδατι, ἢ τῆς ῥίζης ἀφέψημα· δάφνης ῥίζης τοῦ φλοιοῦ  
< ἀ' μετὰ μελικράτου, ἐλάτῃ λεία σὺν φοίνεσιν ἀποξεσθεῖσα,  
ἐρπύλλου ἀπόζεμα· ἡρουγίου < ἀ' μετὰ σταφυλίνου σπέρ-  
ματος, ἰσοπύρου σπέρμα σὺν μελικράτῳ, κέστρου φύλλα με-  
τὰ ὑδρομέλιτος, μαράθρου σπέρμα· νάρδου στάχνος ἀπόζε-  
μα, ἢ μῦρον νάρδιον κοχλιαρίου πλήθος λαμβανόμενον· ὀ-  
ποπάναξ σὺν μελικράτῳ, λευκανθέμου φύλλων, ἢ πίτυος  
φύλλων < ἀ' μεθ' ὕδατος· ῥᾶ ὁμοίως· σελίνου ἀπόζεμα  
καὶ ὁ καρπός, σκάνδικος ἀφέψημα, πενταφύλλου ῥίζης χυ-  
λός· τεύκριον, καὶ ὁ χυλός αὐτοῦ ἐν μελικράτῳ· χρυσοκόμης  
ἀπόζεμα ἐν ὑδρομέλιτι· ἡριγέροντος ἀπόζεμα καὶ ὁ καρπός,

tibus auxiliantur pota haec: agarici oboli bini singulis  
diebus, adianti decoctum, acori infusum, itidemque cha-  
maepityos: sphondylii radix in vino pota, epipactidis, quae  
elleborine dicitur, infusum: amomum, casia, amygdalae  
amarae cum salvia ex melicrato, anagallidis succus, cha-  
maemeli radix et flores in potu, asarum cum aqua, gen-  
tianae radix drach. j. pondere ex aqua, aristolochiae ra-  
dix eodem modo: succi glycyrrhizae drachma cum aqua,  
aut radice decoctum: lauri radicem cortex drachm. j.  
pondere cum melicrato, elate trita et una cum palmulis  
decocta, serpylli infusum, eryngii drachma cum dauci  
semine, isopyri semen cum melicrato, betonicae folia  
cum aqua mulsa, foeniculi semen, spicae nardi infusum,  
aut unguentum nardinum cochlearii mensura sumptum,  
opopanax cum melicrato, leucanthemi aut pinus foliorum  
drach. j. ex aqua, rha similiter, apii infusum et semen,  
scandicis decoctum, quinquefolii e radice succus, teu-  
crium eiusque succus cum melicrato, chrysocomes infu-  
sum in aqua mulsa, senecionis infusum et semen, simi-

πολιοῦ ὁμοίως, πίσης ξηρᾶς λείας < α' καταπασθεῖσα ἐν ποτῶ· μελιλώτου καρποῦ λείου < α', διὰ μελικράτου· κόστος ὁμοίως· τριφυλλίδος, τῆς ὀξαλίδος καλουμένης, ἀφέψημα ὁμοίως πινόμενον· ἄγνου σπέρμα· κενταυρίου χυλὸς τοῦ μικροῦ πινόμενος καὶ ἔξωθεν ἐπιτεθείς· ἀρνογλώσσου ξηραὶ ῥίζαι καὶ τὰ φύλλα· ἀσπαράγου μυακάνθου αἱ ῥίζαι καὶ τὰ φύλλα· στρόβιλοι, ἐρεβίνθοι, ξυροδοδάνου ἢ εὐπατωρίου ῥίζα· θέρμων πικρῶν ἀφέψημα μετὰ πηγάνου καὶ πεπέρους πινόμενον, καὶ ἔξωθεν ἐπιτιθέμενον· ἴρις, πιστακίου καρπός.

Κεφ. νθ'. Καταπλασσόμενα δὲ ὠφελεῖ ἡπατικούς χαμαιπίτυς μετὰ κωδίων ἐφθῶν ξηρῶν νεκομμένων· κριθίνον ἄλευρον μετὰ σύκων· ἄλθαίας ῥίζα ἐν οἴνῳ ἐψηθεῖσα· φοινικοβάλανος ἐφθὴ λεία σὺν κηρωτῇ· ἀψίνθιον σὺν κυπρίνῃ κηρωτῇ καὶ κελτικῇ νάρδῳ· ἀμμωνιακὸν ἀναληφθὲν ὅξει καὶ κηρωτῇ στυφούσῃ. Ἐπὶ δὲ τῶν προσφάτων τῆλις σὺν λινοσπέρμῳ, καὶ γύρῃ, καὶ μελικράτῳ· μηλοκυνδόνια μετὰ ἀλεύρου κριθίνου καὶ τήλεως ἐψημένα.

literque polii: picis aridae tritae drach. j. inspersa potui, meliloti seminis contriti drach. j. ex melicrato, costus simili modo, triphyllidis, quae oxalis dicitur, decoctum eodem modo potum, viticis semen, centaurii minoris succus, tum potus, tum etiam foris impositus, plantaginis siccae radices et folia, asparagi myacanthini radices et folia, strobili, cicer, rubiae aut eupatorii radix: lupinorum amarorum decoctum cum ruta et pipere potum, itemque foris impositum: iris, pistacia.

Cap. LIX. Hepaticos imposita iuvant chamaepitys cum papaverum capitibus coctis, quae sicca confusa fuerint, hordeacea farina cum ficibus, althaeae radix in vino decocta, phoenicobalanus cocta trita cum cerato, absinthium cum cerato cyprino et nardo celtica, ammoniacum exceptum aceto et cerato astringente. In recentiore autem affectu foenum graecum cum lini semine, farinae polline ac melicrato, mala cotonea cum farina hordei et foeni graeci cocta.



Κεφ. ξ'. Σπληνικούς δὲ ὠφελεῖ πινόμενα ἀγαρικοῦ ὄβ. β' μετ' ὀξυμέλιτος· ἄγνου σπέρμα < α', ἀγχούσης ῥίζης < α' ἐν οἴνῳ· ἀδιάντου ἀφέψημα ἐν ὀξυμέλιτι· ἀκόρου ῥίζα μετ' οἴνου ἐφθῇ καὶ ὠμὴ πινόμενη.

Κεφ. ξα'. Τήκουσι δὲ συντόμως σπλήνα ἀσπληνίος ἡ πόα, ἣν καὶ ἡμιόνιον καλοῦσιν, μετ' ὄξους ἀποζιθοῦσα ἐπὶ ἡμέρας μ'. λογχίτις ὁμοίως μετ' οἴνου· περικλυμένου καρποῦ < α' μετ' οἴνου ἐπὶ ἡμέρας δ' ποτιζομένη· χαμαίνισσος μετ' οἴνου· πευκέδανον μετ' ὀξυμέλιτος τήκει. Ναξίας τοῦ πρὸς αὐτὴν ἀκονηθέντος σιδήρου τὸ ἀπότρυμμα μετ' ὄξους· ἄλκυονίου μίλησιου ἡμιωβόλιον μεθ' ὕδατος· βρυονίας ῥίζα < α' μετ' ὄξους ἐπὶ ἡμέρας λ' τήκει σπληνας· ἀμμωνιακοῦ θυμιάματος < α' μετ' ὀξυκράτου· αἷμα δὲ ἄγει δι' οὐρῶν ἀριστολογίας < α' μετ' ὀξυκράτου· βάλανου μυρεψικῆς < α' μετ' ὀξυκράτου· ἐστὶ δὲ κακοστόμαχος καὶ ἐμετική· ξυλοβαλσάμου ἀπόξεμα μετ' οἴνου· βουνίου τὰ φύλλα, καὶ ἡ ῥίζα χυλισθεῖσα σὺν ὀξυμέλιτι· ἐρουθροδάνου καρπὸς καὶ ἡ ῥίζα σὺν οἴνῳ· ἴρεως < α' σὺν ὀξυκράτῳ· σὰρξ ἐχίνου

Cap. LX. Spleneticos adiuvant haec pota: agarici oboli duo cum aceto mulso, viticis semen drach. j. pondere, anchusae radicis drach. j. cum vino, adianti decoctum in oxymelite, acori radix cum vino cocta crudaque bibita.

Cap. LXI. Lienem brevi absumunt asplenia herba, quam et hemionium vocant, aceto infusa et per dies XL pota, similiter et lonchitis in vino, seminis periclymeni drach. j. ad dies quatuor cum vino pota, chamaecissos cum vino, peucedanum cum oxymelite: id quod e cote naxia ferro acuendo deteritur cum aceto: alcyonii milesii obolus dimidius ex aqua, bryoniae radix drach. j. pondere diebus XXX pota: ammoniaci thymiamatis drach. j. cum posca: (sanguinem vero per urinas educit:) aristolochiae drach. j. cum posca, glandis unguentariae drach. j. cum posca: (est autem infesta stomacho et vomitus ciet:) xylobalsami infusum e vino, bunii folia et expressus e radice succus cum oxymelite, rubiae semen et radix cum vino, iridis drach. j. cum

χερσαίου ἐσκελετευμένη μετ' οἴνου, σμυρνίου σπέρμα μετ' οἴνου, θέρμων ἀπόξιμα καθ' ἑαυτό· καππάρως ὁ ἐκ τῶν ἀπίων καρπὸς ἐπὶ ἡμέρας λ' μετ' οἴνου, καὶ ἡ ῥίζα ὁμοίως· ἄγει δὲ ὁμοίως αἷμα καὶ διὰ κοιλίας καὶ οὔρων· κέστρου < α' μετ' ὄξους· κηκὶς ὀμφακίνη σὺν ὀξυκράτῳ· ὀριγάνου ἀπόξιμα· κοραλλίου < α' σὺν ὕδατι· κράμβη ὠμὴ μετ' ὄξους ἐσθιομένη, κροκοδαλίου ῥίζα πινομένη· αἷμα δὲ ἄγει διὰ ῥινῶν· κυκλαμίνου τῆς κισσανθέμου καρποῦ λεανθέντος πεπείρου, καὶ εἰς τροχίσκους ἀναληφθέντος ξηροῦ < α' μετ' οἴνου ἐπὶ ἡμέρας μ' τῆκει κούφως, ἐξαιρομένου καὶ κατὰ κοιλίαν ἐκδιδομένου· λεπίδος σιδήρου < α' μετ' ὄξους· λογχίτιδος σὺν ὄξει ἀποξέσθεισης τὸ ἀπόξιμα· μίλτου ληννίας < α' σὺν ὀξυκράτῳ· μυρική ἀπόξιμα ἢ τὸ σπέρμα σὺν οἴνῳ ποθέν· καὶ ποτηρίῳ ἀπὸ τοῦ μυρικίνου ξύλου ὠφελίμως χρήσαιο ἂν τις ἐν αὐτῷ πίνων· καὶ κανὼ τῷ ἐκ ῥάβδων μυρικίνων πεπλεγμένῳ εἰς τὴν τῶν ἄρτων ἐπίθειν· ποιεῖ καὶ νάρδος κέλτικὴ σὺν ἀψινθίῳ· νυμφαίας σπέρμα ἢ ῥίζα σὺν ὄξει τῆκει· σέρως καρποῦ < α' σὺν ὄξει· πόλιον σὺν ὄξει·

posca, erinacei terrestres caro assiccata cum vino, smyrnii semen cum vino, lupinorum infusum per se: capparis e fructibus pyriformibus semen ad dies XXX ex vino potum: similiter et radix, quae e ipsa aequae ac semen sanguinem per alvum et urinas educit: betonicae drach. j. cum aceto mulso, galla immatura cum posca, origani infusum, corallii drach. j. cum aqua, brassica cruda cum aceto esitata, crocodilii radix epota: (haec vero sanguinem per nares pellit:) cyclaminis alterius, quae cissanthemos cognominatur, fructus maturus tritus et in pastillos digestus drach. j. pondere lienem leviter ad dies XI liquat, ac per urinas et alvum absumit. Squamae ferri drach. j. cum aceto, lonchitidis in aceto fervefactae infusum, rubricae lemniae drach. j. cum posca: tamaricis infusum aut semen cum vino potum: quin et vas potorium e tamaricis ligno utile fuerit, sicuti et panarium, quod e tamaricis virgis contextum sit. Proficit et nardus celtica cum absinthio, nymphaeae semen aut radix cum aceto, intubi seminis drach. j. cum aceto, polium cum aceto, sa-

σαγαπηνόν < α' σὺν ὀξυκράτῳ, στρουθίου < α' σὺν ὀξυμέλιτι· πολεμωνίου ῥίζα σὺν οἴνῳ· πορφύρας πῶμα σὺν σελίνου σπέρματι πινόμενον, καὶ ἡ πῶα ἐψηθεῖσα οἴνῳ σὺν ὀξυκράτῳ· ὕδωρ τὸ ἀπὸ τῶν χαλκείων, ὅπου τὸν πεπυρωμένον σίδηρον ἀποβάπτουσι· σκίλλης ὀπτῆς < α' σὺν ὀξυμέλιτι· σκίλλαν περιπλάσας ὀπτῆσον, καθάρας τρίψον· καὶ ἄρας ἐξ αὐτῆς καταπότια δίδου ἐν θ' ἡμέραις σὺν μελικράτῳ· τευκρίου ἐνεψημένου ἐν ὀξυκράτῳ τὸ ἀπόζεμα· ῥοῦ < δ', χαμαΐδρους ἀφέψημα σὺν μελικράτῳ· γίνεται δὲ ἐκ τῶν φύλλων αὐτῆς καταπότια καὶ δίδοται· τραγοριγάνου ἀπόζεμα μετὰ ἁλατος καὶ ὄξους· ἐρπύλλου ὁμοίως.

Κε φ. ξβ'. Καταπλασσόμενα δὲ παραλαμβάνεται ὠφελίμως ἐπὶ τῶν σπληνικῶν· ὕσσωπον μετὰ σύκων· τέφρα κληματίνη, ἥ καὶ γιγάρτων τέφρα, σὺν ὄξει, ῥοδίνῳ καὶ πηγρῶ· χαμαικίσσου φύλλα καὶ κνίδης φύλλα μετὰ κηρωτῆς· βρυνίας ῥίζα μετὰ σύκου καὶ ὄξους· ἀμμωνιακὸν σὺν ὄξει καὶ κηρωτῇ στυφθείσῃ· ἄσπληνος πῶα μετὰ ὀρόβου καταπλασσομένη· ἀγάλλοχον σὺν οἴνῳ ἢ ὕδατι· ἀψίνθιον ἐψη-

gapeni drach. j. cum posca, struthii drach. j. cum oxymelite, polemonii radix e vino, purpurae operculum cum apii semine potum, et (apii) herba cum vino, addita posca, cocta: aqua fabrorum, in quam ferrum candens immergitur, scillae tostae drach. j. cum oxymelite: eandem subacta farina obvolutam assato, purgatam terito, fingitoque ex ea catapotia diebus novem exhibenda cum melicrato. Valet et teucris in oxycrato decocti infusum, rhois drach. iiij., chamaedryos decoctum cum melicrato: sunt et e foliis eius catapotia, quae in splenis affectibus exhibentur, tragorigani infusum cum sale et aceto: similiter et serpylli.

Cap. LXII. Splenicis admovenda utiliter haec usurpantur: hyssopus cum ficibus, cinis sarmentorum aut etiam acinorum cum aceto, rosaceo unguento et ruta, chamaecissi et urticae folia cum cerato, bryoniae radix cum ficibus et aceto, ammoniacum cum aceto et cerato et aromatibus inspissato, asplenon herba cum ervo imposita, agallochum cum vino vel aqua, absinthium in aceto

θὲν ἐν ὄξει σὺν ἀλεύρῳ αἰρίνῳ καὶ σύκοις· γλήχων σὺν ἁλσὶν ἴσοις· ὀρίαντον ὁμοίως· θέρμινον ἄλευρον, σὺν πίσση καὶ ὄξει ἐψηθέν· ἱξὸς θερμὸς ἀσβέστῳ ἀναληφθεὶς, ἢ λίθῳ ἀσσίῳ· ἰσατέως ἀγρίου φύλλα, καππάρεως ῥίζα· πράσιον σὺν κηρωτῇ, ἢ ὦμῃ λύσει· κάρδαμον σὺν σύκοις· κισσοῦ φύλλα ἀπαλὰ καὶ οἱ κόρυμβοι λεῖοι· λαπάθου ἀγρίου ῥίζα σὺν ὄξει· λινόσπερμον, ἢ τῆλιν, φυραθέντα ἐν ὄξει, μιγείσης καππάρεως ῥίζης, ἢ μυροβαλάνου, ἢ νίτρου· κυδωνία μῆλα σὺν κηρωτῇ· μουσίκης φύλλα λεῖα σὺν ῥοδίῳ, ἢ κηρωτῇ· πόλιον σὺν ὄξει· στυπτηρία σὺν μέλιτι· κυκλάμινος μετ' ὄξους ἐφθῇ καταχρισμένη· κροκόμαγμα μετ' ὄξους ἐφθὸν καταχρισμένον· σποδὸς, ἢ ἀπὸ χαλκείου ἀναβληθεῖσα, σὺν ὄξει ἢ ῥοδίῳ, ἄχρις ἂν γλοιωθῇ· τῆλιν, καὶ νάπυ, καὶ εὐζωμόν, καὶ κάρδαμον, καὶ σμύρνα, καὶ ἄσβεστος, ἴσα μετ' ἱξοῦ· διὲ δὲ θερμαίνειν τὸν ἱξόν, καὶ οὕτως λοιπὰ μινῶναι· καὶ ἀνισον, νίτρου ἀφρὸς καὶ ἄσβεστος, ἴσα μέλιτι ἀναληφθέντα· ἢ τῆλιν, καὶ νάπυ, καὶ εὐζωμόν, καὶ κάρδαμον, καὶ ἄσβεστος, ἴσα σὺν μέλιτι ἀναληφθέντα, ἢ ὄξει, ἢ κονία· ἄσβεστος καὶ

coctum farina loliacea et ficubus, pulgium cum salis pari portione, origanum eodem modo, lupinorum farina cum pice et aceto cocta, viscum calens, calce viva vel lapide assio exceptum, isatidis sylvestris folia: capparis radix, marrubium cum cerato vel hordeacea farina hydrelaeo subacta, nasturtium cum ficubus, hederæ folia tenella et ipsi quoque corymbi triti: lapathi agrestis radix cum aceto, lini semen aut foenum graecum cum aceto subactum, addita radice capparis, aut myrobalano, aut nitro: cotonea mala cum cerato, tamaricis folia trita cum rosaceo unguento vel cerato, polium cum aceto, alumen cum melle, cyclamen in aceto cocto et illita, crocomagma cum aceto coctum et inunctum, cinis, qui e fabrorum officinis reiiicitur, cum aceto aut rosaceo ad viscidum lentoris compagem redactus. Foenum graecum, sinapi, eruca, nasturtium, myrrha et calx viva, aequis partibus immixta, visco prius calfacto: sic et anisum, nitri spuma et calx viva, aequis partibus excepta melle. Aliud: foenum graecum, sinapi, eruca, nasturtium et calx viva, aequali singula



σμέρνα ἴσα μετ' ἐλαίου· θέρμαινε δὲ τὸ ἐλαιον, καὶ οὕτως τὰ λοιπὰ μίσγε.

Κεφ. ξγ'. Πρὸς ὑδρωπικούς δὲ ὡφελεῖ ποτὰ ἀγαρικοῦ τριώβολον μετ' οἴνου· ἄγνου σπέρματος ἑξάγιον<sup>69</sup> α'· ἄγνου ἀφέψημα· ἀκτῆς ῥίζης ἀφέψημα, ἢ τοῦ καρποῦ λείου < α' σὺν οἴνου κυ. β'· ἀλκυόνιον μιλῆσιον μεθ' ὕδατος· ἀμπέλου ἀγρίας (τῆς καλουμένης ῥωμαϊστὶ οὐίτικλης) τῆς ῥίζης τοῦ ἀγεψήματος μετ' οἴνου τεθαλασσωμένου κυ. γ'· ἀναγαλλίδος χυλοῦ κυ. α' καθ' ἑαυτόν· ἀνδρυσάκους ἀφέψημα τῆς πόας, ἢ αὐτὴν κόπτοντα διδόναι μετ' οἴνου, ἢ ὄξους, ἢ ὕδατος· οὖρα δὲ ἄγει πολλά· καὶ ὁ καρπὸς δὲ ποιεῖ ὁμοίως· ἀρονόγλωσσόν μετὰ τὸ ξηροφαγῆσαι, ὀλίγον ἐπεσθιόμενον καθ' ἡμέραν· μετὰ δὲ τοῦτο ἡ λοιπὴ τροφή προσαχέσθω· χαμαιακτῆς ῥίζης τοῦ φλοιοῦ < α', πέπλιον μετ' οἴνου πινόμενον ποιεῖ· σχοίνου < α' μετ' ἴσου πεπέρως· σῦκα ξηρὰ ἐσθιόμενα· σμυρνίου σπέρμα σὺν οἴνῳ· καὶ ὑπερικοῦ καρποῦ

69) Ἑξάγιον, mensura, quam et ἑξάγιον scribunt, post Constantini M. aetatem in numis aureis usurpata, pondus quatuor scrupulorum constituit. Dein transit ad medicos, qui fere drachmae aequale habuerunt. (Fuchs. ad Nicol. Myreps. sect. 1, 5. 9.)

pondere excipiantur melle, vel lixivio. Aliud: calx viva et myrrha aequali pondere cum oleo prius calfacto misceantur.

Cap. LXIII. Hydropicis haec in potu auxiliantur: agarici tres oboli cum vino, viticis seminis sextula, eiusdem decoctum: sambuci radicis decoctum, aut seminis eiusdem triti drach. j. cum vini cyathis duobus: alcyonium milesium cum aqua: decocti radicis vitis sylvestris, quae latine viticula dicitur, cyathi tres cum vini aqua marina diluti cyathis tribus: succi anagallidis cyathus unus per se. Androsaces herbae decoctum, aut eadem contusa exhibeatur e vino, vel aceto, vel aqua: ducit autem copiosas urinas: sed et semen eadem praestat. Plantaginis non nihil, praesumptis siccioribus eduliis, quotidie comedatur, insuperque deinde cibi reliqui assumantur. Iuvat et cortex radicis ebuli drach. j. pondere, nec non poplium cum vino potum: schoeni drach. j. cum pari piperis quantitate, caricae esitatae, smyrnii semen cum vino,

< α', κέστρου φύλλων < α' μετ' οἴνου· ἐρέβινθοι ἐφθοὶ ἐσθιόμενοι· καὶ ἀρτυόμενοι δὲ στάχυϊ πεπέρεως, κυμίνῳ, καὶ ἐλαίῳ· κρόμμυα σὺν τοῖς φύλλοις ἐφθὰ, καὶ ὠμά δὲ διδόμενα· ἢ κίκεως κόκκοι κ' ὡς καταπότια· ὅξος σκίλλινον καταζήφουμένον· ὀρίγανος μετὰ σύκου βιβρωσκομένη· πηγάνου ἀφέψημα σὺν ὄξει πινόμενον· σικύου ἀγρίου ῥίζα ἐν οἴνου ἐζήτινωμένου κυ. β'· δεῖ δὲ λαμβάνειν ἐκ τούτου κυ. γ' ἢ δύο παρ' ἡμέρας γ' ἢ δ', ἕως ἂν ἱκανῶς ὁ ὄγκος συσταλῇ· μαλακῶς ὕδαρές ὑποχωρεῖ, καὶ οὔτε στόμαχόν λυμαίνεται, καὶ τὰς δυνάμεις τηρεῖ· καρκίνοι ποτάμιοι ξηροὶ λεῖοι χωρὶς τῶν χηλῶν καὶ ποδῶν, μετ' ὀλίγου ὀπίου καὶ ὕδατος πινόμενοι· κοράλλιον μετὰ στυπτηρίας ἴσης καὶ χυλοῦ καλαμίνθης, οἴου ἀφέψημα σὺν οἴνῳ· σκίλλης ὀπτῆς < α' σὺν ὀξυμέλιτι· μυττωτὸν ἐσθιόμενον καὶ σκόροδον ἐφθὸν ἀντὶ δριμυφαγίας· ἐχίνου χερσαίου σὰρξ σκελετευθεῖσα, καὶ διδομένη μετ' οἴνου· ὀπόφυλλον πινόμενον μετ' οἴνου· οὔρον αἰγὸς μετὰ γάρδου στάχυος πινόμενον κυ. β' πλήθος κατ' ἡμέραν νήστειν· δι'

seminis hyperici drach. j., betonicae foliorum drach. j. cum vino, cicer coctum, in cibis sumptum, idem conditum spica piperis, cymino et oleo: cepae cum suis foliis coctae, aut etiam crudae exhibitae: ricini grana XX catapotiorum instar deglutita, acetum scilliticum absorptum, origanum cum sicu esitatum, rutae decoctum cum aceto potum: cucumeris sylvestris radix cum vini resinati cyathis duobus: de hoc cyathos duos tresve sumi oportet, interiectis tribus quatuorve diebus, usquedum tumor plurimum subsederit: leniter aquosa detrahit, nec stomachum offendit, ac vires etiam conservat. Valent et cancri fluviales siccati tritique citra forcipes denticulatos ac pedes cum exiguo opii et aqua poti, corallium cum pari alumine et succo calaminthae, sii decoctum cum vino, scillae assatae drach. j. cum oxymelite, intritum ex alliis in cibo sumptum, et allium quoque coctum acrioris vice condimenti, erinaeei terrestris caro inveterata et cum vino potui data, silphii semen in vino potum, urina caprae cum spica nardi duum cyathorum mensura quotidie a ieiunis pota: sic copiosa fiet per urinas evacua-

οὔρων δὲ <sup>70</sup> κενωθήσεται πλήθος ἱκανόν· οὔρον συνάγρου ὁμοίως· σκίλλα χυλισθεῖσα, μγέντος ὀροβίνου ἀλεύρου· δίδου δὲ < α' σὺν οἴῳ πίνειν· πόλιον σὺν οἴῳ ζεσθέν· σαμψύχου ἀπόζεμα· πήγανον σὺν σύκῳ ἐσθιόμενον· ἐκ διαλείμματος δὲ, ἀφέψημα ῥιζῶν σελίνων, ἢ ἀσπαράγου <sup>71</sup>, ἢ σχοίνου, ἢ νάρδου στάχυος, ἢ ἀσάρου, κασσίας ὁμοίως, καὶ κυμίνου, γλυκυῤῥίζης, ὑπερικοῦ, σμυρνίου, καλάμου ἀρωματικοῦ, πτέρως, σεσέλεως, σφονδυλίου, πάντα ἴσα μίξας, τὸ ἀφέψημα πότιζε μετ' οἴνου, καὶ καθ' ἑαυτὰ δὲ ὁμοίως.

Κεφ. ξδ'. Ἐπὶ δὲ τῶν κατὰ σάρκα σταφυλίνου ἀγρίου σπέρμα σὺν οἴῳ· χαμαῖδρος ἀφέψημα· βοάθῃ ξηρὸν λείον σὺν οἴῳ διουρεῖν ποιεῖ· τριφυλλίδος ῥίζης < β' ἐν ὕδατι, ἢ ἐν οἴῳ· χαμαιλέοντος λευκοῦ ῥίζης < β' μετὰ γλυκέως, καὶ τὸ ἀφέψημα δὲ τῆς ῥίζης λαμβανόμενον ἱσχυαίνει· χυσοκόμης δεσμίδιον, ὥν λείον σὺν οἴῳ· ψυλλίου σπέρματος < α' μετ' ὕδατος κυ. γ', τριβόλου ῥίζης < α' μετ'

70) In Augustano codice legitur αἰωρεῖσθωσαν δὲ καὶ κεν. Sed verbum αἰωρεῖσθαι, attolli, gaudio etiam exsultare, apud medicos insolens, huc neutiquam quadrat. Hinc Moibani coniectura arridet, quam textui inserui.

71) Sarac. sic loco σποράν codicis August.

tio. Iuvat et apri urina simili modo, itemque expressus e scilla succus, admixta ervi farina, drach. j. pondere cum vino potui datus, polium cum vino fervefactum, sambuchi decoctum, ruta cum ficu esitata. Per intervalla autem exhibetur decoctum radicum apii, vel asparagi, vel schoeni, vel spicae nardi. Aut: cassiae, amomi, cymini, glycyrrhizae, hyperici, smyrnii, calami aromatici, piperis, seselis, sphondylii, omnium inquam pari pondere mixtorum decoctum e vino propinato. Singula etiam illa per se similiter decocta proderunt.

Cap. LXIV. Iis vero, qui hydrope hyposarca dicto laborant, ista medentur: dauci sylvatici semen cum vino, chamaedryos decoctum: sabina sicca trita cum vino hydropicos per urinas exinanit: trifolii radice drach. ij. in aqua aut vino: radice chamaeleonis albi drach. ij. cum passo, radice etiam decoctum potum extenuat: chrysocomae fasciculus, ovum tritum cum vino, psyllii seminis

ἀκράτου κυ. γ' πινομένη· κνεώρου < α' μετὰ ἄλων < α' καὶ μελικράτου· ἡρύγγης ῥίζα ξηρὰ μετ' οἴνου, καὶ τὸ ἀφέψημα αὐτῆς πινόμενον οὖρα λύει· χαλκοῦ κεκαυμένου < α' μετ' οἴνου ἀλύπως ἄγει ὕδωρ· κρότωνος κόκκους τρίψας μ', δίδου μεθ' ὕδατος· εἰσὶ δὲ λίαν κακοστόμαχοι· ὠφελεῖ καὶ αἶμα σκύλακος κυνὸς, σὺν ὀξυκράτῳ πινόμενον· πίνεται δὲ ὠφελίμως ὑακίνθου σπέρματος < α' ἐν τρισὶν ἡμικοτυλίοις οἴνου λευκοῦ· ἄγει δὲ δι' οὖρων πολλάκις ξέ· ε', ε'· δεῖ δὲ τὸν οἶνον χλιαίνειν, καὶ τὸ ἄνθος κόπτειν, καὶ ὡς ἄλφιστα ἐπιπάσσειν, καὶ οὕτω ποτίζειν· εἰώθασι δὲ τινες τῷ ἄνθει δέσματα βάπτειν.

Κεφ. ξέ'. Καταπλασσόμενα δὲ ὑδρωπικούς ὠφελεῖ βολβοὶ μετὰ μέλιτος· οὗτοι δὲ ἱκανῶς στέλλουσιν· ἀψίνθιον, ἢ ὕσσωπον μετὰ σύκου ἢ ὄξους, καὶ αἰγίνου ἀλεύρου· βόλβιτα ξηρὰ θερμοανθέντα σὺν ὀξυκράτῳ καὶ μέλιτι· προσέμπασαι δὲ θείου ἀπύρου τέταρτον μέρος· σπύραθοι αἰγίοι ἐψηθεῖσαι ἐν οὖρῳ παιδὸς ἀφθόρου· θέρμινον ἄλευρον, καὶ κισσοῦ φύλλα ἐψηθέντα ἐν οἴνῳ, λαῖα· ἢ σύκων διπλάσιον

drach. j. cum aquae cyathis tribus, tribuli radice drach. j. cum meri cyathis tribus pota, cneori drach. j. cum pari quantitate salis et melicrato: eryngii radix sicca cum vino, vel eiusdem decoctum potum urinas concitat. Aeris usti drach. j. cum vino citra molestiam aquas educit. Ricini grana XI confrita dato ex aqua: sunt autem valde infesta stomacho. Iuvat et sanguis catelli cum posca bibitus. Utiliter etiam bibitur hyacinthi seminis drach. j. in vini albi sesquihemina: saepenumero quinque sexve sextarios per urinas educit: oportet autem vino prius tepefacto florem confusum polentae instar inspergere, atque ita propinare. Sunt, qui hoc flore coria tingere soleant.

Cap. LXV. Haec vero imposita hydropicis auxiliantur: bulbi cum melle illiti: (egregie namque tumorem reprimunt:) absinthium vel hyssopus cum ficu, babulum stercus siccum cum posca et melle calfactum, aut aceto et farina loliacea, cui sulphuris vivi quartam partem insperseris: baccae caprinae in pueri impubis urina coctae, lupinorum farina et hederæ folia trita in vino cocta, cupressus et nitrum cum



πρὸς κυπάρισσον καὶ νίτρον· ἕξος θερμανθεὶς σὺν ἄσσιᾳ λί-  
θῳ, ἢ ἁσβέστῳ· ἑλλέβορος μέλας μετ' οἴνου καὶ κριθίνου  
ἀλεύρου· φαιδὸς ὁ ἐπὶ τῶν τελμάτων, ἐπὶ κεραμίδος θερμῆς  
ἀναξηρανθεὶς, καὶ οἶνῳ πυραθεὶς, θεῖος· καὶ κοχλῖαι ἰεὶ σὺν  
ταῖς σαρκὶν ὁμοὶ λεῖοι· οὐ πρότερον γὰρ ἀφίστανται, ἐὰν  
μήπως ἐξικμασθῇ τὸ ὑγρόν· νίτρον μετὰ σύκου, ἢ ἁψινθίου,  
ἢ ὑσώπου· στυπτηρία πᾶσα σὺν στέατι· μυρσίνης φύλλα  
σὺν κηρωτῇ μυρσινίνῃ· σῦκα ξηρὰ ἐφθὰ ἐν οἶνῳ μετὰ ἀλεύ-  
ρου κριθίνου καὶ ἁψινθίου· σῦκον, νίτρον, καστίοριον, πρά-  
σιον, λῆα· καὶ κώδιον καταχρισθὲν ἀμόργῃ καὶ ἐπιτεθέν·  
διουρεῖν δὲ ποιεῖ καλαμίνθη μετὰ ὄξους καὶ πεπέργως, κη-  
ρωτῇ ἀναληφθεῖσα, καὶ ἐπὶ τὸν ὀμφαλὸν ἐπιτεθεῖσα· ποιεῖ  
δὲ ἔτι τὸ αὐτὸ καὶ πρὸς ἰκτερικοὺς καὶ νεφριτικοὺς· ὠφελεῖ  
δὲ καὶ ἡ δι' ἄλῳν καὶ ἐλαίου τρίψις πολλή, μιννυμένου πο-  
τὲ ὀριγάνου κεκομμένου καὶ σεσημένου· ἐνίοτε δὲ καὶ κα-  
ταπλάσσονται τούτοις, τῷ τε ἁλὶ καὶ τῇ ὀριγάνῳ ἴσοις,  
γλοιοποιηθεῖσι σὺν ἐλαίῳ παλαιῷ· θερμὰ δὲ καταπλάσσειν  
δεῖ· ὠφελεῖ δὲ καὶ ἡ διὰ τῶν πεφυσημένων καὶ ἀληλειμμένων

dupla parte ficuum, viscum cum assio lapide et calce vi-  
va calefactum, elleborus niger cum vino et hordeacea fa-  
rina: lens palustris super testa seu tegula calente exsicca-  
ta et cum vino subacta divinum est remedium: cochleae  
quindecim crudae cum suis carnibus contritae: agglutina-  
tae siquidem non prius amoveantur, quam totus exhausti-  
atur humor: nitrum cum ficu et absinthio aut hyssopo,  
aluminis genus quodlibet cum adipe, myrti folia cum ce-  
rato myrteo, caricae in vino coctae cum farina hordea-  
cea et absinthio: ficus, nitrum, castorium, marrubium,  
simul contrita: pellis ovilla inuncta amara et imposita.  
Ceterum urinas movet calamintha, additis aceto et pi-  
pere, cerato excepta et umbilico imposita: atque idem  
praestat auxilium tum ictericis, tum etiam nephriticis.  
Iuvat et frictio multa ex sale et oleo, addito interdum  
origano tuso cribratoque. Interdum et e salis et origani  
aequis partibus cum oleo vetere ad strigementitiam com-  
pagem redactis fit cataplasma, quod calens imponendum  
est. Est et utile vesicis inflatis et inunctis partes tumentes

κύστεων πληῖσις καθ' ἡμέραν ἐπιτηδευομένη. Ἄλλο· βοείας κόπρου κεκαυμένης, νίτρου, γύψου, ἰσχάδων, ἀνὰ γο. γ', ὄξους τὸ ἀρκοῦν φυράσας, ποιήσον ἐμπλαστρον μετὰ ῥά-  
κους, καὶ ἐπίδησον.

Τὰ πρὸς τὰς ἔλμινθας βοηθήματα.

Κεφ. ξξ'. Τὰς δὲ πλατείας ἔλμινθας ἐκτινάσσει πι-  
νόμενα καρδάμων συν ὕδατι, μόρων ῥιζῶν ὁ φλοιὸς ἐψη-  
θεὶς ἐν ὕδατι· ὀνοχείλου τοῦ Ἀλκιβιάδιου ἢ ῥίζα καὶ τὰ  
φύλλα πινόμενα· πετρίδος < ε' συν σκαμμωνίας ὀβολοῖς  
δυσὶ καὶ ἁλσί· προσκοροδοφαγείτω δὲ ὁ μέλλων πίνειν· πε-  
πέρεως καὶ ἐλαγίου κέρατος κεκαυμένου ἴσα συν ὄξυκράτῳ·  
καὶ αὐτὸ τὸ κέρας συν μέλιτι ἐκλειχόμερον· ῥοιᾶς τῶν ῥιζῶν ἀφέ-  
ψημα· σκόροδα ἐσθιόμενα συνεχῶς· ὕσσωπον μετὰ καρδάμου καὶ  
συν σκαμμωνίας ὀβολοῖς δύο ποθέν· ἡλιοτρόπιον τὸ μικρὸν πινό-  
μενον· κάρου βασιλικὰ πολλὰ βρωθέντα· κορίου σπέρμα ὀλίγον  
ποθέν μετὰ ἐλαίου καὶ σιραίου·<sup>72</sup> προσέχειν δὲ δεῖ πλήθει· χα-

72) Σιραίῳ, τῷ γλεύζει ἐψήματι. Galen. expos. voc. Hipp. p. 560.

quotidie verberare. Aliud: stercoris bubuli cremati, ni-  
tri, gypsi, caricarum an. unc. iij. subigito, et ex iis fin-  
gito emplastrum linteo inducendum et superligandum.

*Ad vermes remedia.*

Cap. LXVI. Vermes latos haec bibita pellunt: car-  
damomum cum aqua, mori radicum cortex in aqua co-  
ctus, onochilis, quod et Alcibiadion dicitur, radix et fo-  
lia: filicis radicis drach. j. semis cum scammoniae obolis  
duobus et sale: verum qui hoc remedium sumpturus est,  
allia prius edat oportet: piperis et cornu cervini usti pa-  
res portiones cum posca: ipsum quoque cornu cervinum  
cum melle delinctum, mali punicae radicis decoctum, al-  
lium frequenter in cibis sumptum, hyssopus cum nastur-  
tio et scammoniae obolis duobus bibita, heliotropium mi-  
nus potum, nuces iuglandes multae esitatae, coriandri se-  
minis exiguum cum oleo et defruto potum: sed ab ipsius

μαϊλέοντος λευκοῦ ὄξυβάφου πλήθος μετὰ οἴνου καὶ ὀριγάνου ἀφεψήματος· χαλκάνθου < α' σὺν μέλιτι ἐκλειχόμενη· πεπέρεως καὶ καρδάμου ἀνὰ < α', νίτρου, σκαμμωνίας ἀνὰ < α' δίδου· προσκοροδοφαγηκόςτος ἐπὶ ἡμέρας γ', ἐπιπνίετω δὲ ἄλμης κυ. β'.

Κεφ. ξζ'. Τοὺς δὲ στρογγύλους ἔλμεις ἄγει ἔλαιον ποθέν· ἢ κίκι μετὰ ὕδατος πινόμενον· θέρμιοι πικροὶ ἐσθιόμενοι· ἢ τὸ ἐξ αὐτῶν ἄλευρον ὠμὸν μετὰ μέλιτος ἐκλειχόμενον· καὶ μετὰ ὄξους δὲ ποθέν, συντόμως ἐκτινάσσει· ἢ ὡς ἄλφιτον ἐπιπλασθέν· πίνεται δὲ καὶ τὸ ἀφέψημα αὐτῶν μετὰ πηγάνου καὶ πεπέρεως· νάπυ μετὰ θύμβρας ἢ ἡδυόσμου· καλαμίνθη σὺν ἄλσι καὶ μέλιτι ἐφθῇ, καὶ ὠμὴ ἐσθιομένη· καὶ ἀσκαρίδας δὲ ἐκτινάσσει σὺν κράμβης ὠμῆς χυλῶ καταρροφούμενῃ, ἢ σὺν ὕδατι ὀμβρίῳ· πήγανον ἐλαίῳ ζεσθέν καὶ ποθέν· ἢ ἡδυόσμου χυλὸς ροφούμενος· αἰζώου χυλός· ἀβροτόνου ἀπόξιμα· κύμινον ἀντὶ ἀλφίτου ἐπιπασσόμενον ὄξυκράτῳ· ἀνδράχην ἐσθιομένην, καὶ ὁ χυλὸς πινόμενος· σερίφου ἀπόξιμα, ὃ ἐνιοὶ ἀψίνθιον θαλάσσιον καλοῦσι, σὺν ἄλσι καὶ

copiosiore frequentioreque usu cavendum: chamæleonis albi acetabulum cum vino et origani decocto, chalcanthi drach. j. cum melle lincta. Aliud: piperis, nasturtii, nitri, scammoniae an. drach. j.: de his simul mixtis portio exhibeatur: debent vero praesumi allia per triduum, et superbibi muriae cyathi duo.

Cap. LXVII. Teretes vero lumbricos expellunt oleum potum, galla bibita ex aqua, lupini amari in cibo sumpti, aut farina ex iis cruda cum melle delincta: eadem cum aceto pota brevi eos excutit, uti etiam polentae instar inspersa: bibitur et eorundem decoctum cum ruta et pipere, sinapi cum thymbra vel mentha, calamintha cum alsine et melle cocta, vel cruda esitata: expellit eadem ascaridas cum brassicae crudae succo vel aqua pluviali absorpta: ruta oleo incocta et pota, menthae succus epotus, sempervivi succus, abrotani infusum, cuminum polentae vice inspersum oxycrato, portulaca esitata, itemque succus eius epotus, seriphi (quod nonnulli absinthium marinum vocant) infusum cum sale,

ἐλαίῳ καὶ πυροῖς· ἢ σύκοις, ἢ μύξοις συγκαθειψμένον, ἢ ἄλευροις, ἢ ῥοφήματι· ἢ ξηρὸν ἐπιπασσόμενον ὡς ἄλφιτον καὶ πινόμενον· ἢ σαντονικὸν κοπέν, σὺν σταφίσειν, ἢ φοίνικιν, ἢ μετὰ σύκων βρωθέν· μελίας φλοιὸς ὡς ἄλφιτον ποθέν. Πρὸς ἔλμινθας παίδων ἡδυόσμου ἀπόζεμα πότιζε νήστεις. Καταπλασσόμενα δὲ ὠφελεῖ, κατὰ τοῦ ἐπιγαστρίου ἐπιτιθέμενα, θέρμινον ἄλευρον σὺν μελικράτῳ, ἢ μελάνθιον, ἢ αἶρινον ἄλευρον, ὁμοίως ἰσάτις· πρὸς ἔλμινθας, καὶ πᾶν θηρίον τὸ ἐν τῇ κοιλίᾳ, καταγάγῃς οὕτως· ἐνέγκας θέρμια πικρὰ, καὶ δαφνίδας μετὰ χολῆς ταυρείας λειώσας, καὶ ποιήσας ἔμπλαστρον, ἐπίθης τῷ ὀμφαλῷ τοῦ πάσχοντος, καὶ φασκίῳσον ἐπὶ ἡμέρας γ'.

Κεφ. ξη'. Ἀσκαρίδας κτείνει ἀξούγγιον παλαιὸν εἰς τὸν δακτύλιον καθιέμενον ἀντὶ βαλάνου.

Τῶν κατὰ τὴν μήτραν καὶ τ' ἄλλα γεννητικὰ μορία παθῶν βοηθήματα.

Κεφ. ξθ'. Τὰς δὲ τῆς μήτρας προπτώσεις στέλλει ἀνακίας χύλισμα, ἢ βάτου χυλὸς, ἢ σχίνου, ἢ ῥόδου τῆς ἐπὶ

oleo ac tritico, vel cum ficibus aut myxis farinave coctum, aut siccum polentae instar inspersum sorbitioni ac bibitum: santonicum tusum, cum uvis passis aut palmulis ficibusve manducatum: fraxini cortex instar polentae bibitus. Ad puerorum lumbricōs menthae infusum ieiunis propinato. Iuvant etiam abdomini imposita haec: lupinorum farina cum melicrato, nigella, aut loliacea farina, similiterque isatis. Ad lumbricos omneque animal e ventre deiiciendum lupinos amaros et lauri baccas cum felle taurino subigito, factumque inde emplastrum aegri umbilico adhibeto, fascia ad triduum superinducta.

Cap. LXVIII. Ascaridas necat axungia vetus ano glandis loco indita.

*Ad uteri reliquorumque genitalium membrorum affectus remedia.*

Cap. LXIX. Vulvae procidentias cohibent acaciae succus, rubi succus, aut lentisci, rhois opsoniorum succus



τὰ ὄψα ὁ χυλὸς διαχριόμενος· κνίδης κλάδος προσαπτόμενος· ἴου φύλλα καταπλαττόμενα· ἀπόπατος βοῦς νομάδος ἄρδενος ὑποθυμιώμενος· ἀριστολοχία λεία ἐν πεσσῷ μετὰ τινος τῶν στυφόντων· καὶ τὸ ἀπόζεμα αὐτῆς εἰς ἐγκάθισμα καὶ ὑπατμισμὸν· ἀσφαλτος ὑποθυμιωμένη· χαλβάνη καταπλασσομένη· κηκίδος ἀφέψημα· μυρσίνης, ἢ σχίνου, ἢ σιδίων ἀφέψημα εἰς ἐγκάθισμα.

Κεφ. ο'. Τὰς δὲ φλεγμονὰς τῆς ὑστέρας καὶ μύσεις καὶ ἀλγήματα, ἐφόμενα εἰς ἐγκαθίσματα, ὠφελεῖ ἄγνου σπέρμα, ἀλθαίας ῥίζα, ἀρτεμισία, βακχάριδος ῥίζα, γλήχων, δάφνη, ἴρις, κασσία, κάλαμος, σχοῖνος, κενταυρίου τοῦ μεγάλου ῥίζα, κόνυζα, κύπριος, λευκοῖων ἄνθη ξηρά· μαλάχη, μελίλωτον, κρίνων ἄνθη, λευκάνθεμον, πρῶσου κεφαλωτοῦ κόμη, σῦκα ξηρά μετὰ τήλεως ἢ πτισάνης, τῆλης, λινόσπερμον· ὑποθυμιώμενα δὲ ὠφελεῖ ἄγνου σπέρμα, βδέλλιον, κασσία, κάλαμος, λάδανον, λιβανωτίδος σπέρμα καὶ ῥίζα· καὶ (τὰ) πρὸς τὰ καρκινώδη ποιεῖ ῥητίνη τερμινθίνη σὺν σμύρῃ.

illitus, urticae ramulus applicitus, violae folia pro cataplasmate imposita, simum bovis armentarii masculi suffumigatum, aristolochia trita cum quopiam astringentium in pesso subdita: eiusdem etiam decoctum usurpatum ad in-sessionem ac suffitum, bituminis suffitus, galbanum pro cataplasmate impositum, gallae decoctum: myrti denique, aut lentisci, aut malicorii decoctum ad insessum.

Cap. LXX. Uteri inflammationes, praeclusiones doloresque decocta haec in sessione iuvant: viticis semen, althaeae radix, artemisia, baccharis radix, pulegium, laurus, iris, cassia, calamus et iuncus odorati, centaurei maioris radix, conyza, cyperus, leucii flores sicci, malva, melilotus, lilii flores, leucantheum, porri capitati coma, ficus aridae cum foeno graeco vel ptisana, foenum graecum, lini semen. Suffitu ad eadem conferunt viticis semen, bdellium, cassia, calamus, ladanum libanotidis semen et radix. Ad canerosas vero uteri affectiones facit resina terebinthina cum myrrha.

Κεφ. σα'. Προστίθεται δὲ πρὸς τὰς φλεγμονὰς καὶ τὰ ἀλγήματα ἄγνου σπέρμα λεῖον, ἀλθαίας ῥίζα ἐφθὴ ἐν μελικράτῳ μαλαχθεῖσα σὺν στέατι χοιρείῳ νεαρῷ καὶ τερεβινθίνῃ· ἀνθυλλίου ῥίζα λεία σὺν ῥοδίνῳ· ἀρογλώσσου χυλὸς ἐν ἐρίῳ, σόγγου ὁμοίως χυλὸς, ἀσκληπιάδος χυλὸς ἢ τὰ φύλλα προστιθέμενα, βούτυρον ὁμοίως· τήλεως ἀφειρημένης ὁ ἀποθλιβείς χυλὸς, μιγείς στέατι χοιρείῳ, ἢ βουτύρῳ προσφάτῳ· κνίκου ῥίζα ὀπτὰι σὺν ῥοδίνῳ, καὶ τὰ ἄνθη σὺν κηρωτῇ, καὶ μυελῷ, καὶ στέατι· λινὸσπερμον ἐψημένον σὺν κρόκῳ καὶ χοιρείῳ στέατι· ὕσσωπον σὺν βουτύρῳ καὶ μελιλώτῳ· οὖρου ἀνθρωπίνου ὑποστάθμη σὺν κύπρινῳ· περιστρεφῶν σὺν στέατι χηνείῳ καὶ τερεβινθίνῃ ὁμοίως· μυελὸς ἐλάφειος σὺν σουσίνῳ· στύραξ ἀνεθείς σὺν κύπρινῳ· χρίσματα δὲ ἀρμόζει πρὸς τὰ αὐτὰ ἴρινον, κύπρινον, ἀμαράκινον· τὸ τοῦ ἐλαιοῦ λῆπος, ὃν ῥωμαῖστὶ γλῆρις καλοῦσιν· ἐνέμενα δὲ μαλάσσει καλῶς ἀλεύρου κριθίνου χυλὸς μετὰ ὕδατος ἐψηθεὶς, ἄλικος, ἢ ὀρύζης, ἢ τήλεως, ἢ λινოსπέρμου, ἢ μαλάχης χυλὸς ὁμοίως.

Cap. LXXI. Ad uteri autem inflammationes ac dolores forma pessi subiiciuntur viticis semen tritum, althaeae radix cocta in melicrato subactaque cum adipе snillo recenti ac terebinthina: anthyllidis radix trita cum rosaceo, plantaginis succus vellere exceptus, sonchi succus eodem modo, asclepiadis succus aut folia apposita, similiter et butyrum: succus e decocto foeno graeco expressus, snillo adipi aut recenti butyro admixtus: cnici radices assae cum rosaceo, et flores eiusdem cum cerato, medulla et adipе: lini semen coctum cum croco et snillo adipе, hyssopus cum butyro et meliloto, urinae humanae sedimentum cum cyprino, verbenaca recta cum anserino adipе ac terebinthina simili modo: medulla cervina cum susino, styrax liquatus cum cyprino. Ad eadem conveniunt inunctiones ex irino, cyprino, amaracino, itemque adeps eius animantis, quod Latini glirem appellant. Iniecta vero egregie molliunt farinae hordeaceae cremor ex aqua coctus, alicae quoque, aut oryzae; aut foeni graeci, aut seminis lini, aut denique malvae cremor eodem modo.

Κεφ. οβ'. Πινόμενα δὲ τὰς χρονίους φλεγμονὰς καὶ τὰ ἀλγήματα τῆς ὑστέρας παύει αἰθιοπίδος ῥίζης ἀγέφυμα, γλυκυσίδης κόκκοι ἰε' μεθ' ὕδατος, πάνακος ἀσκληπιαδίου φύλλα, ἀκόρου ῥίζα· κενταυρίου τοῦ μεγάλου ῥίζα· ἄμωμον· ἀρκευθίδες· ἀριστολοχίας τῆς δακτυλίτιδος ῥίζα μετὰ σμυρνίου σπέρματος· βαλσάμου καρποῦ < α' μετὰ μελικράτου· γερανίου ῥίζης < α' ἐν μελικράτῳ· κέστρου φύλλων < δ' μετὰ ὑδρομέλιτος· τριφυλλίδος καρπὸς, καὶ τὰ φύλλα ὁμοίως.

Κεφ. ογ'. Πρὸς δὲ τὰς ἐλκώσεις τῆς μήτρας ἀρμόζει ἀμόργη ἐψητὴ περιχοιομένη μετὰ κηρωτῆς σουσίνης, ἢ λύκιον ὁμοίως, ἢ περιχοιόμενος χυλὸς ἀκακίας.

Κεφ. οδ'. Ὀδαξιμοὺς δὲ μήτρας παύει καὶ κνησμοὺς κόλπων ἀνδράγχης ὁ χυλὸς ἐγκλυζόμενος, λιγρόσπερμον ἐφθὼν ἐν μελικράτῳ· τῆλιν ὁμοίως, ἔλαιον σουσίνον, ἢ κύπρινον, ἢ τραγάκανθον σὺν ὕδατι.

Κεφ. οε'. Ἄγει δὲ ἔμμηνα καὶ λόγια ἐπιεικῶς πινόμενα ἀπυρέτοις μετ' οἴνου, πυρέσσουσι σὺν μελικράτῳ ἢ ὕδατι, ξιγίου

Cap. LXXII. In potu vero sumpta uteri diuturnas inflammationes doloresque sedant aethiopidis radicis decoctum, paeoniae grana quindecim ex aqua, pānacis Asclepii folia, acori radix, centaurii maioris radix, amomum, iuniperi baccae, aristolochiae longae radix cum smyrnii semine, carpobalsami drach. j. cum melicrato, geranii radicis drach. j. in melicrato, betonicae foliorum drach. iiij. ex hydromelite, trifolii semen ac folia similiter.

Cap. LXXIII. Vulvae ulcerationibus inuncta conveniunt amurca decocta cum cerato liliaceo, lycium aut acaciae succus eodem modo.

Cap. LXXIV. Mordaces vulvae prurigines ac sinus muliebris pruritus leniunt portulacae succus infusus, lini semen coctum in melicrato, foenum graecum similiter, oleum susinum vel cyprinum, tragacanthae lacryma cum aqua.

Cap. LXXV. Menstrua et a partu relictā uteri purgamenta moderate cient haec cum vino pota, si febris

ρίζα, οἰνάνθης πόας καρπὸς, καὶ τὰ φύλλα, καὶ ὁ καυλός· σελίνου ῥίζα καὶ ὁ καυλός· οὖρον λυγγός· σίνηπι λῆτον καταπασθὲν ὡς ἄλφιτον· πάνακος φύλλα· ἀσκληπιάδος καρπὸς καὶ τὰ ἄνθη· περικλυμένου φύλλα, πετροσέλινον· πράσου χυλός, καὶ τὸ πράσον ἐσθιόμενον· ἀμπελόπρασον, ῥάφανος ἐσθιόμενή, ἄρου ῥίζα ἐφθῇ ὁμοίως, σελίνου ἀπόζεμα καὶ τὸ σπέρμα, σκόροδον σὺν οἴῳ πινόμενον, σταφυλίνου ἀγρίου σπέρμα, μυττωτὸν τὸ ἐκ σκοροδίων ἐσθιόμενον, στάχυος φύλλα σὺν οἴῳ πινόμενα, στοιχάδος ἀφέψημα ἐπὶ ἡμέρας γ' πινόμενον νήστεσιν.

Κεφ. σς'. Μᾶλλον δὲ ἄγει, πινόμενα ὁμοίως, ἀγαρικὸν, ἄγνου σπέρμα μετὰ γλήχωνος ἢ πεπέρεως, ἀδιάντον, νάρδος ἀγρία, ἀριστολοχίας ῥίζα σὺν σμυρνίῳ· ἐλελίσφακός· σφονδυλίου ῥίζα καὶ σπέρμα· λιβανωτίδος ῥίζα, σεσέλεως ῥίζα καὶ ὁ καρπός· τραγοριγάνου ἀφέψημα, ἵππομαράθρου σπέρμα· καὶ ῥίζα· κνίδος τῶν φύλλων ἀφέψημα μετὰ σμύρνης· δαμασωνίου ῥίζα· ἄμωμον· ἀνθεμίδος φύλλα καὶ ἡ ῥίζα· σπύραθοι αἵγριοι μετὰ τινος τῶν ἀρωματικῶν· ἀρτεμισία· ἄσφαλ-

absit: sin minus, ex melicrato vel aqua: gladioli radix, oenanthes herbae folia, caulis et semen: apii radix et caulis, urina lyncis, sinapi tritum, polentae instar inspersum, panacis folia, asclepiadis semen et flores, periclymeni folia, petroselinum, porri succus, et ipsum porrum in cibo sumptum, ampeloprasum, raphanus esitatus, ari radix cocta similiter, apii infusum et semen, allium in vino potum, dauci agrestis semen, intritum ex alliis comestum, stachyos folia cum vino pota: stoechadis decoctum, triduo ieiunis potum.

Cap. LXXVI. Potentius autem eadem illa praestant, simili modo pota: agaricum, viticis semen cum pulegio vel pipere, adiantum, nardus agrestis, aristolochiae radix cum smyrnio, salvia, sphondylii radix et semen, libanotidis radix, seseleos radix et semen, trago-rigani decoctum, hippomarathri semen et radix, urticae foliorum decoctum cum myrrha, damasonii radix, amomum, anthemidis folia et radix, baccae caprinae cum aliquo ex aromaticis, artemisia, bitumen, absinthii succus



τος· ἀψίνθιον ὠμοτριβὲς σὺν κελτικῇ νάρδῳ· βουνίου ῥίζα, καὶ τῶν καυλῶν τὸ χύλισμα· βακχάριδος τῆς ῥίζης τὸ ἀφέψημα ἐν ὕδατι· βράθυος φύλλα· γλήχωνος ἀπόξεμα· γλυκυσίδης ῥίζα· γλυκυρῥίζης ἀπόξεμα ἢ χυλός· δάφνης ἀλεξανδρίνης ῥίζα· δαφνοειδές· ἴρις· ἐλενίου ἀφέψημα· ἐλιγρούδου ὁμοίως· ἐρπύλλου ὁμοίως· ὁποῦ συκῆς ὀλίγον μετὰ ὠοῦ ῥοφητοῦ· ἐρέβινθος ἐσθιόμενος, καὶ τὸ ἀφέψημα πινόμενον· ἡρύγγης ῥίζα, θύμον, ἢ θύμβρα ἀποξεσθέντα· ἵπποσελίνου ῥίζα καὶ ὁ καρπός, ἵππομαράθρου ὁμοίως, κασσία· καρδάμων, ὑπερικῶ καυλός ἢ ῥίζα ὁμοίως.

Κεφ. οζ'. Ἐπιτεταμένως δὲ ἄγει, ὥστε καὶ ἔμβρυα ἐκτινάσσειν πινόμενα σὺν οἴνῳ, ἢ μελικράτῳ, ὥσπερ εἴρηται· πρασίῳ χυλός ἐπὶ ἡμέρας γ', καὶ τὸ ἀπόξεμα· περιχυμένου καρπός, πηγάνου ἀγρίου σπέρμα, πετρίδος ῥίζα, βρουωνίας ῥίζα < β' μεθ' ὕδατος· ταράσσει δὲ τὴν διάνοιαν· ἀμμωνιακῶ < α'· σαγαπήνῳ ὁμοίως· ὁπός, ἢ ὁπόφυλλον ὁμοίως σὺν σμύρνῃ καὶ πέπερι· ὁποπάνας ὁμοίως· ἀναγύρου φύλλα καὶ τὰ τεθνηκότα ἄγει· ἀσφοδέλου ῥίζα· ἄρου σπέρμα·

expressus cum celtica nardo, bunii radix et succus e caulibus, baccharis radicis decoctum in aqua, sabinae folia, pulegii infusum, paeoniae radix, glycyrrhizae infusum aut succus, lauri alexandrinae radix, daphnoides, iris, helenii decoctum, elichrysi et serpylli similiter, lactis ficulnei modicum cum ovo sorbili, cicer esitatum, et decoctum eius potum, eryngii radix, thymus aut thymbra feroefacta, hipposelini radix et semen, hippomarathri similiter, cassia, cardamomum, hyperici caulis aut radix similiter.

Cap. LXXVII. Potentissime vero menses cient, atque ita ut foetus etiam excutiant, pota haec e vino aut melicrato, uti dictum est: marrubii succus triduo potus, vel eiusdem infusum, perichlymeni semen, rutae sylvestris semen, filicis radix, bryoniae radix drach. ij. pondere ex aqua: (sed mentem perturbat:) ammoniaci drach. j., sagapenum similiter, liquor silphii aut semen similiter cum myrrha et pipere, opopanax simili modo: anagyri folia etiam emortuos foetus pellunt: asphodeli radix,

βολβοὶ σὺν ἁπαλοῖς φύλλοις δάφνης· δικτάμνου < α' καὶ τὰ τεθνηκότα δὲ ἐκτινάσσει σὺν οἴνῳ· δρακοντίου ἀφέψημα τῶν ῥιζῶν· τούτου δὲ καὶ ὁσμὴ τῶν φύλλων κατὰ τὴν ἀνθησιν, ἐπὶ τῶν ἀρτισυλλήπτων, φθόριός ἐστι· θηλυπτέριδος ῥίζα· θλάσπι, χαλβάνη, λευκοῦ σπέρματος < β' ἐν ὕδατι· σέ-  
σελι σὺν οἴνῳ καθ' ἡμέραν πινόμενον· καρδαμίνη σὺν οἴνῳ·  
πήχανον, καὶ τὸ σπέρμα αὐτοῦ ὁμοίως· καστόριον μετὰ  
γλήχωνος ἀποζέματος, σχοῖνος· ἀναισθήτως ὀλισθάνει ἐμβρυα,  
ἐὰν ὦν σὺν τῷ ὀστράκῳ θερμάνας καὶ καταχρίσας κεδρίαν, καὶ  
πάλιν θερμάνας καὶ καταχρίσας, καὶ τὸ αὐτὸ τρίτον ποιήσας  
δῶς ῥοφήσαι· ἢ φελλὸν πεπισσωμένον παλαιὸν ἐν κεραμίῳ  
καύσας, λείον ἐπιπάσας ἐν οἴνῳ, δὸς πιεῖν· ποιεῖ δὲ καὶ  
καππάρεως ὁ ἐκ τῶν ἀπίων καρπὸς πληθὺς < β' σὺν οἴνῳ,  
ἢ τῆς ῥιζῆς ὁμοίως· κενταυρίου λεπτοῦ χυλὸς ὁμοίως· κεδρί-  
δες λεῖται· κέστρου τῶν φύλλων < α', κικαΐας ῥίζα ἀπο-  
βροχθεῖσα ἐν γλυκεῖ· κιννάμωμον ποθέν· κλिनποδίου ἀπό-  
ζεμα· κριθμοῦ καρπὸς καὶ ἡ ῥίζα, ἐψηθέντα ἐν οἴνῳ· κισσ-  
ανθέμου καρπὸς < α' ἐν οἴνῳ· κυπαρίσσου πρίσματα· κύ-

ari semen, bulbi cum tenellis lauri foliis: dictamni drach.  
ij. cum vino enectos etiam fetus eiicit: dracunculi radi-  
cum decoctum: huius, dum floret, foliorum vel ipse  
odor recens conceptos fetus exanimat: filicis feminae  
radix, thlaspi, galbanum, leucorii seminis drach. ij. in  
aqua, seseli cum vino quotidie potum, cardamine cum  
vino, ruta et semen eius similiter, castorium cum pule-  
gii decocto, iuncus odoratus. Citra sensum prolabetur  
fetus, si ovum cum sua testa calfactum cedria inunxeris,  
iterumque calfeceris et inunxeris, ac id ipsum tertio re-  
petiveris, tumque gravidæ sorbendum dederis. Aliud: su-  
ber vetus pice oblitum in testa urito, et tritum vino in-  
spersum similiter propinato. Valent et ad ciendos poten-  
tissime menses capparidis pyriformis fructus aut radices  
drach. ij. in vino potae: similiter et centaurii minoris  
succus, cedri baccae tritae, betonicae foliorum drachma,  
circaeae radix in passo macerata, cinnamomum potum,  
clinopodii infusum, crithmi radix cum semine in vino  
cocta, cissanthemi seminis drachma in vino, cupressi ra-

πειρος· λαπάθου ἀγρίου ῥίζα· λογχίτις πόα ἐν οἴνῳ ἐψηθεῖσα· καρδάμου σπέρμα· μανδραγόρου σπέρματος < ἅ συν οἴνῳ· μελανθίου < ἅ· ὀξύμυρσίνης ῥίζα ἐψηθεῖσα ἐν οἴνῳ· σαμψύχου σπέρμα· κύπρου σπέρμα· σίσων· τορδύλιον· τραγορίανον· χαμαίδρυος ἀφέψημα· χαμαιπίτυς σὺν μέλιτι· γῆς ἔντερα ξηρὰ πινόμενα· ποιεῖ καὶ σύκων τὸ ἀφέψημα τῶν φύλλων.

Κε φ. σή. Προστιθέμενα δὲ ἔμμηνα ἄγει, καὶ τὰ ἐκ τόκων, καὶ ἔμβρυα, οἰσυπος ἐν ἐρίῳ οἰσυπηρῷ προστεθεὶς ἐπὶ ἡμέρας γ'· ἄκινος, καὶ τὸ σπέρμα αὐτῆς· μανδραγόρου ῥίζα ξυσθεῖσα ὡς κολλύριον, καὶ προστεθεῖσα· ἑλλέβορος μέλας καὶ λευκός, κνίδης φύλλα μετὰ σμύρνης λεῖα· ἄμωμον· ἀμύγδαλα, ἢ ἀμυγδάλινον σὺν οἴνῳ· ἀνεμώνη λεῖα· ἀριστολοχία μετὰ σμύρνης· βδέλλιον· δαφνίδες λεῖαι· ἐλατήριον σὺν μέλιτι· ἐρυθροδάνου ῥίζα ὁμοίως· ἡμεροκάλλους ῥίζα· ἡλιοτροπίου τοῦ σκορπιούρου φύλλα· θέρμινον ἄλευρον μετὰ σμύρνης καὶ μέλιτος· θρίδακος ἀγρίας ὁ καρπός· ἵππομαράθρου ῥίζα· κασσία σὺν μέλιτι· κάλαμος ἀρωματίτης ὁμοίως· κα-

menta, cyperus, lapathi sylvestris radix, lonchitis herba in vino decocta, nasturtii semen, mandragorae seminis drachma una cum vino, nigellae drachma, rusci radix in vino cocta, sampsuchi semen, cyperi semen, sison, tor-dylium, tragoriganum, chamaedryos decoctum, chamaepitys cum melle, lumbrici terrestres sicci poti, ficus de-nique foliorum decoctum.

Cap. LXXVIII. Subdita in pessis menses trahunt, et quae a puerperio relinquuntur, ac ipsos quoque par-tus evocant: oesypum cum lana succida triduo apposi-tum, acinos et eiusdem semen, mandragorae radix derasa in collyrii forma et indita, uterque helleborus, urticae fo-lia trita cum myrrha, amomum, amygdala, aut ex eis oleum cum vino, anemone trita, aristolochia cum myr-rha, bdellium, lauri baccae tritae, elaterium cum melle, similiterque rubiae radix, hemerocallis radix, heliotropii scorpiuri folia, lupinorum farina cum myrrha et melle, lactucae sylvestris semen, hippomarathri radix, cassia cum melle, calamus aromaticus similiter, calaminthae folia,

λαμίᾱθης φύλλα· χαλβάνη· κενταυρίου τοῦ μεγάλου ῥίζης ὁ  
 χυλὸς, ἢ ῥίζα· κισσοῦ κόρυμβοι λεῖτοι, καὶ ὁ μίσχος μέλιτι  
 χρισθεὶς ἄγει γενναίως ἔμβρυα· κιννάμωμον σὺν σμύρνῃ· κό-  
 στος ὁμοίως· κρίνου ῥίζα ἐφθῇ σὺν ῥοδίῳ· ἀταράχως δὲ  
 τὰ ὑπομένοντα σπᾶται· κυκλαμίνου ῥίζα σὺν μέλιτι, καὶ ὁ  
 χυλὸς· φασὶ δέ τινες, ὅτι, κἂν ὑπερβῇ τὴν ῥίζαν τῆς κυκλα-  
 μίνου γυνὴ ἔγκυος, ἐκτιτρώσκει· ὁμοίως καὶ τὴν καλουμένην  
 πόαν ὄνοσμα ἱστοροῦσιν, ὅτι γυνὴ ἐὰν ὑπερβῇ ἔγκυος ἢ γεύ-  
 σηται, ἐκτιτρώσκει· σάμψυχος· λινόζωστις σὺν μέλιτι· πήγα-  
 νον σὺν σμύρνῃ καὶ ὦψ· κράμβης χυλὸς μετὰ αἰρίνου ἀλεύ-  
 ρου· κονύζης χυλὸς· ὀποπάναξ, καὶ ἡ ῥίζα ὥς κολλύριον· σι-  
 δηρίτιδος τῆς Ἡρακλείας τὰ φύλλα· σκόρδιον· στύραξ· ἄγει  
 δὲ καὶ μᾶλλον ἔμβρυα ἀγχοῦσης ῥίζα· ἀρτεμισία ἀναληφθεῖ-  
 σα ὥς κολλύριον, σὺν δαφνίσιν, ἢ σμύρνῃ, ἢ ἰριδι, ἢ σύ-  
 κῳ, ἢ νίτρῳ· καὶ ὁ ἀπαλὸς δὲ βλαστὸς αὐτῆς προστεθείς·  
 βρουωνίας ῥίζης ὁ χυλὸς προστεθείς ἐν ἐρίῳ· γεντιανῆς ῥίζα  
 ξυσθεῖσα ὥς κολλύριον· δικτάμνου < α' μετὰ μέλιτος·

galbanum, centaurii maioris e radice succus, aut ipsa ra-  
 dix, hederæ corymbi triti: eiusdem etiam foliorum pe-  
 dunculus melle irrigatus praeclare partus extrahit: cinna-  
 momum cum myrrha, costus similiter: lilii radix cocta  
 cum rosaceo sine vexatione puerperæ quæ in utero mo-  
 rantur extrahit: cyclaminis radix cum melle, ac ipse etiam  
 succus: aiunt porro nonnulli, si radicem eam prægnans  
 mulier transgrediatur, abortum fieri. Idem quoque de  
 herba onosmate dicta tradunt, nempe si eam prægnans  
 supergrediatur gustetve, abortum facere: sampsuchum,  
 mercurialis cum melle, ruta cum myrrha et ovo, brassi-  
 cæ succus cum loliacea farina, conyzæ succus, panacis  
 liquor, eiusdem quoque radix in collyrii formam redacta,  
 sideritidis heracleæ folia, scordium, styrax. Partus po-  
 tissimum evocat anchusæ radix: artemisia cum lauri bac-  
 cis, vel myrrha, vel iride, vel ficu, nitrove in collyrii  
 formam redacta: idem præstat tenellum etiam germen  
 eius appositum: bryoniæ radicis succus in vellere apposi-  
 tus, gentianæ radix derasa in collyrii formam, dictamini  
 drachma una cum melle: dracunculi radix cum posca,



δρακοντίου ῥίζα σὺν ὀξυκράτῳ· ἴρις· σμύρνα σὺν ἀψινθίῳ ἢ θέρμων ἀποβρέγματι· ἢ πηγάνου χυλός· κνέωρον ἀναληφθέν σὺν κῳ· νίτρον ὁμοίως· κενταυρίου λεπτοῦ χυλός· κεδρία· κολοκυνθίδος ἐντεριώνη σὺν μέλιτι· κισσανθέμου χυλός σὺν οἴνῳ· λιβανωτὸς καὶ ὁπὸς μανδραγόρου, καὶ αἶθρον μίγντα ἐν πεσσῳ· ὁποπάναξ προστεθείς· στρουθίου ῥίζα σὺν μέλιτι· πόλιον σὺν οἴνῳ· πράσιον ὁμοίως· σκαμμωνίας ὁπὸς ἐν ξρίῳ προστεθείς· στυπτηρία ὑγρὰ· ὑπερικοῦ σπέρμα λεῖον σὺν μέλιτι· χονδρίλλης μαστίχῃ μετὰ σμύρνης· φλόμου χυλός μετὰ σμύρνης, ἐν ξρίῳ προστεθείς· οὖρον ἀνδρὸς, πεσσῳ ἀναλαμβάνομενον, καὶ προστιθέμενον· μελάνθιον καὶ σμύρνα λεῖα, μέλιτι ἀναληφθέντα, κυάμου ἐλληνικοῦ μέγεθος.

Κε φ. θθ'. Ὑποθυμώμενα δὲ ἄγει ἔμμηνα καὶ λόγια καὶ ἔμβρυα ἄμμι μετὰ ῥητίνης τερμινθίνης· βδέλλιον βραχύ· δίκταμνον· καρδάμωμον· χαλβάνη· πίτυος φλοιὸς καὶ πεύκης· πορφύρας θαλασσίας πώματα, σκόροδον, σιλύρου καφαλή καὶ σάροξ.

Κε φ. π'. Ἐγκαθίσματα δὲ ταῦτα ἄγει, ἐψημένα μετὰ

iris, myrrha cum absinthii aut lupinorum infuso, rutae succus, cneorum ficu exceptum, nitrum similiter, centaurii minoris succus, cedria, colocynthidis medulla cum melle, cissanthemi succus cum vino, tus cum liquore mandragorae ex loliacea farina subditum in pesso, struthii radix cum melle, polium cum vino, marrubium similiter, scammoniae liquor in vellere appositus, alumen liquidum, hyperici semen tritum cum melle, chondrillae lacryma mastichae similis cum myrrha, verbasci succus cum myrrha in vellere appositus, urina viri pesso excepta et subdita, melanthium cum myrrha tritum et melle exceptum fabae graecae magnitudine.

Cap. LXXIX. Suffitu menses, relicta a partu purgamenta et fetus evocant ammi cum resina terebinthina, bdellii exiguum, dictamnus, cardamomum, galbanum, pinus ac piceae cortex, purpurarum marinarum opercula, allium, siluri caput et caro.

Cap. LXXX. Ad eadem in sessione prosunt haec in

ὔδατος· ἀγήρατον· ἀκτῆς φύλλα· ἀρτεμισία· δίκταμνον· δάφνη· κόνυζα· κόστος· μῆον· λευκόιον· μελισσόφυλλον· πράσου κεφαλατοῦ κόμη, καὶ σέλινα.

Κεφ. πα'. Καταπλάσσεται δὲ πρὸς λόγια καὶ ἔμμηνα κινεῖ ἀρτεμισία πολλή· κατὰ τῶν ὑποχονδρίων· ἐπιτεταμένως δὲ ἄγει, ὥστε καὶ ἔμβρυα ἐκτινάσσειν· αἶρινον ἄλευρον πράσου χυλῷ φυραθὲν, κυκλαμίνου χυλὸς σὺν ἐλατηρίῳ, ἢ αἰρίνῳ ἁλεύρῳ· μυελὸς ἐλάφειος καὶ χαλβάνη καὶ ἀμμωνιακὸν καὶ ἔλαιον, ἴσα.

Κεφ. πβ'. Ἰσθησι δὲ ῥοῦν πινόμενα μετ' οἴνου γλυκυσιδῆς κόκκοι πυρροὶ ἰ' ἢ ιβ' σὺν οἴνῳ· ὑποκιστίδος χυλὸς· πευκεδάνου ὀπός· συμφύτου πετραίου φύλλα καὶ ὁ καρπός· στατική<sup>73</sup> πῶα λαχανευομένη ὡς προσόψημα· βάτου ἀφέψημα, καὶ χύλισμα βαλαυστίου, ἢ ἀκακίας· σκίνου τῆς ῥίζης ἀφέψημα καὶ χύλισμα· γῆ σαμία μετὰ βαλαυστίου· ἐλάτης μυρεψικῆς ἀπόξεμα· ἐλάφου κέρας κικαυμένον μετ' ὀξυκράτου· ἰτέας ῥίζα, ἢ τὰ φύλλα· κλυμένου χύλισμα· λευκογραφίς· λί-

73) Στατική vulgo. De Statice herba Plin. 26, 53.

aqua decocta: ageratum, sambuci folia, artemisia, dictamnus, laurus, conyza, costus, meum, leucoium, melissophyllum, porri capitati coma, apium.

Cap. LXXXI. Ad pellenda puerperii purgamenta ciendosque menses copiosa artemisia hypochondriis cataplasmatibus instar adhibetur. Potentius vero vulvam purgant, ac in tantum, ut fetus etiam eiiciant, farina loliacea porri succo subacta, cyclaminis succus cum elaterio aut loliacea farina: item medulla cervina, galbanum, ammoniacum et oleum, paribus mixta portionibus.

Cap. LXXXII. Muliebrem fluorem sistunt ex vino pota paeoniae grana fulva decem aut duodecim cum vino, hypocistidis succus, peucedani liquor, symphyti petraei folia et semen, statice herba etiam pro opsonio oleis modo esitata, rubi decoctum, expressus balaustio succus, uti et acacia, lentisci, radicis decoctum et succus, terra samia cum balaustio, elates unguentariae infusum, cornu cervinum ustum cum posca, salicis radix aut folia, clymeni succus, leucographis, lapis haematites cum succo

θος αἱματίτης σὺν χυλῷ ῥοιᾶς· λυσιμάχιον πόα, καὶ ὁ χυλὸς αὐτῆς· λωτοῦ τοῦ δένδρου πρισμαίων ἀπόξεμα ἐκλειχόμενον· λίθου ὀστρακίτου < ἄ μετ' οἴνου· μήκωνος μελαίνης σπέρμα σὺν οἴνῳ, ἢ σὺν μέλιτι, (καὶ ὁ καρπὸς αὐτῆς.) μυρικήης φλοιὸς λεῖος, καὶ ὁ καρπὸς αὐτῆς· ὄξυακάνθου <sup>74</sup> καρπὸς, τῶν ἐν αὐτῷ ἐριωδῶν ἐπιμελῶς ἀποκαθαρθέντων· τραχύνει δὲ τὴν ἀρτηρίαν· πολυγόνου χυλὸς, ἢ ἀρογλώσσου ὁμοίως· πρίνου τοῦ φλοιοῦ ἀπόξεμα, πυτία λαγωῦ· ῥοὸς βυρσοδεψικῆς χυλὸς, ῥόδων ἄνθος σὺν ὄξυκράτῳ, στεμφύλων ἀπόξεμα.

Κεφ. πγ'. Προστιθέμενα δὲ σὺν ἐρίῳ ῥοῦν ἴσθησιν ὑποκιστίδος χύλισμα· ῥοὸς βυρσοδεψικῆς ὁμοίως· βαλαύστιον λεῖον· θαλία, καὶ ὁ χυλὸς αὐτῆς· ἀκακίας χύλισμα, ἀειζώου· ἀπόπατος αἰγὸς σὺν λιβανωτῷ· δεῖ δὲ ἐνελεῖν ἐρίῳ καὶ προστιθέναι· τέφρα κληματίνης ὕλης προστεθεῖσα· Ἀχίλλειος πόα· βάλανοι λεῖται· ἰὸς σιδήρου· λιβανωτὸς, καὶ ὁ φλοιὸς αὐτοῦ· λευκογραφίς· λυσιμάχιος πόα· λύκιον σὺν γάλακτι·

74) Κυνόςβατον cum ὄξυακάνθῳ confundit: cf. Diosc. lib. i. cap. 122. 123.

mali punici, lysimachia herba eiusdemque succus, infusum loti arboris ramentorum delinctum, ostracitae lapidis drach. j. cum vino, papaveris nigri semen cum vino aut melle, tamaricis cortex tritus eiusdemque fructus: oxyacanthae fructus diligenter ab interiore lanugine repurgatus, quippe quae arteriam exasperet: polygoni succus, similiterque plantaginis, ilicis corticis infusum, leporinum coagulum, rhois coriariorum succus, rosarum flos cum posca, vinaceorum infusum.

Cap. LXXXIII. Subdita cum lana fluxionem sistunt muliebrem hypocistidis succus, similiterque rhois coriariorum, balaustium tritum, germen oleaginum eiusdemque succus, acaciae succus, itemque sempervivi: simum caprinum cum ture, lana involutum et appositum: cinis e ligno sarmentorum appositus, Achillea herba, glandes quernae tritae, rubigo ferri, tus et cortex eius, leucographis, lysimachia herba, lycium cum lacte, mandrago-

μανδραγόρου σπέρμα λῆϊον μετὰ θείου ἀπύρου· μελίλωτον· πολύγονον καὶ ὁ χυλὸς αὐτοῦ· κηκίδος τὸ ἐντὸς μετὰ λιβά-  
νου καὶ ὕδατος· καρύου βασιλικοῦ τὸ ἐντὸς, καὲν καὶ σὺν  
οἴνῳ προστεθέν.

Κεφ. πδ'. Ἐγκαθίσματα δὲ ῥοῦν ἴστησι· δεῖ δὲ χλια-  
ροῖς ἐγκαθίζειν· ἀγριελαίας ἀπόζεμα, σχίνου, καὶ βάτου,  
ἀγαλλόχου, δρυὸς φύλλων καὶ φλοιοῦ, καὶ βαλάνου, καὶ  
πρίνου, μυρσίνης, στεμφύλων, ῥοὸς βурсοδεψικῆς, σιδίων.

Κεφ. πέ'. Ἐπιτίθενται δὲ κατὰ τοῦ ἐπιγαστρίου εἰς  
τὸ ἐπισχεῖν ῥοῦν, κρίθινον σὺν κηκίδι λεία, σιδίοις, ἢ βα-  
λαυστίῳ, ἢ βάτῳ, ἢ τρυγὶ ὄξους· ἢ πρίνου φλοιὸς, ἢ βάλα-  
νοι, ἢ μυρσίνης φύλλα, ἢ σχίνου, ἢ θηβαϊκῆς φοίνικος.

Κεφ. πς'. Πρὸς δὲ τοὺς ἐκ τῆς ὑστέρας συμβαίνοντας  
πνιγμοὺς ἀρμόζει πινόμενα ἀγαρικοῦ < α' ἐν οἴνῳ· μανδρα-  
γόρου ῥίζης ὀβολοὶ δύο σὺν οἴνῳ· πετροσελίνου καρπός· ἀρνο-  
γλώσσου καρπός καὶ ὁ χυλὸς σὺν οἴνῳ· γλυκυσίδης μέλανες

rae semen tritum cum sulphure vivo, melilotus, polygo-  
num eiusque succus, gallae pars interior cum ture et  
aqua, nucis iuglandis nucleus ustus et cum vino ap-  
positus.

Cap. LXXXIV. Sunt et insessus cohibendo huic  
profluvio accommodati, dummodo tepidis iis laborantes  
insideant. In eum usum usurpantur infusa oleastri, len-  
tisci, rubi, agallochi: quercus foliorum, corticis et glan-  
dis: similiterque ilicis, myrti, vinaceorum, rhois coria-  
riorum et malicorii.

Cap. LXXXV. Ad cohibenda porro eadem foemi-  
narum profluvia imponuntur imo ventri hordeacea farina  
cum galla trita, vel malicorio, vel balaustio, vel rubo,  
aut aceti faece: ilicis cortex aut glandes, folia myrti, aut  
lentisci, aut palmae thebaicae.

Cap. LXXXVI. Ad uteri strangulatum haec in po-  
tu conveniunt: agarici drach. j. e vino, mandragorae ra-  
dicis oboli duo cum vino, semen petroselini, plantaginis  
semen et succus cum vino, paeoniae grana nigra numero



κόκκοι ἐ' μετὰ μελικράτου· ὄνυξ ἐν κογχυλίου πινόμενος· ὄξος σκίλλινον καταρρόφούμενον.

Κεφ. πζ'. Ὁσφραινόμενα δὲ διεγείρει τὰς ὑστεριας πνιγμονὰς ἄσφαλτον, καστόριον, χαλβάνη, σίνηπι σὺν ὄξει σκίλλητικῷ· πίσσα ὑγρὰ, κεδρία· ἐλλύχνια φλεγόμενα καὶ ἀποσβεννύμενα· πευκεδάνου φύλλα καὶ ὀπός· τρίχες καεῖσαι· σφονδύλιον· πήγανον· σίλφιον· κρόμμυον· σκόροδον· κνίδη προςαγομένη σκέλεσι καὶ μετώπῳ.

Κεφ. πη'. Ὑποθυμῖται δὲ πρὸς ταῦτα γαγάτης λίθος· ὄνυξ ὁ ἀπὸ τῶν πορφυρῶν· πευκέδανον· σαγαπήνου ὀπός· σφονδύλιον· ἄσφαλτος· καστόριον· χαλβάνη· λειχὴν ἵππου· φώκης πυτία· σίλφιον· κέρας ἐλάφου.

Κεφ. πθ'. Προστίθεται δὲ κατὰ τοῦ δακτυλίου πήγανον σὺν μέλιτι ἐν ἐρίῳ ἀναληφθέν· κνίδης σπέρμα μετὰ στακτῆς.

Κεφ. ζ'. Πρὸς δὲ τὰς συλλήψεις ἐνεργεῖ ποτὰ κραταιόγονον, καὶ ὁ καρπὸς αὐτοῦ, ὑπὸ τε τοῦ ἀνδρὸς καὶ

XV ex melicrato, onyx e conchylio potus, acetum scillinum absorptum.

Cap. LXXXVII. Olfactata haec ab utero suffocatas excitant: bitumen, castorium, galbanum, sinapi cum aceto scillitico, pix liquida, cedria, ellychnia incensa et extincta, peucedani folia et liquor, cremati capilli, sphondylium, ruta, silphium, cepa, allium. Prodest et urtica cruribus ac fronti admota.

Cap. LXXXVIII. Suffitu insuper haec prosunt: gaggates lapis, onyx, seu tegumentum purpurarum, peucedanum, sagapeni liquor, sphondylium, bitumen, castorium, galbanum, lichen equinus, vituli marini coagulum, silphium, cornu cervi.

Cap. LXXXIX. Subduntur vero ano in hoc affectu ruta cum melle lana excepta, urticae semen cum stacte.

Cap. XC. Conceptum adiuvant haec in potu sumpta: crataegoni semen tum a viro, tum et a muliere bi-

τῆς γυναικὸς πινόμενον ἐπὶ ἡμέρας μ', ἢ σταφυλίνου καρπὸς καὶ ἡ ῥίζα ἐσθιομένη ὑπὸ τῆς γυναικὸς πρὸ τῆς συνόδου.

Κεφ. εα'. Προστιθέμενα δὲ ὠφελεῖ πρὸς σύλληψιν ἄμμι μετὰ μυελοῦ πρὸ τῆς συνόδου· λαγωῦ πυτία σὺν βουτύρῳ· λινοζώστεως σπέρμα ἢ χυλὸς ἀντὶ πεσσοῦ.

Κεφ. εβ'. Ἰστορεῖται δὲ ἀρρένοτοκεῖν ποιεῖν, μεθ' ὕδατος κυάθων γ' πρὸ τῆς συνόδου καὶ πρὸ τοῦ δείπνου ἐπὶ ἡμέρας μέ, ὅρχεως τῆς βοτάνης τῆς μεΐζονος τὸ ἀπόζημα πινόμενον· ἢ δὲ αὐτῇ, ἐσθιομένη παρὰ τῶν ἀνδρῶν, ἀρρένογόνος ἐστίν· ἢ δὲ ἐλάττων θηλυγόνος, ὑπὸ τῶν γυναικῶν ἐσθιομένη· ὅρχεις ἀλεκτρούονος λευκοῦ, μετὰ τὴν σύλληψιν<sup>75</sup> πρὶν τοῦ τινος γεύσασθαι καταποθέντες, ἀρρένογόνοι γίνονται· προστεθὲν δὲ λέγεται ἀρρένοτοκεῖν ποιεῖν λινοζώστεως τῆς ἄρρενος τὸ σπέρμα μετὰ τὴν σύλληψιν εὐθέως· θηλυτοκεῖν δὲ τῆς θηλείας ὁμοίως· τυποῦν δὲ εἰς ἄρρεν ἱστορεῖ-

<sup>75</sup>) Coniectura Saracenī. Lectio vulg. ἀπότῃξιν facile mutanda esset in ἀπότῃξιν, ut sensus quidam constet. Sed post partum hoc remedium adhibere, absurdum esset.

bitum diebus XI, dauci semen et radix a muliere sumpta in cibo ante congressum.

Cap. XCI. Vulvae autem subdita conceptioni conferunt haec: ammi cum medulla appositum ante congressum, coagulum leporinum cum butyro, pessus e mercurialis semine aut succo.

Cap. XCII. Fertur ad gignendam prolem masculam conferre infusum orcheos maioris herbae, ante congressum et ante cibum ex aquae ternis cyathis diebus XLV potum. Haec eadem a viris esitata, ut mascula proles gignatur, efficit: minor vero, ut feminea, si a feminis comedatur. Gallinacei albi testes si subinde a conceptu deglutiat mulier, priusquam aliud quicquam gustarit, mares in utero fieri dicuntur. Fertur et mercurialis maris semen mox a conceptu vulvae admotum, ut mares, foeminae vero semen similiter usurpatum, ut foeminae in lucem edantur, efficere. Proditur quoque memoriae, ari-

ται μετὰ τὴν συνουσίαν εὐθέως προστεθεῖσα ἀριστολογίας ῥίζα ἐν βοείᾳ σαρκί.

Κεφ. εὑ'. Φυλάσσειν δὲ ἱστορεῖται τὸ συλληφθὲν πηγνύμενον προστεθεὶς λίθος ὃ ἐν τῇ σαμίᾳ γῇ εὕρισκόμενος λεῖος· τελεσφορεῖν δὲ καὶ μὴ ἀποβάλλειν τὸ ἔμβρυον τὰς εὐολίσθους γυναῖκας ποιούσι σπέρματος μελανσπέρμου<sup>76</sup> κόκκοι μὰ ἐν ὀθονίᾳ δεθέντες, καὶ φορούμενοι ὑπὸ τὸν σκόλλυν<sup>77</sup> τῶν τριχῶν.

Κεφ. εῑδ'. Πρὸς δὲ τὰς δυστοκούσας περιάπτεσθαι φασιν ὠφελεῖ μετὰ ἀναγύρου φύλλων· δεῖ δὲ μετὰ τὸ τεκεῖν εὐθέως ἀφαιρεῖν τὸ περιάπτον· ἢ λίθον ἱάσπιν τῷ μηρῷ περιάπτειν, ἢ κυκλαμίνου ῥίζαν ξηρὰν ὁμοίως· ἢ κυδωνίου χυλίσματος < α' σὺν ὑδρομέλιτος κυ. α' ποθεῖσαν· ἀδιάντον λεῖον μετ' οἴνου καὶ ἐλαίου ὠφελεῖ· καὶ παταμικοῦ προσαγωγή τοῖς ῥώθωσι· εὐτοκεῖν δὲ ποιήσεις τίκτουςαν, ἐὰν ὀπλὴν ἵππου ὑποκαπνίσῃς.

Κεφ. εῑε'. Περιάπτεται δὲ πρὸς τὸ μὴ συλλαμβάνειν,

76) Plin. 20, 71.

77) Σκόλλυς (σκολλὺς) Hesychio κορυφὴ καταλελημμένων τῶν τριχῶν.

stolochiae radix, statim a concubitu admota vulvae in carne bubula, mares figurare.

Cap. XCIII. Conceptum in utero corporatum conservare traditur appositus lapis, qui in samia terra reperitur. Ut autem mulieres, quarum lubricus est uterus, ad statum tempus suos gerant partus, neve abortiant, efficiant seminis melanspermi grana xij. linteolo illigata et sub spira crinium gestata.

Cap. XCIV. Difficulter parientibus aiunt anagyri folia utiliter adalligari: sed a partu statim auferri abiici- que oportet. Prodest et iaspis femori adalligatus: similiter et cyclaminis radix: succi cotoneorum drachma cum cyatho hydromelitis: adiantum quoque tritum cum vino et oleo confert, uti et sternutatorium naribus adhibitum. Parientibus denique faciliorem praestabis partum, si ungulam equi suffumigaveris.

Cap. XCV. Ad inhibendum conceptum haec pro

ὥς συνεργήσοντα ἰστόρηται· γυναικὸς αἷμα ἐκ τῶν καταμηνίων ξηρὸν δεθὲν ἡμιονεῖω ἢ ἐλαφείω δέρματι, καὶ περιαφθέν· ἢ ὑπερβαινέτω ἀποτεθὲν που πρὸ τοῦ συγγενέσθαι· ἄσπληνον βοτάνη καθ' ἑαυτήν, καὶ σὺν ἡμιόνου ὀπλῇ περιεπτόμενη· δεῖ δὲ ὀρύσσειν αὐτὴν ἀσελήνου νυκτός· μυρικής ξύλον καὲν, καὶ σβεσθὲν ἰδίῳ καταμηνίοις, περιεπτόμενον βραχίονι· πίνεται δὲ πρὸς ἀσπληνίαν ἡμιόνιος πόα, μινέντος αὐτῇ ἔξ ἡμιόνου ὀπλῆς τοῦ ἐντός· πτέριδος ῥίζα μετὰ γλυκέως πινομένη· θηλυπτερίδος ὁμοίως· ἐπιμηδίου ῥίζα πινομένη ἐν οἶνῳ· ἰὸς σιδήρου· ἰτέας ἄνθη καὶ τὰ φύλλα· κράμβης ἄνθη πινόμενα μετὰ οἶνου μετὰ τὴν σύλληψιν· λαγωῦ πτυία μετὰ τὴν ἀφεδρον ποθεῖσα ἐπὶ ἡμέρας γ'· λεύκης φλοιὸς μετὰ τὴν κάθαρσιν σὺν ὀξυκράτῳ νήστεσι· λίθου ὀστρακίτου < β' ἐπὶ ἡμέρας δ' πινέτωσαν· προστίθεται δὲ πρὸς τὸ μὴ συλλαμβάνειν πρὸ τῆς συνόδου ἡδύοσμον λεῖον· καὶ τὸ αἰδοῖον δὲ τοῦ ἀνδρὸς τῷ χυλῷ περιχρισθέν· κράμβης ἄνθος λεῖον ἐν πεσσῶ μετὰ τὴν σύλληψιν, οὐκ ἔξ πηγνυσθαι· νεβροῦ πτυία ἡμέρας γ' προστεθεῖσα μετὰ τὴν κά-

amuleto iuvare perhibentur: foemineus sanguis menstruus siccatus, muli aut cervi corio illigatus et appensus, aut sicubi positum mulier ante concubitum supergrediatur: asplenon herba per se et cum ungula muli adalligata, sed ea illuni quapiam nocte effodienda: tamaricis lignum ustum et proprio mulieris sanguine menstruo extinctum et brachio alligatum. Bibuntur autem ad conceptum prohibendum hemionis herba, admixta ungulae muli parte interiore, filicis radix cum passo, filicis foeminae eodem modo, epimedii radix e vino, rubigo ferri, salicis flores et folia, brassicae flores a conceptu ex vino poti, leporis coagulum diebus tribus a menstrua purgatione potum, populi albae cortex post eandem purgationem ieiunis e posca bibitus, ostracites lapis drach. ij. pondere quatri-duo potus. Vulvis subditur ante concubitum conceptus adimendi gratia mentha trita: eiusdem etiam succo virile membrum circumlinitur: brassicae flores triti, et a conceptu in pesso subditi, semen coagulari non sinunt: hinnuli coagulum, triduo a purgatione muliebri apposi-



θαρσιν· πελεκίνου σπέρμα πρὸ συνουσίας· στυπτηρία ὑγρὰ ὁμοίως· ἢ τήλεως ἀφειψήματι πρὸ συνουσίας προσκλυζέσθωσαν.

Κεφ. ες'. Συνουσίας δὲ παρορμᾷ καὶ ἐντάσεις ἐργάζεται ὀρμίνου σπέρμα· ξιφίου ῥίζα ἢ ἄδρᾶ καὶ ἀνωτέρω παρορμᾷ σὺν οἶνῳ ποθεῖσα· ἢ δ' ἰσχυρότερα τοῦ αὐτοῦ τουναντίον ἐκλύει τὴν ὀρμὴν· ὄρχεως βοτάνης ὁ μείζων βλαστὸς μετὰ γάλακτος ποθεῖς ἐντείνει, ὁ δὲ μικρὸς δι' ὕδατος ποθεῖς ἐκλύει· κνίδης σπέρμα ἀγρίας πινόμενον μετ' οἶνου· ἄνισον σὺν οἶνῳ· ἄρου ῥίζα ἐφθῇ ἐσθιομένη· ἡδύοσμον ὁμοίως· κάρδαμον καὶ τὸ σπέρμα πινόμενον· κορίου σπέρμα ὀλίγον μετὰ ὕδατος· πλεῖον δὲ ποθὲν, κάρρον ποιῇ· κόστος σὺν οἶνῳ ἢ οἶνομέλιτι· κρόκος ὁμοίως· λινόσπερμον μετ' οἶνομέλιτος καὶ πεπέρεως ἀντὶ κοπτῆς λαμβανόμενον· μαράθρου δάκρυον· πράσου καρπὸς ἐσθιόμενος, καὶ χυλὸς πινόμενος· σατύριον ἐρυθραϊκόν· ἔστι δὲ ὅμοιον σπέρμα τῶν ἐν ταῖς ἀπίοις ἢ μήλοις, στιλπνότερον δὲ, καὶ γλίσχρον διαμασση-

tum, spem partus adimit, uti et securidacae semen subditum ante coitum: similiter et alumen liquidum: iuvat et muliebres locos ante concubitum foeni graeci decocto fovere.

Cap. XCVI. Venerem stimulat pudendique arrectionem promovet homini semen. Gladioli radix crassior simul ac superior, in vino potui data, veneris appetentiam facit: contra vero, quae gracilior simul et inferior est, eandem remittit. Orcheos herbae maius tuber e lacte potum libidinis impetum exsuscitat: minus ex aqua bibitum eundem reprimit ac inhibet. Excitant et libidinem urticae sylvestris semen cum vino potum, anisum cum vino, ari radix cocta et esitata, similiter et mentha, nasturtium eiusque semen bibitum, coriandri semen quantitate exigua ex aqua sumptum: (largius enim assumptum, altiore soporem inducit:) costus cum vino vel mulso, crocus similiter, lini semen admixtis mulso ac pipere placenta modo sumptum, foeniculi lacryma, porri semen comestum, et succus epotus: satyrium erythraicum, cuius semen pyrorum malorumve seminibus est simile, at

θεν· σίκκος ποθείς ἰνδικός· ἀποπαύει δὲ τὰς ἐντάσεις φα-  
κοῦ ἀφέψημα ἐπιποθέν· σταφυλίνου ἄγριου σπέρμα· τερε-  
βίνθου καρπὸς ἐσθιόμενος.

Κεφ. ζζ'. Ἀμβλύνει δὲ τὰς πρὸς συνουσίαν ὁρμὰς ἀν-  
δράχνη ἐσθιομένη, καὶ πήγανον ἄγριον καὶ ἡμέρον ἐσθιόμε-  
νον· θρίδακος ἄγρίας σπέρμα καὶ ἡμέρου πινόμενον· δρα-  
κοντίου ῥίζα ἐν οἴνῳ ποθεῖσα ξηρὰ καὶ τὰς ἐντάσεις πᾶναι·  
στρόβιλοι μετὰ σικίου σπέρματος· καὶ ἀνδράχνης χυλὸς, καὶ  
σῦκα ἐσθιόμενα.

Κεφ. ζή'. Πρὸς δὲ τοὺς γόνους προῖεμένους ἀπροαι-  
ρέτως ὠφελίμως δίδεται ἱριδος < β' μετ' οἴνου· κατα-  
πλασθέν δὲ πρᾶννει κώνειον κατὰ τοῦ καυλοῦ καὶ τῶν δι-  
δύμων καὶ ἐφηβαίου ἐπιτιθέμενον· νυμφαίας ῥίζα μετὰ ἀλ-  
φίτου διδομένη ἐσθιέσθαι ὡς μᾶζα, ὄξυβάφου πληθὺς· ἢ πι-  
νομένη καθ' ἑαυτήν· ἀνήθου σπέρμα πινόμενον· ἐκλύουσι δὲ  
γονὴν κισσοῦ κόρυμβοι μέλανες πινόμενοι.

Κεφ. ζθ'. Πρὸς δὲ τοὺς ὄνειρώττοντας συνεχῶς ἄρ-

splendidus viscosumque mandenti: scincus indicus po-  
tus [accendendi venerem, pudendumque arrigendi ma-  
ximam vim habet:] at ea reprimitur remittiturque, lentis  
decocto superbibito. Conciliant denique venerem dauci  
sylvestris semen, et terebinthi fructus esitatus.

Cap. XCVII. Porro venereos impetus reprimunt  
portulaca in cibo sumpta, ruta tam sativa quam agrestis  
esitata, lactucae sylvestris aequae ac sativae semen potum:  
dracunculi siccata radix, e vino pota, rigida intentaque  
pudenda laxat et remittit. Iuvant et nuclei pinei cum  
cucumeris semine, portulacae succus, ac ficus in cibo  
sumptae.

Cap. XCVIII. Quibus invito ac praeter voluntatem  
genitura effluit, haec conducunt: iridis drach. ij. ex vino  
potae, conium virgae, testi ac pubi pro cataplasmate im-  
positum: nymphaeae radix aut per se pota, aut cum po-  
lenta pulmentarii vice in cibo data, acetabuli mensura:  
anethi semen bibitum. Genituram porro exsolvunt he-  
derae corymbi nigri in potu sumpti.

Cap. XCIX. Libidinum frequentes in somno ima-

μόξει πρὸς ἐπίσχεσιν ταῦτα καταπλαττόμενα· κωνείου σπέρμα κατὰ τῶν διδύμων καταπλαττόμενον· ἐὰν γὰρ κατὰ τοῦ αἰδοίου τις καταπλάσῃ, παραλυθήσεται· νυμφαίας ῥίζαν κατὰπλάσσει· καὶ αἰδοῖα κορίου χυλῶ καὶ στρύχνου κατάχρει, διδύμους καὶ νίτρω καὶ ῥάμνου χυλῶ· ἀνδράχνης πίεσμα· καὶ αὐτὴ δὲ καταπλάσσεται καθ' ἑαυτὴν καὶ μετ' ἀλφίτου, καὶ ἄγνου φύλλα σὺν ἀλφίτῳ· ἢ κύμινον λεῖον μετὰ κίω-  
λίας φυραθέν.

Κεφ. ρ'. Ποθέντα δὲ ὠφελεῖ τοὺς ὄνειρώττοντας νυμφαίας ῥίζης ἀπόζεμα, πρὸ τοῦ σίτου λαμβανόμενον· τῇ τροφῇ δὲ μιγνυμένη ἢ ῥίζα ξηρὰ, καὶ τὸ σπέρμα ὁμοίως· καλαμίνθης ἀπόζεμα πινόμενον ἰᾶται ὄνειρωγμούς· θριδάκος σπέρμα καὶ ἀνδράχνης σὺν ὕδατι πινόμενον.

Τῶν κατὰ τοὺς νεφροὺς καὶ τὴν κύστιν παθῶν  
βοηθήματα.

Κεφ. ρα'. Τοὺς δὲ ἐνουροῦντας ἰᾶσθαι δεῖ ἐπιπλήξει,  
καὶ ἐν τῷ δι' ἡμέρας ἐθισμῶ τῆς οὐρήσεως, καὶ μεταξὺ κατ-

ginationes haec adhibita compescunt: conii semen testibus impositum: nam si quis genitali applicuerit, id effoetum languescet: nymphaeae radix adhibita, coriandri aut solani succus pudendis illitus, rhamni succus cum nitro testibus illitus. Iuvat et portulacae succus expressus: ipsa quoque per se et cum polenta imponitur: viticis folia cum polenta, cuminum tritum cum cimolia subactum.

Cap. C. Obnoxiiis libidinis per somnum imaginibus cum geniturae profusione opitulantur haec in potu sumpta: nymphaeae radicis infusum ante cibos assumptum: radix vero sicca similiterque semen etiam cibis utiliter miscentur: calaminthae infusum bibitum insomnia veneris adimit, itemque lactucae aut portulacae semen ex aqua potum.

#### *Renum ac vesicae vitiorum remedia.*

Cap. CI. Eorum, qui stratis immeiunt, urinae incontinentiam emendabis, si increpueris et urinae tum in-

έχειν· κύσται τε αἰγεία ἢ προβατεία κεκαυμένη ποτίζειν σὺν ὀξυκράτῳ, ἢ ὠπτημένην σὺν τῷ οὖρῳ ἐπὶ θερμῇ σποδιᾷ διδόναι φαγεῖν, ἐσπέρας τε διψᾶν ἀναγκάζειν· ποιεῖ δὲ καὶ λαγῶυ ἐγκέφαλος, ὅσον ἐρέβινθος, μετὰ χηνείου στέατος ἴσου καὶ κόμμεως καταπινόμενα, ἢ συμφυραθέντα ἀλφίτῳ, καὶ ἐσθιόμενα· καπρείας ὅπλῃς λείας κοχλιάριον μετὰ μελικράτου, ἢ καστορίου, ἢ ἄγνου· πηγάνου τὸ αὐτό.

Κεφ. ρβ'. Νεφριτικούς δὲ ὠφελεῖ πινόμενα ἀγαρικοῦ < α' μετὰ οἴνου κυ. α' ἀγχούσης ῥίζης < α' ὁμοίως· ἀλκυονίου ὀβ. β' μετὰ ὕδατος· ἀμώμου < α' μετὰ οἴνου· ἀμύγδαλα πικρὰ σὺν ὕδατι, ἢ ἐκλειχόμενα σὺν ῥητίνῃ τερμινθίνῃ· ἀναγαλλίδος ἢ πολυγόνου χυλὸς σὺν οἴνῳ, σταφίδες ἐσθιόμεναι χωρὶς τῶν γιγάρτων· βουνίου φύλλων καὶ τῆς ῥίζης ὁ χυλὸς ἐπὶ ἡμέρας ιβ' πινόμενος μετὰ γλυκέως· ἢ γάλα· γλυκυσίδης ἀφέψημα· γλυκυρρίζης χυλός· ἐλάτης μυρεψικῆς ἀπόζεμα, ἡγουν τὸ ἀφέψημα· σάρξ ἐχίνου χερσαίου ἐσκελετευμένου σὺν οἴνῳ· σμυρνίου σπέρμα σὺν γλυκεῖ· κασ-

terdiu reddendae; tum etiam certis intervallis continendae assuefeceris, praetereaue vesicam iis caprillam aut ovillam ustam e posca propinaveris, aut cum urina, quam continet calentibus cineribus inassatam, exhibueris, ac denique vesperi sitim tolerare coëgeris. Inhibet et leporis cerebrum cum aequalibus portionibus adipis anserini et gummi deglutitum, aut polentae permixtum et esitatum. Iuvat et ungulae apri tritae cochlearium cum melicrato, aut castorei, vel viticis, vel rutae tantundem.

Cap. CII. Nephriticis utiliter haec potui dentur: agarici drachma cum vini cyatho, anchusae radicis drachma similiter, alcyonii oboli duo ex aqua, amomi drachma cum vino, amygdalae amarae ex aqua potae, aut cum resina terebinthina delinctae, anagallidis aut polygoni succus cum vino, uvae passae demptis vinaceis esitatae, bunii succus e foliis et radice diebus duodecim potus ex passo, lac, aut paeoniae decoctum, glycyrrhizae succus, elates unguentariae infusum aut decoctum, terrestris erinacei inveterata caro cum vino, smyrnii semen cum pas-



σία σὺν οἴνῳ· καρδαμώμου < α' σὺν γλυκεῖ· κάλαμος ἀρωματίτης ὁμοίως· κιννάμωμον ὁμοίως· κέστρου φύλλων < α' σὺν γλυκεῖ· ἀρκεύθου ἀφέψημα ὁμοίως· μήρου ἀπόβρεγμα ὁμοίως· μίλτου λημνίας < δ' ὁμοίως· οὖρον ὄνου ποθὲν ἱστορεῖται ἰᾶσθαι· σάκχαρον σὺν ὕδατι· σκάνδικος ἀφέψημα· σταφυλίνου ἀγρίου σπέρμα· στρόβιλοι ἐσθιόμενοι· συμφύτου πετραίου ἀπόζεμα ἐν μελικράτῳ· σῦκα ξηρὰ ἐσθιόμενα· χαμαιπίτυος ἀπόζεμα ἐν μελικράτῳ.

Κεφ. ργ'. Ἐὰν ἔλκος δέ τις ἔχει ἐν τῷ καυλῷ, καὶ ἐπιδάκνηται, ἐνεργῶς βοηθεῖ τραγανάνθης < β' βεβρεγμένης ἐν οἴνῳ νήστεσι ἐκλεικτόν.

Κεφ. ρδ'. Ἐὰν δὲ αἷμα οὖρεῖ, σχιστῆς < α', τραγανάνθης < β' κόψας, ἀναλαμβάνει τροχίσκους ἀνὰ ὄβ. β', ἓνα διδούς ἐν γλυκεῖ. Τὰς δὲ ἐκ νεφρῶν αἰμορροαγίας ἴσθισι στρατιώτης ὁ ἐπὶ τῶν ὑδάτων πινόμενος.

Κεφ. ρε'. Ἀλγήματα δὲ κύστεως ἱᾶται λινόσπερμον ὦμον, σήσαμον, ὄρμινον, ἐκάστου κυ. α' κατ' ἰδίαν σὺν

so, cassia cum vino, cardamomi drachma cum passo, calamus aromaticus similiter, itemque cinnamomum, betonicae foliorum drachma cum passo, iuniperi decoctum similiter, itidemque mei infusum, aut rubricae lemniae drach. iiij. Urina asini pota auxilio esse fertur, saccharum cum aqua, scandicis decoctum, pastinacae sylvestris semen, nuclei pinei in cibo sumpti, petraei infusum in melicrato, ficus siccae esitatae, chamaepityos infusum in melicrato.

Cap. CIII. Ulceri virgae morsus sensum inferenti efficaciter auxiliantur tragacanthae drach. ij. in vino maceratae et a ieiunis sumptae ad modum eclegmatis.

Cap. CIV. Ad sanguinis mictum aluminis scissilis drach. j., tragacanthae drach. ij. contundito, et pastillos fingito, quorum singuli binos pendant obolos: ex his unum e passo propinato. Sanguinis vero e renibus manantis profluvia sistit stratiotes in aquis nascens epotus.

Cap. CV. Doloribus vesicae medentur lini semen crudum, sesamum, horminum, singula per se ex passi

γλυκεῖ πινόμενος· ὄξυσχοίνου σπέρμα· ἢ βολβῶν τῶν ἐκ πυ-  
ρῶν <sup>78</sup> σπέρμα ὁμοίως· λωτοῦ σπέρμα ὁμοίως ἐν οἶνῳ· μή-  
κωνος μελαίνης ἢ λευκῆς σπέρματος < α' σὺν ὕδατι θερμοῦ  
πινομένη, ἢ μελικράτῳ· κυδωνίων ἄνθη· ἢ ἐλίκων ἀμπέλου,  
ἢ ἀνδράχνης ἀφέψημα πινόμενον· ἢ γεντιανῆς χυλὸς σὺν ὕδατι.

Κεφ. ρζ'. Καταπλάσσεται δὲ ὠφελίμως ἐπὶ ἀλγούσης  
κύστεως νυμφαίας ῥίζα καὶ σπέρμα· πολύγονον· πετροσέλι-  
νον· χαμαιπίτυς σὺν οἶνῳ καὶ στέατι ὑεῖω ἐψημένη· κριθί-  
νη γῦρις, τῆλις, λινόσπερμον, φοίνικες, μῆλα κυδωνία ἐφθαά,  
κωδίαί μήκωνος ἐφθαί καὶ ὑοσκυάμου ἀλεύρω μιγεῖσθαι.

Κεφ. ρζ'. Πρὸς δὲ τὰς ἐλκώσεις τῆς κύστεως ποιεῖ  
μὲν καὶ τὰ ἐπὶ νεφριτικῶν ἀναγεγραμμένα ποτά· ἀρμόζει δὲ  
καὶ ταῦτα· ἀγρώστεως τῆς ἐν Παρνασσῷ φυομένης ῥίζα, καὶ  
τῆς ἄλλης τε ἀφεψηθεῖσα ἐν ὕδατι πινομένη· ἀνδράχνης χυ-  
λὸς ἐν γλυκεῖ· γάλα γλυκύ· ἐλάτης μυρσινικῆς ἀπόζεμα· κυ-  
παρίσσου φύλλα μετὰ σμύρνης ποθέντα· ἰᾶται δὲ κύστιν  
ῥευματιζομένην μαλάχη ἐσθιομένη, ἢ μύρτα ἐσθιόμενα.

78) Foës. oecon. Hipp. βόλβιον.

cyatho uno pota: oxyschoeni semen, bulborum e tritico  
semen similiter: pariter et loti semen e vino, seminis  
papaveris nigri aut albi drachma ex aqua calida aut me-  
licrato pota: cotoneorum flores, vitis capreolorum, aut  
portulacae decoctum, gentianae denique succus ex aqua.

Cap. CVI. Dolenti vesicae haec utiliter adhiben-  
tur: nymphaeae radix et semen, polygonum, petioseli-  
num, chamaepitys cum vino et adipe suillo cocta, hor-  
deaceus pollen, foenum graecum, lini semen, palmulae,  
mala cotonea cocta: capita denique papaveris cocta, hyos-  
cyami farinae admixta.

Cap. CVII. Vesicae exulcerationibus medentur tum  
quae nephriticis bibenda praescripsimus, tum praeterea  
haec: radicis graminis tum parnassii, tum etiam alius eu-  
iuspiani ex aqua decoctum in potu: portulacae succus cum  
passo, lac dulce, elates unguentariae infusum: cupressi  
folia cum myrrha pota, quae vesicae etiam fluxione ten-  
tatae auxiliantur: malva in cibo sumpta, myrti denique  
baccae esitatae.

Κεφ. ρθ'. Ἐπιδεκνομένην δὲ κύστιν ὠφελῆ σάκχαρον πινόμενον· σκάνδικος ἀφέψημα πινόμενον· καὶ τῆς λεγομένης φαλήρειως (φαλαρίδος) βοτάνης κοπείσης θλιβείς ὁ χυλὸς σὺν οἴνῳ· γεννᾶται δὲ ἐν τοῖς σίτοις· συμφύτου ἀφέψημα· κνήκος ἀλεθεῖσα· ἀμύγδαλα πικρά· στροβίλια πεφρυγμένα· κόμμι κοκκυμήλων· τραγάκανθον ἐν γλυκεῖ μετὰ κέρατος ἐλαφείου κεκαυμένου, μιγείσης αὐτῷ σχιστῆς ὀλίγης.

Κεφ. ρθ'. Δυσουρία δὲ βοηθεῖ πινόμενον ἀσπαράγου ἀγρίου ῥίζης ἀπόζεμα, καὶ τὸ σπέρμα σὺν οἴνῳ· πάνταξ σὺν μελικράτῳ· ποιεῖ δὲ καὶ πρὸς ψωριῶσαν κύστιν· πολυγόνου χυλὸς· σαμψύχου ἀπόζεμα· σέσελι· σικύου ἡμέρου σπέρμα καθαρὸν σὺν γάλακτι, ἢ γλυκεῖ, καὶ πικροῖς ἀμυγδαλοῖς· ἢ αὐτὰ ταῦτα ἀμύγδαλα ἐν γλυκεῖ· σκορδίου χύλισμα ἐν οἴνῳ· σταφυλίνου ἀγρίου σπέρμα, φιλεταιρίου ῥίζης < α' ἐν κράματι· φοῦ ἀπόζεμα· χαμαιπίτυος ὁμοίως· χαμαιλέοντος λευκοῦ < α' ἢ β' μετὰ ὀριγάνου ἀποζέματος ἢ οἴνου· ψευδοβουνίου κλωνία δ' μεθ' ὕδατος· ὠκίμου σπέρμα, ἀβρότονον ὁμοίως ἀποζεσθὲν ἐν ὕδατι, ἄχρις οὗ τρίτον λειψθῇ.

Cap. CVIII. Vesicae mordicationes rosionesve leniunt saccharum bibitum, scandicis decoctum epotum: phalaridis herbae, quae inter frumenta nascitur, contusae succus expressus cum vino: symphyti decoctum, cneei pollen, amygdalae amarae, nuclei pinei tosti, pruni arboris gummi, tragacanthum in passo cum cornu cervino usto, addito etiam aluminis scissilis momento.

Cap. CIX. Urinae difficultati bibita auxiliantur radicis asparagi sylvestris infusum, et semen eiusdem cum vino, panax cum melicrato, qui quidem scabie laboranti vesicae etiam succurrit: polygoni succus, sampsuchi infusum, seseli, cucumeris sativi semen mundatum cum lacte aut passo et amygdalis amaris, aut ipsa amygdala amara e passo: scordii expressus succus e vino: dauci sylvestris semen, philetacrii radicis drachma e vino diluto, plu infusum, similiter et chamaepityos, chamaeleonis albi drachma una aut altera cum origani infuso aut vino, pseudobunii ramuli quatuor ex aqua, ocimi semen, similiter et abrota-

ἀγαρικῷ < α' μετ' οἴνου· γλυκυρρίζης ἀπόξεμα πινόμενον· ὄξυ-  
 μυρσίνης ἀγρίας ρίζα ἀπέξεσμένη· δαμασσωνίου ρίζης < α' σὺν  
 οἴνῳ· στρόβιλοι καθαροὶ μετὰ σικύου σπέρματος καὶ γλυ-  
 κέως· ἀνθυλλίου < γ' σὺν οἴνῳ· ἀνθέμιδος ρίζαι καὶ τὰ  
 ἀνθη ὁμοίως· ἀσπαλάθου ἀπόξεμα ὁμοίως· ἀψίνθιον ἀπο-  
 ξεσθὲν σὺν σελίνου ρίζῃ ἴσῃ· ἢ σχοῖνος, ἢ τάρδος, ἢ μάρα-  
 θρον ἐν ὕδατι· βακχάριδος ρίζα ἐψηθεῖσα ἐν ὕδατι· βουνίου  
 τὰ φύλλα καὶ ἡ ρίζα, χυλισθέντα μετὰ μελικράτου· ἐλιχρύ-  
 σου ἄνθος σὺν τοῖς φύλλοις ἐν οἴνῳ· ἐρπύλλου ἀπόξεμα  
 ὁμοίως· σμυρνίου ρίζα πινόμενη ἐν οἴνῳ· ἡρύγγης ρίζα μετὰ  
 σταφυλίνου σπέρματος καὶ οἴνου· ἵπποσελίνου ρίζα καὶ  
 σπέρμα ὁμοίως· καρδάμωμον μετὰ οἴνου ἢ ὕδατος· κάλα-  
 μος ἀρωματίτης μετὰ ἀγρώστεως ρίζης, καὶ σελίνου σπέρμα-  
 τος, ἐψηθεὶς ἐν ὕδατι· κεδρίδες πινόμεναι μετὰ πεπέρεως  
 καὶ οἴνου· κιννάμωμον σὺν οἴνῳ· κοραλλίου < α', κλινόπο-  
 δίου ἀπόξεμα ἐν ὕδατι· κυπαρίσσου τῶν φύλλων ὁ χυλὸς  
 πινόμενος σὺν οἴνῳ· λεύκης τοῦ δένδρου φλοιὸς σὺν οἴνῳ·  
 ἔξωνύχου, τοῦ καὶ λιθοσπέρμου, καρπὸς πινόμενος ὁμοίως·

num ad tertias in aqua decoctum, agarici drachma cum  
 vino, dulcis radicis infusum potum, rusci sylvestris in-  
 fusa radix, damasonii radicis drachma cum vino, nuclei  
 pinei repurgati cum semine cucumeris et passo, anthylli-  
 dis drach. iij. e vino, anthemidis radices ac flores simi-  
 liter, aspalathi infusum eodem modo, absinthium infu-  
 sum cum aequali portione radicis apii, schoenus, aut  
 nardus, aut foeniculum ex aqua, baccharidis radix de-  
 cocta in aqua, bunii e foliis et radice succus cum meli-  
 crato, elichrysi flos cum foliis e vino, serpylli infusum  
 similiter, smyrnii radix pota e vino, eryngii radix cum  
 semine dauci et vino, hipposelini radix et semen simili-  
 ter, cardamomum cum vino vel aqua, calamus aromati-  
 cus cum radice graminis et apii semine coctus in aqua,  
 cedri baccae cum pipere ex vino potae, cinnamomum  
 cum, vino corallii drachma, elinopodii infusum in aqua,  
 cupressi foliorum succus ex vino potus, populi albae cor-  
 tex cum vino, exonychi, quod et lithospermon dicitur,



αἱματίτης λίθος ἐν οἴῳ· μαράθρου ἀφέψημα σὺν ὕδατι· μυριόφυλλον ὁμοίως· πτελέας ῥίζα σὺν γλυκεῖ· ὀνόβρυχis ἐν οἴῳ· οἰνάνθη πόα καὶ ῥίζα· ὄνοι οἱ ὑπὸ ταῖς ὑδραῖς λεῖτοι· πινόμενοι· ὄρνιθος ἀπόπατος σὺν οἴῳ· εἰς δὲ τὸν οὐρητικὸν πόρον ὑποτίθενται πρὸς ἐξουρισμὸν κόρεις ἀπὸ κλίνης λεῖτοι· καταπλάσσεται δὲ πρὸς δυσουρίας ὀρόβινον ἄλευρον σὺν ὄξει, καὶ ἐπιδίδεται· ὁμοίως δὲ οὖρα ἄγει μῆον λεῖον καταπλάσθην κατὰ τοῦ ἐφηβαίου· ὑποθυμιάμενα δὲ καὶ οὖρα ἄγει βδέλλιον, ἀρτεμισία, ἀκρίδες, τρίχες ἐλάφου· περιεστολισμένος δὲ ἔστω κύκλωθεν, ἵνα ἀδιάπνευστος ᾗ· περικύρει καὶ τὸν δακτύλιον ἀμαρακίνῳ μύρῳ.

Κεφ. ρί'. Εἰς ἐγκαθίσματα δὲ ἀποζέννυται ἐπὶ τῶν περὶ τὴν κύστιν διαθέσεων ἀνθεις, δάφνη, κάλαμος ἀρωματίτης, κυπαρίσσου φύλλα.

Κεφ. ριά'. Λίθους δὲ τοὺς ἐν κύστει θρύπτει, πινόμενα σὺν οἴῳ, ἀδιαντον, φιλειταιρίου ῥίζης < β', σμυρνίου σπέρμα· ὄξυμυρσίνης ῥίζα ἐν γλυκεῖ ἀποβροχομένη, καὶ

semen similiter potum, haematites lapis e vino, foeniculi decoctum in aqua, millefolium similiter, ulmi radix cum passo, onobrychis cum vino, oenanthe herba et radix, millepedae, quae sub vasis aquariis degunt, tritae ac potae, finus gallinaceus cum vino. Cimices lectularii contriti urinae fistulae ad eliciendam urinam induntur. Imponitur vero contra difficultatem urinae farina ervi cum aceto, et superilligatur: similiter et urinas ciet meum tritum, pectini impositum. Suffumigata quoque urinas movent bdellium, artemisia, locustae et pili cervini: undique vero vestibis cinctum coopertumque esse oportet, cui remedium adhibetur, ut ne suffitus vapor quaquaversum exhalet atque dissipetur. Sedes etiam amara-cino unguento circumlinatur.

Cap. CX. Ad insessus autem ebulliant in vesicae affectionibus anthemis, laurus, calamus aromaticus et cupressi folia.

Cap. CXI. Calculos vesicae conterunt atque comminuunt adiantum, philetaerii seu polemonii radicis drach. ij., smyrnii semen, rusci radix in passo macerata, et sc-

ὁ καρπὸς σὺν οἴνῳ· ἵππομαράθρου σπέρμα καὶ ἡ ῥίζα, ἀλ-  
θαίας ῥίζα καὶ τὸ σπέρμα· ἄλκυονίου μίλησιου ὀβ. β' σὺν  
ὑδατι· ἀμύγδαλα πικρὰ σὺν γλυκεῖ, καὶ τὸ ἔλαιον αὐτῶν·  
ἀνθέμιδος τῆς πορφυράνθους τὸ ἄνθος καὶ ἡ ῥίζα· λευκαν-  
θέμου ἀπόζεμα· ὀνώιδος ῥίζα σὺν οἴνῳ καὶ μέλιτι· βδελ-  
λίου < α' σὺν οἴνῳ· τριβόλου γλωροῦ καρποῦ χυλός· φή-  
νης τοῦ ὀρνέου, ὃ ῥωμαῖσι ὀσσίφραγον καλοῦσιν, ἡ κοιλία  
ξηρὰ κατ' ὀλίγον πινομένη· γλυκυσίδης ῥῶγες πυρροὶ ἐσθιό-  
μενοι καὶ πινόμενοι· ἐπὶ δὲ τῶν παίδων λιθιῶντων καὶ πρὸς  
τὰς ψωριώσας κύστεις ἀρμόζει δάφνης ῥίζης ὁ φλοιός· κυ-  
πείρου ἀφέψημα· σνάχυς, ἡ φύλλα Ἰνδικά· ὀποπάναξ· τρα-  
γάνανθα· γεντιανή· πλατυκύμινον· σπέρμα ἐνζώμου καὶ ξαν-  
θίου· κωνάρια· ἄλμη· ἐλένιον· ὄρχις κάστορος < α' μετ' οἴ-  
νου εὐώδους· κοτυληδόνης ῥίζα καὶ ἡ πόα ἐσθιομένη· κάρ-  
δαμώμου < α' μετὰ δάφνης ῥίζης τοῦ φλοιοῦ < α' σὺν οἴ-  
νῳ· κόμμεως τοῦ ἐξ ἀμυγδάλης πικρᾶς, ἡ ἀμπέλου, ἡ κοκ-  
κυμηλέας, μετὰ γλυκέως· ῥίζα ἐφθῇ ἐν οἴνῳ· ἐξωνύχου καρ-  
πὸς λεῖος· λίθοι οἱ ἀπὸ τῶν σπόγγων λεῖοι μετ' οἴνου· οὐ-

men eius cum vino, hippomarathri semen et radix, al-  
thaeae radix et semen, alcyonii milesii oboli duo ex aqua,  
amygdalae amarae cum passo, et ex iisdem oleum, an-  
themidis, quae flore est purpureo, et flos et radix, leucan-  
themi infusum, ononidis radix cum vino mulso, bdellii  
drachma cum vino, tribuli e virenti fructu succus, avis,  
quam ossifragum Latini vocant, ventriculus arefactus pau-  
latim epotus, paeoniae acini fulvi, tum esitati, tum etiam  
poti: (qui quidem puerulis calculo et scabie vesicae labo-  
rantibus conveniunt:) lauri e radice cortex, cyperi de-  
coctum, nardi indicae et spica et folia, opopanax, traga-  
cantha, gentiana, cuminum latum, semen crataegi et xan-  
thii, nuclei pinei, muria, helenium, castorii drachma  
cum vino odorato, umbilici Veneris radix et herba in ci-  
bo sumpta, cardamomi drachma una cum aequali ponde-  
re corticum radicis lauri e vino: gummi amygdali ama-  
rae, aut vitis, aut pruni, cum passo: radix in vino cocta,  
exonychi s. lithospermi semen contritum, lapides e spon-  
giis triti cum vino, urina taurina pota, parthenii, quod

ρον ταύρου πινόμενον· παρθενίου τῆς λευκανθέμου καλουμένης ἢ πόα· παλιούρου σπέρμα· ἄμωμον ἐσθιόμενον· τοῦτο δὲ καὶ τὰ λιθογόνα ὕδατα καθαίρει συνεινόμενον· σισυμβρίου ἀπόζημα· στρουθίου ῥίζα σὺν πάνακι καὶ καππάρεως ῥίζῃ· καὶ ἐξουρεῖν τὸν λίθον ποιεῖ· πολίου ἀπόζημα· λίθος ἰουδαϊκός, τριβόμενος σὺν ὕδατι καὶ πινόμενος· σκολοπένδριος βοτάνη· ἔστι δὲ καὶ διουρητικόν· σχοίνου ἄνθος πινόμενον καθ' ἡμέραν· μυσκέλεδρα<sup>79</sup> μετὰ ἐλαχίστου κρόκου καὶ σμύρνης ποτιζόμενα σὺν ὕδατι· ἢ μετὰ λιβανωτοῦ ὀλίγου καὶ οἰνομέλitos πολὺν ἐπιπασσόμενα, ἢ τὸ ἀφέψημα λιβανωτοῦ· ἢ λίθος τῶν ἐξουρηθέντων ὑπ' αὐτῶν τριβείς καὶ ποθεῖς ἐν οἴνῳ.

Κεφ. ριβ'. Οὐρητικά δέ ἐστι καὶ τὰ παραδιδόμενα μὲν πρὸς δυσουρίας καὶ λιθιῶντας· καὶ ταῦτα δὲ πινόμενα σὺν οἴνῳ ὠφελεῖ δυσουροῦντας, καὶ ἐφ' ὧν οὖρα κινῆσαι βουλόμεθα, ὥς ἐπὶ ὑδρωπικῶν καὶ ἰκτερικῶν· ἀκάνθης λευκῆς ῥίζης < α'. ἀκάνθης τῆς παιδέρωτος καλουμένης ῥίζης ὁμοίως· ἀκόρου ῥίζα· τριφυλλίδος καρπός, καὶ ὁ χυλός αὐ-

79) *Μυόχοδα* Hesych., Pollux.

leucanthemon dicitur, herba, paliuri semen, amomum in cibo sumptum: (quod aquas etiam, quae calculos gignunt, emendat, si cum iis coquatur:) sisymbrii infusum. Struthii radix cum panace et capparis radice etiam calculos cum urina pellit: polii infusum, lapis iudaicus tritus cum aqua et potus, scolopendrium herba, quae et urinas ciet: schoeni flos quotidie potus, muscerda cum paucissimo croco et myrrha propinata ex aqua, aut cum pauciore copia largiore inspersa vino mulso, turis etiam decoctum, ac denique lapis, quem calculo laborans excreverit, tritus e vino potus.

Cap. CXII. Urinas ciet tum quae ad urinae difficultatem et calculos commemoravimus, tum et haec sequentia in vino pota, quae quidem adiuvant non solum urinae difficultate laborantes, sed et ceteros, quibus urinas pellere consultum fuerit, velut hydropicos et arquatos: spinae albae radice drachma, acanthi paederotis dicti radice tantundem, acori radix: trifolii semen, succus et

τῆς, καὶ τὸ ἀπόζημα· ἀρκτίου ῥίζα, καὶ τὸ ἀφέψημα αὐ-  
 τῆς· ἄρκειον καὶ προσώπειον, ἢ φιλάνθρωπος, ἢ σκορδόγιον,  
 ὃ Ῥωμαῖοι περσωνάκειαν καλοῦσι.<sup>80</sup> ἀκακίας τὸ σπέρμα ἄριστα  
 ποιεῖ λιθιῶσι μετὰ πεπέρεως καὶ οἰνομέλιτος· Ἀρεταῖος ὄνο-  
 σμα<sup>81</sup> ἐν τοῖς νεφριτικοῖς ἔγραψεν· ἡ νάρκδου συριακῆς ῥίζα· τραγ-  
 ορίανον· καὶ χυλὸς ὀριγάνου καὶ πετροσελίνου, ἵρεως· καρ-  
 πὸς σελίνου· κρίθμον· πηγάνου ἀγρίου σπέρμα· κνίδης σπέρ-  
 μα· ἀλθαίας τῆς ῥίζης ἀφέψημα, βρυωνίας ῥίζης λευκῆς ἢ  
 μελαίνης < α', καὶ ὁ ἀσπάραγος ἐσθιόμενος· ἀμπελόπρασα  
 ἐσθιόμενα· ἄνισον πινόμενον· ἄνηθον· ἄρου ῥίζα ξηρὰ ἐν  
 οἰνομέλιτι ἐφθῇ ἐσθιομένη· καὶ δρακόντιον ὁμοίως· ἀρκευθί-  
 δων ἀφέψημα, καὶ αὐταὶ λείπει πινόμεναι σὺν οἴνῳ· ἀσφοδέλου  
 ῥίζης < α' σὺν οἴνῳ· ἄσαρον ὁμοίως· ἀστραγάλου ῥίζα·  
 βαλσάμου καρπὸς < α', καὶ ὁπὸς βαλσάμου μετὰ γλυκέως·  
 τριχομανές· ὑακίνθου ῥίζα· ὑπερικόν· χαμαιιδάφνης ἀλεξαν-  
 δρίνης ῥίζα· γιγγίδιον· δίκταμνον· βάλανοι δρυῖνοι ἐσθιόμε-  
 ναι, καὶ τὸ ἀφέψημα αὐτῶν· ἑλενίου ἀφέψημα· ἐλελισφάκου

80) Diosc. lib. 4. cap. 107.

81) Aret. curat. diut. lib. 2. c. 4. Mutilus caput, ubi forte onosma commendatum fuit.

infusum: arctii radix et eiusdem decoctum, arcium, quod  
 et prosopium, aut philanthropos, aut scordonium, Latinis  
 personata dicitur: acaciae semen praeclare calculosis pro-  
 ficum cum pipere et vino mulso. Aretaeus inter nephriti-  
 corum remedia onosma reposuit. Nardi syriacae radix,  
 tragoriganum, succus origani, petroselini, iridis: semen  
 apii, crithmum, rutae sylvestris semen: urticae semen,  
 althaeae radice decoctum, bryoniae albae aut nigrae  
 dragma, asparagus in cibo sumptus, ampeloprasum esi-  
 tatum, anisum bibitum, anethum, ari radix sicca in mul-  
 so cocta et esitata, similiter et dracunculi radix, baccarum  
 iuniperi decoctum, et ipsae quoque tritae ex vino potae: as-  
 phodeli radice dragma cum vino, asarum simili modo, astragali  
 radix, carpobalsami dragma, opobalsamum cum passo,  
 trichomanes, hyacinthi radix, hypericum, lauri alexan-  
 drinae radix, gingidium, dictamnus, glandes quernae in  
 cibis sumptae, ac carundem decoctum, helenii decoctum,



ἀφείψημα· ξερίνθοι ἐσθιόμενοι, καὶ τὸ ἀφείψημα αὐτῶν·  
 ἐρυθρόδανον· ἑλίνος θαλάσσιος· θέρμου ῥίζης ἀπόζεμα· θρί-  
 δαξ ἐφθῇ, ὡς λάχανον ἐσθιομένη· ἢ θύμον, ἢ θύμβρα· ἵππου-  
 ρίδος ῥίζα, καὶ τὰ φύλλα· ἰτέας ὁπός· καπνός· ὁ ἐπὶ ταῖς  
 κριθαῖς βρωθεὶς χυλὸς δι' οὖρων ἄγει· καλαμίνθης ἀπόζε-  
 μα, κάχρους· κισσὸς αἶμα ἄγει· κόστος, καὶ κρόκος καὶ ἡ ῥί-  
 ζα αὐτοῦ μετὰ γλυκέως· κρόμμυα ἐφθά· λιγυστικοῦ ῥίζα  
 καὶ ὁ καρπός· λίθοι οἱ ἐκ σπόγγων· μαλαβάθρου φύλλα·  
 μελάνθιον· ξιφιδίου ῥίζα ἢ ἄνω· κόρεως καρπὸς σὺν οἴνω·  
 ὀλοσχοίνου καρπός· ὀνόβρυχis· ὀρίγανον· οὖρον λυγγός<sup>82</sup>  
 λαῖον ἐν ὕδατι· αἰγὸς οὖρον ὁμοίως μετὰ νάρκδου στάχους·  
 περικλυμένου φύλλα· πέπερι· πήγανον· πίτυος φλοιός· πό-  
 λιον· πράσιον· πράσον ἐφθόν· ῥάφανος καὶ τὸ σπέρμα· ῥη-  
 τίνῃ πᾶσα, μάλιστα δὲ σχίνου· σέλινον ὠμὸν καὶ ἐφθόν, καὶ  
 τὸ σπέρμα αὐτοῦ· σιδηρεῖτις, ἢ καὶ Ἡρακλεία· σίσων· ἄσαρον·  
 σκίλλης ὁπτῆς < α' σὺν ὀξυμέλιτι· σόγγον ῥίζα καὶ ὁ καρπός·  
 στρουθίου ῥίζα· ἰσχυρῶς οὖρητικαί εἰσι στρόβιλοι ἐσθιόμενοι.

82) Dioscor. lib. 2. c. 100.

salviae decoctum, cicer in cibo sumptum, eiusdem deco-  
 ctum, rubia, echinus marinus, lupini radice infusum, la-  
 ctuca elixa, oleris instar in cibo sumpta, thymus, thym-  
 bra, equiseti radix et folia, salicis liquor, fumaria: cre-  
 mor hordei assumptus urinas trahit: calaminthae infusum,  
 cachrys: hederæ etiam sanguinem cum lotio educit: co-  
 ctus, crocum, huius radix cum passo, cepae elixae, li-  
 gustici radix et semen, lapides spongiarum, malabathri  
 folia, nigella, gladioli radix superior, coreos semen cum  
 vino, holoschoeni semen, onobrychis, origanum, lyncis  
 urina trita ex aqua, caprae urina similiter cum spica nar-  
 di, periclymeni folia, piper, ruta, pini cortex, polium,  
 marrubium, porrum elixum, raphanus eiusdemque se-  
 men: resina quacvis, praecipue vero lentiscina: apium,  
 seu crudum, seu etiam coctum, ac semen eiusdem, side-  
 ritidis, quae et Hieraclea dicitur, sison, asarum, scillae to-  
 stae drachma cum oxymelite, sonchi radix et semen, stru-  
 thii radix: pinei denique nuclei esitati vehementer urinas  
 promovent.

## Θ Η Ρ Ι Α Κ Α.

Κεφ. ριγ'. Λυσσοδήκτοις δὲ ὠφελεῖ τὸ αἷμα τοῦ λυσ-  
 σῶντος κυνὸς ποθέν, καὶ τὸ ἥπαρ αὐτοῦ ὀπηθέν καὶ  
 βρωθέν· καρκίνων ποταμίων ὀφθαλμοὶ φωχθέντες, καὶ μετὰ  
 ὕδατος ποθέντες κυ. α'. ἢ καὶ ὅλων καέντων τῆς τέφρας <  
 α' ἢ δ'· γεντιανῆς < α', καὶ ἀμπέλου λευκῆς τῆς τέφρας <  
 β' σὺν οἴνῳ λευκῷ ἐπὶ ἡμέρας γ' πινόμενον· καὶ ὁ κυνό-  
 δους δὲ τοῦ δακόντος κυνὸς, ἐντεθεὶς εἰς σκυτίδα, καὶ πε-  
 ριαφθεὶς βραχίονι, ὠφελεῖ· καὶ λύκιον ποθέν· ἢ ἀριστολο-  
 χίας καὶ γεντιανῆς καὶ σαφνίδων καὶ σύρνης ἴσον ἐκάστου  
 ἀναλαβὼν δίδου πιεῖν, ἢ καὶ ἐπὶ τὸ δῆγμα ἐπιτίθει· βάτρα-  
 χοὶ σκευασθέντες καὶ ἐσθιόμενοι· πυτία κυνὸς ἐν ἐψήματι·  
 καταπλάσσειν δὲ δεῖ ἐπὶ τῶν λυσσοδήκτων τὰ τραύματα τοῖς  
 δυναμένοις τηρεῖν ἐφ' ἱκανὸν τὰ ἔλκη, καὶ μὴ ἔαν ταχέως  
 ἀπουλοῦσθαι· βέλτιον δὲ, εἰ καὶ ἐπὶ παντὶ, εἰς αὐτὰ τὰ  
 κυνόδηκτα παραλαμβάνόμενον σκόροδον καθ' ἑαυτὸ, ἢ καὶ  
 σὺν μέλιτι· κνίδης φύλλα σὺν ἄλσιν, ἢ μέλιτι· κρόμμυον

*Theriaca, hoc est contra morsus ictusque  
 venenatos auxilia.*

Cap. CXIII. Morsis a cane rabioso conferunt haec:  
 sanguis rabidi canis potus, et eiusdem iecur assum co-  
 mestum, cancerorum fluviatilium oculi tostī et ex aquae  
 cyatho poti. Aut cineris e cancris integris crematis dra-  
 chma una aut altera, gentianae drachma una, cineris vitis  
 albae drach. ij. misceantur, et cum vino albo triduo bi-  
 bantur. Iuvat et dens caninus rabiosi canis, qui momor-  
 derit, folliculo ex aluta inditus et brachio adalligatus:  
 lycium potui datum. Aristolochiae, gentianae, baccarum  
 lauri et myrrhae partes aequales mixtae propinantur, aut  
 etiam vulneri ex morsu imponuntur: apparatus etiam ra-  
 nae in cibo sumuntur, uti et canis coagulum in sapa.  
 Vulneribus etiam adhiberi oportet, quae diutius eadem  
 dilatata servant, nec tam cito sinant coire ac cicatrice ob-  
 duci. Quare consultum fuerit, ut in quovis alio, ita  
 maxime in canis rabiosi morsu allium usurpare, seu per  
 se, seu etiam cum melle. Proficiunt et urticae folia cum

μεθ' ἁλός, ἢ πηγάνου· σίλφιον μεθ' ἁλός· ὁπὸς σιλφίου παττόμενος λείος, ἢ καταπλαττόμενος· τάριχος πᾶς· τέφρα κληματίνη σὺν ἐλαίῳ· ἄκτῆς φύλλα σὺν ἁλσίν· ἀμύγδαλα πικρὰ σὺν μέλιτι· βαλλωτῆς φύλλα, ἢ ἀρνογλώσσου σὺν ἁλσίν· ἡδύοσμον ὁμοίως· κάρυα βασιλικὰ σὺν κρομμύῳ καὶ ἁλσὶ καὶ μέλιτι· μελισσόφυλλον μεθ' ἁλῶν· μυάκων σάρξ· νίτρον σὺν ὑείῳ στέατι· ὀρόβινον μετὰ μέλιτος· οὔρον ἀνθρώπινον καταντλούμενον· πήγανον σὺν ὄξει· πυροὶ ὥμοι μασσηθέντες καὶ ἐπιτεθέντες· σικύου ἡμέρου φύλλα σὺν οἴνῳ· ὁπὸς συκῆς ἐπισταζόμενος, ἢ συκῆς φύλλα· ἢ κράδαι ἀπαλαὶ σὺν μέλιτι· τέφρα συκίνῃ σὺν κηρωτῇ· ὑὸς ἄφοδος σὺν ὄξει ἐψηθεῖσα· καὶ τὸ περσικὸν μῆλον μασσηθὲν καὶ ἐπιτεθέν.

Κεφ. ριδ'. Ποτὰ δὲ κοινὰ πρὸς ἔρπειτὰ δίδεται πέπερι σὺν ὄξει καὶ μηκωνίῳ· πηγάνου ἀγρίου σπέρμα· πλάτανου σφαιρία ὁμοίως· πολεμωνίου, τοῦ καὶ φιλεταιρίου, < α' σὺν οἴνῳ· πυρίτης ἢ πύρεθρον· πυτία νεβροῦ καὶ λαγωοῦ· σαγαπηνοῦ < α'· σελίνου σπέρμα· σκορδίου < β', τοῦ δὲ

sale aut melle, cepa cum sale aut ruta, silphium cum sale, eiusdem liquor, aut tritus inspersus, aut alioqui cataplasmatitis instar applicitus, salsamentum omne, cinis sarmentitius cum oleo, sambuci folia cum sale, amygdalae amarae cum melle, ballotes aut plantaginis folia cum sale, mentha similiter, nuces inglandes cum cepa, sale et melle: apiastrum cum sale, mytulorum caro, nitrum cum suillo adipe, farina ervi cum melle, urina humana affusa pro fotu, ruta cum aceto, triticum crudum mansum et impositum, cucumeris satiivi folia cum vino: fici liquor instillatus, eiusdem folia aut tenelli surculi cum melle: cinis ficulneus cum cerato, succerda cum aceto cocta. Persicum denique malum commanducatum et impositum.

Cap. CXIV. Ad quosvis serpentium morsus communia haec remedia potui dantur: piper cum aceto et meconio, rutae sylvestris semen, platani globuli similiter: polemonii, quod et philetaerium appellatur, drachma cum vino: pyritis seu pyrethrum, coagulum hinnuli ac leporis, sagapeni drachma, apii semen, scordii drachmae

χυλίσματος < α' σπαργανίου ρίζα καὶ ὁ καρπός· συκαμίνου ὀπός· τεύκριον· τευκρίου ρίζης χυλός· ταῦτα σὺν οἴνῳ λαμβανόμενα· πυρίτης, κὰν ὑποζύγιον δηχθῇ, ἐγχυθεὶς διὰ στόματος σὺν οἴνῳ, ὑγιάζει.

Κεφ. ριέ. Πρὸς δὲ τὰ τῶν ἔχειν δῆγματα τῶν σὺν οἴνῳ λαμβανομένων, καὶ ἐν τροφῇς μέρει, ἀνυτικώτατον βοήθημα ἐπ' αὐτῶν ἡ σκοροδοφαγία καὶ ἀκρατοποσία· ὥστε ἂν ὑπομένη τις πλείονα βρωῶσιν καὶ πόσιν, μὴ χρῆζειν ἄλλου βοηθήματος· ποιεῖ καὶ χελώνης θαλασσίας αἶμα ξηρόν σὺν κυμίνῳ ἀγρίῳ· πυτία λαγωῦ· αἰδοῖον ἐλάφου ἄθροενος < α' ξηρά· ἀκάνθης λευκῆς (σπέρμα)· συκῆς φύλλα· ἀκόρου ρίζα καὶ φύλλα· ἔχιον· χαμαῖδρωψ·<sup>83</sup> νάρδου συριακοῦ ρίζα· ἀριστολοχίας μακρᾶς ρίζα· σμύρνιον· ἀπαρίνης χυλός· λιβανωτίδος ρίζα· πηγάνου ἀγρίου ρίζα· βρυωνίας λευκῆς ἢ μελαίνης ρίζα· ἀμπελόπρασον ἐσθιόμενον· ἀγαρικοῦ < α' ἀναγαλλίδος χυλός· ἄνισον· περιστρεῶνος ρίζα· ἀσπαράγου ἀφέψημα, ἢ σπέρμα· ἀρκευθίδες· ἀσφοδείου ρίζης

83) Diosc. lib. 3. c. 102.

quae, densati vero eiusdem succi drachma una, sparganii radix et semen, sycomori liquor, teucrium, radicis teucrii succus: haec porro cum vino sumenda. Pyritis vero etiam iumentorum ex morsu vulnera per os infusa sanat.

Cap. CXV. Inter ea, quae contra viperarum morsus in cibo potuque ex vino sumuntur, praesentissimum atque efficacissimum praestant auxilium alliorum esus et meraci potio, ita ut, si quis frequentius et largiore copia illis utatur, haudquaquam alio egeat remedio. Facit et praeclare testudinis marinae sanguis exsiccatus cum sylvestri cumino, coagulum leporis, cervi maris pudendum aridum drachmae unius pondere, spinae albae [semen], ficulnea folia, acori radix et folia, chamaedrops, nardi syriacae radix, smyrnium, aparinae succus, libanotidis radix, rutae sylvestris radix, bryoniae tam albae quam nigrae radix, ampeloprasum in cibo sumptum, agarici drachma, anagallidis succus, anisum, verbenacae radix, asparagi decoctum, aut semen, iuniperi baccae, asphodeli



< γ' ἀσκληπιάδος ῥίζα· ἀστέρος ἄττικου τὸ ἄνθος· ἀ-  
 τρακτυλίδος ἄνθη καὶ τὰ φύλλα, ὅσον < α', μετὰ πεπέ-  
 ρεως· πιστάκια λεῖα πινόμενα, βάτραχοι ζωμευθέντες καὶ  
 ἐσθιόμενοι· βαλσάμου ὁποῦ ἢ καρποῦ < α', ἢ βδελλίου <  
 α' ἢ γαλὴν σκελετεύσας καὶ ξηράνας, δίδου < β'· γεντιανῆς  
 ῥίζης < β' μετὰ δυοῖν ὀβολοῖν πεπέρεως καὶ πηγάνου· τοῦ  
 δὲ χυλοῦ < α'· γῆς σαμίας τοῦ ἀστέρος < β'· δαύκου σπέρματος  
 < β'· ἐγκέφαλος ἀλεκτορίδων πινόμενος· βάλανοι δρύϊνοι ἐσθιό-  
 μενοι· ἱρίδος < β'· ἑλενίου ἀπόζεμα· ἐλαφοβόσκου ῥίζα καὶ  
 σπέρμα· ἐλιχρύσου ἀπόζεμα· ἐρπύλλου ἀπόζεμα· ἐρυθροδά-  
 νου φύλλα καὶ καυλοί· ἐχίου ῥίζα, καὶ καυλός, καὶ φύλλα,  
 καὶ σπέρμα· τριφυλλίδος σπέρματος < α', καὶ τὰ φύλλα  
 ὁμοίως· τραγορίανος· ἥπαρ κάπρου λεῖον ἐν οἴνῳ· ἡρύγγης  
 ῥίζης < α' μετὰ σταφυλίνου σπέρματος· ἵππομαράθρου ῥί-  
 ζα καὶ σπέρμα· ἄμωμον, καὶ κασσία· καρδάμωμον, καὶ καρ-  
 κίνοι ποτάμιοι λεῖοι, σὺν γάλακτος διεθέντες· ἥττον δὲ οἱ  
 θαλάσσιοι· κέστρου φύλλων < β'· κιννάμωμον· κλινοποδίου  
 ἀπόζεμα· κόστου < β' μετὰ πεπέρεως ὀβολῶν β'· ὀρίανος

radicis drach. iij., asclepiadis radix, asteris attici flos:  
 atractylidis flores et folia drachmae pondere cum pipe-  
 re; pistacia trita pota, ranae in iure elixae ac esitatae,  
 balsami liquoris aut seminis drachma, bdellii drachma,  
 mustelae inveteratae et exsiccatae drach. ij., gentianae ra-  
 dicis drachm. ij. cum duobus piperis obolis et ruta: suc-  
 ci autem drachm. j., asteris samii drachm. ij., seminis dau-  
 ci drachm. ij., cerebrum gallinaceum potum, glandes quer-  
 nae esitatae, iridis drachm. ij., helenii decoctum, pasti-  
 naciae radix et semen, elichrysi infusum, itidemque ser-  
 pylli, rubiae folia et caules: echii radix, folia, caulis et  
 semen: seminis trifolii drachma, et folia similiter: trago-  
 riganum, apri iecur tritum in vino, cryngii radicis  
 drachma cum semine dauci, hippomarathri radix et se-  
 men, amomum, cassia, cardamomum: cancri fluviatiles  
 triti cum lacte dissoluti: itemque marini, sed illis minus  
 efficaces: betonicae foliorum drachm. ij., cinnamomum,  
 clinopodii decoctum, costi drachm. ij. cum totidem pipe-  
 ris obolis, origanum heracleoticum, ac eius infusum,

ήρακλεωτική, καὶ τὸ ἀπόζεμα αὐτῆς· κράμβης χυλός· κυκλαμίνου ῥίζα· κυπαρίσσου σφαιρία· κύμινον ἡμερον καὶ τὸ ἄργιον· λαγωῦ πυτία καὶ νεβροῦ· λεοντοπετάλου ῥίζα· μυρικής ἀπόζεμα· μαράθρου σπέρμα· μυρσίδος ῥίζα· αἱματίτης λίθος σὺν οἶνῳ· ἀριστολοχίας ῥίζης, σμύρνης, δαφνίδων, γεντιανῆς, ἴσον ἐκάστων μέλιτι ἀναληφθὲν πίνεται, καὶ ἐπὶ τὴν πληγὴν ἐπιτίθεται· μελίας φύλλα σὺν οἶνῳ, ἥ ὁ χυλός αὐτῶν, κἂν ἤδη ἀποθνήσκει· οὔρον τὸ ἴδιον ποθὲν καὶ ἐπιτεθὲν μεγάλως ὠφελεῖ· ἡ ἄγχουσα· πλατάνου καρπός· κάρδαμον· κυπάρισσος· πίτυος φλοιὸς σὺν οἶνῳ· ἡλιοτρόπιον.

Κεφ. ριζ'. Κεράσταις δὲ ἰδίως ἀρμόζει ἄμμεως < β' μετὰ σμύρνης καὶ οἶνου.

Κεφ. ριζ'. Καταπλάσσεται δὲ προσεχῶς τριφυλλίδος φύλλα· μελίας φύλλα· πήγανον· καλαμίνθης φύλλα· λινόσπερμον σὺν ἁλσὶν ἢ ὀριγάνῳ καὶ μέλιτι· πρὸς κεράστας καὶ ὄρνιθες ἀνασχισθεῖσαι ζῶσαι καὶ ἐπιτεθεῖσαι θερμαί· ἀλλασσεῖν δὲ δεῖ συνεχῶς· ἀπόπατος αἰγὸς ἐψηθεῖσα ἐν ὄξει· ἀρι-

brassicae succus, cyclaminis radix, cupressi globuli, cuminum, tum sativum, tum et agreste, leporis atque hini-nuli coagulum, leontopetali radix, tamaricis infusum, foeniculi semen, myrrhidis radix, lapis haematites cum vino. Aristolochiae radiceis, myrrhae, baccarum lauri, gentianae partes aequales excipiuntur melle, atque conflatum ex iis medicamentum et potui datur, et vulnere imponitur. Fraxini folia ex vino, ac eorundem succus etiam moribundo prosunt. Urina propria pota et imposita magnifice iuvat: nec non et anclusa, platani fructus, nasturtium, cupressus, pini cortex cum vino, heliotropium.

Cap. CXVI. Privatim vero cerastae morsui adversantur ammeos drachm. ij. cum myrrha et vino.

Cap. CXVII. Adhibentur vero, ita ut adhaerescant, trifolii folia, fraxini folia, ruta, calaminthae folia, lini semen cum sale, vel origano ac melle: gallinae vivae dissectae et adhuc calentes impositae: sed in ipsarum locum alias subinde sufficere oportet: fimus caprinus coctus in

στολοχίας μακρᾶς ἢ ῥίζα μετὰ ὕδατος· ἀσφοδέλου ῥίζα, ἄν-  
θη, φύλλα, σὺν οἴνῳ· κεδρία ἢ πίσσα ὑγρὰ σὺν ἁλσί, καὶ  
πρὸς κεράστιας· δάφνης φύλλα σὺν ἐλαίῳ ἐψηθέντα· ἐρείκης  
φύλλα σὺν οἴνῳ· ἐχίου φύλλα ὁμοίως· τρυῆ οἴνου μετὰ ἁλ-  
φίτου καὶ ὄξους· κρόμμυα ὁμοίως· ὀρόβινον σὺν οἴνῳ· πη-  
γάνου φύλλα μεθ' ἁλὸς καὶ μέλιτος· πίτυρα ἐν ὄξει ἐψηθέν-  
τα· πράσον καρτόν· ῥαφάνου φλοιὸς σὺν μέλιτι· σάμψυχον  
σὺν ἁλσί καὶ ὄξει· σκίλλα ἐψηθεῖσα ἐν ὄξει· σκόροδα ἐν  
ὄξει· τέτρα πάσα ἐν ὄξει, καὶ μάλιστα ἀπὸ κράμβης, ἢ με-  
λίσ· καταντλεῖται δὲ ἐπὶ τῶν ἰοβόλων τριφυλλίδος ἀπόξε-  
μα· ἐπὶ δὲ τῆς πληγῆς ἰδίως βούτυρον ἐπιτιθέμενον· ἀβρό-  
τονον λεῖον μετ' οἴνου, ἄγρου φύλλα, ἀδιάντον· ἐλκοὶ δὲ  
τὴν ἐπιφάνειαν, ἐὰν ἐπὶ πολὺ ἐάσης, γῆς παρίνης<sup>84</sup> φύλ-  
λα· πινέτωσαν δὲ ἐν ὀξυμέλιτι.

Κεφ. ριγ'. Πρὸς δὲ αἰμορροΐδος (καὶ προσηΐδος) δή-  
γματα ὠφελεῖ ἀνδράχνη καταπλασσομένη, ἀρνόγλωσσον, πε-  
ριστερεῶνος φύλλα· αὐτοῦ τοῦ θηρίου καεῖσα ἢ κεφαλὴ καὶ

84) Diosc. lib. 2. c. 207. Cum ξητίνης lectio sit corrupta, sub-  
stitutū ἀνεμώνης synonymon.

aceto, aristolochiae longae radix cum aqua: asphodeli ra-  
dix, flores et folia cum vino: cedria aut pix liquida cum  
sale, quae et contra cerastae morsum valet: lauri folia  
cum oleo cocta, ericae folia cum vino, echii folia simili-  
ter, faex vini cum polenta et aceto, cepae similiter, er-  
vi farina cum vino, rutae folia cum sale et melle, fur-  
fures in aceto decocti, porrum sectivum, raphani cortex  
cum melle, sampsuchum cum sale et aceto, scilla in ace-  
to cocta, allia cum aceto: cinis omnis cum aceto: maxi-  
me vero e brassica vel fraxino. Foventur et a virulentis  
animantibus inflicta vulnera trifolii infuso: peculiariter  
autem ipsis vulneribus butyrum imponitur: abrotanum  
tritum cum vino, folia viticis, adiantum. Summam vero  
cutem ulcerant, si diutius reliqueris, anemones folia:  
bibantur et ex aceto mulso.

Cap. CXVIII. Contra haemorrhoidis [ac presteris]  
morsus haec conveniunt: portulaca imposita, plantago,  
verbenacae folia, ipsius serpentis caput crematum et im-

ἐπιτεθεῖσα· ὕσσωπον· ἄσβεστος· σκόροdon λευκόν· πράσον· πήγανον· κνίδη· κάρδαμον, καὶ σπέρμα· σκόροdon λεῖον σὺν οἴνῳ ποθέν· ἀσταγίδες ἐσθιόμεναι· νεοσσοὶ ὠμοὶ ἐσθιόμενοι σὺν οἴνῳ.

Κεφ. ριθ'. Ἐπὶ δὲ προσητῆρος ὠμοτάριχος θύννος πολὺς ἐσθιόμενος· δεῖ δὲ οἶνον πολὺν ἐπιπίνοντας ἐμεῖν.

Κεφ. ρκ'. Ἐπὶ δὲ ἀσπίδος ἢ πτυάδος κόρεις ζ' ἢ ἡ καταποθέντες ὠφελοῦσιν· ὅξος πινόμενον· συνεχῆς διέγερσις, πληγαὶ, κίνησις ὅλου τοῦ σώματος· καταντλεῖται δὲ ὠφελίμως θάλασσα θερμή.

Κεφ. ρκβ'. Πρὸς πληγὰς σκορπίων, καὶ φαλαγγίων, καὶ σφηκῶν, καὶ μελισσῶν, ποτὰ σὺν οἴνῳ λαμβανόμενα· ἀβρότονον· ἀγαρικοῦ < α'· ἀγρηάτου σπέρμα· ἀδιαντον· αἰεῖζων· σκορπιοειδὲς, ἰδίως πρὸς σκορπίου πληγὴν· ἔρφυλλος· ἀλθαίας ῥίζης < α'· λυχνίδος σπέρμα, ἰδίως δὲ πρὸς φαλάγγια· συκαμίνου ῥίζης ὅπὸν δῶς πιεῖν, ἢ σταγίδας· ὄξαλίδος ὃ καρπὸς καὶ ἡ ῥίζα· ὀνογύρου < δ'· ἄμμεως < β' ἐξόχως ποιεῖ· ἀσφοδέλου καρπὸς, καὶ τὸ ἄνθος ποθέν·

positum, hyssopus, calx viva, allium candidum, porrum, ruta, urtica, nasturtium et eius semen, allium tritum ex vino potum, uvae passae esitatae, pulli crudi cum vino in cibo sumpti.

Cap. CXIX. In presteris morsu conditanei thunni caro abunde comesta auxiliatur, sed vino copioso deinde superbite vomitus concitandus est.

Cap. CXX. Ad aspidis aut ptyadis morsum cimices septem octove devorati iuvant, acetum bibitum, assidue excitationes, percussiones et totius corporis agitationes. Utiliter etiam aqua marina calens perfunditur.

Cap. CXXI. Ad scorpionum, phalangiorum, vesparum et apum ictus haec e vino bibuntur: abrotanum, agarici drachma, agerati semen, adiantum, sempervivum, scorpioides, (quod scorpionis ictui privatim adversatur,) serpyllum, althaeae radices drachma, lychnidis semen, (quod peculiariter phalangiis resistit,) sycamini radices liquor potui datus, oxalidis semen et radix, onogyri drach. iiij., ammeos drach. ij. eximie iuvant: asphodeli semen et



δακίνθου ῥίζα· χαμαίδρους ἀπόξεμα, καὶ ὁ χυλὸς· γλήχων· ἱρίδος < β'· θριδάκος ἀγρίας σπέρμα· ὑπερικόν· κονία σὺν κίνη· κισσοῦ ῥίζης χυλὸς σὺν ὄξει· κυπαρίσσου σφαιρία σὺν οἴνῳ· μαλάχης ζωμὸς πινόμενος, καὶ αὐτὴ ἐφθὴ ἐσθιομένη· μελανθίου < α'· μελισσόφυλλον, καὶ ὁ χυλὸς αὐτοῦ· σόγχος ἐσθιόμενος· μύρτα χλωρά· μυρίκης καρποῦ < α'· πηγάνου σπέρμα· πολύγονον, καὶ ὁ χυλὸς· τερεβίνθου καρπός· δαφνίδες λείαι· σκορπίουρον· καρδάμων· ἀναγαλλίδος χυλὸς· σκόροδα ἐσθιόμενα, ἐπεὶ ψύξιν ἐπιφέρουσι σκορπίων πληγαί· ἢ ὑοσκύαμου ἀπόξεμα, ἢ ἀπόβρεγμα σὺν οἴνῳ, ἄρμόζει πιεῖν, καὶ αὐτὸς ὁ σκορπίος ὅπτις βρωθεῖς· ἀσβόλη ἀπὸ τῆς καπνοδόξης μετ' οἴνου πινόμενη.

Κεφ. ριβ'. Καταπλασσόμενα δὲ ἄρμόζει σκορπιοπλήκτοις, καὶ μελισσῶν, καὶ σφηκῶν, καὶ φαλαγγίων πληγαῖς ταῦτα· βόλβιτον καταπλασθέν· ἐρφυλλον· ἄλεις λείῳ σὺν ὄξει· ἄμων μετὰ ὠκίμου· ἄλθαϊας φύλλα ἐφθὰ μετὰ ἐλαίου ὀλίγου μιγέντα· τάρικος πᾶς καταπλασσόμενος· ἡλιοτρόπιον, τὸ καὶ σκορπίουρον καλούμενον· κόνυζα· ὀρίγανον,

flos in potu: hyacinthi radix, chamaedryos decoctum et succus, pulegium, iridis drach. ij., lactucae agrestis semen, hypericum, lixivium e ficu, radice hederæ succus cum aceto, cupressi globuli cum vino: malvæ ius epotum, et ipsa elixa in cibo sumpta: melanthii drachma, melissophyllum et eius succus, sonchus in cibo sumptus, virides myrti baccae, tamaricis seminis drachma, rutæ semen, polygonon et eius succus, terebinthi fructus, lauri baccae contritæ, scorpiurus, cardamomum, anagallidis succus, allia esitata: (quoniam refrigerationem inferunt scorpiionum ictus:) hyoscyami infusum cum vino, ipse scorpius assus in cibo sumptus: fuligo denique e camino cum vino pota.

Cap. CXXII. Ad scorpionum, apum, vesparumque et phalangiorum ictus hæc applicita conveniunt: fimum bubulum, serpyllum, sal tritus cum aceto, amomum cum ocimo, althææ folia elixa, oleo pauco admixta, salsamentum quodvis adhibitum: heliotropium, quod et scorpiuron nominant: conyza, origanum, lilii folia, cycla-

κρίνου φύλλα· κυκλάμινον· πάνακος ἀσκληπιοῦ ἄνθη, καὶ τὰ φύλλα χειρωνίου· πόλιον σὺν ὄξει· δάφνης φύλλα ξηρά· ὁπὸς συκῆς ἐνσταζόμενος· μαλάχης φύλλα ἐφθὰ καὶ ὠμά· συκαμίνου φύλλα· σισύμβριον, ἢ καρδαμίνη σὺν ὄξει· μελισσόφυλλον· φλόμος σὺν ὄξει· χαμαίδρυς ὁμοίως· κυπάρισσος μασσηθεῖσα ὑπὸ νήστεως τινος, καὶ ἐπιτεθεῖσα· μῦες οἱ κατοικίδιοι ἀνασχισθέντες καὶ ἐπιτεθέμενοι· τυρὸς ἄλμυρὸς καταπλασσόμενος· κοχλίας λείος σὺν ὀστράκῳ· ἀσκαλαβώτης παραχοῖμα ἀνασχισθεὶς καὶ ἐπιτεθείς· θεῖον ἄπυρον ἀναληφθὲν ῥήτινῃ τερμινθίνῃ καὶ ἐπιτεθέν· γεντιανῆς ῥίζα ὁμοίως· ἄγρωστις λεία ἐπιτεθεῖσα παραχοῖμα παύει· ποιεῖ καὶ αὐτὸς ὁ σκορπίος λείος ἐπιπλασθεὶς· σαῦρος ἄρουραῖος ἀνασχισθεὶς καὶ ἐπιτεθείς· σόγχου ῥίζα σὺν κράμβης χυλῷ· συκαμίνου ὁπός. Καταντλεῖται δὲ ὠφελίμως θαλάσση ζεστῇ· καὶ εἰς θερμὸν δὲ ἔλαιον ὁ πεπληγὼς τόπος καθιέσθω.

Κεφ. ργ'. Πρὸς σκολοπένδρας καὶ μυγάλης δῆγματα καταπλάσσονται ἄλλες σὺν πίσσῃ καὶ κεδρία καὶ μέλιτι· σκόροδον μετὰ συκῆς φύλλων καὶ κυμίνου· καλαμίνθης φύλλα·

minius, pānācis asclēpiī flores et folia chironii: polium cum aceto, lauri folia sicca, fici arboris lac instillatum, malvae folia cocta ac etiamnum cruda, sycamini folia, sisymbrium aut cardamine cum aceto, melissophyllon, verbascum cum aceto, chamaedrys similiter, cupressus aieiuno quōpiam commanducata et imposita, mures domesticī dissecti et impositi, caseus salsus applicitus, cochlea contrita cum sua testa, stellio confestim dissectus et impositus, sulphur vivum, resina exceptum terebinthina et impositum, gentianae radix similiter: gramen tritum et impositum protinus auxiliatur: iuvat et ipse scorpius tritus et illitus, lacertus campestris dissectus et impositus, sonchi radix cum brassicae succo, sycomori liquor. Fovetur et affecta pars aqua marina fervefacta: quin et eadem calenti oleo immittitur.

Cap. CXXIII. Ad scolopendrae et muris aranei morsus haec pro cataplasmate adhibentur: sal cum pice, cedria et melle: allium cum ficus foliis et cumino, cala-

κριθὴ κεκαυμένη σὺν ὄξει· σκόροδον καὶ ἀκρέμονες συκῆς καὶ γύλλα μετὰ ὀροβίνου ἀλεύρου καὶ οἴνου· πρὸς δὲ τὴν μυγαλὴν αὐτὴ ἢ μυγαλῇ ταχέως τριβεῖσα σὺν οἴνῳ καὶ ποθεῖσα· πίνεται δὲ κοινῶς, πρὸς ἀμφοτέρω ἀψίνθιον σὺν οἴνῳ· ἡδυόσμου ἀπόζεμα σὺν οἴνῳ· δρακοντίου ῥίζαν λειοτριβήσας μετὰ οἴνου καὶ ἐλαίου πότιζε· ἢ ὑγρόπισσον μετὰ θερμοπυρίας ζυμώσας ἐπίπλασσε, καὶ ἰᾶται.

Κεφ. ρκδ'. Πρὸς δὲ τρυγόνος θαλασσίας πληγὴν καταπλάσσεται ὠφελίμως φανὸς μετὰ μέλιτος λεῖος.

Κεφ. ρκε'. Πρὸς δὲ δράκοντος θαλασσίου πληγὴν αὐτὸς ὁ δράκων ἀναπτυχθεὶς καὶ ἐπιτεθεὶς· καὶ ὁ ἐγκέφαλος αὐτοῦ πινόμενος, καὶ τῇ πληγῇ οὖρον ἀνθρώπινον καταπληθέν· ἔρπυλλον καταπλάσθέν.

Κεφ. ρκς'. Σκορπίου θαλασσίου πληγὴν ἰᾶται θεῖον ἄπυρον σὺν ὄξει ἀνατριβόμενον· ἢ τρίγλα ἀνασχισθεῖσα καὶ ἐπιτεθεῖσα· δαφνίδες τρεῖς πινόμεναι.

Κεφ. ρκς'. Ἀσκαλαβώτου δῆγμα ἰᾶται σήσαμον.

minthae folia, hordeum ustum cum aceto: allium cum tenellis ficus surculis et foliis, farina ervi ac vino. Privatim vero ad muris aranci morsus facit mus ipse araneus statim contritus in vino et potus. Communiter vero ad utriusque morsus haec bibuntur: absinthium cum vino, menthae infusum cum vino: dracunculi radix trita cum vino et oleo etiam propinatur. Pix vero liquida cum calido fomento subacta et illita sanat.

Cap. CXXIV. Ad pastinacae marinae ictum utiliter imponitur lens cum melle contrita.

Cap. CXXV. Ad marini draconis ictum draco ipse divulsus et impositus iuvat, nec non et cerebrum eius epotum: vulnus quoque ipsum urina humana fovetur: imponitur et serpyllum.

Cap. CXXVI. Vulneri ex marini scorpionis ictu medetur sulphur vivum cum aceto contritum, aut mullus in longitudinem fissus et impositus. Tres quoque lauri baccae bibuntur.

Cap. CXXVII. Stellionis morsui sesamum medetur.

Κεφ. ρκγ'. Διώκει δὲ τὰ θηρία ὑποστρωννύμενα ἀβρό-  
τονον, ἄγνος, ἔχιον, καλαμίνθη, κόνυζα, ὀρίγανον, ἔρφυλ-  
λον, πόλιον, ἀσφόδελος· θυμιώμενα δὲ ἄγνου φύλλα, ἄ-  
σφαλτον, βδέλλιον, ἐλάφου κέρας, καλαμίνθη, καρδάμωμον,  
χαλβάνη, καστόριον, κόνυζα· κυπαρίσσου ἢ κέδρου πρίσμα-  
τα· γαγάτης λίθος· λυσιμάχιος· μελάνθιον· πευκέδανον· σα-  
γαπηνόν· πόλιον.

Κεφ. ρκδ'. Κτείνει δὲ θηρία προστεθέντα χαλβάνη  
σὺν σφονδυλίῳ καὶ ἐλαίῳ· καρκίνοι ποθέντες σὺν ὠκίμῳ, καὶ  
προστεθέντες, σκορπίους κτείνουσι· λυχνὶς ἀγρία παρατεθεῖσα  
σκορπίους σκοτίζει· σταφυλίνου ἀγρίου σπέρμα προστεθέν.

Κεφ. ρλ'. Συγχοιόμενα δὲ κωλύει θηρία προσάγειν,  
καὶ διώκει· ἀλθαΐας καρπὸς μετὰ ἐλαίου καὶ ὄξους· δαφνί-  
δες σὺν ἐλαίῳ καὶ ὄξει· χαλβάνη, καὶ κεδρίδες σὺν ἐλαφείῳ  
μυελῷ, ἢ στέατι· πάνακος ἀσκληπιοῦ καρπὸς καὶ ἄνθη  
σὺν ἐλαίῳ καὶ ὀπῷ· μαλάχης φύλλα λεῖα σὺν ἐλαίῳ ἀλει-  
ψάμενος, ἅπληκτος ὑπὸ σφηκῶν· καὶ μελιττῶν διαμένει·

Cap. CXXVIII. Serpentes ceterasque venenatas  
bestias substrata fugant haec: abrotanum, vitex, echium,  
calamintha, conyza, origanum, serpyllum, polium, aspho-  
delus. Suffitu vero haec: viticis folia, bitumen, bdel-  
lium, cornu cervinum, calamintha, cardamomum, galba-  
num, castorium, conyza, cupressi vel cedri ramenta, ga-  
gates lapis, lysimachia, melanthiam, peucedanum, saga-  
penum, polium.

Cap. CXXIX. Admota vero haec venenatas bestias  
interimunt: galbanum cum sphondyllo et oleo, cancri cum  
ocimo poti, itemque appositi scorpiones necant. Lych-  
nis sylvestris apposita scorpions obtenebrat. Facit et syl-  
vestris dauci semen appositum.

Cap. CXXX. Illita vero haec venenatas bestias ar-  
cent ac etiamnum abigunt: althaeae semen cum oleo et  
aceto, lauri baccae cum oleo et aceto, galbanum et cedri  
baccae cum cervi medulla aut adipe, panacis asclepii se-  
men et flores cum oleo et [laserpitii] liquore. Malvae  
foliis tritis ex oleo si quis perungatur, a vespis et apibus



ποιοῦσι καὶ κάμπαι αἱ ἐπὶ τῶν λαχάνων σὺν ἐλαίῳ συγχροόμεναι.

Κεφ. ρλα'. Ἀδήκτους δὲ ἀπὸ τῶν ἐρπετῶν τηρεῖ ἐλάφου ἄρρενος αἰδοίου ξηροῦ < α', πινομένη σὺν οἴνῳ· ἐχίου ῥίζα προποθεῖσα· σταφυλίνου ἀγρίου σπέρμα βρωθέν· δρακοντίου ῥίζης χυλῷ ἐάν τις συγχρίσῃ τὰς χεῖρας, ἄροι ἂν ὁ τοιοῦτος ἀλύπως ἐκίδνας· ἢ πενκεδάνου ὁπὸς ὅλος συγχρίσεται.

Κεφ. ρλβ'. Ἐνδέματα καὶ ἀντιπαθῇ πρὸς σκορπίους καὶ θηρία· ἱστορεῖται ὠφελεῖν πρὸς σκορπιοπλήκτους ἡλιοτρόπιου τοῦ μεγάλου τοῦ σκορπιούρου ἢ ῥίζα περιεπτομένη. Νεκροὶ δὲ σκορπίον ἀκόνιτον προσαχθέν· ἐγείρει δὲ ἐλλέβορος λευκός· ἀκάνθης λευκῆς σπέρμα περιεπτόμενον. Θηρία διώκει λίθος ὀφίτης περιεπτόμενος. Ἀπόνους ποιεῖ μυελὸς ἐλάφειος περιχρίόμενος. Ὁξαλίδος ῥίζα προστεθεῖσα, φιλειταιρίου ῥίζα περιεπθεῖσα, ὑπὸ σκορπίου κωλύει ὅλως τι πάσχειν.

minime ferietur: ab iisdem etiam tuentur erucæ, quæ in oleribus nascuntur, ex oleo inunctæ.

Cap. CXXXI. A serpentium morsibus tutos hæc præstant atque præmuniunt: genitalis sicci e cervo masculo drachma e vino pota, echii radix præbibita, dauci sylvestris semen devoratum. Dracunculi radicis succo si quis manus inunxerit, tuto ac citra offensionem viperas apprehendet, uti et qui peucedani liquore corpus univsum perunxerit.

Cap. CXXXII. Sunt et amuleta, quæ scorpionibus venenatisque bestiis adversantur: ac heliotropii quidem maioris, quod scorpiurum vocant, radix alligata ictis a scorpione salutaris perhibetur. Scorpius admoto aconito quasi moriturus torpescit, idemque appposito helleboro albo velut ad vitam revocatur. Valet et spinæ albae semen e collo suspensum. Fugat et venenatas bestias ophites lapis adalligatus. Incolumes et inoffensos præstat medulla cervina circumlita: oxalidis radix admota, itidemque philetaerii radix adalligata, ne quis a scorpio laedatur noxamve sentiat, omnino prohibent.

Κεφ. ρλγ'. Κώνωπας δὲ οὐκ ἔα προσέροχασθαι συγ-  
χρόμενον ἀψίνθιον σὺν ἐλαίῳ· θυμωόμενα δὲ κόνυζα, κυ-  
παρίσσου σφαιρία καὶ κόμη καὶ πρίσματα· βόλβιτον.

Κεφ. ρλδ'. Βδέλλας δὲ τὰς προσφυομένας παρισθμίους  
καὶ καταπόσει καὶ στομάχῳ ἀποβάλλει ἄλμη καταρρόφου-  
μένη· ὅξος· ὁπὸς σιλφίου, μετὰ ὅξους ἀναγαροχρισθεῖς, ἢ  
καταρρόφούμενος· ἢ βούτυρον καὶ ὅξος μίξας καὶ πυρώσας  
σίδηρον, βάψον αὐτὸ εἰς αὐτὰ, καὶ δὸς πιεῖν, καὶ ἐκβαί-  
νει ἡ βδέλλα· ἢ ὀπόφυλλον· ἢ χάλκανθον σὺν ὄξει ἀναγα-  
ροχρισθέν· ἢ λαβὼν στυπτηρίαν σχιστὴν τρίψας καλῶς, ἐμ-  
φύσησον τοῦ ἔχοντος βδέλλας στόματι, καὶ ἐξελεύσονται· ἢ  
χυλὸς ἀναγαλλίδος πινόμενος· ἢ ὅξος δορυμὺ μετὰ θύμου  
λειήναντες πινέτωσαν· ἢ νίτρον καὶ ἁλὸς σὺν ὕδατι ἀναγα-  
ροχρίζεσθωσαν. Ἐκβαλεῖς δὲ, ἐὰν ἐμβιβάσας ἐν βαλανείῳ εἰς  
ἐμβασιν, διδῶς ὕδωρ ψυχρὸν λίαν ἐν τῷ στόματι διακρατεῖν·  
ἐλεύσονται γὰρ ἐπὶ τὸ ψυχρὸν ἐκπυρούμεναι· καὶ μετὰ τὸ  
ἀναγαροχρίζεσθαί τινι τῶν προειρημένων, περιχανάτω τὴν  
ἐκ τοῦ ὕδατος ἰλύν· πρὸς γὰρ τὴν ὁσμὴν ἐνεχθήσονται.

Cap. CXXXIII. Culices advolatu arcet absinthium  
cum oleo inunctum. Idem praestant snffitu conyza, cu-  
pressi globuli, coīna, ipsaque ramenta: denique et bubu-  
lum stercus.

Cap. CXXXIV. Hirudines tonsillis, gulae et ori  
ventriculi adhaerentes excutiant absorpta muria, ace-  
tum: itemque silphii liquor ex aceto gargarizatus, aut ser-  
bitione haustus. Aliud: in aceto et butyro mixtis ferrum  
ignitum ubi exstinxeris, ea propinato, et prodibit hiru-  
do. Aliud: silphii semen aut chalcanthus cum aceto gar-  
garizato. Aliud: alumen scissile probe tritum inspirato  
in os habentis hirudines, et exhibunt. Prodest et anagal-  
lidis succus epotus, vel haustum acetum acre, in quo  
thymum intritum sit, itemque nitrum cum sale ex aqua  
gargarizatum. Eiciēs vero, si in aquae calidae solum  
demisso frigidissimam aquam ore continendam exhibue-  
ris: sic enim calore offensae, protinus ad frigidam pra-  
repent. Post os itidem aliquo ex antedictis collutum, ri-  
ctus hiatu aquae limus apprehendatur: eius enim odore  
allectae illae prosilient.

## ΑΛΕΞΙΦΑΡΜΑΚΑ.

Κεφ. ρλέ'. Πρὸς δὲ τὰ θανάσιμα κοινῶς ἁρμόζει ἔλαιον πινόμενον, ἢ βούτυρον χλιαρὸν, ὅταν ἔλαιον μὴ παρῇ· ἐμείτω δὲ ὁ πιών· ἀβροτόνου < α'· κόνυζα μετ' οἴνου καὶ σταφυλίνου σπέρματος· κέστρου φύλλων < β'· σὺν οἴνῳ, καὶ προπινόμενα δὲ, δυσαλώτους ποιεῖ· λογχίτιδος τῆς πόας ἀπόζημα σὺν οἴνῳ· κεδρόμηλα λεῖα ἐν οἴνῳ· μίλτου ληνίας < α'· νάρδου κελτικῆς < β'· νάρθηκος ἐντεριώνη· νηρίου τῆς ῥοδοδένδρου τὰ ἄνθη· σιλφίου ὁπός· ἵπποποτάμου ὄρχις· ὀποπάναξ σὺν ἀριστολογίᾳ· ἀσκληπιάδος καρπὸς καὶ τὰ ἄνθη· καὶ τῆς χειρωνίου ῥίζα· τούτων ἕκαστον σὺν οἴνῳ· πολίου ἀφέψημα τῆς ῥίζης· πευκεδάνου ὁπός καὶ ἡ ῥίζα, πίσση ὑγρὰ ἐκλειχρμένη· πρασίου χύλισμα σὺν οἴνῳ· σαπηρὸν ὁμοίως· οὖρον σαπρὸν θερμὸν πλεῖστον πινόμενον καὶ ἀνεμούμενον.

Κεφ. ρλζ'. Ἀνενέργητα ποιεῖ τὰ θανάσιμα προπινόμε-

*Alexipharmaca, hoc est venenorum assumptorum remedia.*

Cap. CXXXV. Contra letalia venena haec in genere faciunt: oleum bibitum, aut, si id non sit in promptu, butyrum tepidum: sed qui biberit, revomat oportet: abrotani drachma, conyza cum vino et dauci semine: betonicae foliorum drach. ij. ex vino: sed et eadem praesumpta a venenorum noxa praemuniunt: lonchitidis herbae infusum e vino, citrea mala cum vino contrita, rubricae lemniae drachma, nardi celticae drach. ij., ferulae medulla, nerii, quod et rhododendron dicitur, flores, silphii liquor, hippopotami testiculus, opopanax cum aristolochia, panacis asclepii semen et flores: chironii vero radices: et horum quidem singula cum vino: polii radiceis decoctum, peucedani liquor et radix, pix liquida delincta, expressus marrubio succus cum vino: similiter et sagapenum, urina putris calens, copiose hausta vomitioneque reddita.

Cap. CXXXVI. Letalia venena irrita inefficaciaque reddunt haec, siquidem in potu praesumantur: buniadis

να, βουνιάδος σπέρμα, καλαμίνθη πινομένη· κάρυα βασιλικὰ μετὰ ἰσχάδων, καὶ πηγάνου φύλλων προεσθιόμενα, καὶ ἐπιβρωθέντα σὺν πηγάνῳ καὶ ἐλαίῳ.

Κε φ. ρλζ'. Ἰδίως δὲ πρὸς ἀκόνιτον ἀρμόζει αἰζώου τοῦ μείζονος ἄνθη μετ' οἴνου· ὀποβάλαμον μετὰ γάλακτος· ἄκρατος πολὺς σὺν ἀψινθίῳ· κιννάμωμον σὺν οἴνῳ· πάνακος ἀσκληπιοῦ καρπὸς καὶ ἄνθη· πηγάνου ἀγρίου σπέρμα, ὃ καὶ ἐπιβρωθέν ἄπρακτον καθίστησιν· πυτία ἐρίφου σὺν ὄξει, ἢ λαγωοῦ, ἢ ἐλάφου· σιδήρου σκωρία πεπτρωμένη, καὶ ἐν ὀξυμέλιτι σβεσθεῖσα· ἢ σιδήριον πυρωθέν καὶ μέλιτι σβεσθέν· ζωμὸς βόειος· κονία μετὰ οἴνου καὶ ἀβροτόνου· πράσιον σὺν οἴνῳ· χαμελαία σὺν οἴνῳ· πήγανον ὁμοίως· συκῆς φύλλα λεῖα· χαμαιπίτυς καλῶς ποιῇ· ὀρίανος ὀνίτις· πολύκνημον σὺν οἴνῳ· ὄρνιθος καθεψημένης συγχλωθείσης ζωμὸς, κρέως λιπαροῦ ὁμοίως· ὀποβάλαμον σὺν γάλακτι γυναικίῳ, ἢ ὕδατι· μορέας ῥίζαν ἐψήσας σὺν οἴνῳ, μίξας μέλι, δίδου· ἄργυρος καὶ χροσὸς πεπτρωμένα, σβεσθέντα μέλιτι· ὅπῃ μῆκωνος

seu napi semen et calamintha. Sed et iuglandes cum caricis et rutae foliis in cibo praesumptae, aut etiam postea sumptae cum ruta et oleo, eundem praebent effectum.

Cap. CXXXVII. Privatum vero adversus haustum aconitum conferunt sedi maioris flores cum vino, opobalsamum cum lacte, meracum copiosum cum absinthio, cinnamomum cum vino, panacis asclepii semen et flores: rutae agrestis semen, quo etiam postea sumpto venenum hoc inefficax redditur: coagulum hoedi, aut leporis, aut cervi, cum aceto: scoria ferri ignita in aceto mulso restincta, aut ferramentum excandefactum et melle restinctum, ius bubulum, lixivium cum vino et abrotano, marubium cum vino, chamelaea cum vino, ruta similiter, ficus folia contrita: chamaepitys egregie iuvat: origanum onitis, polycnemon cum vino, gallinae ius ita discoctae, ut simul etiam omnis ex ea succus resolvatur, ius carnis pinguis similiter, opobalsamum cum lacte muliebri, aut aqua: mori radix cum vino cocta et melle admixto adhibita: argentum et aurum ignita, extincta melle: liquor



σὺν σφέλῃ<sup>85</sup> ὄξους χρίειν· σημεῖα δὲ ἀκονίτου, τρέμει τὸ σῶμα καὶ ἄλλεται καὶ ὀγκοῦται καὶ πελιοῦται.

Κεφ. ρλθ'. Μέλι τὸ ἐν Ἡρακλείᾳ τῇ ποντικῇ γεννώμενον βρωθὲν μανίαν ποιεῖ· βοηθοῦνται δὲ οἰνομέλιτι καλῶ, καὶ πηχάνῳ ἐσθιομένων· ὁσάκις δὲ ἂν ἐξεμέσωσι, προσφερέσθωσαν τὸ οἰνόμελι· τὴν ἀφοδὸν δὲ τῶν φαγόντων τὸ μέλι αὔεις, ἢ κύνες φαγόντες, τὸ αὐτὸ πάσχουσι.

Κεφ. ρλθ'. Πρὸς δὲ τὸ τοξικὸν ποιεῖ αἷμα τράγου, καὶ αἰγὸς, καὶ ἐρίφου, καὶ νήσσης, καὶ κυνὸς ἐν οἴνῳ· γογγυλίδος ἡμέρου σπέρμα πινόμενον· χαλβάνη σὺν οἴνῳ καὶ σμύρνη· γλυκὺς· δρυὸς φλοιὸς μετὰ βοείου γάλακτος ὁμοίως· καὶ φηγοῦ ἢ πρίνου φύλλα, ἢ ῥίλης χυλὸς (σὺν) οἴνῳ πολλῶ ποτισθεὶς· μήλων ἀγρίων καρπὸς ἐσθιόμενος· στρουθία μῆλα ὁμοίως· κυδώνια λειώσας ἐν ὕδατι σὺν γλήχωνι, δίδου· ἢ ῥόδιον, ἢ ἴρινον, ἢ ἄμωμον, ἢ βαλσάμου καρπὸν σὺν οἴνῳ.

85) Vox, qua Alex. Trall. fere primus utitur (lib. II. p. 630.), corrupta ex σφέλῃ (faecula) quam Galenus (de compos. sec. loca, lib. I. p. 490.) exponit.

papaveris cum aceti faece illitus. Sumpti autem aconiti signa sunt haec: corpus contremiscit, subsultat, intumescit livescitque.

Cap. CXXXVIII. Mel, quod in Heraclea Ponti provenit, qui assumpsere, insani fiunt. Remedio sunt mulsum praestans, et esitata rutae folia: quoties autem mulsum evomuerint, iis toties de novo exhibeatur. Ceterum eorum, qui mel huiusmodi comederint, stercus si sues canesve gustarint, eodem etiam mali genere afficiuntur.

Cap. CXXXIX. Toxicum adversantur sanguis hirci, caprae, hoedi, anatis et canis e vino: rapi sativi semen potum, galbanum cum vino et myrrha, vinum passum, quercus cortex cum lacte vaccino similiter, fagi aut ilicis folia, aut radiceis succus cum vino copioso potus, malorum agrestium fructus esitatus, struthia mala similiter, mala cotonea trita in aqua cum pulegio, oleum rosaceum, aut irinum, ammonium, carpobalsamum cum vino.

Κεφ. ρμ'. Πρὸς τοὺς τρωθέντας ὑπὸ βέλους φαρμακωθέντος, εἰς τὰ τοξεύόμενα δὲ καὶ οἷς ἐπιχρίεται τὸ ξίφος φάρμακα, ἀρμόζει ὁπὸς σιλφίου πινόμενος μετ' οἴνου, καὶ ἐπιτιθέμενος τοῖς τραύμασι μετὰ τινος τῶν θερμαντικῶν ἀποζεμάτων.

Κεφ. ρμα'. Ἰξίου δὲ, τοῦ μέλανος χαμαιλέοντος λεγομένου, ποθέντος, βοηθεῖ ἀψίνθιον τριπτόν μετὰ ὄξους· καστορίον σὺν ὄξει· ἄκρατος οἶνος πολὺς σὺν ἀψινθίῳ· ὄξύμελι· ὄξος σὺν πηγάνου ἀγρίου σπέρματι· σιλφίου ῥίζα, τραγορίγανου ἀπόζεμα· ῥητίνη τερμινθίνη, ἢ πιτυίνη· κάρυα βασιλικὰ, ἢ τῆς καρύας οἱ βλαστοί· ἰνάρδος μετὰ καστορίου· καὶ σιλφίου ὀβολὸς μετ' οἶνον· τραγορίγανόν σὺν γάλακτι· ἐνιοὶ δὲ φασὶ καὶ θαψίας χυλὸν πινόμενον ὠφελεῖν.

Κεφ. ρμβ'. Πρὸς δὲ τοὺς κώνειον πεπωκότας ἔλαιον ἱρίνον, ἢ ἀψίνθιον σὺν οἴνῳ πινόμενον πολὺ· καρδάμωμον ὁμοίως· κινναμώμου < α' σὺν οἴνῳ· ἀκρατοποσία· ὄξος θερμόν· ἔλαιον ἀμαράκινον· πηγάνου ἀγρίου σπέρμα· στύραξ σὺν οἴνῳ· πέπερι σὺν κνίδης σπέρματι καὶ οἴνῳ· ὁπὸς σιλφίου σὺν ἐλαίῳ καὶ γλυκεῖ.

Cap. CXL. Iis, qui venenato telo gladiove icti sunt, convenit silphii liquor e vino potus, itidemque vulneribus impositus cum decocto aliquo calfaciente.

Cap. CXLI. Contra potum ixiā, qui idem est cum nigro chamaeleone, auxiliantur absinthium tritum cum aceto, castoreum cum aceto, meracum largius cum absinthio, acetum mulsum, acetum cum agrestis rutae semine, silphii radix, tragorigani decoctum, resina terebinthina aut pinca, nuces inglandes, aut ipsius arboris germina, nardus cum castoreo, et silphii obolus cum vino, tragoriganum cum lacte. Nec desunt, qui etiam thapsiae succum epotum iuvare asserant.

Cap. CXLII. Hausto conii veneno resistunt oleum irinum aut absinthites largius cum vino bibitum, cardamomum similiter, cinnamomi drachma cum vino, meri potio, acetum calens, oleum amaracinum, rutae agrestis semen, styrax cum vino, piper cum urticae semine ac vino, silphii liquor cum oleo et passo.

Κεφ. ρμγ'. Κορίου δὲ ποθέντος, ὠφελεῖ ἴρινον ἔλαιον, καὶ οἶνος ἄκρατος σὺν ἀψινθίῳ, ἢ ἄλφιτα ὠμὰ σὺν θαλάσσει, χιῶν σὺν γλυκεῖ.

Κεφ. ρμδ'. Σμίλακος δὲ ποθέντος, ὃν ἐνιοὶ θύμαλλον καλοῦσι, Ῥωμαῖοι δὲ τάξον, δοτέον οἶνον πολύν· καὶ ὄξος, καὶ ὅσα τοῖς κώνειον πεπωκόσιν ἀρμόζει, παραληπτέον καὶ ἐπὶ ταύτης.

Κεφ. ρμέ'. Τοῖς δὲ ψύλλιον πεπωκόσιν ἀρμόζει τὰ βοηθήματα, ἃ καὶ τοῖς κορίον προσεγεκαμένοις.

Κεφ. ρμς'. Τοῖς δὲ φαρικὸν πιούσιν ἄκρατος πολὺς ἀρμόζει σὺν ἀψινθίῳ, ἢ κινναμώμῳ· γλυκὺς πολὺς· νάρδος κιλικία σὺν οἶνῳ· ἴρις ἀγρία ὁμοίως· πήγανον σὺν κριθίνῳ ἀλεύρῳ καὶ ὄξει.

Κεφ. ρμζ'. Πρὸς δὲ μηκώνιον, ἔλαιον σὺν ὕδατι· ἄλεις σὺν ὄξυμέλιτι· γλυκὺς· μέλι θερμανθὲν σὺν ῥοδίνῳ· ἄκρατος πολὺς σὺν ἀψινθίῳ· ἢ κιννάμωμον σὺν μέλιτι· ὄξος θερμόν· ὀρίανον σὺν κονία καὶ γλυκεῖ· πηγάνου ἀγρίου σπέρμα· ῥόδιον, ἴρινον· ἢ κόπρος ὀρνιθος λεῖος σὺν ὄξει, ἢ σὺν ὄξυμέλιτι.

Cap. CXLIII. Coriandro poto adversantur irinum oleum, merum cum absinthio, polenta cruda cum aqua marina, nix cum passo.

Cap. CXLIV. Contra venenum taxi, quam Graeci smilacem, nonnulli thymalon appellant, vinum copiosum dari oportet, itemque acetum et quaecunque convenire diximus iis, qui conium hauserunt.

Cap. CXLV. Adversus epotum psyllium eadem, quae hausto coriandro, remedia auxiliantur.

Cap. CXLVI. Contra pharicum potum conveniunt meracum largius cum absinthio aut cinnamomo, passum copiosum, nardus cilissa cum vino, iris sylvestris similiter, ruta cum hordeacea farina et aceto.

Cap. CXLVII. Epoto papaveris liquore succurrunt haec: oleum cum aqua, sal cum oxymelite, passum, mel calfactum cum rosaceo, merum copiosum cum absinthio, cinnamomum cum melle, acetum calens, origanum cum lixivio et passo, rutae agrestis semen, rosaccum, irinum, fimum gallinaceum tritum cum aceto aut oxymelite.

Κεφ. ρη'. Ἐφημέρου δὲ ποθέντος, ὃ καὶ κολχικὸν καλοῦσιν, ὠφελεῖ καστανίων τὸ ἐντὸς λεῖον σὺν οἴνῳ· πολυποδίου τὸ ἀπόξιμα· ὀρίγανον σὺν κονία· πολυγόνου χυλὸς καὶ ῥίζα σὺν γάλακτι γλυκεῖ· δρυὸς, ἢ φηγοῦ, ἢ πρίνου φύλλα λειώσας, δίδου σὺν γάλακτι· ἀμπέλου, ἢ βάτου χυλὸν, ἢ καυλοὺς λείους σὺν ὕδατι· καὶ νάρθηκος ἐντεριώνη μετ' οἴνου· ἢ ἔρπυλλον μετ' οἴνου, ἢ μύρτων καρπὸν, ἢ ῥοιᾶς λέπη ἀποβρέξας ἐν οἴνῳ· γάλα βόειον βοηθεῖ, ὥστε ἂν παρραχρῆμά τις λάβῃ τὸ γάλα, ἄλλου βοηθήματος οὐ χρήζει.

Κεφ. ρηθ'. Δορυχνίου δὲ ποθέντος, γάλα, γλυκὺς οἶνος χλιαρὸς, καὶ ὄρνιθος στῆθος καθεψηθὲν, λεῖον ποθέν, καὶ ὁ ζωμός· ἐχῖνοι, κόγχοι, καὶ πορφύραι, καὶ κάριδες, πίνναι, κτένες, κήρυκες, ὡμὰ καὶ ἐφθὰ ἐσθιόμενα.

Κεφ. ρν'. Στρώχνου δὲ μανικοῦ ποθέντος, ἀρμόζει μελίκρατον, ἀμύγδαλα πικρὰ ἐσθιόμενα· ἄνισον πινόμενον, ζωμός λιπαρὸς, καὶ ἄλλα τινὰ λίπος ἔχοντα χλιαρὰ πινόμενα.

Cap. CXLVIII. Contra potum ephemerum, quod etiam colchicum appellant, auxiliantur haec: interna castanearum tunica cum vino, polypodii decoctum, origanum cum lixivio, polygoni succus et radix cum lacte dulci: quercus, aut fagi, aut ilicis folia trita cum lacte, vitis aut rubi succus, vel cauliculi triti cum aqua, ferulae medulla cum vino, serpyllum cum vino, myrti fructus, aut punici cortices in aceto macerati. Quin et lactis vaccini potus usque adeo est efficax, ut, si quis illud quamprimum sumpseris, non sit aliud desideraturus auxilium.

Cap. CXLIX. Contra dorycnium succurrunt lac, passum tepidum, gallinacei pectusculi elixi triti succus haustus, ipsumque ius epotum: echini denique, conchae, purpurae, squillae, pinnae, pectines, buccina, seu cruda, seu elixa comedantur.

Cap. CL. Hausto solano furioso conveniunt aqua mulsa, amygdalae amarae esitatae, anisum potum, ius pingue, et alia quaedam pinguis tepida in potu sumpta.



Κεφ. ρνα'. Πρὸς δὲ ὑοσκύαμον, γάλα, μελίκρατον  
 σὺν γάλακτι ὀνείῳ· ἄκρατον πίνειν, ἐμείν· ἀμαράκινον μύ-  
 ρον· τῆλιν σὺν ἐλαίῳ· κνίδης σπέρμα σὺν οἴνῳ, ἢ τὰ φύλ-  
 λα· κάρδαμον, νάπυ, κικώριον, ῥάφανος· ἥσυχάζειν δὲ δεῖ  
 αὐτοὺς ἀναγκάζειν, ἵνα ὥσπερ τὸν οἶνον ἐκπέσσωσι· σημεῖα δὲ  
 ταῦτα· μέγα παραληρεῖ, δοκεῖ τε μαστιγοῦσθαι· μέγας περὶ  
 τὰ ὑποχόνδρια πόνος· ἰσχύων ἐκλυσις, αἵματος οὖρησις.

Κεφ. ρνβ'. Κανθαρίδων δὲ ποθεισῶν, βοηθεῖ ἔλαιον σὺν  
 ὕδατι, καὶ ἵρινον, καὶ ῥόδινον· γάλα· φασὶ δέ τινες, ὅτι τὰ πτερὰ  
 καὶ οἱ πόδες τῶν κανθαρίδων πινόμενα ἐν γλυκεῖ, ἀντιφάρ-  
 μακόν ἐστι· ποιεῖ δὲ καὶ μήλινον ἔλαιον, πήρανον μετὰ ἱρί-  
 νου, καὶ τὸ σπέρμα· ἐλάφου ἐκ τῆς πιμελῆς ζωμός λαμβα-  
 νόμενος· γλήχων σὺν ὕδατι· λινόσπερμα, συγκαθεψήσας αἰ-  
 γὸς πιμελὴν, ἢ προβάτου, ἢ χηνὸς σάρκα, ἐσθιέτωσαν· ἔγ-  
 κλυζε δὲ γάλα· καὶ ἀμπέλου καυλοὺς τρίψας, σὺν γλυκεῖ δι-  
 δρυ· σκορπιοειδὲς σὺν μέλιτι, σαμίας < α' μετὰ σιγαίου.

Cap. CLI. Adversus hyoscyamum lac, aqua mulsa  
 cum lacte asinino, merum bibitum et vomitione reddi-  
 tum, amaracinum unguentum, foenum graecum cum oleo,  
 urticae semina cum vino, aut folia, nasturtium, sinapi,  
 cichorium, raphanus. Cogendi porro ad quietem, qui hoc  
 veneno potionati sunt, quemadmodum qui vinum bibe-  
 runt, ut ipsum excoquant. Hisce porro signis sese pro-  
 dit, qui hyoscyamum assumpserit: plurimum delirat, fla-  
 gris caedi sibi videtur: his accedunt vehemens circa hy-  
 pochondria dolor, virium exsolutio et cruenta mictio.

Cap. CLII. Ad cantharidas potas haec sunt auxi-  
 lio: oleum cum aqua, irinum et rosaceum, lac: alae ac  
 pedes ipsarum cantharidum e passo poti, uti quidam as-  
 serunt, dantur pro antidoto. Invant et oleum melinum,  
 ruta cum irino, et semen quoque, ius ex adipi cervi  
 sumptum, pulegium cum aqua: esitatum lini semen, qui-  
 cum adeps caprina vel ovilla, aut anseris caro cocta fue-  
 rit: lac iniectum clystere, vitium tenelli palmites, triti  
 cum passo et potui dati, scorpioides cum melle, samiaq  
 terrae drachma cum sapa.

Κεφ. ρηγ'. Βουπρήστεως δὲ ληφθείσης, δίδου ἔλαιον χλιαρόν· ἰσχάδας τρίψας καὶ ἐψήσας οἶνω, δίδου πιεῖν· ἢ γάλα σὺν φοίνιξι λείοις· ἀχράδας ξηρὰς πολλὰς σὺν οἶνω λείας· γάλα βόειον νεαρόν· οὖρον γυναικεῖον ἀρμόζει πινόμενον καὶ ἐξεμούμενον.

Κεφ. ρηδ'. Πιτυοκάμπης δὲ ληφθείσης, ἀρμόζει γάλα γλυκὺ· μήλινον ἔλαιον καὶ ἱρινόν.

Κεφ. ρηε'. Σαλαμάνδρας δὲ ποθείσης, βοηθεῖ γάλα γλυκὺ σὺν ὕδατι, ῥήτινη σὺν μέλιτι· χαμαιπίτυς συνεψηθεῖσα στροβίλοις σὺν ὕδατι· κνίδης σπέρμα, ἢ φύλλα σὺν κριθίνῳ ἀλεύρῳ καὶ ἐλαίῳ ἐψήσας, δίδου· χαλβάνη καὶ χελώνης θαλασσίας αἷμα, συνεψηθέντα καλῶς καὶ λαμβανόμενα· βάτραχοι μετὰ ῥίζης ἡρυγγίου ἐψηθέντες, καὶ λαμβανόμενοι.

Κεφ. ρης'. Λαγωῦ δὲ ποθέντος, βοηθεῖ ποθὲν γυναικὸς γάλα, ἢ ὄνου· κεδρία σὺν γλυκεῖ, ἢ οἶνω· κεδρίδες ἐσθιόμεναι· κυκλαμίνου ῥίζα σὺν οἶνω· μαλάχης ὁ καυλὸς σὺν τῇ ῥίζῃ· ἔλλαβόρου μέλανος, ἢ σκαμμωνίας < α'· ῥοαὶ

Cap. CLIII. Iis, qui buprestin assumpserint, oleum tepidum exhibeto, caricas tritas et in vino coctas propinato, aut lac cum palmulis contritis. Invant et pyra sylvestria sicca multa cum vino trita, lac bubulum recens, itemque urina muliebris pota et vomitione reddita.

Cap. CLIV. Contra haustas pinorum erucas conveniunt lac dulce, oleum melinum et irinum.

Cap. CLV. Hausta salamandra auxiliantur lac dulce cum aqua, resina cum melle, chamaepityos in aqua decoctum cum nucleis pineis, urticae semen aut folia cum hordeacea farina et oleo cocta: testudinis marinae sanguis et galbanum simul probe cocta sumptaque, ranae cum eryngii radice coctae et in cibo sumptae.

Cap. CLVI. Hausto lepore marino sunt auxilio haec: lac muliebre vel asininum potum, cedria e passo aut vino, cedri baccae comestae, cyclaminis radix cum vino, malvae caulis cum radice, hellebori nigri aut scam-

ἐσθιόμεναι οἰνώδεις, καὶ οἱ πυρῆνες· οὐδὲν δὲ τῶν ἰχθύων ὑπομένουσι προσφέρεσθαι, εἰ μὴ καρκίνους ποταμίους, καὶ τούτους μόνους πέσσουσι· τεκμήριον δὲ τοῦ δύνασθαι σωθῆναι αὐτοὺς, ἐὰν ἰχθύς ἡδέως προσενέγκωνται· ἀρμόζει δὲ καὶ ἐλλέβορος λευκός· οὐ γὰρ εὐλαβητέον ἐπ' αὐτῷ τοὺς ἐμέτους· βοηθεῖ δὲ ἐν ἀρχῇ καὶ οὖρον ἀνθρώπινον ποθὲν καὶ ἐξεραθέν· καὶ χηνὸς αἷμα παραχρῆμα πινόμενον. Ὁ λαγῶν θαλάσσης πεπωκὼς ἐμεῖ πυκνὰ, καὶ χρώματα παντοδαπά· οἶονεὶ γὰρ σαπρὸν τι φάγων, οὐ κατέχει· τούτω χηνὸς καὶ ὄρνιθος στέαρ αἷμα δὸς πιεῖν.

Κεφ. ρνζ'. Πρὸς δὲ φρῦνον καὶ τὸν κωφὸν βάτραχον βοηθεῖ χελώνης θαλασσίας ἢ χερσαίας αἷμα ξηρὸν μετ' οἶνου· δαμασωνίου ῥίζης προσφάτου σὺν ὄξει < α', ξηρᾶς δὲ < β'· ποιοῦσι καὶ ἀκρατος πολὺς πινόμενος καὶ ἐξεμούμενος· καλάμων ρίζα σὺν οἶνῳ· κύπερος σὺν οἶνῳ· δίδωκε δὲ καὶ περιπάτοις, ἢ δρόμοις χρώμενος, καὶ λοῦε ἐν πυριατη-

moniae drachma, mala punica vinosa comesta, eorumque nuclei. Qui hoc venenum biberint, piscinum nihil admittunt, praeter fluviatiles caneros, quos etiam solos concoquunt. Signum porro salutis fuerit, si pisces alacriter in cibos admiserint. Convenit eis etiam helleborus albus: neque sunt pertimescendi, qui eum sequuntur, vomitus. Iuvat et ab initio urina hominis pota et vomitu reddita, itemque sanguis anseris confestim epotus. Hausti leporis marini signum est frequens vomitus et variorum colorum: nam ventriculus ceu ingesto quopiam putri minime continet. Sic affecto anseris et gallinae adipem simul dato in potu.

Cap. CLVII. Adversus rubetae et ranae mutae venena auxiliantur testudinis marinae aut terrestris sanguis exsiccatum cum vino, damasonii radice recentis cum aceto drachma, siccae autem drachmae duae. Iuvat et meracum copia largiore potum ac vomitu reiectum, arundinis radix cum vino, cyperus cum vino. Sollicitandi etiam, qui venena eiusmodi hauserunt, ad ambulationis aut cursus exercitia, itemque lotiones crebras in caldariis cellis.

ρίοις· ἰδίως δὲ πρὸς φρυῶνον, βάτραχος ἐφθός, ἣ ὀπτός προσφερόμενος.

Κεφ. ρη'. Τὰ δὲ ταυρείου αἵματος σημεῖα· ἀφωνία, πόνος στομάχου, οὐρῆσαι οὐ δύναται· ταυρείου αἵματος ποθέντος, βοηθοῦσιν ὄλυνθοι σὺν ὄξει ποθέντες· καθ' ἑαυτὸ ὄξος· νίτρον σὺν σιλφίῳ· πυτία ἐρίφου, ἢ λαγωῦ μετ' οἴνου· νίτρον < α' μετ' οἴνου· κράμβης σπέρμα σὺν ὄξει· κονύζης φύλλα σὺν πεπέρει· ἢ βάτου χυλὸς σὺν ὄξει· καὶ φλεβοτομεῖν δεῖ· κοιλίαν τε κινεῖν· ἐμέτους δὲ φυλάττεσθαι ὥς βλαβερούς.

Κεφ. ρηθ'. Γάλακτος δὲ θρομβωθέντος, ὠφελίμως δίδεται γλυκὺς πολὺς· ὄξος χλιαρόν· ὄλυνθοι σὺν ὄξει· ὀπὸς σιλφίου σὺν ὄξυκράτῳ, ἢ κονία· πυτία λαγωῦ, ἢ νεβροῦ, ἢ ἐρίφου, ἢ ἀρνός, ἢ δορκάδος, ἢ βουβάλου, ἢ μόσχου σὺν ὄξει· γλυκὺς σὺν ὄξει· ἡδύοσμον σὺν ὄξει· καὶ κοιλίαν δὲ λύνει· ἐνιοὶ δὲ ἡδύοσμον σὺν οὔρῳ διδόασιν· ἄλυκὸν δὲ μηδὲν προσφέρειν· μᾶλλον γὰρ πηγνυται τὸ γάλα·

Privatim autem contra rubetam facit rana elixa vel assa in cibo sumpta.

Cap. CLVIII. Taurini sanguinis poti signa sunt vocis interceptio, dolor stomachi, urinae retentio. Contra hoc venenum succurrunt grossi ex aceto poti, acetum per se, nitrum cum laserpitio, coagulum hoedi aut leporis cum vino, nitri drachma cum vino, brassicae semen cum aceto, conyzae folia cum pipere, rubi succus cum aceto. Tundenda etiam vena, ciendaque alvus: at vomitus, tanquam noxii, vitandi.

Cap. CLIX. Contra lac in grumos concretum utiliter exhibentur passum copiosum, acetum tepidum, grossi cum aceto, liquor silphii cum posca aut lixivio: coagulum leporis, aut hinnuli, aut hoedi, aut agni, aut capreae, aut bubali, aut vituli cum aceto, passum cum aceto, mentha cum aceto. Sed et solvenda est alvus. Sunt qui mentham cum urina exhibeant. Salsi porro nihil offereandum, quoniam lac magis coiret ac densaretur: at ne-



ἀλλ' οὐδὲ ξμεῖν δεῖ· ἔστι δὲ τοῦτο δυσβοηθητότερον τοῦ αἵματος.

Κεφ. ρζ'. Πρὸς δὲ μύκητας ποιῇ ἀλεκτορίδος ἄφοδος σὺν ὀξυκράτῳ· ἀριστολοχίας < ἅ μετ' οἶνου· κλημάτων κονία, ἢ ἔξ ἀχράδος τοῦ δένδρου ποθεῖσα· καὶ συνεψόμεναι δὲ τοῖς μύκησιν αἱ ἀχράδες, καὶ τὰ φύλλα αἴρουν τὸ πνιγῶδες αὐτῶν· ἀψίνθιον μετ' ὄξους· μέλι ἐκλειχόμενον καὶ πινόμενον σὺν ὕδατι· μελισσόφυλλον σὺν νίτρον, ἢ κονία· ἢ ἄλεις σὺν ὄξει· ἀχράδες ἐσθιομέναι· ἀμαράκινον πινόμενον· ἀκράτος πινόμενος· πάνακος ἀσκληπιοῦ ῥίζα καὶ καρπός· πήγανον σὺν ὄξει, τρυξ οἶνου κεκαυμένη, καὶ ὦμῃ πινομένη μεθ' ὕδατος, ῥάφανος ἐσθιομένη· ἄκρωσ δὲ ποιῇ τὸ τοῦ χαλκοῦ ἄνθος σὺν ὄξει· καρδαμίνη, νάπυ· τραγακάνθου ῥίζα σὺν ὄξει.

Κεφ. ρζα'. Γύψου δὲ πόθεισος, ποιῇ γάλα, ξμεῖται δέ· ἔλαιον σὺν μελικράτῳ, ἢ σύκων ἀφεψήματι· κονία σὺν οἶνῳ· ὀρίγανον σὺν κονίᾳ ἢ ὄξει· μαλάχης ἀπόζημα.

que his vomitus convenit. Ceterum huic veneno aegrius, quam taurino sanguini, potio succurritur.

Cap. CLX. Contra fungos haec auxiliantur: fimum gallinaceum cum posca, aristolochiae drachma cum vino, lixivium e sarmentis vitium aut pyraastro arbore potum. Ipsi quoque pyrastri fructus ac folia, si cum fungis decoquantur, horum strangulandi vim auferunt. Invat et absinthium cum aceto, mel delinctum, vel in aqua potum, apiastrum cum nitro aut lixivio, sal cum aceto, pyra sylvestria esitata, amaracinum potum, meracum haustum, panacis asclepii radix et semen, ruta cum aceto, faex vini usta et cruda quoque pota ex aqua, raphanus in cibo sumptus: aeris flos cum aceto egregie opitulatur: cardamine, aut sinapi, radix tragacanthae cum aceto.

Cap. CLXI. Contra gypsi potum proficiunt lac vomitu reddendum ex aqua mulsa aut ficuum decocto, lixivium ficulneum cum vino, organum cum lixivio vel aceto, malvae infusum.

Κεφ. ρξβ'. Πρὸς δὲ τοὺς λιθάργυρον πιόντας ποιᾷ ἄκρατος πολὺς διδόμενος σὺν ἀψινθίῳ, σελίνου ἀγρίου σπέρμα σὺν οἶνῳ· ὑπερικόν· ὕσσωπον σὺν οἶνῳ· σμύρνης ὀβ. β'. ὀρμίνου σπέρμα· λειμώνιον, καὶ σέλινον· καὶ ἀγρίων περιστερῶν κόπρος δοθεῖσα μετὰ νάρδου.

Κεφ. ρξγ'. Ψιμυθίου δὲ ποθέντος, ἔλαιον, μέλικρατον· σύκων ἀφέψημα σὺν ἐλαίῳ θερμῷ· γάλα· ἐμείτῃ δὲ αὐτό· ὄλυνθοι σὺν ὄξει· μαλάχης ἀφέψημα σὺν ταῖς ῥίζαις· ἀμαράκινον, ἴρινον· σήσαμον λεῖον μετ' οἶνου· κονία κληματίνη· περσέων ὅστις σὺν ἐλαίῳ ἢ κριθῶν ἀφεψήματι· κόμμι κοκκυμήλων, πτελέας τὸ ἐν τοῖς θυλακίοις ὑγρόν· χοῆσθαι δὲ μετὰ τοὺς ἐμέτους, καὶ θαψίας χυλῶ, ἢ σκαμμωνίας [ὀπῶ].

Κεφ. ρξδ'. Ὑδραργύρου ποθείσης, ἀρμόζει γάλα πινόμενον, ἢ οἶνος σὺν ἀψινθίῳ ἢ σελίνου σπέρματι· ἢ ὕσσωπον σὺν οἶνῳ· ἐμείτω δὲ αὐτό· καὶ τὰ πρὸς λιθάργυρον ἀναγεγραμμένα ποιεῖ· ἄκρως δὲ βοηθοῦνται χρυσοῦ ἐλασμά-

Cap. CLXII. Iis, qui lithargyrum biberint, succurrunt haec: meracum largius cum absinthio propinatum, apii sylvestris semen e vino, hypericum, hyssopum cum vino, myrrhae oboli duo, hormini semen, limonium et apium, fimus palumbinus cum nardo exhibitus.

Cap. CLXIII. Cerussa pota, prosunt haec: oleum, aqua mulsa, ficuum decoctum cum oleo calente, lac potum vomitioneque redditum, grossi cum aceto, malvae cum radicibus decoctum, amaracinum, irinum, sesamum tritum e vino, lixivium e sarmentis vitium, persicorum nuclei cum oleo aut hordei decocto, gummi pruni arboris, humor, qui in folliculis ulmi continetur. Ceterum post vomitiones etiam thapsiae succo aut scammoniae liquore utendum est.

Cap. CLXIV. Argento vivo poto, conveniunt lac haustum, aut vinum cum absinthio vel apii semine, hyssopus cum vino, ita tamen ut deinde revomantur: prosunt et quae proxime contra lithargyrum praescripsimus auxilia. Mirifice vero adjuvat globulus e lamella auri

τιον μικρόν τι καταπίνοντες περιφερές· περιχώννυται γὰρ τῷ χρυσῷ διὰ συγγένειαν, καὶ συνολισθαίνει διὰ τῆς ἑδρας.

### Ε Π Ι Λ Ο Γ Ο Σ.

Ὅσα διὰ πείρας ἡμῶν, ὧ φίλτατε Ἀνδρόμαχε, τῶν ἁπλῶν φαρμάκων ἐν δυσὶ τόμοις συνειληγότες, ἐπεστάλκα-  
μέν σοι.

perexiguâ devoratus: illi enim argentum vivum propter cognationem circumfunditur et adhaerescit, ac simul etiam lubrico lapsu per sedem egeritur.

### Ε Π Ι Λ Ο Γ Ο Σ.

Haec sunt, carissime Andromache, quae tibi de simplicium medicamentorum usu experimentis comprobato, duobus libris sortiti, misimus.

---

COMMENTARIUS  
IN  
DIOSCORIDEM.

---

PRAEFATIO.

Ut, quonam iure opus susceperit, pateat, censura maiorum orditur Dioscorides, primos aetate nominans *Iolam* Bithynum et *Heraclidem* Tarentinum, quorum ille, a paucis laudatus, cum Heraclidi anteponatur, tempore Ptolemaei Evergetis et Seleuci Callinici vixisse videtur. A Plinio pluribus locis, a Galeno fere semel<sup>1</sup>, et a Nicandri scholiaste<sup>2</sup> citatur. Heraclides Tarentinus, celebris empiricae scholae sectator<sup>3</sup>, a Galeno saepius praedicatur. Scripsisse autem eum non de omni materia medica, ut Dioscorides, sed speciatim de compositione medicamentorum et probatione<sup>4</sup>; neque posse quemquam, si modo legerit, quae Heraclides de plantis memoriae tradiderit, plantas ipsas dignoscere<sup>5</sup>, testatur Galenus, in eo omnino cum nostro consentiens.

Sequitur *Cratevas* herbarius, qui Mithridati plantam inscripsit, Mithridatiam appellatam<sup>6</sup>, et in opere *ῥιζοτο-*

---

1) De antidot. 1. p. 7. ed. Lips.

2) Ad Theriac. v. 683.

3) Cels. praef.

4) Galen. de fac. simpl. med. 6. p. 795.

5) Galen. de antid. 1. p. 7.

6) Plin. 25, 26.



μικῶν effigies plantarum pinxit.<sup>7</sup> Eum noster saepius excerpt<sup>8</sup>, quamquam vel neglexisse, vel omisisse plures plantas testetur. Nec dissentit Galenus, dum descriptiones plantarum in Crateva obvias sine aspectu intelligi non posse asserit.<sup>9</sup>

*Andreas*, quem medicum noster appellat, deductis ab Herophilo viris annumerat Celsus, qui de medicamentorum facultatibus scripserint.<sup>10</sup> Id opus *νόρθηκα* scholiastes Nicandri vocat.<sup>11</sup>

His priscorum nomine insignitis, ad recentiores accedit, Asclepiadis assecclas, quibus tria potissimum opprobrio vertit: protinus quidem, saepius commutasse plantas officinales: dein, experientia sprete, ad commenticias molecularum differentias medicamentorum facultates exposuisse; tertium ordinem idoneum non servasse; vel enim facultates nullo modo cognatas consociasse, vel alphabeti elementa sequentes, satis diversas plantas dispariaque medicamenta coniunxisse. In his quidem, quae vituperat noster, ratiocinia de moleculis seu ὄγκοις primum merentur locum. Post Heraclidem enim Ponticum Asclepiades, loco ἀτόμων, ἀνομοίων μὲν καὶ ἀπαθῶν Demochiti, ὄγκους παθητούς statuerat principia rerum.<sup>12</sup> E molecularum autem ad spatiola seu πόρους ratione omnem corporis animalis statum explicans, συμμετρίαν πόρων dixit sanitatem constituere<sup>13</sup>, et, qui Asclepiadi adhaerebant, methodici τὴν μετασύγκρισιν asserebant ἐναλλάττεσθαι τὴν ποροποιίαν.<sup>14</sup> Itaque et actionem medicamentorum versari statuebant in mutata ὄγκων ratione ad πόρους. Quod cum commenti loco habeat Dioscorides, vitio quidem ipsis vertit; sed, non spreto plane loquendi usu vulgari, sae-

7) Plin. 25, 4.

8) Lib. 2. c. 153 — 185. lib. 4. c. 35.

9) De antidot. l. c.

10) Lib. 5. praef.

11) Ad theriac. v. 684.

12) Sext. Empir. adv. phys. 2. s. 318. Euseb. praepar. ev. 14, 23.

13) Galen. meth. med. 4. p. 269.

14) Ibidem.

pius in opere ipso de facultate medicamentorum μεταποροποιούσῃ<sup>15</sup> et de μετασυγκρίσει loquitur.<sup>16</sup> Hinc et emendatio textus (p. 3.), qua, Gadaldini codicis auctoritate fretus, εἰς ὅγκων διαφορὰς loco εἰς ὅγκον, aut εἰς ὅγκον διαφορᾶς posui, apta mihi potius quam temeraria videtur.

Nominat autem Dioscorides inter Asclepiadis assecclas primum *Bassum* Tylaeum. *Τυλαῖον* scribunt codices et ipsa Aldina, unde patriam dixeris Tylon, insulam margaritis gossypioque celeberrimam Arabici sinus.<sup>17</sup> Tullium Bassum citat Caelius Aurelianus<sup>18</sup>, *Βάσσον τὸν Τύλιον* Epiphanius.<sup>19</sup> Alii eundem scriptorem medicum credunt cum Iulio Basso, quem Scribonius Largus semel<sup>20</sup>, Plinius vero pluribus celebrat locis. Hinc iam Ruellius loco *Τυλαίου* *Ιούλιον* esse ponendum autumavit, Goupylus vero et Saracenus *Τυλαῖον* in *Ιυλαῖον* temere mutarunt. Equidem satius duxi, codicum auctoritati plus fidere, quam coniecturae, credibili quidem, sed neutiquam probandae.

De *Nicerato* nihil liquet, nisi composita medicamenta praedicasse, quorum quaedam a Galeno<sup>21</sup> citantur. Scripsisse librum de catalepsi Caelius Aurelianus tradit.<sup>22</sup>

Nec, in tanta memoriarum caritate, de *Petronio* aliquid certi exponere ausim. Epiphanius enim hunc Dioscoridis locum totum transscripsit.<sup>23</sup> Plinius *Diodotum* cum *Petronio* eundem habet: „Petronius Diodotus, inquit, qui anthologumena scripsit.“<sup>24</sup>

Qui hic *Νίγερ*, Erotiano *Νίγρος* dicitur.<sup>25</sup> Neque de eo aliquid exploratum habemus. Namque Sexti cognomen, quod recentiores ei tribuunt, nullo veterum testi-

15) Tom. 1. p. 643. 16) Ib. p. 384.

17) Theophr. hist. plant. 4, 7. Plin. 6, 32. 12, 21.

18) Acut. 5, 16.

19) Adv. haeres. 1, 80. 20) Cap. 6. n. 121.

21) De compos. sec. loc. 5. p. 654, 7. p. 98.

22) Chron. 2, 5.

23) Adv. haeres. 1. n. 5.

24) Lib. 20, 32. Cf. et lib. 25, 64.

25) Expos. voc. Hipp. p. 244. 386.

monio firmatur, neque, fueritne idem cum Sextio Plinii<sup>26</sup>, patet.

P. 7. Ὅτι τινὰ τῶν βοτανικῶν φαρμάκων cum Io. Bauhino esse legendum persuasissimum habeo, cum τὰ δὲ λοιπά sequatur. Assertio autem manifesto congruit cum Theophrasto, qui<sup>27</sup> τὸν ἐλλέβορον καὶ τριάκοντα ἔτη εἶναι χρῆσιμον praecipit.

Cap. I. *De Iride*. Ἴρις, Ἴριν scribunt Aldina et optimi editores, quamquam Eustathius<sup>28</sup> ὀξύνεσθαι τὴν ἀρωματικὴν πόαν, adeoque ἰρίς scribi doceat. Βαρυνεῖσθαι etiam haud sine exemplis est: sic modo ἰρίς apud Theophrastum Schneideri legitur, modo ἴρις. De genitivo pariter ambigitur. Ἴριδος legitur in optimis codicibus et Theophrasti et Dioscoridis. Ἰρεως tamen habent plures, ut LXX<sup>29</sup>, auctor εὐπορίστων, Paullus Aegineta: ἴριος etiam Theophrastus.<sup>30</sup>

Θελπίδη, aut cum cod. C. θαλπίδη, a θάλπω, θάλπος deducendum, signat calefacientem vim, quam in lingua saltem radix exserit.

Appellationem radice*s maricae* possumus ex *amaricante* corruptam habere. Sed Marcellus Vergilius potius legendam esse *naronicam* autumat, cum ad Narona fluvium, ὃς διαχωρίζει τοὺς Ἰλλυριοὺς καὶ Αἰβύρονους (schol. Nicand.) praecipue Iris proveniat.<sup>31a</sup> Consecratrix Romanis dictam fuisse, idem auctor est, quod ad expiationes et lustrationes adhiberetur, unde et καθάρων appellata sit.

Ὅπερ τρίτος aut ὀπερ τρίτις, si latina est vox, nec etrusca, *pertritam* videtur radicem signare, quia vel pertrita s. contusa adhibetur, aut quia usu tritissima est.

Νάϋ aegyptiaca vox est, etiamnum arabica ناي, quae ignem signat, sicut hebraica נר lampada s. lucernam.

Iam accedo ad descriptionem: in qua quidem protinus praeferendam esse duxi codicum vindobonensium le-

26) Lib. 32, 13.

27) Hist. pl. 9, 14.

28) Ad Il. 3. p. 296.

29) Exod. 50, 24.

30) Hist. plant. 1, 7.

31a) Nicand. ther. v. 607. Ἴριν θ' ἣν ἔθρεψε Ἀφίλων καὶ Νάρος ὄχθη.

ctionem ἐπὶ κλωνίων, quoniam pedunculos florum expriment. Olim ἐπὶ καυλῶ in *supremo caule* interpretes reddebant. Multi autem sunt in παραλλήλοις ἄνθεσι exponendis: discrepant vero Ruellius et Marcellus, quorum ille ad alternum situm, hic ad aequalem distantiam consilium transfert. Ab illius partibus stat Anguillara, ab huius Matthiolus, ut reliquos taceam.

In florum coloribus variis sequutus sum optimos codices, Serapionem, principemque editionem, in quibus μήλινα, loco μέλανα, legitur. Ultimam lectionem habent cum Asulano reliqui. At vero melleus aut luteus color in Iridis speciebus satis vulgaris est; niger vero nusquam occurrit. E variis proinde coloribus efficimus, et *Irin germanicam* et *florentinam* a Dioscoride intelligi. Utraque autem per omnem Graeciam frequenter provenit.

Libycam, quam et Galenus carthaginensem vocat<sup>31b</sup>, viribus inferiorem perhibet. Quae cui nostratum specierum adiudicanda sit, in ambiguo est. Peculiares Africae borealis species habentur: *Iris alata* Lam., *mauritanica* Clus., *iuncea* Poir., *stylosa* Desf.

Illyrica iris Galeno dicitur ἀστραγαλῖτις, quod astragali formam tuber referat.<sup>32</sup>

Arabibus sola radix أيرسا, herba vero florida السوسن الاسا, *lilium coeleste*, dicitur.

Κολλύριον est massa pultacea, qualem e terra samia glutinosam conficiebant.<sup>33</sup>

Cap. II. *De Acoro*. In synonymis gallicum πεπεράκιον ab Apuleio<sup>34</sup> redditur *piper apium*, cuius cognominis ratio ita exponitur, ut tradatur, herba hac in vase apum suspensa, apes nunquam seduci. Sed valde dubia est, quamquam assentiantur Hermolaus et Marcellus, cum Romanam genuinam appellationem apud Gallos quaerere nequeamus.

<sup>31b</sup>) De antidot. 2. p. 189.

<sup>32</sup>) De compos. sec. loc. 1. p. 422.

<sup>33</sup>) Lib. 5, 171.

<sup>34</sup>) Cap. 7. p. 139. ed. Ackerm.



Arabibus dicitur  $\zeta\delta$ , cuius cum citrinum floris colorem praedicet Serapion e Dioscoride, ita legisse in textu suo exploratum habemus: unde non *Acorum Calamum*, sed *Pseudacorum* hic intelligendum esse existimo. Id et confirmatur Apuleio, qui acorum in locis cultis, hortis et pratis nasci praecipit. Id utique de Iride Pseudacoro, neutiquam de Acoro Calamo dici potest.<sup>35</sup>

Aliud cognomen *σπλήγιον* (non *σπληνίον*) fide codicis constantinopol. recepti, praeunte Salmasio, qui propter vim contra splenis tumores eodem iure nostrum dici, ac thapsiam *ὑπόπιον*, recte arbitratur.

Cap. III. *De Meo athamantico* pauca sunt, quae moneam. Vulgaris est planta per omnem fere Europam, in locis alpestribus et alpinis abundans.

Cap. IV. *De Cypero. Cyperi rotundi* L., etiam nunc in cycladibus insulis frequentis, tubera suaveolentia odoris gratia inter vestimenta a Graecis servantur.<sup>36</sup> Medicas eorum vires celebrat et Galenus.<sup>37</sup> Unguentum eretricum fieri e cypero Theophrastus testatur.<sup>38</sup>

In voce *ἐρυσίσκηπτρον* dubius haereo. Siquidem Hesychius *ἐρείσκηπτρον* scribit, cum quo coniungere student, quicquid Plutarchus de *ἰρισκήπτοις*, i. e. iis lignis scribit, εἰς ᾧ ἡ ἰρις ἐπισκήψῃ.<sup>39</sup> Neque tamen video, quare non adhaeream simplici etymologiae ἀπὸ τοῦ ἐρύειν et σκῆπτρον: virgas enim profert cyperus longas, apice coronatas et flexiles.

Cyperi indici speciem, cuius radix zingiberi similis, manducata crocea et amaricans deprehendatur, Matthiolum habuit *Curcumam*, in quo quidem eo magis assensum meretur, cum et Ruellius testetur, pilosas partes glabescere, dum ea fricentur.<sup>40</sup> Hinc et  $\text{ح}$  curcumam Arabes vocant. Serapion sub titulo *Curcuma chelidonium*

35) Salmas. de homon. hyl. iatr. p. 36.

36) Sibthorp et Smith fl. graec. prodr. 1. p. 29.

37) De facult. simpl. 7. p. 54.

38) De odor. p. 742.

39) Quaest. nat. 4, 2. Bodaeus a Stapel ad Theophrast. r. 465.

40) Hist. stirp. 2, 4.

Graecorum tractat. Avicennam nomine *قرقوعا* <sup>41</sup> Curcumam describere Roxburghius perperam perhibuit. <sup>42</sup> Est enim arabica illa vox corrupta e *προκομάζματι* Dioscoridis.

Cap. V. *De Cardamomo*. Indicum aroma duabus potissimum viis Graeciam apportabatur. E Babylone enim, maximo emporio, navigiis in Euphratem demissis adverso amne vehebantur mercimoniae ad pontem illum celebrem, qui super Euphrate in Commagene, Syriae contermina, exstructus erat: <sup>43</sup> aut ultra provectae in superiores fluminis partes Armeniam apportabantur <sup>44</sup>, dein vero vel per terras Asiae minoris, vel e Trapezunte per pontum euxinum Bosporumque thracicum advehebantur. Sed fuit etiam alia indicarum mercium via, e Babylone ad Susam, Persidis metropolin <sup>45</sup>, hinc autem vel ad Sardes, vel per portas caspias et Mediam, cuius caput Ecbatana, iterum versus occidentem vehebantur. <sup>46</sup> Quamobrem Theophrastus cardamomum ab aliis refert ex India, ab aliis vero e Media deduci. <sup>47</sup> Simili plane modo et nostra aetate merces et aromata ac medicamenta ab emporiis potius quam a patria cognomina obtinuerunt, rhabbari exemplo.

Cap. VI. *De Nardo*. Ne verbosa eruditionis simulatione Salmasium aemuler, dicam, quod tricenario studio liquet. Nardi veterum sunt Valerianae, quarum praestantissima odore est *Patrinia Jatamansi* Don. <sup>48</sup>, seu Valeriana Jatamansi Jones. <sup>49</sup> Haec est Nardus indica veterum, distincta foliis lameolatis integerrimis, floribus fasciculatis purpureis, pedicellis fructibusque tomentosis. Haec est gangitis, *τὸν χνοῦν ἔχουσα*, qui deest in *sampharitica*. Haec nomen habet a Saphar, regia oppidi arabici, qua

41) Avic. ed. Roman. p. 246.

42) Asiat. research. 11. p. 340.

43) Strab. 6. p. 301.

44) Herod. 5, 52.

45) Arrhian. 3, 16.

46) Herders Idcen, 1. b. p. 713.

47) Hist. plant. 9, 7.

48) Flor. nepal. p. 159.

49) Asiat. research. 2. p. 405. 417. vol. 4. p. 433.

itur e portu sinus arabici extremi Musa.<sup>50</sup> Alia dicitur syriaca, πολύκομος, colore luteo. Hanc provenire in montium indicorum parte ea, quae Syriam spectet, noster. Patriniæ videtur species esse, quae plerumque lutescunt, forte ob odorem et aureum florum colorem est *P. scabiosaefolia* Fisch., quam in Imao et Emodis montibus crescere compertum habemus. Montana vero magis nigricans et fragrantior videtur *Valeriana Hardwickii* Wallich<sup>51</sup>. esse, etiamsi ipse eam non cognoscam. Provenit vero in omnibus Emodorum montium iugis.

Aetate, quae Dioscoridem exceperit, indica nardus νάρδου στάχυος nomine insignita fuit.<sup>52</sup> Arabibus genus omne dicitur سنبل, et primitivo nomine نردین. Avicenna, in epitomen contrahens Dioscoridis descriptionem, et de specie عصف (lutea) loquitur<sup>53</sup>, in qua voce exponenda mirum est quantum hallucinetur Salmasius.<sup>54</sup>

Cap. VII. *De celtica nardo.* Nullus dubito, *Valerianam celticam* pariter ac *Saliuncam* All., quarum illa in alpihus Styriae Carinthiaeque, haec in alpihus Liguriaeprovenit, intelligi, maxime postquam Wulffenius commercium florentissimum retulerit, quod et nostra memoria quaestui incolis est, dum navigia quotannis Tergesti onerant hac planta, per totum Orientem lectissima ad unguenta condienda.<sup>55</sup> Avicenna eandem vocat القليطى: dein vero de الغليظ loquitur, quam vocem e priore corruptam esse autumat Salmasius; sed cum ἀδρόν exprimat, potest etiam versio esse θυλακίτιδος.

*Saliunca* nomen genuinum celticum hodiernum valere dicitur.<sup>56</sup>

Τράγον, quem olim, gravi errore, pro *Saxifraga*

50) Ptolem. 6, 7. Plin. 6, 26. Samfur hodie dicitur oppidum Arabiae, inter Hodeidam et Sanam.

51) Roxb. fl. ind. 1. p. 166.

52) Galen. fac. simpl. 8. p. 84.

53) Avic. ed. arab. p. 225.

54) Homon. hyl. iatr. p. 150. 151.

55) Jacqu. collect. 1. p. 50. 51.

56) Dalechamp. hist. pl. p. 982. Valer. Cord. in h. l. p. 2.

*Hirculo* L. habebam, neutiquam ea esse planta potest. Crescit haec enim in paludibus borealibus, radicem habet fibrosam, folia linearia lanceolata, caulem erectum, flore croceo terminatum. Iam vero, quatenam sit ea planta, plane nescio, ni forte ῥιζοτόμοι *Valerianae saxatilis* L., omnino una cum celtica crescentis, radices graveolentes, neutiquam aromaticas, simul evulsas caule privarint, ut pondus augetur.

Cap. VIII. *De Nardo montana*. Hanc esse *Valerianam tuberosam* nullus dubito, cum in montibus Ciliciae, Cretae et Cypri copiosam invenerit Sibthorpius, cum radices gerat tuberosas, fragrantas, cum asphodeli radicibus omnino comparandas. Quid autem ἡρυνγίς sit, cui folia et caules simulantur, divinare neque. Namque de Eryngio sermo esse nequit, etiamsi spinae desint.<sup>57</sup> Habet enim folia radicalia oblonga integerrima, caulina pinnatifida. Coniecturam Iustiniani Chii confirmant tum mentio caulis praegrediens, tum ipsa natura, quae cognita Cilici auctori esse debebat.

*Θυλακίτις* dicebatur, quod tuber similitudinem quamdam cum fiscella haberet, sicut et papaver ob caput seu capsulam eodem nomine insigniebatur.<sup>58</sup> *Νῆρις* graeca mihi videtur vox, a loco natali desumta: *νηρίδες* enim rupes Hesychio dicuntur. *Πυρρίτις* est aliud cognomen, a Galeno adhibitum.<sup>59</sup>

Cap. IX. *De Asaro*. Nullum potest dubium esse, quin nostrum intelligatur *Asarum europaeum*. De cognominibus parum constat, nisi quod *baccar* Virgilii eadem planta esse videtur, quoniam et cum hedera iungitur, et coronariis herbis adnumeratur.<sup>60</sup> Et nostra aetate incolae agri veronensis hanc plantam *baccheram* aut *baccaram* vocare, Pollinius auctor est.<sup>61</sup>

Cap. X. *De Phu*. Nemo scientius hoc caput illustravit, quam Fab. Columna, qui, cum iuvenis comitali

57) Neque tamen eo minus Fab. Columna cum Eryngio *Nardum* comparat. (Ecphras. p. 213.)

58) Diosc. 4, 65.

59) De fac. simpl. 3. p. 81.

60) Virg. ecl. 4, 19. 7, 27.

61) Flor. veron. 2. p. 91.



morbo conflictaretur, Valerianae ope revaluit. Tum in phytobasano<sup>62</sup>, tum in ecphrasi stirpium<sup>63</sup> *Valerianam* nostram *officinalem* eam esse stirpem statuit, quam Dioscorides *Φοῦ* nomine descripserit: additis textus emendationibus, quas et ego adoptavi. Tantum autem abest, ut primus hanc sententiam protulerit, ut potius iam Brunfelsius diserte dicat: Phu esse nostram Valerianam.<sup>64</sup> Aliam speciem, *V. Phu*, quae et nostra aetate id nomen gerit, primus pro vero Dioscoridis *Φοῦ* habuit Valer. Cordus:<sup>65</sup> neque tamen ullum addidit argumentum, quo haec opinio fulciretur.

Nostra memoria, cum Asiae minoris plantae solertius examinatae sint, in Lycia invenit Hawkinsius, Sibthorpii comes, Valerianae speciem, quam *Dioscoridis* dixit, quod magis cum descriptione conveniret. Namque pastinacae aut oleris atri folia multo aptius cum huius speciei aut *V. sambucifoliae* Mikan. foliis comparantur, quam cum foliis Valerianae officinalis.

*Ναρκίσσου* pro *νάργδου* legerunt et Arabes, ut Avicenna<sup>66</sup> *نرجيس* habet, quod e *نردس* facillime potuit formari.

Cap. XI. *De Malabathro*. Obscuro huic loco lucem primus attulit Garcias<sup>67a</sup>, dum Cassiae esse folium perhiberet. Quae cum arbor sit in India cis Gangem crescens, potuerunt quidem folia vento deiecta paludibus aut fluminibus innatantia reperta esse, unde, sicut in pluribus indicis mercimoniis, fabula illa originem duxisse videtur. Garcias addit, indicum nomen esse *Tamalabathra*, quod fictum esse alii tradunt e Malabaria, Indiae provincia et *Bathron*, quod folium signat. Sed et hodiernum id cognomen Cassiae apud Indos vulgare est.<sup>67b</sup> Graeci serio-

62) Ed. Jan. Planc. p. 92 — 93.

63) p. 210 — 220.

64) Append. ad tom. 2. p. 3.

65) Annot. in Diosc. f. 3.

66) Ed. arab. p. 236.

67a) Clus. exot. p. 177.

67b) Fleming in Asiat. research. 11. p. 170.

res et φύλλον μαλαβάθρου et φύλλον ἰνδικόν vocant, et unguentum ex eo paratum φυλλινόν.<sup>68</sup> Arabes vocant ساج, cuius significatum ignoro.

Cap. XII *De Cassia.* Κασσία aut κασία quibusdam derivari posse videtur ab ebraico קַשְׂיָה, quo cassia in codice sacro Ebraeorum pluribus locis insignitur. Radix ebraea קַשְׂיָה signat *abscindere, abradere*, ut modum, quo cassia paratur, indicet. Arabice dicitur سليخة, a سَلَخ, *cortex*. Species prima Dioscoridi appellatur ἄχυ, manifesto ebraicum אֲחִי, quod et LXX<sup>69</sup> et Siracides<sup>70</sup> in sermonem graecum recipiunt, signans palustres generatim plantas.<sup>71</sup> Hanc igitur esse κασσίαν τὴν ἐκ λιμνῶν Strabonis, nequaquam dubito.<sup>72</sup> Mercatores Alexandrinos nuncupasse hanc δαφνίτιν refert: quod quidem cognomen malo a portu sinus Arabici Δαφνοῦς derivare<sup>73</sup>, quam a lauro, cum qua parum aut nihil similitudinis obviam est.

Optimam speciem dicit purpurascentem, crassam, ζίγιρ, quam Galenus γιζί vocat.<sup>74</sup> Ζίγιρ nil aliud esse videtur, quam arabicum ساجور, τὸ φρύγανον, ἢ καύσιμος ὕλη. Itaque vel ab eius usu apud Sabaeos profecta est appellatio, quoniam cassia uti eam nationem, tanquam cremiis vulgaribus, ad ignem accendendum, refert Strabo<sup>75</sup>, vel etiam propter tenuitatem corticis cum φρυγάνοις confertur.

Μουσλήτις aut μουσλίτις Galeno μόσυλλον dicitur<sup>76</sup>, a promontorio et portu mosylico, quo et unde cinnamomum et cassia devehebantur.<sup>77</sup> Hodie dicitur caput Gardafui.

Vilioris speciei nomen ἀφυσήμων iam sub textu exposui. Dicebatur et κιντώ, quod idem arbitror cum ebraico קִנְיָה, et δάναρ, دَنَار arabice, *luxuria* plantarum. Haec de cognominibus cassiae.

68) Nic. Myreps. 34, 22.

69) Genes. 41, 2.

70) Cap. 40, 16.

71) Hieron. in Jes. 7. col. 187.

72) Lib. 16. p. 455.

73) Strabo lib. 16. p. 418.

74) De antidot. 1. p. 72.

75) Lib. 1. p. 437.

76) De theriac. ad Pis. p. 257.

77) Plin. 6, 34. Ptolem 4, 7.

Iam de patria. Cum nostro consentiunt veteres omnes, Arabiam esse cassiae partiam. Et antiquissimus quidem testis est Ezechiel propheta, qui Tyrum afferri cassiam a Iavanicis ex Usal perhibet.<sup>78</sup> Iavan autem et Usal fuisse Arabiae felicitis emporia, Bochartus docuit.<sup>79</sup> In ea patria declaranda uberiores sunt Agatharchides<sup>80</sup> et Strabo<sup>81</sup>, teste etiam Dionysio Periegete.<sup>82</sup> Nostra quidem aetate, quamquam Niebuhrius cum Forskoleo obierint Arabiam, Cassia in ea regione haud inventa est. Id inde pendere videtur, quia regiones Arabiae, quae Austrum spectant Eurum, nondum pervestigatae sunt.

Comparat auctor folium Cassiae cum Piperis folio, in quo quidem non taxandus est, quoniam folia utriusque glabra, ovato-oblonga, nervosa sunt.

Cap. XIII. *De Cinnamomo.* Antiquissimum aroma, cuius nomen etiam graecum a Phoenicibus commodatum fuisse Herodotus testatur<sup>83</sup>, et in ipsis Ebraeorum priscis libris קַמְמוֹן constanter dicitur. Ortam esse eam appellationem ex indico *Cacyn-nama*, quod *dulce lignum* interpretatur, non sine veritatis specie asseverat Marshallius.<sup>84</sup> Indicam originem quamquam nemo est qui ignoret, *κινναμωφόρος* tamen *χώρα* a priscis auctoribus tum in Aethiopia orientali, tum in Arabia saepissime celebratur.<sup>85</sup> Nec tamen nostris temporibus apertae sunt eae regiones. Vix mentionem merentur, quae nugator Philostratus de cinnamomo ad Caucasum crescente fabulatur.<sup>86</sup>

Id tamen notandum, et arabicam appellationem دار صيني esse indicae originis: namque in Bengalia et hodiernum *Darschini* est nomen cinnamomi.<sup>87</sup> Cum Arabum doctri-

78) Ezech. 27, 19. יוֹן מֵאֲוִיזַל

79) Phaleg, col. 117.

80) Apud Phot. cod. 250. p. 458. 459, ed. Bekker.

81) L. c. p. 437. 455. 456.

82) Orbis descr. v. 939.

83) Lib. 3. c. 111. *Τὰ ἡμεῖς ἀπὸ Φοινίκων μαθόντες κιννάμωμον καλέομεν.*

84) Annals of philos. 1817. Oct. p. 255.

85) Strabo lib. 16. p. 418. 434.

86) Apud Phot. cod. 241. p. 325.

87) Fleming in Asiat. research. 11. p. 170.

na vincere coepisset vilia Graecae eruditionis rudimenta, Arabicae appellationes Graecis etiam substitutae, sed saepe male scriptae et pronunciatae sunt. Sic *Dâr-sini* transiit in ἀρσενικόν.<sup>88</sup>

Septem fere species enumerat Dioscorides, cum decem diversas distinguant, qui nostris temporibus Ceylonam frequentarunt.<sup>89</sup> Optimum declarant rubicundo-flavum, subinde in bruneum vergens aut pullum (τῇ χροῖα μέλαν, τεφρίζον ἐν τῷ οἰνώδει). Laeve debet esse, quoniam deglutus est cortex, et tenue: librum enim arboris solum continet: hinc fibrosa compages optimae est notae. Hoc e trimis frondibus sumtum semper praefertur crasso, corticoso, lignoso, quale e truncis prope radicem petitur. Id ξυλῶδες aut ξυλοκιννάμωμον noster appellat. Cassia lignea nostratum et Cassia cinnamomea eadem esse videntur, unde et Cassiam ipsam ex eadem arbore provenire, quae Cinnamomum largiatur, veteres iam statuerunt.<sup>90</sup>

Cap. XIV. *De Amomo* ingens est disceptatio, quam dirimere in nostra eo minus est potestate, quo diutius iam e nostris officinis exulavit id aroma. Et primum quidem de nomine. Ἄμωμον pariter ac ἀμφῶμος Hesychio dicitur ὁ λιβανωτός, dein et ὁμός. *Om* vero seu *Hom* erat apud Persas veteres remedium universale adversus mala quaevis.<sup>91</sup> Hinc, cum et arabica vox حالم huic respondeat, persicam credo esse originem, neque assentior Salmasio, qui ἄμωμον cum ἀμωμήτῳ coniunctum, mendae aut vituperii expers interpretatur, ut amomis unguentis condita sint corpora mortuorum.<sup>92</sup> Neque arabicam vocem a حالم, columba, derivare ausim, sicut Bochartus, vel e calore eximio columbarum, qui cum ca-

88) Nic. Myreps. 32, 21.

89) Falk in act. harlem. 15. pag. 279. Thunberg it. vers. germ. pag. 270.

90) Galen. de antidot. I. p. 70. Καὶ γὰρ καὶ γίνεται ποτε κιννάμωμον ἐκ μεταβολῆς τῆς κασσίας, ὥστε ὅλον μὲν ὁρᾶσθαι τὸ οἶον δένδρον ἀκριβὲς κασσίαν, ἀκρέμονας δὲ τινὰς ἐν αὐτῷ κιννάμωμον, συνεχεῖς τοῖς πλάδοις τῆς κασσίας εὐρίσκεισθαι.

91) Zend-Avesta, ed. Kleuker, 2. p. 381.

92) Plin. exercit. p. 283.



lefaciente aromatis vi conferri possit, effecit: aliis respu-  
cientibus ad similitudinem folii cum pede columbino, quam  
nullo modo agnosco.

Cum medio aevo omnis veri amomi notitia perditum  
ivisset, substituerunt officinae vel Sisonis Amomi semi-  
na, vel indicum aroma, quod cardamomo cognatum esset.  
Herbarii vero docti modo hanc modo illam plantam sic  
vocarunt, Anastaticam hierochunticam Cordus uterque,  
Cubebas Caesalpinus, myrtum Pimentam (americanam)  
alii, quibus et Clusius<sup>93</sup> addidit *Forsteram magellanicam*  
Sw., quam Drakius, illustris navarcha, forte apportave-  
rat, decepto Clusio, cui persuasit pharmacopola quidam,  
se ex emporio sinus Persici Ormuz hanc plantulam acce-  
pisse. Nuper quoque Feaeus<sup>94</sup> Amomum Cardamomum  
L., quod cum Lamarckio racemosum vocat, pro Amomo  
veterum habuit, licet nulla profecto nota utrique com-  
munis sit.

Equidem autem ante viginti annos sententiam Plu-  
knetii defendi: Amomum esse *Cissum vitigineam* L. Ar-  
busculam nominat Pluknetius<sup>95</sup> bacciferam, circumplica-  
tilem, vitigineo folio subtus lanato, fructu racemoso, fer-  
vidiore odore. Fruticulus est scandens, subvolubilis, ra-  
mis fulvescentibus, foliis cordato-subrotundis quinquelo-  
bis, subtus ferrugineo-pubescentibus, quae cum Bryoniae  
foliis conferri possunt. Flores sunt umbellati, incani, ut  
ergo color Levcoium aemuletur. Baccae sunt pyriformes,  
coerulescentes, odore, sapore fervidae.

Obstare videtur patria: namque nostra extra Indiam  
orientalem inventa non est. Amomum autem a Dioscori-  
de ex Armenia venire, e Media et Ponto ipso dicitur.  
Assyrium vocant Romani.<sup>96</sup> In Mesopotamia crescere  
perhibet Strabo<sup>97</sup>, Καρδών χώραν (Carduenen) patriam di-  
cit Iosephus.<sup>98</sup> Quamvis haud sine exemplo est, indicas

93) Exot. p. 199.

94) Flor. virgil. p. 16. 199.

95) Mant. p. 27. t. 337. f. 2.

96) Virgil. eclog. 4, 25. Quid quod scythicum nominat Da-  
mocrates apud Galen. de compos. med. sec. loc. 8. p. 224.

97) Lib. 16. p. 290.

98) Antiqu. iud. 20, 2.

plántas etiám in Assyria vetere reperiri, credo tamen, propter emporia, ad Euphratem et Tigrin, in Media et ad Pontum euxinum celebria, quae aroma illud apportabant, has regiones pariter commutatas fuisse cum ipsa patria, ac id in reliquis Indiae aromatis contigisse, iam supra probavimus.

Graviter erravit Plinius, dum, postquam vitem labruscam indicam nuncupavit, folia cum punici mali foliis comparat, quibus etiam adulterari scribit.<sup>99</sup>

Nec de Rauwolfii Amomo, quod ipse ex Armenia habuisse testatur<sup>100</sup>, nec de Anguillarae, quod *Pepe salvatico* vocat, quod suo tempore in hortis venetis patavinisque cultum sit<sup>1</sup>, aliquid certi pronuntiare ausim.

C. Hofmannus malam suadet textus mutationem. Ubi legimus: ἐκλέγου τὸ πρόσφατον, οὐ πεπιλημένον ἢ συμπεπλεγμένον, λελυμένον δὲ καὶ διακεχυμένον, contrarium iubet scribi: τὸ πρόσφατον, πεπιλημένον ἢ συμπεπλεγμένον, οὐ λελυμένον δὲ καὶ διακεχυμένον. Immemor certe fuit Hofmannus, secundum Plinium adulterari amomum „gummi liquido, ut cohaereat convolvatque se in uvae modum.“

*Ἀμωμὶς* illa, qua adulterabatur verum amomum, est vel Cissi alia species, inodora, cuius fructus decidunt, vel Bryoniae species, quae sicut Br. dioeca, floret quidem, sed fructum in mascula planta ferre nequit. Amomis, quam Clusius et Dalechampius<sup>2</sup> pingunt, est planta pusilla magellanica, quam dixerim *Arbutum microphyllum* Forst., nisi nimis obscura esset icon. Sed Drakius, a quo Clusius plura habuit, eam attulisse videtur.

Cap. XV. *De Costo*. Tres enumerat auctor species, primam arabicam candidam, indicam alteram nigrificantem, tertiam syriacam, buxei coloris odoreque ferientem. Priorres duae species aetate solummodo differre videntur, quod iam Garcias autumavit.<sup>3</sup> Arabica autem est dicta prima species, non quod in Arabia crescat, sed quod Arabes

99) Lib. 12, 28.

1) Semplici, p. 34.

3) Clus. exot. p. 205.

100) Iter german. p. 128.

2) Hist. p. 1814.

eam ex India adveherent. Namque in Arabia saltem a recentioribus haud inventa est. Linnaeus tamen etiam *Costum arabicum* dixit.

Quid syriacus sit, quem Avicenna قسط الرومي, costum romanum, vocat, nescio. Non cognosco similem costo radicem, buxei coloris et odoris ferientis, nisi Galangae radix fuerit, quam Arabes demum introduxerunt.

Helenii radix, quam mercatores Commagenes costo admiscuerunt, potuit quidem pro eo sumi, cum et color albidus et odor subviolaceus et sapor amarus aromaticusque decipere queant. Attamen sapor magis rancidus est et glutinosus, nec fragrantia insignis.

Cap. XVI. *De Schoeno.* Σχοίνων varia erant Graecis genera: hinc Hippocratici auctores nostrum cognomine εὐόσμον distinguunt. Arabes أنخر vocant. Σχοίνου ἄνθος iam Galeni aetate appellatum fuisse, ipse miratur, cum ipse florem nondum conspexerit: qui enim advehatur, flores perdidisse, quod cameli in patria libentissime depascantur.<sup>4</sup> Contraxerunt dein σχοίνου ἄνθος in σχοίνανθος, sicut Aëtius et Io. Actuarius, unde Palladius Rutilius et Plinius Valerianus cum latinobarbaris *sqüinanthum* formarunt.

Esse autem gramen arabicum odoratum, aromaticum, nemo non videt. Garcias id describit, quemadmodum ex Arabiae ora habuit, quae Euronotum seu Vulturum spectat. Est vero *Andropogon Schoenanthus*, quem et ex India orientali siccum habeo, et diu colui. Est autem fragrantissimus, dum recens est: odor cum citrino comparatur melius, quam cum rosaceo. Culmus superne fulvus est, rufescentes flosculi cum involucris. Si siccus teritur, camforacei aliquid spirat. Copiosus est in Arabia, ubi inventum Forskoleus Andropogonis bicornis nomine designat.<sup>5</sup> Crescit et in India orientali et in Africa australi. Quae nam autem graminis species libyca Dioscoridi dicatur, nescio, cum inutilem declaret. Τευχίτης dicebatur arabicus,

4) De antid. 1. p. 70.

5) Flor. arab. p. 175.

quia in τεύχεσι, vasis, afferebatur. Quem Nabataei mercatores apportabant, indicus fuisse videtur. Hunc nabataeum vocat Avicenna أجامى, quod, sitne derivandum ab أجم, Syriae oppido, iuxta Damascus, an ab أجم, arundineto, ignoro.

Cap. XVII. *De Calamo aromatico.* Nihil abest, quin *Acorum* nostrum *Calamum* habeam hanc veteribus celebratissimam plantam. Indicus praesertim, a Rheedio delineatus<sup>6</sup>, graciliorem habet radicem, quam nostri est, magis geniculatam, fulvam, intus albidam ac spongiosam. Nemini profecto ignota est fragrans et aromatica eius indoles. Arabibus dicitur قصب نريوة. Κιφός vertitur ياقوتى, qua voce color chrysolithi intelligitur.

Theophrastus solerter de patria calami et schoeni agit.<sup>7</sup> Esse inter Libanum et alium montem parvum convallem modicam et lacum amplum, iuxta quem in paludibus exsiccatis proveniant. Lacus ille Gennesaritis a Strabone vocatur<sup>8</sup>, ים בְּנֵי־נַחֲשִׁיץ ab Ebraeis<sup>9</sup>, λίμνη Τιβεριάς a Iosepho.<sup>10</sup> Burckhardtus in paludibus istis iuncos et arundines quidem altas, sed nec calamum, nec schoenum invenit.<sup>11</sup>

Cap. XVIII. *De Balsamo.* Fruticis celebratissimi patriam regionemque, ubi colatur, alii aliam indicant. In eo tamen plerique cum nostro conveniunt, in Iudaea provenire, sive sponte, sive hominum cura. Convallem Iudaeae, quam D. indicat, Theophrastus vallem Syriae vocat, in qua duo esse paradisi ferantur.<sup>12</sup> Eam regionem Strabo planitiem Hierochuntis dicit, feracem palmarum et balsami fruticis:<sup>13</sup> Iosephus τὴν ἀπὸ τοῦ Καρμύλου κοιλάδα pretioso balsamo celebratam nominat, quod in sola ea gignatur.<sup>14</sup> Galenus Engadinum balsamum tanquam praestantissimum laudat<sup>15</sup>: fuit autem Engadinum

6) Hort. malab. 11. t. 48. Vaëmbu.

7) Hist. plant. 9, 7.

8) Lib. 16. p. 327.

9) Numer. 34, 11. Jos. 13, 27.

10) Bell. iudaic. 3, 3.

11) Iter german. ed. Gesen. 2. p. 559.

12) Hist. plant. 9, 6.

13) Lib. 16. p. 367.

14) Antiq. ind. 5, 1.

15) De antidot. 1. p. 25.



oppidum lacui Sirbonidi vicinum. Denique Aristides Scythopolin Galilaeae dicit balsami feracem.<sup>16</sup> Burckhardto nuper accolae lacus Tiberiadis retulerunt, in hortis eius regionis fruticem eum coli, sed cum pessime eum descripserint, nec ipse peregrinator viderit, testimonium falsum esse videtur.<sup>17</sup> Etiam si autem cultus fuerit frutex in Palaestina, haud tamen indigena esse videtur, quia nusquam eius in priscis Ebraeorum libris mentio fit: namque סִרְבִּי, quod in regione Gilead provenire dicitur<sup>18</sup>, quodque Talmudici veteres plerique pro balsamo habent<sup>19</sup>, nequaquam id esse, sed mastichen, probarunt Salmasius<sup>20</sup>, Bochartus<sup>21</sup> et Celsius. Introduxisse eius culturam in Palaestinam regina Sabaea ex Arabia traditur.<sup>22</sup>

In ora Arabiae maritima, quam Sabaei habitabant, sponte provenire, iam Strabo docet.<sup>23</sup> Id et P. Alpinus perhibet<sup>24</sup>: et Forskoleus ipse eum fruticem haud procul a Mokha Arabiae invenit.<sup>25</sup>

In Aegyptum igitur, ubi plures fruticem eum cultum viderunt, ex Arabia introductum fuisse, idem P. Alpinus contendit. Praeter Dioscoridem Symeon Sethus<sup>26</sup>, Abdollatifus<sup>27</sup>, Ebn Alwardi et Bakui<sup>28</sup> Heliopolin Aegypti eam regionem vocant, ubi is frutex colatur. Ibi etiam, circa oppidum Arabiae vicinum, crucigeri balsami fruticem semet invenisse testantur.<sup>29</sup> Post renatas literas primus Petr. Belonius plantam in horto cahirensi visam de-

16) Orat. 3. p. 595. 17) Iter german. 2. p. 564.

18) Genes. 37, 25. Ierem. 8, 22.

19) Cels. hierob. 2. p. 183.

20) Homon. hyl. iatr. p. 175.

21) Hieroz. 1. p. 628.

22) Ioseph. antiq. iud. 8, 6. Comment. ad Theophr. p. 354.

23) Lib. 16. p. 434. 24) De plantis Aeg. p. 49.

25) Flor. arab. p. 79. Niebuhrio relatum est, ad Zafra in provincia Hedschâs verum balsamum provenire. (Besch. von Arabien, p. 357.)

26) De cib. fac. p. 9. 27) Aeg. p. 13.

28) Notices et extraits, 2. p. 29. 445.

29) Iac. de Vitriaco in Bongars gest. Dei per Francos, 1 p. 1128. Marin. Sanut. 2. p. 260.

scripsit<sup>30</sup>, dein vero plures. Et in ora maris rubri occidentali reperit Saltius, confirmante generis veritatem R. Brownio.<sup>31</sup>

Hactenus de patria. Iam inquirendum est in descriptionem plantae, apud veteres obviam. Dioscorides fruticem cum lycio aut pyracantha, folia sempervirentia cum rutae foliis comparat. Theophrastus haud ita bene arborem dicit malum punicam proceritate aequare, sed folia itidem rutae habet similia, et ἐκλευκα.<sup>32</sup> Rectius Strabo τὸ φυτόν θαμνωδες habet, κυτίω ξοικὸς καὶ τερμίνθω.<sup>33</sup> Pausanias fruticem ait myrto similem, folia vero maioranæ.<sup>34</sup> Avicennae textus memorabilis est, nam protinus Aegypti oppidum Heliopolin (عين الشمس) balsami feracem pronunciat, dein arbusculam cum lycio (حصص) comparat, unde proficiscitur, λυκίου nos pro λευκοίου recte posuisse.<sup>35</sup>

Egregie primus recentiorum Petr. Belonius formam fruticis delineat; fruticosam dicit arbusculam, duorum triumve cubitorum altitudine, foliis primum coniugatis, dein ternatis, demum pinnatis, foliolis lentisci aut rutae similibus, ciceris tamen folia haud superantibus. Ita et P. Alpinus. Tandem Forskoleus inventam in Arabia plantam cum Linnaeo communicavit, a quo scianter 1764 genus Amyridis stabilitum est.<sup>36</sup> Duas tamen species constituit, *Am. gileadensem*, foliis ternatis, et *Am. Opo balsamum*, foliis pinnatis, quae, Belonio observante, in unam contrahendae esse videntur.

Inciso ferreis unguibus arbusculae cortice, excipi balsamum, noster tradit, Theophrastum sequens. Tacitus, qui Palaestinam dicit balsami patriam, vim ferri haud adhiberi contendit, „pavere enim venas:“ seu, quia facilius ferro altius demisso ipsum alburnum laeditur, haud succus peculiaris, sed latex crudus ascendens, promanat. Hinc

30) Obs. 2, 39. p. 110. ed. Clus.

31) Salt. iter. germ. p. 165. 476.

32) Hist. pl. 9, 6. 33) Lib. 16. p. 368.

34) Lib. 9. c. 28. 35) Ed. arab. p. 140.

36) Amoen. acad. 7. p. 68. 69.

fragmine lapidis aut testa aperiri corticem docet.<sup>37</sup> Ita et Plinius, qui „uni terrarum Iudaeae concessum“ balsamum tradit, incidi corticem vitro, lapide aut osseis cullis docet. „Ferro laedi vitalia odit. Emoritur protinus, eadem amputari supervacua patiens. Incidentis manus libratur artificii temperamento, ne quid ultra corticem violet.“<sup>38</sup> Sic et Iosephus acutis lapidibus vulnerari corticem scribit.<sup>39</sup>

Copia balsami quavis aestate e frutice obtinendi Dioscorides ita tradit, ut quaestum omnem ex amplo horto faciundum indicet. Namque sex vel septem χόας vel congiï faciunt 36—42 sextarios, aut 45—50 libras. Quae insignis copia fidem fere superat, ni cum Theophrasto statuamus, mixtum plerumque balsamum ac adulteratum, quod evehatur. Largiorem tamen singularum arborum venam suo tempore fuisse testatur Plinius. Postquam enim, dum sibi Iudaeam penitus Romani subderent, de pretiosa hac arbore dimicatum esset, sata fuit ea a fisco, „nec unquam fuit numerosior, aut procerior.“

Nostra aetate Arabes stillantes sponte e ramis fruticis guttas excipiunt, nec fertilissimus frutex ultra triginta vel sexaginta guttas intra diei spatium largiri dicitur.<sup>40</sup>

Egregie notae exponuntur, quibus genuinum balsamum ab adulterato distinguatur: in quibus memoranda praesertim acidula indoles, qua fit, ut lac coagulet. Inhaeret autem cuivis balsamo acidum quoddam, quod benzoicum esse, nuperi probarunt chemiae magistri. Hinc fit, ut et succos plantarum coeruleos balsama rubro colore inficiant. Proinde iure nostro, accedente codicum auctoritate, ὀξύζων posuimus, loco μὴ παροξύζων. Dum nimis annosum est, oleum aethereum avolat, odor multo debiliior fit, et pondus balsami augetur, ut et fundum aquae, cui iniicitur, petat.<sup>41</sup>

Hypericum illud e Petra oppido ad adulterandum

37) Hist. 5, 6.

38) Lib. 12, 54.

39) Antiq. ind. 14, 4. Bell. ind. 1, 6.

40) Gerlach, Reise nach Constantinopel, p. 227.

41) Murray appar. medic. 4. p. 40.

balsamum usurpatum, veram fuisse Hyperici speciem, probabile est. Scatent enim Hyperica, maxime orientalia, resina et oleo aethereo odorato. Nec absonum est, fruticosam seu arborescentem Arabiae indigenam speciem, quam *H. revolutum* Vahlus nuncupavit, eo consilio adhibitum fuisse.

Cap. XIX. *De Aspalatho*. Quinam fuerit is frutex spinosus, ligno rubescente, quo ad spissanda unguenta utebantur unguentarii, magnopere dubium est. Quodsi appellationibus fidendum est apud recentiores Graecos usitatis, ἀσπάλαθος est *Cytisus laniger* Cand. (*Spartium villosum* Vahl.) Frutex enim est rigidus, ramis ramulisque omnibus spinescentibus, foliis sericeis, calycibus villosissimis, leguminibus lanatis, quem in Africa boreali, Corsica, Neapoli, per omnem Graeciam et insulas maris aegaei, in Rhodo etiam et Cypro invenerunt. Cum tamen vivum eum non viderim, nescio, fragrans sit et rubescens lignum trunci radicisve. In ramis florentibus saltem, quos in Corsica et ad Salernum lectos servo, nihil eius indolis animadverto, licet mihi notum sit, ad tingendum affines plantas adhiberi. Provenire eum fruticem Dioscorides ait in Istro, Nisyro, Syria et Rhodo. Istrus autem est Stephano Byzantino quadruplex: prima urbs Cretae, altera Ponti, tertia insula iuxta Triopium Cnidiae, quarta Iapygiae. Cum hic vero Istrus cum Nisyro, insula Cycladum, iungatur, intelligenda videtur esse insula inter Nisyrion et oram Asiae minoris sita.

Alterum genus aspalathi habeo vel *Spartium horridum* Vahl., quod et in omni Graecia vulgare est, vel *Cytisum spinosum* Lam., quem P. Alpinus primus in Creta observavit.<sup>42</sup> Eo tyranni in Hade castigantur.<sup>43</sup>

Arabes vocant دأى شيشغان, cuius originitio, ut cum Quintiliano loquar, me fugit.

Cap. XX. *De Bryo*. Βρύον varium habet significatum. Floris gemma dicitur Theophrasto<sup>44</sup> et ipsi Diosco-

42) De plantis exot. p. 12. 13.

43) Plato de leg. 10. p. 471. ed. Gryn.

44) Hist. pl. 1, 1.



ridi.<sup>45</sup> Amenta mascula Theophrasto<sup>46</sup>: alii flores et Theophrasto<sup>47</sup> et Nicandro.<sup>48</sup> Theophrastus quoque algas marinas generali nomine βούου signat.<sup>49</sup> Noster hic lichenum species, quae arbores inhabitant intelligit, Usnea nostratibus dictae, ab Arabico أشند (Oschnah). Odoratissima earum est indica, *Alectoria Arabum* Achario dicta, quam et Dillenius icone expressit.<sup>50</sup> Aliae minus odoratae sunt, licet a senioribus saepe adhibitae: *Usnea florida*, *barbata* et *plicata*, quae, dum in coniferis arboribus crescunt, odoratiores esse consuescunt. Avicenna, qui et in iuglande inveniri asserit, meliorem tamen declarat ex India apportatam.<sup>51</sup>

Cap. XXI. De *Agallocho* post Rumphii, Loureirii et Celsii labores multo certius iudicare possumus. Et primum quidem de nomine. Graecum nomen ἀγάλλοχον, cui respondet arabicum أغلاجين (*Agalladschin*), a priscis Ebraeis אהלית aut אהלית vocatur.<sup>52</sup> Primitivum autem nomen in arabicis appellationibus اللوة (*Allowat*) et اللية (*Allijath*) servatum esse videtur. Radix insuper لوى tortum id ac anfractuosum lignum signat. Ex ultima arabica voce *Allowat* Graeci ἀλόη<sup>53</sup> et ξυλαλόη<sup>54</sup> formarunt. Ceterum Arabes saepius id lignum etiam عود الهندى (*Ud alhendi*), aut عود (*Ud*) κατ' ἐξοχήν vocant.

Iam ad ipsam ligni indolem et generis definitionem. Noster lignum cum θυῖνω e *Thuia articulata* Vahl. propter γόγγρους, quibus scatet, comparat. Esse punctatum, odoratum, astringentem cum quadam amaritudine, cortice tunicato et subvariegato. Arabes multo uberiores sunt in variis *Agallochi* speciebus distinguendis: quae, ad locorum natalium nomina vocatae, nec nova indigent il-

45) Lib. 3, 130.

46) Hist. pl. 1, 2, 2, 1, 3, 3.

47) Hist. pl. 3, 7, 9, 18. 48) Theriac. v. 71. 895.

49) Hist. pl. 4, 6.

50) Hist. musc. t. 84. f. 10.

51) Ed. arab. p. 128.

52) Num. 24, 6. Psalm. 45, 9. Cant. 4, 14.

53) Io. 19, 39.

54) Salmas. Plin. exerc. p. 743.

lustratione, nec nostrae videntur aetatis mereri attentionem. Proinde, nusquam laureolam in mustaceo quaerens, omnia haec mitto, ut propius, quid sit agallochum, indicem. Est autem lignum gongrodes, i. e. morbo quodam natum, quo gemmae propaginesque reprimuntur, idque oritur, quod nostrates *Maserkröpfe*, Galli *Madreure*, Itali *Marezzi* vocant. Hac autem congestionem oleosarum resinosarumque partium in gongris fit, ut frustis his extractis arbor omnis pereat. Est vero *Aloëxylon Agallochon* Lour., arbor procera, quae per Indiam orientalem, Cochinchinam et insulas maris indici satis frequens, raro tamen gongros hos odoratos producit. Quanta solertia incolae insularum moluccanarum haec lignorum frusta odorentur, Rumphius refert.<sup>55</sup> Modo enim nasi ope investigant, modo noctu aut diluculo, putrescentium frustorum vestigia lucentia oculis sectantes, pretiosissimam materiem persequuntur.

Cap. XXII. Quid *Nascaphthon* aut *Narcaphthon* sit, ingenue fateor me nescire, quando et Iablonskius suam expositionem iterum abrogavit.<sup>56</sup> Credidi quidem olim, hoc *φλοιῶδες* fuisse appellationem *macis*, seu arilli nucis moschatae. Sed id quis probaverit?

Cap. XXIII. De *Cancam* ante hos triginta, et quod excurrit, annos uberrime disserui.<sup>57</sup> Neque ullam video rationem, cur sententiam ibi pronunciatam deseram. Cancamum est lacrima arabicae arboris, myrrhae quodammodo similis, sed virosi gustus. Quaenam arbor illa sit, plane nesciremus, nisi Rhazeus eam, *لك* (*lakh*) nominatam, ex arbore fluere diceret, quam cum *غبر* (*gubera*), *Sorbo domestica*, comparat, quaeque ad oram maris persici crescat.<sup>58</sup> Avicenna de *Lakh* eadem praedicat, quae de *قنقهام* (*Kankehar*), pro quo legendum est *قنقهام* (*Kankeham*) seu *κάνκαμον*, arabicae originis.<sup>59</sup>

55) Herb. amboin. 2. p. 50.

56) Opusc. I. p. 159.

57) Antiqu. bot. p. 80 — 88.

58) Rhaz. contin. 23, 701.

59) Ed. arab. p. 247.

Est autem in Arabia et Africa, quae Euronotum spectat, *Amyridis* species vulgaris, quam Forskoleus *Katataf* dixit, quae, Sorbo domesticae similis, quotannis, dum pluvia abundat, intumescere praegnansque dicitur evadere pulvere rubro fragranti, quo capita aspergere mulieres arabes consuescunt.<sup>60</sup> Lignum eius arboris in Aegyptum transfertur, quo vasá hydrophora fictilia eius fumo impraegnentur. Gummi eiusdem arboris alvum ducit, adeoque obesos emaciat et menstruum sanguinem prolicit.

Cap. XXIV. *De Cyphi.* Suffimenti huius e variis rebus compositi nomen aegyptium Iablonskius bene exposuit.<sup>61</sup> Damocrates iambis compositionem cyphi descripsit<sup>62</sup>, ut et Plutarchus.<sup>63</sup> Ideoque haud mediocrem acquisivit famam apud veteres.

Cap. XXV. *De Croco* nullus dubitationi locus, quid sit. Multo magis de natalium locorum praestantia ambigitur. Corycium noster primarium vocat, secundum lycium, e monte Olympo Lyciae, tertium, quem Aegae, oppidum Aeolidis, inter Pergamum et Magnesiam, proferat. Loco *Αιολίδος*, quod codd. vindob. habent, editiones omnes ponunt *τῆς Αἰτωλίας*. Qua regione cum nullum eius nominis oppidum notum sit, Saracenus iam suasit, *Αιολίδος* esse ponendum, de quo conferatur Wesselingius.<sup>64</sup> Cyrenaicum et siculum declarat debiliorem. De cyrenaico autem contrariam Theophrastus profert sententiam: odoratiorem enim esse cyrenaicum aliis docet, rationemque suo modo reddit.<sup>65</sup> Quod siculum attinet, haud me fugit, in editionibus legi: ὁ ἐκ Κενταρίας πάντων τῶν κατὰ τὴν Σικελίαν εὐσθενῆς κατὰ δύναμιν· λαχωνώδεις ὄντες πάντες· διὰ μέντοι τὸ πολύχυλον καὶ εὐχρουν οἱ ἐν τῇ Ἰταλίᾳ τὴν θυίαν βάπτοντες, τοῦτω χρῶνται. De centuripino croco locus quidem exstat apud Plinium<sup>66</sup>, quem transscripsisse senior quidam librarius videtur. Nam-

60) Forskol flor. arab. p. 80. 61) Opusc. p. 118.

62) Galen. de antidot. 2, p. 117. 65) De Iside p. 383.

64) Ad itineraria romana p. 145. 146.

65) Hist. pl. 6, 6. De caus. pl. 6, 17.

66) Lib. 21, 17.

que in vetustis codicibus nihil eiusmodi invenitur, nisi verba ea sola, quae equidem posui.

Cap. XXVII. *De Helenio*. Antiquitus nostrum helenium iam nomen suum habuisse, certum est. Nomen sortitam esse plantam e lacrimis Helenae, cum occisum ab haemorrhoidae Canobum defleret, fabulantur veteres.<sup>67</sup> Succum eius praedulcem laudat Plinius, unde et nectarium dictum, et cum rubo idaeo confertur.

Alterum vero helenium, aegyptium dictum, *Teucrium* videtur *Marum* esse, cum Cratevas et Dioscorides ita id describant, ut facilis sit coniectura. Folia cum lenticulae foliis comparantur: Plinius, commutata eorum indole cum foliis, serpylli foliis similia dicit, Apuleius amaraci, confuso helenio primo cum hoc. Haec est species, quae coronaria fuit.<sup>68</sup>

Cap. XXXIII. Sicyonium oleum manifesto docet D. nomen a Sicyone habere, cuius ager nobilissimae fertilitatis<sup>69</sup> olei admodum ferax est.<sup>70</sup> Posterius sicyonium conficere consuerunt e radicibus cucumeris sylvestris (σίικυς ἄγριος), cui et taedam pineam et foenum graecum addiderunt, ut et breviori tempore albidum redderent et fortius.<sup>71</sup>

Cap. XXXIV — XXXVI. Sordes balneorum, palaestrae et gymnasiorum, inter se manifesto differentes, eo magis peculiarem exigunt declarationem, quo magis aliena omnis eorum institutorum ratio est a nostris moribus. Siquidem in balneis vulgaribus camerae erant singulares, in quibus sudor detergebatur.<sup>72</sup> Fiebat id ope σκληγγίδος, seu cultelli incurvi, obtusi<sup>73</sup>, aurei, argentei vel eburnei, quem, sicut in thermarum ruinis a Traiano imperatore exstructarum inventus est, depingi curavit Mercurialis.<sup>74</sup>

67) Plin. 21, 23. Ptolem. Hephaest. apud Phot. c. 190. p. 149. Etymol. magn. 297.

68) Theophr. hist. 6, 1. 6., causs. 6, 11.

69) Liv. 27, 31.

70) Wheler it. p. 443.

71) Paull. Aegin. lib. 7. p. 293.

72) Galen. meth. med. 10, 10. p. 708. 709.

73) Galen. de fac. simpl. 10, 14. p. 283.

74) De arte gymnast. p. 20.



Itaque balneorum sordes nihil sunt, nisi sudor ipse humanus, a corpore derasus, cuius salsedinem manifestam cum obscuro amarore Galenus perhibet esse molliendi discutiendique vi praeditam.

Differunt autem omnino sordes e palaestris. Etenim, qui in palaestris luctum erant inituri, prius alipterium ingredientibus ungebantur, uncti autem ad conisterium seu locum, ubi pulvis erat, transeuntes, pulvere conspergebantur, sicque deinceps in varias exercitationes prodibant: quibus absolutis a reunctoribus et mediastinis iterum earumdem *στλεγγίδων* ope deradebantur. Earum autem sordium, e sudore, oleo pulvereque compositarum, usus erat medicus insignis. Atticis dicebantur *κονίσσαλος*, aliis *πάτος*.<sup>75</sup>

Mirari desinet, sordes eas foedas a veteribus remedium loco fuisse celebratas, qui meminerit, nec cogitari quicquam obscoeni aut immundi posse, quod Xenocrates saltem Aphrodisiensis repudiaverit. Namque et genituram virilem, quae post congressum e sinu muliebri effluit, contra perniones<sup>76</sup> et menses ipsos bibendos, et cerumen, et iecur humanum voranda praecepit. Infamia ea praecepta Galenus ita perhorrescit ac abominatur, ut Romanorum leges, ne quis carne humana vescatur, in censum vocet.

De sordibus gymnasiorum paullo difficilior est quaestio. Derasas eas esse a statu is noster testatur. Statuas autem et columnas in gymnasiis frequentes dicit Lucianus.<sup>77</sup> Quanam eae sordes fuerint, ex unico Theophrasti loco<sup>78</sup> coniicio. Statuas ibi sudare quandoque refert, maxime si e cedrina materia sculptae sint. Exsudans ille liquor oleaceo-resinosus, pulvere mixtus, quo aër gymnasiorum repletus esse debuit, medicas virtutes habuisse, quis est qui negarit?

Cap. XXXVII. *De Elaeomelite.* Est succus melleus,

<sup>75</sup>) Galen, de fac. simpl. l. c. Lucian. Anachars. p. 156. 188. ed. bipont.

<sup>76</sup>) Galen. l. c. p. 250.

<sup>77</sup>) L. c. p. 194.

<sup>78</sup>) Hist. pl. 5, 9.

neutiquam oleaceus, qui intra librum alburnumque trunci collectus, vel foratione trunci elicitur, vel, dum rumpitur cortex, effluit. Similem et nostrae arbores, dum finditur cortex, largiuntur; gummi exemplo, quod e cerasis annosis, cortice fisso, exsodat. Alvum eo succo duci, satis commune est omnibus substantiis melleis, etiamsi stuporem aut soporem inde natum exponere nequeam. Potiores certaturos praesumere ex eo cyathum unum Plinius refert.<sup>79</sup>

Additos fuisse, dum oleum olivarum pararetur, ramusculos oleagineos, non ex hoc solo comperimus loco, sed etiam e Galeno.<sup>80</sup> Is enim, ut oleum astringente vi omphacium aemuletur aut ὀμωτριβές, ramusculos addi testatur. Sic in Geoponicis suadetur, ut oleum hispano simile conficiatur, succum novellorum ramusculorum oleae admiscere, ut acrimoniam quamdam ac amaritudinem oleum obtineat.<sup>81</sup>

Cap. XXXVIII. *De oleo ricini.* Duos modos enumerat, quibus paretur; coctionem nimirum et expressionem. Uterque modus, nostra etiam aetate usitatus, sua habet detrimenta. Molita enim grana torculoque expressa turbidum largiuntur oleum, quoniam mucilago simul in olei mixtionem abit. Coctione autem dulcedo perit et oleum facilius rancidum evadit.<sup>82</sup> Quam ampla fuerit apud Aegyptios huius olei consumptio, etiam ad culices abigendos, refert Herodotus.<sup>83</sup>

Διαστροφαὶ τῆς ὑστέρας, *conversiones uteri*, complectuntur etiam perversum uteri situm, qui in graviditate contingit, ubi vel versus os sacrum fundus uteri promovetur, cervice sursum tracta; vel in vesicam provolvitur uteri fundus, cervice orificioque in intestinum rectum vergentibus. Ea vitia Hippocraticis iam nota, ab iis describuntur.<sup>84</sup>

79) Lib. 23, 50.

80) De fac. simpl. 6. p. 868. 869. Cf. et Meth. med. 12. p. 822.

81) Lib. 9. c. 26.

82) Murray apparat. med. 4. p. 204.

83) Lib. 2. c. 94. 95.

84) Hipp. de morb. mul. 1. p. 590. 597. Foës.

Cap. XXXIX. *De oleo amygdalino.* Cum hic primum ἡμιώριον, hora dimidia, occurrat, quaeritur, quonam modo diei partes antiqui metiri consueverint. Divisionem autem diei in duodecim partes, una cum gnomone et poli situ, didicisse Graecos a Babyloniiis, testatur Herodotus.<sup>85</sup> Eam artem, umbris solis metiri diei partes seu horas, Anaximenen Milesium perfecisse, auctor est Plinius<sup>86</sup>, quem morem solis cursum indagandi suo tempore suetum declarat Xenophon.<sup>87</sup> Ea horologia bello panico primo ad Romanos pervenisse Varro testatus erat.<sup>88</sup> Serenis tantum diebus eae horae certae erant: nubilo metiri tempus ope clepsydrae aut horologii hydraulici docuit a. u. c. 595 (ante Chr. 159) Scipio Nasica, collega consulis Laenatis. Inventam eam machinam fuisse a Ctesibio Alexandrino, Ptolemaeo Evergeta Aegyptum regnante, Vitruvius tradit.<sup>89</sup> Cum tamen vulgatus huius machinae usus fieri non posset, Graeci Romanique aequales fere nostris horas solo aequinoctio habuerunt: eo breviores diurnae fiebant per brumam, quo longiores nocturnae: per aestatem contra eo longiores diurnae, quo breviores nocturnae. Namque duodecim partes (μέρη, σημεῖα) et diei et noctis numerabantur, sive longiores fuerint dies noctesque, sive breviores. Quodsi vero simpliciter horae nuncupantur, intelliguntur aequinoctiales, quae igitur nostris fere aequales sunt.

Cap. XLVII. *Μετασυγκρίνειν* est vox methodicis usitata, qua medendi ratio signatur, e *θεραπεία φιλοπαράβολω* Asclepiadis orta.<sup>90</sup> Qui enim corpora statuebant esse *συγκρίματα τῶν ὄγκων*, seu molecularum, ii etiam morborum causam quaerebant in laesa molecularum ad poros seu spatiola ratione, quam restituere vel *μεθοδικῶς*, *στεγνώσει* vel *χαλάσει* studebant, vel *φιλοπαράβολως* acria quaevis atque incitantia ad restituendam eam rationem adhibebant. Haec vero methodus dicebatur *μετασύγ-*

85) Lib. 2. c. 109.

86) Lib. 2, 78.

87) Memor. 4, 3.

88) Apud Plin. 7, 60.

89) Archit. 9, 9.

90) Cael. avel. acut. 1, 15. 3, 8.

κρίσις aut μεταποροποίησης<sup>91</sup>: qua omnino, si vires labascunt in morbis acutis, maxime vero in diuturnis, et nostra aetate boni utuntur medici, dum arnicam et phosphorum, hydrargyri et stibii praeparata, tincturam cantharidum et argentum nitricum propinant.

Cap. LI. Oleum mastichinum optimum in insula Chio parabatur, quoniam laudatissima a priscis inde temporibus chia fuit mastiche.<sup>92</sup> Galenus e sola chia, candida ea, oleum parari, ex aegyptia vero, quae nigricans, neutiquam, asseverat.<sup>93</sup> Nostra etiam aetate, licet Pistacia Lentiscus per omnem orientem crescat, e Chio insula tamen mastichen nobilissimam ipsi Arabes petunt.<sup>94</sup>

Cap. LII. Cum μύρων admodum multiplex esset apud Graecos usus, variae etiam praedicabantur compositiones, quibus duo potissimum genera exstiterunt: στακτά vel ψακαστά, fluida et stillatitia, aut παχέα, spissa, quae variis vegetabilibus σύφουσι in eam molem redigebantur.<sup>95</sup> Videntur autem molem unguentorum spissiore praetulisse, ut melius conservarentur: cui fini et sales apti erant, quos frequenter adiicit noster. Στύμματα ea seu spissamenta xylobalsamum praeprimis, schoenanthum et calamum aromaticum comprehendebant. Odorem suum fere amittebant, ut unguentum et spissius et aptius redderent ad recipiendum primarium odorem.<sup>96</sup> Plerumque addebantur ἡδύσματα ad acuendam fragrantiam, in quibus militabant nardorum species, myrrha, costus et alia. Nonnunquam et εἰς χρωματισμόν, coloris gratia, crocus aut anchusa, cinnabaris etiam, assumebantur.

Cap. LIII. Ut unguentum rosaceum paretur, rosarum numero mille ad viginti libras olei sumuntur. Hinc, quod iam Saracenus observat, ῥόδων ἀριθμῷ χιλίων πέτα-

91) Galen. de facult. simpl. 5. p. 783. meth. med. 4. p. 270.

92) Plin. 12, 36.

93) De fac. simpl. 7. p. 69.

94) Niebuhr Besch. von Arab. p. 144. Tournef. it. p. 144.

95) Athen. deipnos. 2. p. 46. 48. ed. Schweigh. Romanis mulieribus opulenti gratissima erant unguenta foliata (e malabathro) et spicata (e nardo). Galen. de sanit. tuend. 6. p. 440.

96) Theophr. de odor. p. 738. 739.



λα legendum, Nam mille rosarum petala haud sufficiunt.

Cap. LIV. Quamvis ἐλάτη vulgo Pinum Piceam denotet, signat tamen et σπάθην seu involucrium spadicis palmarum, quod corticem Plinius vocat. Ἐλάτην ligneam (coriaceam potius) nuncupat Theophrastus, qua propter fragrantiam utantur ad unguenta conficienda.<sup>97</sup> Ἐκ σπάθης δένδρου parari unguentum, Paullus Aegineta monet.<sup>98</sup>

Cap. LXII. Susinum unguentum nomen habere a liliorum appellatione semitica ליל, Arab. يسوس, quae etiamnum superest in hispan. *Azucena*, certum est. Inde et in Palaestina, liliorum feracissima, et in Phoenice optimum conficiebatur id unguentum, et Phoenices, templum Salomonis aedificantes, capita columnarum aut coronas ad liliorum formam (לילית לילית) sculpebant.<sup>99</sup> Hinc et Stephanus Byzantinus et Eustathius<sup>100</sup> Susam, Persidis metropolin, appellatam esse a liliorum copia ibi crescentium referunt.

Susini confectionem paullo aliter, et clarius quidem, describit Paullus.<sup>1</sup> Laudabili vero solertia veteres unguenta talia paraturos iusserunt, ut paullatim tantum flores odoratos adicerent, quoniam, si semel ac simul omnis eorum copia iniiceretur, nec debito modo extrahi e singulis floribus odorifera substantia, nec arceri a superstitionibus floribus putredo posset aut foetor.

Cap. LXIV. Butyrinum, styracinum et onychinum unguentum difficultatis non nihil habent. Affinia crocino ea esse et confectione et efficacia, auctor perhibet. Butyrinum dictum fuisse a butyro, quod olei loco sumeretur, Marcellus Vergilius statuit; neque ab assensu alienum me esse fateor, nisi quod repugnet, sumtam fuisse appellationem a vehiculo potius, quam, ut ubique fit, a substantia principali. Styracem sumtum fuisse loco myrrhae,

97) Theophr. l. c. p. 742. 98) Lib. 7. p. 296.

99) 1 Reg. 7, 19. 22. 100) Ad Dionys. v. 1073.

1) L. c. p. 297.

probabile est. "Ὀνυχα ἀρωματίζοντα ingressum esse onychinum unguentum, nequaquam dubito, etiamsi sciam, et Cornarum et Fuchsium aliud quid hic loci intellectum existimasse. Cum nempe bdellium ipse D. εἰκοδὸς ὄνυχα vocet, cum Damocrates βδέλλην, ὄνυχα τε iungat<sup>2</sup>, rati sunt docti viri, et ὀνύχινον unguentum potius a βδέλλιο nomen gerere, quam ab onyche odorato. In eo autem assensum mereri nequaquam videntur.

Cap. LXV. Cyprini unguenti confectio e Cypro, i.e. *Lawsonia alba* Lam., a Theophrasto ita docetur, ut cardamomum aspalathumque prius odorato vino macerari, mature autem cyprum eximi et exprimi iubeat, ne foetere incipiat et putrescere.<sup>3</sup> Haud puto, cum Cornaro loco ἐλαίου λίτρας θ' esse ἐλαίου legendum: et primum quidem, quia nulla nos cogit librorum scriptorum auctoritas: dein, quod compositio Posidonii, repetita a Paulo<sup>4</sup>, praeter helenium etiam cyprri flores, iridem, salviam, maioranam etc. continet, et longe alio modo paratur. Accedit, cum pondera calami, aspalathi, myrrhae et cardamomi praecipiantur, olei etiam copiam necessario indicari debere. Initio autem generatim docebatur, quale oleum et quomodo praeparatum sumendum sit.

Cap. LXVIII. Amaracinum unguentum in Cyzico probatissimum fieri, D. testatur. Galenus vero<sup>5</sup>, qui et amaracum in Cyzico crescentem vidit, et quomodo a maro differat, observavit, sua aetate asserit ad id unguentum solum adhibitum fuisse marum. Hortatus est ipse eius unguenti confectores, tantum amaraci iniicerent, quantum mari. Quo facto unguentum minus odoratum deprehendit. Sic Theophrastus confici id ex optimis aromaticis docet, praeter amaracum. Hoc enim odoramento nihil unquam seplasiarios in unguentis uti, sed falsam esse appellationem (a maro repetendam.)<sup>6</sup>

De oleo petrae seu petroleo est additamentum manifesto spurium, hoc loco ineptum, atque a vero admodum

2) Galen. de compos. med. sec. loc. 8. p. 226.

3) De odor. p. 740. 741.

4) Lib. 2. p. 298. 299.

5) De antidot. 1. p. 53.

6) De odor. p. 742. 743.

aberrans. Etenim quis dixerit teterrimum petrolei odorem bonum? (ἐνῶδες μετὰ τινος βαρύτητος).

Cap. LXIX. *De Megalio*. Theophrastus praeprimis conferendus, qui megalion esse unguentum confectu operosum et pretiosum testatur. E resina usta componi, quae oleo per decem dies totidemque noctes adiiciatur: tum etiam myrrham, cassiam, cinnamomum et oleum balaninum.<sup>7</sup> Nomen deducitur a Megalo Syracusio, qui id invenerit.<sup>8</sup> A gloria, seu a virium magnitudine id nomen proficisci, Plinius autumat.<sup>9</sup>

Cap. LXX. Ἡδύχρον in Co insula parari ex iisdem rebus, quibus amaracinum constet, noster testatur. Hinc et Apollonius Herophileus<sup>10</sup> et Plinius<sup>11</sup> amaracinum componi in Co insula referunt. Hoc est, quod incendi vult Cicero, ut exhilaret aegrum.<sup>12</sup>

Cap. LXXI. Μετώπιον cur sit aegyptiae originis, prorsus non video. Nomen a Graecis, Aegyptum inferiorem ex Amasis aetate habitantibus, adeptum esse videtur, quia fronti (τῷ μετώπῳ) illineretur. Quod autem fieri solet in coloniis, patriam linguam dediscentibus aut deformantibus, id etiam accidisse in Aegypto graecanica videtur. Unde et μετώπιον in νέτωπον, quin in ipsum νίωπον mutarunt. Cuius lectionis vitiatae plurima exstant vestigia in Hippocraticorum scriptis, Alexandriae degentium. Erotianus asserit, νίωπον esse amygdalarum amararum, quae id unguentum ingrederentur, cognomen, cuius appellationis nullum apud veteres obvium est vestigium.<sup>13</sup> Νέτωπον autem idem esse cum μετωπίῳ, Hesychius affirmat.

Cap. LXXII. Mendesium unguentum nomen habet

7) L. c.

8) Hellad. apud Phot. cod. 279. p. 532. Sed μεταλεῖον scribit, quod falsum esse exploratum habeo, sicut et in Hesychio μεταλλεῖον. Athen. 15, 12. Iul. Poll. 6, 19. Galen. de compos. med. sec. loc. 2. p. 570.

9) Plin. 13, 2.

10) L. c. 11) L. c.

12) Tusc. quaest. 3, 19. Vulgo *hedrychum*. Cf. Galen. de antid. 1. p. 51.

13) Erotian. p. 260. ed. Franz.

a Mendete, Sebennyticae praefecturae oppido<sup>14</sup>, ubi praestantissimum illud unguentum parabatur.<sup>15</sup> Mendes autem oppidum nomen habuit a Mendete, qui deum Pana apud Aegyptios referebat.<sup>16</sup>

Cap. LXXIII. De Stacte iam Theophrastus<sup>17</sup>, esse eam myrrham stillatitiam. Alio autem loco duplicem eius originem aperit, alteram naturalem, quae sponte ex arbore stillet, (διὰ τὸ κατὰ μικρὸν στάζειν,) alteram artificialem. Concisa enim myrrha in balanino oleo liquescente, affusaque aqua fervida, myrrham solidam fundum petere, quam prelo expressam largiri stactem.<sup>18</sup> Primam solam speciem spontaneam agnoscit Plinius.<sup>19</sup> Haec est στακτή, quae מור עבר (Myrrha stillatitia) in Cantico Salomonis dicitur.<sup>20</sup> עבר autem stillatitiam designare, vel inde patet, quod in Periplo maris erythraei σμύρνα ἐκλεκτή καὶ στακτή (ἀβείρ) μίναια dicatur. Est et arabica vox عبر, lacrimare. Neque alia est מור דרורי<sup>21</sup>: לר enim Arabes utuntur ad pluviae, lactis, aquae effusionem significandam.

Cap. LXXVI. Ἰασμή est یاسمین Arabum, *Jasminum*, floribus odoratissimis, quod ab Aëtio perperam pro viola alba habetur.

Cap. LXXVII. De Myrrha ipsa multa dubia, etiam post duodeviginti saecula, supersunt. Et primum quidem ipsam arborem myrrhiferam nemo scientius indagavit; licet Petr. Belonius prope Ramam Palaestinae inveniit fruticem, „caudice contorto, denso, horrentibus spinis obsito, foliis acaciae, sed maioribus,“ quem suspicabatur myrrhiferam arborem esse.<sup>22</sup> Belonii plantam

14) Strabo lib. 16. p. 540.

15) Plin. 13, 2.

16) Jablonsky opusc. 1. p. 138. Paull. Aeg. 7. p. 291. Τὸ μενδήσιον εἰρηται διὰ τὸ ἐν Αἰγύπτῳ εὐρησθαι, ἐνθα καὶ ὁ Μένδης γέγερται.

17) Hist. pl. 9, 4. 18) De odor. p. 742.

19) Lib. 12. s. 35. lib. 13. s. 2.

20) Cant. 5, 5.

: ירי גמפני-מור ואצבעתי מור עבר על פסות חמפני:

21) Exod. 30, 23. 22) Obs. 2, 80. p. 159.



Sieberius nuper prope Joppen invenisse videtur, *Mimosam agrestem* nuncupans, quae tamen potius *Prosopis* species est. Sed nihil innotescit de myrrha ex hoc frutice manante. Brucius, cum Abyssiniam obiret, e regione myrrhifera ramusculos solos accepit, Mimosae aut Acaciae, quam *Sessa* appellavit; sed gummi producere testatur, a myrrha longe diversum.<sup>23</sup>

Descriptio myrrhiferae arboris apud veteres satis varia est. Theophrastus e mercatorum sinum Arabicum navigantium testimonio fruticem esse humilem tradit, trunco duro, per terram strato, crasso, folio *Andrachnes* laevi. Alios avtoptas citat, qui spinosum fruticem viderint in montibus arabicis prope Heroum portum, foliis ulmi, sed crispis, apice mucronatis, ut folia ilicis.<sup>24</sup> Lentisci foliis similia tradit Evemerus folia myrrhiferae arboris, ceterum, ut Diosc., cum Acacia vera (*ἀκάνθη αἰγυπτιακή*) comparat: sed confudisse cum libanoto videtur.<sup>25</sup> Plinius magnopere differt: modo enim Theophrasti definitionem repetit, exceptis tamen foliis, quae olivae similia dicit [*ἐλαία* legens, loco *πελέα*]. Iubam contulisse folium cum folio olusatris. Aliquos similem fruticem iunipero, scabriorem tantum spinisque horridum, folio rotundiore, sed sapore iuniperi, tradidisse. Nec non fuisse, qui e turis arbore utrumque nasci mentiti sint.<sup>26</sup> E quibus omnibus rite collatis effeci olim, *Amyridem Kafal* Forsk. esse arborem myrrhiferam. Similimam autem utramque speciem, et forte eandem esse, Forskoleus refert. Ramos spinescere, folia esse subrotunda, serrata. Dici autem arborem myrrhiferam huic assimilen.<sup>27</sup>

*Γαβιρέαν* dici pinguissimam myrrham, solo laeto proveniente, quae multam quoque stacten sudet, exponere ausim ex arabico *جابر*, *praepotens*, quia princeps et palmaria species. Troglodyticam appellari a Troglo-

23) Iter german. vol. 5. p. 39. t. 4. 5.

24) Hist. plant. 9, 41.

25) Diod. 5, 41.

26) Lib. 12, 34.

27) Flor. aeg. arab. p. 80.

dytarum regione, in Africae litore Arabiae adverso, nullum est dubium.<sup>28 a</sup> Quin etiam sic nominant Damocrates<sup>28 b</sup> et Galenus<sup>29</sup>, quanquam Salmasius legi debere *τρογλίτιν* perhibeat.<sup>30</sup> *Καυκαλὶς* exoleta myrrhae species dicta mihi esse videtur, quod *κάτοπτος* s. *κεκαυμένη* videretur. Aminaeam etiam improbari, auctor noster asseverat, cum contra Plinius minaeam troglodyticae soli postponat.<sup>31</sup> Et Galenus *τὴν τρογλοδύτιν ὀνομάζεσθαι μιναιάν, ἀπὸ χωρίου, καθ' ὃ γεννᾶσθαι φασὶ τὴν καλλίστην*.<sup>32</sup> Eas contrarias autem opiniones aequare aut dirimere meum haud est. Persuasum habeo, *ἀμινάαν* scriptum esse *σμίρναν* vel ab ipso D., vel ab librariis, quia *ἀμινάως οἶνος* multo notior erat, quam *μιναία σμίρνα*. Minaeos autem oras habitasse sinus arabici, quae eorum spectant, praeter Plinium Ptolemaeus testatur.<sup>33</sup>

Ceterum myrrham dici *βάλ* ab Aegyptiis, Plutarchus tradidit<sup>34</sup>, quod mutandum esse in *σάλ*, hodiernum copticum, monet Jablonskius.<sup>35</sup>

Cap. LXXVIII. *De boeotica myrrha* ambigi fere nequit, quando Theophrastus *ἵπποσέλινον* dicit lacrimam fundere myrrhae similem, nonnullos etiam omnino myrrham vocare.<sup>36</sup> Cum *ἵπποσέλινον* autem nostrum *Smyrnium Olusatrum* sit, ad hoc referenda est myrrha boeotica. Galenus *ὀλούσατρον* Romanorum ab *ἵπποσέλινῳ* distinguens, illud et crudum comedi, hoc vero nonnisi coctum posse.<sup>37</sup> In quo quidem *Sium latifolium* cum *ἵπποσέλινῳ* commutasse videtur, namque et huius folia ab Italis, nomine *Crescione*, cocta comeduntur.<sup>38</sup>

Cap. LXXIX. *Styrax* arbor, quae per omnem Graeciam, Asiam minorem Syriamque satis frequens est, mala cydoniae omnino similia habet folia. Optima haec lacri-

28 a) Plin. 6, 34, 12, 35. 28 b) Galen. de antid. 2. p. 115.

29) L. c. lib. 1. p. 68.

30) Plin. exercit. p. 895. *Τρογλίτιν* scribi a recentioribus graecis, bene monet Needhamius ad Geopon. 7, 36.

31) Lib. 12, 35. 32) L. c.

33) Lib. 6. c. 7. 34) De Is. et Osir. p. 383.

35) Opusc. 1. p. 49. 36) Hist. pl. 7, 6.

37) De fac. alim. 2. p. 658. 38) Caesalp. de plant. 7, 59.

ma e Gabale, oppido Syriae ad orientem Antiochiae, venit.<sup>39</sup> Secundus fama styrax erat, qui e Pisidia, regione inter Phrygiam et Ciliciam media, evehebatur. Tum vero et cilicius commendabatur. Et nostra etiamnum aetate styrax ex Asia minore Syriaque advehitur.

Cap. LXXX. Bdellium esse lacrimam arboris arabicae, loco saracenicae, posui, Marcello iam monente et testantibus Plinio, Galeno et Oribasio. Posset tamen lectio vulgaris *σαρακηνικοῦ* facilius mutari in *χαρακηνικοῦ*. Charak enim, oppidum persici sinus intimum, quo Arabia eudaemon cognominata excurrit, inter Tigrin et Eulaeum, conditum ab Alexandro M., Characeni regioni, quae ad Elymaida pertinebat, appellationem dedit, ipsa etiam natione Characena vocata.<sup>40</sup> Itaque characenica potuit a Dioscoride dici haec substantia, quae aliis arabica vocabatur.

Avicenna disertis verbis<sup>41</sup> مقل, quod bdellium est, dividit in judaeum, quod et siculum sit, et arabicum, quod e Mechha exportetur. Hoc provenire e palmae specie, quae arbor Dûm (دم) lego loco (دم) dicatur. Kaempferus egregiam reliquit notionem huc pertinentem, licet ipse arborem non viderit. Bdellium, quod مقل أزراق (*Mokl asrâk*), esse succum inspissatum, pellucidum, rufescentem e fructuum palmae foliis flabelliformibus coctum. Crescere eam palmam ad utramque sinus persici oram.<sup>42</sup> Herbertus de Jager, cuius studia palmis dicata Rumphius celebrat, quique ipse arbores bdelliferas observarat, Kaempfero testificatus est, *Borassum* esse *flabelliformem*, e cuius quidem fructibus in insulis Moluccis succus dulcis ac edulis coquitur inque solidas tabulas inspissatur. At vero bdellium alio modo, ex immaturis fructibus, additis suaveolentibus floribus, paratur, ut amaricans fiat et fragrans.

Priscis Ebraeis מִלְחָה dicebatur: produci in regione

39) Plin. 12, 56. 40) Plin. 6, 51.

41) Ed. arab. p. 206.

42) Amoen. exot. p. 668.

Chavilah (Arabia felice).<sup>43</sup> Manna deserti speciem praebebat bdellii propter pelluciditatem ac colorem.<sup>44</sup> E בִּדְלִי, commutato ב cum נ, μάδελκον, pro quo Plinius habet maldacon. Βόλχον e βδόλχον fictum esse, quod etiam cum בִּדְלִי congruit, probabile est.

Alterum bdellium, sordidum ac nigrum, ἄδρόβωλον καὶ παλαθῶδες, quod ex India advehatur, facile cum Harduino<sup>45</sup> crediderim, Benzoën esse. Ea enim est species, quam Plinius bactrianam vocat, quia Bactri ex India, via celebratissima<sup>46</sup>, merces indicas apportabant, et, ne per alias gentes, Arabas praeprimis, quaestum perderent, apud se gigni eiusmodi pretiosas res, mentiebantur. Non dubito, aliud fuisse Galeni bdellium scythicum, quo ad curandum scirrhum tumorem utebatur.<sup>47</sup> Scytharum enim nomen est adeo vagum, ut et Sacae et Massagetae et Bactri et Sogdiani eo comprehenderentur.<sup>48</sup> Scythia, quam Ptolemaeus extra Imaum vocat, ad Emodos usque montes procedit, totamque tibetanam regionem complectitur.

Arborem, quae largiatur bdellium illud nigrum, ipse Plinius describit. Esse nigram, magnitudine oleae, folio roboris, fructu caprifici naturaque. Si nostra est benzoë bdellium illud alterum, credibile non est, arborem illam a mercatoribus visam fuisse. Crescit enim in Sumatra et peninsula indica ultra Gangem.<sup>49</sup> Descripta est arbor et iconibus delineata a Martino Houttuyn<sup>50</sup> et Jona Dryandro<sup>51</sup>, qui *Styracis* speciem esse docuit. Neque folia integerrima subtus tomentosa cum roboris foliis, neque fructus (drupa) cum ficubus comparando. Περσικόν dici id bdellium quibusdam, Plinius refert, quia ἐκ περσίων γῆς, extremis orbis terrarum partibus, exportetur.

43) Genes. 2, 15.

44) Num. 11, 7.

45) Ad Plin. 12, 19.

46) Strab. 11. p. 493. lib. 16, p. 176.

47) Therap. ad Glauc. lib. 2. p. 106.

48) Herod. 7, 64. Οἱ γὰρ Πέρσαι πάντας τοὺς Σκύθας καλεοῦσι Σάκας.

49) Garc. ab Ort. in Clus. exot. p. 155. 156.

50) Act. harlem. tom. 21. p. 257.

51) Philos. transact. vol. 77. p. 507.



Cap. LXXXI. *De ture* plura dici par est, ut principali in veterum suffimentis. Antiquitus autem duplex fuit: *arabicum*, album, a guttis nomen habens (σταγονίας) et *indicum*, rutilum aut subfulvum. Primitivum vero nomen לבان esse arabicae civitatis, quae tus producat, testatur Abu'l fadli.<sup>52</sup> Sic transiit ad Ebraeos, qui לבונה in priscis voluminibus praedicant, tametsi derivatio a לבן, *albescere*, haud inepta sit. Fuisse autem apud Ebraeos arabicae originis, patet.<sup>53</sup> Neque desunt in arabica lingua similes vocis, ac in ebraica, affinitates: لبن *lac et lacrima arboris*, لبني *arbor lac emittens*. Aliud est nomen turis arabicum satis vulgare: كندر, quod, cum a كدر, *turbidum esse*, derivari possit, indicam potius turis speciem designasse videtur. Sed et indicum turis nomen ipsum *Cundur* est.<sup>54</sup>

Nec arboris ipsius quae sit facies, certo apud veteres constitit. Namque consulto mercatores pestiferum esse regionis aërem adituque difficillimam terram fabulabantur, ne lucrum cum exteris partirentur.<sup>55</sup> Proinde, qui primus relationes navigatorum collegit, Theophrastus, adeo diversa enuntiavit, ut uniri fere nequeant. Protinus enim arborem esse quinque cubitos altam, folia pyri sylvestris similia, sed haud adeo herbacea, verum cum rutae foliis, quoad colorem, conferenda; corticem arboris esse laevem, ut lauri. Aliorum testimonio arbor turifera dicebatur lentisco similis, neque fructus ii similitudini contrarius: hi etiam albidius e iunioribus, fulvum tus e vetustioribus manare arboribus asseruerunt. Non defuerunt, qui cum terebintho compararent, cum ipsa ligna ad Antigonus veherent; sed eosdem graviter lapsos fuisse, cum ex eadem arbore et tus et myrrham retulerint. Tandem et in luco quodam prope Sardes fuisse arborem, quae turifera dicta sit, lauro perquam similis.

52) Apud Cels. hierob. 1. p. 231.

53) Ies. 60, 6. Ierem. 6, 20.

54) Fleming in Asiat. research. 11. p. 158.

55) Arrian. peripl. mar. eryth. p. 158.

Id quidem opinionum dissidium augescit etiamnum, si Evemeri, cuius mendacia in omni antiquitate percrebuerant, relationes conferimus. Is enim<sup>56</sup> arborem turiferam cum acacia aegyptia comparans, salignum tamen folium ei tribuit. Et ipse Plinius testatur<sup>57a</sup>, quanquam Romani res in Arabia gesserint, legatos etiam miserint, nihil tamen exploratum de facie arboris habere. Iubam regem scripsisse, arborem esse contorti caudicis, ramis aceris maxime pontici, succum amygdalae modo emittere; talesque in Carmania apparere, et in Aegypto satas studio Ptolemaeorum regnantium.

Iam de patria ipsa praeciendum est. Antiquissima autem Ebraeorum monumenta patrocinantur Sabaeorum regioni.<sup>57b</sup> Omnis nimirum, australis ora Arabiae adeo ferax fuisse turis dicitur, ut adnavigantes „plurima naribus tura duxisse“ dicantur.<sup>58</sup> Cattabaniam privatim vocat Eratosthenes provinciam Arabiae, turis proventu celebrem.<sup>59</sup> Cattabenos vocat Ptolemaeus, aditui ad sinum persicum proximos<sup>60</sup>, promontorii ergo, Syagri dicti, accolae<sup>61</sup>, unde syagrium tus Dioscoridis appellationem accepit. Vocatur id promontorium hodie رأس الحد (Râs el Had). Cattabaniam provinciam *Katibawar* Theophrastus nuncupat.<sup>62</sup>

Sequitur provincia Adramytta Theophrasto, תַּדְרַמְיִת Mosi<sup>63</sup>, حضرموت (Hadramaut) Arabibus dicta, quae et hodie turis, sed vilioris, copiam producit.<sup>64</sup> Oppidum huius provinciae est مرباط (Merbât), Avicennae dictum, unde et hodie tus exportatur.<sup>65</sup> Optimum e Daffar, sed e portu etiam Keschîn, (sachalítico veterum) evehitur.<sup>66</sup> Haec regio in periplo maris erythraei ob turis divitias celebratur.<sup>67</sup> Mqscha, quod idem auctor no-

56) Diod. Sic 5, 41. 57a) Lib. 12, 31.

57b) Ies. 60, 6. Ierem. 6, 20.

58) Diodor. 3, 46. 59) Strabo 16, p. 593.

60) Lib. 6, 7. 61) Plin. 6, 33.

62) Hist. pl. 9, 4. 63) Genes. 10, 26.

64) Niebuhr Besch. von Arab. p. 284.

65) Niebuhr l. c. p. 287. 66) Ibid.

67) Peripl. maris eryth. p. 16.

minat, sine dubio est Moscate ad sinum persicum.<sup>68</sup> *Μαμάλη*, quod Theophrastus ture celebre vocat, *Μάμαλα κώμη* Ptolemaei esse videtur, quae ad oram maris rubri, in regione Cassanitarum (*Κασανδρείς* Agatharchidis) sita erat.

Mercaturam turis antiquitus praeter Phoenices et Midianitae et Gerrhaei faciebant. Gerrha autem oppidum Plinio dicitur<sup>69</sup>, et gerrhaeum ipsum tus Nicandro.<sup>70</sup>

Nec tura orae utriusque sinus persici, ad extimum angulum usque, aut insularum eius, spernebantur. Erant enim insulae Tylos et Arados in persico sinu, quas Evesmerus Panchaiae nomine comprehenderat<sup>71</sup>, quaeque hodie Baharein et Eschr dicuntur, adeo celebres turis proventu, ut et Virgilius panchaia tura laudaverit.<sup>72</sup> Ibidem autem ineunte saec. XIV. Marcus Paulus, peregrinator immortalis, arbores invenit populis similes, quae tus exsudabant.<sup>73</sup> In ipsa Carmaniae ora Chardinus easdem invenit arbores.<sup>74</sup>

Nec africanae sinus persici orae deest sua gloria. *Λιβανωτοφόραν* hanc regionem Strabo tradit a Pytholai promontorio ad *τελευταῖον ἀκρωτήριο* extendi<sup>75</sup>: ultimum promontorium Guardafui recentioribus dicitur. Ex hac etiam ora tus afrum venire, Brugius testatur.<sup>76</sup> Cum igitur et ex India et e Persidis oris et ex insulis sinus persici et ex ipso Africae litore tura exportarentur, Agatharchides etiam iure suo contendit, Sabaeos ea ex ulterioribus maris advehere.<sup>77</sup>

Tandem arboris, quae indicum tus largitur, indolem et loca natalia egregie aperuit Colebrookius<sup>78</sup>; definiente simul Roxburghio systematicum nomen, bonisque iconibus

68) Niebuhr l. c. p. 297.

69) Lib. 6, 53. 70) Alexiph. v. 107.

71) Diod. 5, 42. 72) Georg. 2, 139.

73) M. Polo in Ramusii coll. 2. f. 59. a. Ed. Marsden, p. 723.

74) Voy. en Perse, 4. p. 28. 75) Lib. 16. p. 417.

76) Iter germ. 5. p. 43.

77) Geogr. min. ed. Hudson, 1. p. 64.

78) Asiat. research. 9. p. 377.

arborem illustrante.<sup>79</sup> Est vero *Boswellia turifera* Roxb., Terebintheis annumeranda. An vero et arabicum tus ex eadem arbore fluat, dubium est. Quem Adansonius 1750 ad Bernardum Iussievum misit rāmum arboris turiferae e Senegambia, eum Lamarckius suspicatus est ad Amyridem Kafal Forsk. pertinere.<sup>80</sup> Cuius cum folia ternata, foliola obovata, apice subserrata, subtus sint tomentosa, posset quidem firmari, quicquid mercatores Theophrasto retulerunt, arborem nimirum pyri habere folia. Attamen nihil Forskoleus de ture ex hac arbore stillante comperit.

In secundi turis nomine emendando haud diu haesi, quando et Aldina ἐν σμίλῳ habet, et Salmasius simile adiectivum, quod vero nusquam occurrit, fingere debere sibi visus est. Quid κοπίσκος sibi velit, ingenue fateor, me certo non scire, licet, si σμίλευτος dictus fuit λίβανος, a σμίλῃ, qua scalpebatur, potuit etiam κοπίς, culter, huic voci originem dare, aut forte cum Marcello Vergilio sentiendum, quod spuria indoles sive deterior huius turis eo verbo indicetur, a κοπίζειν, mentiri? Magis placet Bodaei expositio: κοπίσκον dici tus, quia in secunda mensa adhibebatur<sup>81</sup>, κοπίς autem ab Hesychio δαῖπνον dicitur, uti et Lacedaemonii sic coenam vocarant.<sup>82</sup>

Ἀρωμίτην dici τὸν λίβανον πρωτεύοντα, non mirum est, quoniam ἄρωμον vocabatur quodvis aroma purum et non vitiatum, Hesychius etiam λίβανωτόν et ἄρωμον iungit tanquam synonyma. Ἀρόην denique appellabatur λίβανος πρωτεύων, vel propter vim masculam fortiolemve, vel, ut Plinius vult, ob similitudinem frustorum cum testibus.

Cum adulterari tus dicat auctor resina pini, imponere aliquis etiam Linnaeo potuit, ut *Iuniperum hispanicum* Lam. pro turifera arbore haberet, eamque vocaret turiferam. Sed nemo unquam vel ex hac specie vel ex alia, *phoenicea* et *lycia* Linnaeo dicta, quae per Europam au-

79) Asiat. research. 1. c. et Plant. corom. 5. t. 507.

80) Encycl. bot. 2. p. 626. 81) Athen. 14, 4.

82) Bod. in Theophr. p. 931.



stralem Asiamque mediam crescit, verum tus prolicuit, neque ullum exstat testimonium, ex Hispania tus venire aut ex Europa australi.<sup>83a</sup>

Adiungo, quae loco difficillimo expediendo idonea videntur. Haustum tus in secunda valetudine (in agone *cod. vindob.*) furorem inducere, et largius cum vino potum etiam interficere. Praestantium codicum lectionem praetulissem, si ulla adesset veri similitudo eius effectus. Sed videor mihi odorari, quatenam traditio subsit. Agatharchides enim, qui, dum Ptolemaeorum dominatio ad finem vergeret, geographica scripsit, quorum fragmenta a Photio servata ad nos pervenerunt, Sabacos narrat a continuo fortique turis odore adeo laedi, ut sensus obtundantur atque εἰς ἔκλυσιν ἐσχάτην incidant, hinc asphalto et τράγου πώγωνι solere temperare eam nimiam fragrantiam.<sup>83b</sup>

Cap. LXXXII. LXXXIII. Sicut cortex turis ipsius arboris est, hoc aromate scatentis, ita et manna seu γῦρις (pollen) nil est nisi pulvis e contuso tritove ture natus, qui ideo iisdem pollere debebat viribus, ac ipsum tus.

Cap. LXXXVI. LXXXVII. *Πίνυς* est *Pinus Pineae* L., quae in conis fructus fert edules, amygdalis assimiles, *πιτυίδας*, quos vulgus italicum *pinocchi* aut *pignoli* vocat. Arabes hanc nucem eodem, quo avellanam, nomine insigniunt جوز: esse autem fructum الصنوبر الكبير, pinus maioris, Avicenna docet.<sup>84</sup> Recentiores Graeci κουκουναριά arborem nominant.<sup>85</sup> Eiusdem generis esse cum πεύκη (τῇ κωνοφόρῳ Theophr.) seu *Pinu Cembra* L., noster asserit, sed specie differre. Egregie hic fere primum γένος et εἶδος eodem sensu sumuntur, quo hodie genus speciemque distinguimus: aliis vero locis saepe confunduntur. *Pinu Cembra* autem στροβίλους producit, quos

83<sup>a</sup>) Lam, *encycl. bot.* 2, p. 626.

83<sup>b</sup>) Phot. *cod.* 250. p. 458. Cf. et Diod. Sic. 3, 47. Strabo lib. 16. p. 436. Καρούμενοι ὑπὸ τῶν εὐωδίων αἰθροῦσι τὰν χάρων ἀσφάλτον θυμιάματι καὶ τράγου πώγωνος.

84) Ed. rom. p. 152.

85) Sibthorp fl. graec. ed. Smith, tom. 2. p. 247.

nostrates *Zirbelnüsse*, Itali *zermi*, Galli *ceinbrots* vocant. Eas nuces Avicenna vocat حب الصنوبر. Maiorem autem speciem distinguit a minore, illam ex arbore بسوس (pro qua corrupta voce Celsius recte بطوس, πίτυς, legit)<sup>86</sup>, minorem habere fructum magis triangularem, astringentem et submordacem.<sup>87</sup> Mox vero ἡ στρόβιλος pro arbore ipsa sumitur, quae πεύκη sit. Namque ita et Geoponici<sup>88</sup> Pinum Cembram ipsam στρόβιλον appellant. De fructibus autem arboris recentiores semper intelligere στρόβιλους, si antiquis κῶνοι, Hippocrati κόκκαλοι dice-  
rentur, Galenus auctor est.<sup>89</sup>

*Λαδίον* proprie est facula, qua lustrationes et καθαρμοί instituebantur<sup>90</sup>; sed taedulam etiam seu festucam, quamvis e pingui ligno pineo, signat. Σπάθη aut σπαθίς est spathula, qua et miscebantur res, unguenta ingredientes, aut qua illinebantur etiam τὰ μύρα.<sup>91</sup>

Cap. LXXXIX. XC. *De Lentisco*. Supra iam c. 51. de Mastiche chia praestantissima sermo fuit. Virentibus surculis delicatuli dentes purgare consuerunt, ut σχνο-  
τρώκταν Lucianus eum vocet, qui manducat lentiscum, ut dentes albescant.<sup>92</sup>

Avicenna mastichen (مصطكى) duplicem habet, graecum (رومى) album et nabataeum (نبتي pro قبتى legendum) nigrescentem.

Cap. XCI. Terebinthi fructum edulem esse, e veteribus Aelianus<sup>93</sup> et Strabo<sup>94</sup>, e recentioribus Belonius.<sup>95</sup>

Arabibus audit arbor البطم et fructus الحصرأ حبة, propter colorem exquisitae glaucum.

Locum hunc de praestantia resinae lentiscinae infi-

86) Cels. hierob. 1. p. 110.

87) Avic. ed. rom. p. 179. 88) Lib. 11. c. 1. 11.

89) Comm. in libr. de vict. acut. 4. p. 848. De fac. alim. 2. p. 591.

90) Jamblich. protrept. ed. Arc. Theod. p. 145. Λαδίῳ θάκον μὴ ἐπόμασσε. Sacras res profanis ne permisceas. Dicebatur et δάλιον, ξύλον ἡμίφλεκτον. Hesych.

91) Iul. Poll. 10, 26.

92) Lucian. Lexiph. p. 191. ed. Reiz.

93) Var. hist. 3, 39. 94) Lib. 15. p. 229.

95) Clus. exot. p. 152.

maque strobilinae qualitate citat Galenus<sup>96</sup>, veritatem huius asserti fatens, si quis ἀπλῶς de tota substantia loquatur. Quodsi vero de caloris gradu sermo fuerit, strobilina calore principem, secundam abietinam, lentiscinam postremam pronunciat.

Cap. XCII. Resinae aliae, quas iam terebinthinas vocamus, sunt: 1. terebinthina argentoratensis e Pinu picea: 2. terebinthina veneta e Pinu Larice, quam e Gallia subalpina exportari recte animadvertit. Resinam ex his siccam Colophoniam vocat, e Colophone nomen derivans. Fuit autem Colophon oppidum Ioniae, Apollinis Clarii oraculo antiquitus celebre<sup>97</sup>, sed Strabonis aetate iam obsoletum.<sup>98</sup> Utebantur forte sacerdotes ea resina, ut accensa praestigias facerent, flamma colorata terrorem iniicientes. Terebinthinam vero optimam censet, quae e Pinu Pineae et P. Abiete (ἐλάτη) in Pityusa insula gignatur. Haec insula iam Yviza appellatur.

Cap. XCIV. Κῶνον dici picem liquidam, memorabile est. Hinc et κωνίζειν et πισσοκωνίζειν, *pice inungere*, πισσοκώνητος, *pice unctus*, et ἀκόνιτον, ἀκώνητον, *haud pica-tus*, quod ultimum in nostro saepe obvium perperam scribitur in editionibus ἀκόνιτον.

Cap. XCV. De πισσελαίου significatu differunt veteres. Namque Galenus in Asia minore vocari permixtam cum oleo picem liquidam πισσέλαιον, supernatantem vero pici liquidae humorem, qui tenuior sit ipsa et debilior, πισσάνθος.<sup>99</sup> Ultimum, a πισσελαίῳ Dioscoridis etiamnum diversum, nostrates appellant gelben Theer, Angli nobiscum tar, Galli goudron, Itali catrame. Dioscoridis vero πισσέλαιον est Theerwasser, quod, Berkeleyo suadente, arte confectum, quondam magnam acquisivit laudem in curandis diuturnis morbis, praesertim scorbuto, lepra et exanthematibus.<sup>100</sup> Idem est infusum picis, quod ὀρόσπισης nomine Paullus commendat.<sup>1</sup>

96) De compos. med. sec. gen. 3. p. 590.

97) Tacit. ann. 2, 54.

98) Lib. 14. p. 543.

99) De compos. medic. sec. loca, 1. p. 441.

100) Berkeley's Siris, or inquiries concerning the virtues of tar-water. Lond. 1744. 8.

1) Lib. 3. p. 121.

Cap. XCVI. Fuliginem sumi ad pigmenta καλλιβλέ-  
φαρα, seu ad palpebras nigro colore tingendas, noster as-  
serit. Haec ars dicebatur κομμωτική Galeno, quam gene-  
ratim spretam probe a κοσμητική distinguit. Illius enim  
finem esse, ut pulcritudinem acquisiticiam inducat, ut  
igitur canos capillos nigrore honestet, aut palpebras cal-  
vas novis pilis ornet; κοσμητικήν custodire et servare,  
quicquid naturalis pulcri in corpore sit.<sup>2</sup>

Cap. XCVII. Picem liquidam coctam, ut siccescat,  
παλιμπίσσαν dici, non mirum est: sed viscosae huius no-  
men βοσκάς cilicium videtur. Pix brutia, picandis va-  
sis vinariis perquam commoda, fere laudatissima est.<sup>3</sup>  
Erat autem in Brutiorum regione, quae extrema Italiae  
Siciliam spectabat, sylva, Sila dicta, pinuum earum fe-  
racissima, quae optimam largiebantur picem.<sup>4</sup> Suspicio,  
esse *Pinum brutiam* Tenor., quam equidem in horto co-  
lo, maritimae Lam. et Pinastro Ait. maxime affinem. Ce-  
terum non sibi constant veterum libri in scribendo Bru-  
tiorum nomine. Cum nostro *Βουττίαν* habet Lucianus,  
secundum editionem principem et optimam Hemsterhusio-  
Reizianam.<sup>5</sup> *Βρουττίαν* habet partem Siciliae Stephanus  
Byzantinus. *Βρέττιον* et *Βρεττίους* legimus apud Strabo-  
nem. Et Stephanus ipse corrupto loco: ἡ χώρα βρεττία,  
καὶ ἡ γλῶσσα (πίσσα emendavit Bochartus:<sup>6</sup>) Ἀριστοφά-  
νης (Ἀριστοφῶν emendavit Berkelius:<sup>7</sup>) Μέλαινα δεινὴ  
γλῶσσα (πίσσα) βρεττία παρῆν.

Cap. XCVIII. Ζώπισσαν simpliciter ξηρὰν ῥήτινην  
Hesychius vocat: alii autem cum nostro derasam e navi-  
bus cum cera picem, quae diutius aqua marina macerata  
fuerit.

Cap. XCIX. Ἀσφαλτος seu bitumen fossile no-  
men habere propter ἀσφάλειαν dicitur, qua muri ex eo  
aedificantur<sup>8</sup>, exemplo murorum Babylonis antiquissi-

2) Galen. de comp. med. sec. loc. 1. p. 434.

3) Plin. 14, 25. Colum. 12, 18.

4) Strabo lib. 6. p. 257. 5) Lucian. Pseudomant. p. 84.

6) Canaan, p. 595. 7) Ad Steph. Byz. p. 244.

8) Dio Cass. 68, 27. Ἐνθα μέντοι τὴν τε ἀσφαλτον εἶδε Τραῖα-



mo.<sup>9</sup> Laudatissimum fuit bitumen iudaicum, a quo lacus ἀσφαλτίτης nomen habet. Dicitur autem ebraice חֲמָר et arabice حمر (*Chommer*), e radice חמר, *rubescere*, quia optimum πορφυροειδὺς στίλβει, ut noster testatur. Lacus asphaltites a Iudaeis medii aevi dicitur חמם החמר<sup>10</sup>, a nostrae aetatis Arabibus بحر لوط (*mare Lothi*.) In valle Siddim multi putei bituminis (בְּאֵרֵי חֲמָר) indicantur<sup>12</sup>: esse autem rimas et fissuras rupium, e quibus bitumen stillet, incolae Burkhardtio persuaserunt.

Alia loca indicantur, in quibus et Agrigentinus ager Siciliae, ubi oleum petrae aquis innatans reperitur. Testimonia supersunt in Plinio<sup>13</sup> et nostrae aetatis peregrinatore, Cephalide.<sup>14</sup>

Cap. C. Apollonia Epidamno vicina est urbs Illyridis graeca, ad Arum fluvium sita et LX stadia a mari dissita, a Corcyraeis condita.<sup>15</sup> Posidonius apud eundem testatur, in finibus Apolloniatarum Nymphaeum appellari petram ignivomam, sub quo fontes sint aqua tepida et asphalto scatentes, gleba, ut appareat, asphaltitide ibi ardente. Montes idem ceraunios dicit Apolloniae fere vicinos, initium faucium ionii sinus adriaticique. Itaque exploratum habemus, recte nos legere Ἀπολλωνία ἢ πρὸς Ἐπιδάμνω. Epidamnus enim eadem est, teste Stephano, cum Dyrrhachio. Loco Ἐπιδάμνω autem Ἐπιδάυρω legit Oribasius, vel interpret eius, Goupylus etiam et alii, quod quam inscite factum sit, cuivis patescit, qui Epidaurum Peloponnesi cum ceranniis montibus componi non posse intellexerit. Cetero haec Apollonia eadem est, quam Galenus τὴν κατ' Ἑπείρον dicit.<sup>16</sup> Abest enim Apollonia a finibus Epiri haud ultra CCL stadia.

---

νος, ἐξ ἧς τὰ τεῖχη Βαβυλῶνος ὠκοδόμητο· τοσαύτην γὰρ ἀσφάλειαν πλίνθοις ὀπταῖς ἢ καὶ λίθοις λεπτοῖς συμμιχθεῖσα παρέχεται, ὥστε καὶ πέτρας καὶ σιδήρου παντὸς ἰσχυρότερα αὐτὰ ποιεῖν.

9) Herod. 1, 179. 180. Genes. 11, 3.

10) Bochart Can. p. 39.

11) Burkhardt. iter. germ. p. 666.

12) Genes. 14, 10. 13) Lib. 35, 51.

14) Iter german. p. 284. 285. 15) Strabo lib. 7. p. 424.

16) De fac. simpl. 11. p. 375.

Cap. CI. Naphthae vocis origo orientalis manifesta est. *نفث* (*Nepthh*) enim Arabum a radice derivatur, quae *effervescere* et *accendi* signat. In eo vero fallitur auctor, quod *περιήθημα* seu colamen asphalti dicat naphtham. Namque in omni Media citeriore, praesertim circa Baku et Tavis (Ecbatana olim dictum) sponte e terra manat, flammam e longinquo accipiens, quemadmodum Alexander M.<sup>17</sup> olim nuperque Kaempferus<sup>18</sup> experti sunt.

Cap. CII. *Κύστις ρευματιζομένη*, contra quam fructus cupressi suadentur, Saraceno negotium facessivit, quando *ρεύμα* et apud nostrum et apud alios veteres varios habet significatus. Quodsi locus (5, 81.) comparatur, ubi vis vini mandragoritis *ρεύμάτων παχυντική* dicitur, aliusque locus (5, 32.), ubi vinum e pyris *ρεύματα ἔνδον ἐπέχειν* perhibetur, fluxiones seri, mucii aliorumque humorum significare videntur *ρεύματα*; *ρευματίζεσθαι* autem de visceribus dicitur seu organis, quae fluxionibus iis laborant: e. g. *θώραξ ρευματιζόμενος*, quod nostra aetas catarrhum vocat pulmonum. De iis *ρεύμασι*, eorumque qualitatibus iam Hippocratici arguta tradiderunt ratiocinia.<sup>19</sup> Itaque *κύστις ρευματιζομένη* nostratibus *catarrhus vesicae* vocatur, vulgo natus ex haemorrhoidum mucosarum vitio.

Cap. CIII. Iuniperum duplicem habet, alteram maiorem, minorem alteram. Illius fructus comparatur cum *καρύω, ἁπλῶς λεγόμενῳ*, huius cum *καρύω ποντικῷ*. *Κάρυον* autem quanquam nucem quamvis designet, maxime de euboica aut iuglandis fructu usurpatur. Iam crescit per Graeciam et Illyricum *Iuniperus macrocarpa* Sibth., quam primus Lobelius<sup>20</sup> nomine Iuniperi maximi illyrici delineavit. Baccas ellipticas ea fert, nigrescentes cum rore coeruleo, duplo maiores, quam Oxycedri, ut folia superent. Alia vero est syriaca iuniperus, quam Billardierius *drupaceam* dixit.<sup>21</sup> Inventam in monte Cassio Syriae ita describit, ut fructus subrotundos tuberculosos ter superare

17) Plutarch. Alex. c. 35.

18) Amoen. exot. p. 274. s.

19) Hipp. de vict. acut. p. 397. Foës.

20) Stirp. hist. p. 629. Iuniperus maior Matthiol. p. 118.

21) Plant. syr. 2. t. 8.

dicat folia. Haec autem species etiãmsi Dioscoridi nota esse potuit, haud tamen adeo communis fuisse videtur, ac prior. Altera species, cuius fructus cum καρύω ποντικῷ seu ἡρακλεωτικῷ conferuntur, *Juniperus Oxycedrus* esse videtur, per omnem Europam australem satis vulgaris, cuius baccae rufescentes nucem avellanam aequant.

Λιβιούμ nomen aegyptium cum nota generis feminini τελιβί pronunciatum in Lycaonum linguam transiisse testatur Jablonskius.<sup>22</sup> Namque δέλβαιαν dictam fuisse apud Lycaones Stephanus Byzantinus est auctor.<sup>23</sup> Rossius adiiicit, ἑλλιβί, aegyptiam vocem, plantam denotare, quae insaniam tollat.<sup>24</sup> Ipsam etiam graecam vocem ἄρκενθος aegyptiae esse originis perhibet: ἐρχηβθώ enim *umbrosam* plantam signare. Nomen afrum aut punicum ζουορινόπειτ scriptum videtur צרי ספר, *arbor balsamica lugubris*, esse.

Cap. CIV. Duas esse varietates *Juniperi Sabinae*, alteram *cupressifoliam*, alteram *tamariscifoliam* Aitonio dictam, cuius notum est. Genera duo D. dicuntur, cum raro discrimen generum, specierum et varietatum apud veteres obvium sit.

Cap. CV. Descriptio Cedri varia est in codicibus et editionibus. Nostra quidem lectio nititur auctoritate codicum vindobonensium, Cantacuzeni et interpretum Arabum, qui شربين (*scherbin*) arborem, قطران (*kitrán*) vero κεδρίαν appellant. Ipsa etiam vox κεδρία videtur orientalis esse originis, sicut Plinius perhibet, picem liquidam in Syria cedrium vocari<sup>25</sup>. قطران autem certe radicem קטר habet, quae in omnibus semiticis dialectis *redolere*, *suffire* significat.

Serapion et Avicenna legisse videntur μικρότερον μὲν παρὰ πολύ, namque minorem cedri fructum quam cupressi praedicant. Editio princeps vero, Marcellus Vergilius, et qui sequuntur, nihil habent de differentia cedri maioris minorisque, καρπὸν φέρουσα μύρτου μέγεθος,

22) Opusc. I. p. 126.

23) Voc. Δέλβη, p. 296.

24) Etymol. aegypt. p. 18.

25) Lib. 16, 21.

περιφεροῇ, ad κέδρον generatim trahentes. Utraque lectio suas habet difficultates, pauciores posterior. Quodsi enim, ut videtur, *Iuniperus phoenicea* L. est veterum κέδρος, cupresso quidem similis est ramis foliisque, sed neutiquam fructu. Hic enim est globulosus, sed multo maior Iuniperi communis fructu. Posset igitur, ni temeritas subesset, sic emendari: φύλλα δὲ ἔχει ὥσπερ κυπαρίσσου, καρπὸν δὲ μύρτου, μακρότερον μὲν παρὰ πολὺ. Emendatio haec Vitruvio firmatur.<sup>26</sup> Is enim arbores cedri dicit similes *cypresseae foliaturae*. Neque arbitror cum Saraceno, καρπὸν hic semen signare, quoniam cupressi fructus, non semina, veterum medicamenta ingrediebantur.

Iuniperum autem ac κέδρον veterum admodum affines esse, patet et e Nicandri versiculo<sup>27</sup>

Μηδὲ σέ γε χραίσμη πολίου λάθοι ἢ κέδροιο  
ἄρκευθίς.

Ubi scholiastes: Ἀρκευθος (ἄρκευθίς) δὲ καλεῖται ὁ καρπὸς τῆς κέδρου, ἐπεὶ καὶ αὐτὸ τὸ δένδρον ἄρκευθος λέγεται. Ἐτεροι δὲ τὴν βοτάνην φασίν, οὐ τὸν καρπὸν, ὃ κρεῖττον δοκεῖ.

Altera cedrus parva, spinosa, iuniperi ad instar, *Iuniperus nostra communis* esse debet.

Κεδρία, resina iuniperi, quam Arabes etiam سندروس (sandarūs), Latinobarbari et recentiores *sandaracham* vocarunt, traditur vi corrumpendi corpora animata pollere, defuncta vero conservandi. Namque Aegyptii ad condienda corpora eorum, quibus non satis opum erat, Herodoto teste<sup>28</sup>, omne abdomen κεδρία implebant et νίτρον seu soda caustica. Resina ea κατατήκεσθαι autumabant viscera et intestina, soda vero musculos (τὰς σάρκας.) Ea vero vis cum longe absit ab hac resina, erroneae etiam sunt traditiones de modo eo condiendi cadavera. Qui nuper mumias plures examini subiecerunt, Rouyerius<sup>29</sup>, Belzo-

26) Archit. lib. 2. c. 9.

27) Theriac. v. 584. 28) Lib. 2. c. 87.

29) Descr. de l' Egypt. Antiq. 2. p. 216.



nus<sup>30</sup> et Sieberus<sup>31</sup>, tota corpora resina et asphaltio impraegnata, viscera autem abdominalia nonnunquam in globum compacta invenerunt, et, si quando desint, probabile est, caustica quadam substantia, velut natro s. soda, prius exesa fuisse, ut per anum extrahi possent, quod Plutarchus quoque innuit.<sup>32</sup> Hinc etiam Herodotus dicere potuit<sup>33</sup>, *συρμαίη διηθήσαντες τὴν κοιλίην ταριχέεσθαι τοὺς νεκροὺς τοὺς χρήμασι ἀσθενεστέρους*. Συρμαία enim et συρμαϊσμός dicebatur purgatio corporis et alvi evacuatio, sive id per superiora fieret, sive per inferiora.<sup>34</sup> Paullo ante Herodotus morem Aegyptiorum tradiderat, per triduum singulorum mensiam vomitionibus *συρμαΐζειν*<sup>35</sup>. Itaque exedere nequivit viscera *κιδρία*, sed praestitit id natrum causticum.

Theophrastus *ἄρκευθον* et *κέδρον* diverso sensu sumit. Illam enim phoeniceam dixit, procerioris staturae, mollioribus foliis insignem, fructum nigrum, ansterum ac *ἄβρωτον*. Cedrum autem lyciam etiam Oxycedrum dici, foliis esse durioribus, spinosis, fructum gerere flavum, myrti mole.<sup>36</sup> Incidisse autem in plures videtur errores, cum vulgares in Graecia plantas plures haud ipse cognoverit.

Cap. CVI. Laurum duplicem, foliis angustioribus latioribusque et Theophrastus pronunciat.<sup>37</sup> Plinius multa, et diversa quidem, genera lauri citans, *regiam* habet laurum, quae coeperit Augusta appellari, amplissimam et arbore et folio.<sup>38</sup> Matthiolus utramque, vulgarem (angustioribus foliis) et latifoliam, pingi curavit. Varietatem hanc, cultu productam, habemus.

Avicenna duobus locis, diversisque nominibus *داهمست* (*dahemast*) et *غار* (*gâr*) tractat, persico illo et hoc arabico.

30) Iter germ. p. 108.

31) Ueber ägyptische Mumien, p. 14. 15.

32) Conviv. septem sap. c. 16. p. 627.

33) L. 2. c. 88.

34) Foës. oeconom. Hipp. voc. *συρματα*.

35) L. 2. c. 77. 36) Hist. pl. 3, 12.

37) L. c. 38) Lib. 15, 39.

Cap. CVII. De platani lanugine et Galenus: cavendum esse, ne fistulae spiritali illabatur, siccare enim eam et exasperare, vocemque laedere, ut et visum et auditum.<sup>39</sup>

Cap. CVIII. De fraxini vi contra serpentes mirabilia narrat Plinius: tantam nimirum esse, ut ne matutinas quidem occidentesve umbras, quanquam longissimas, arboris eius serpens attingat, adeo ipsam procul fugiat. Quin, si fronde ea gyroque ignis claudatur serpens, in ignes potius quam in fraxinum fugere eum.<sup>40</sup> Haec autem ideo adduxi, ut patescat, Plinium *σμύλον*, *σμύλακα*, taxum, cum *μελία*, fraxino, commutasse. De illius enim venenata vi, etiam umbris inhacrente, multa prodidere et veteres et recentiores.<sup>41</sup> Hinc et hallucinari existimo Dioscoridem, si fraxinei ligni *τορρεύματα* letalia esse perhibet, *σμύλου* aut *σμύλακος* ligno cum *μελία* commutato.

Cap. CIX. Quid *σφαίρια*, globuli, sint in Populo alba, dum folia germinant, erumpentes, dubitari potest. Matthiolus idem esse ac *βρόνον*, quod in *λεύκαις* crescere et Galenus tradit.<sup>42</sup> Neque tamen lichenes, quando folia erumpunt, sed per omnem aetatem in cortice arboris reperiuntur. Multo minus gemmae subintelligendae sunt, licet ad unguenta adhiberentur: *ὄζοι* enim dicuntur gemmae, quae neutiquam globulorum formam habent. Sed amenta ipsa feminea gerunt uvas a Latinis dictas lana plenas, seu capsulas seminibus comosis refertas. Haec quidem turgidae, circa *ἐκβλάστησιν* foliorum, non male cum globulis comparantur.

E cortice populorum albae et nigrae generari fungos edules alio nullo veterum testimonio confirmatum memini; licet e Geoponicis quidam, Tarentinus dictus, e populo nigra desecta, et fermento in aqua soluto ac in plagam trunci infuso fungos populneos pronasci memoret.<sup>43</sup>

39) De fac. simpl. 8. p. 104.

40) Plin. 16, 24.

41) Theophr. hist. pl. 8, 11. Caes. bell. gall. 6, 31. Floyer *ψευδακοβ*. p. 189.

42) De fac. simpl. 6. p. 855.

43) Geopon. 12, 41.

Cap. CX. Una cum populo nigra electrum seu succinum tractari, non mirum est, qui antiquam eam narrationem cognoscit de Heliadibus, Phaethontis fulmine interemti mortem lugentibus, quarum in populos mutatarum lacrimae sole coagulatae succinum constituere.<sup>44</sup> Quodsi huius fabulae originem investigamus, protinus obvius fit historiae pater, Herodotus, qui Eridanum fluvium, in extremis Europae versus boream tractibus, ἡλέκτρον (succini) patriam prodit.<sup>45</sup> Esse autem Eridanum eundem fluvium cum Rheno nostro, patet maxime ex Electridum insularum, succini feracium, situ ad orientem Eridani et ex adverso Britanniae.<sup>46</sup> Phoenices autem primos ad boreales regiones navigasse, ut stanno electroque quaestum facerent, exploratum habemus. Siquidem ipsum ἡλέκτρον nomen non sine veritatis specie Bochartus ex antiqua punica, quae fuit ebraea, lingua derivavit.<sup>47</sup> Namque ירן aut ארנה-ערב, *resinam pini* significans, facillime in ἡλέκτρον mutari potest, et vestigia ערב etiamnum in arabico علك, *resina*, supersunt. Tam rarum autem antiquissimum fuit electrum, ut imitamentum veteres fingerent, metallum ex auro quintaque argenti portione compositum.<sup>48</sup> Posterius fuisse id ἡλέκτρον, cuius Homerus meminit<sup>49</sup>, ipse Plinius indicat.

Cum dein saeculorum lapsu et Phoenicum et Carthaginensium navigationes et commercia exolescerent, Romani novam quaesiverunt viam, qua pretiosum succinum sibi compararent. Veteres forte memoriae Pythae aderant Massiliensis, qui, cum et sinum codanum et maris baltici oras appulisset, electrum invenerat; huius vestigia per Germaniam, Pannoniam Sarmatiamque Romani percontantes, tandem ad vada maris baltici venerunt, electrum eructantis.<sup>50</sup> Neque defuerunt, qui, postquam Drusus Germanicus litora maris germanici ad Cimbrorum pro-

44) Apollon. Rhod. 4, 506. Ovid. metam. 2, 864. Diodor. Sic. 5, 23. Arist. mirab. ausc. p. 1092. ed. Pac.

45) Lib. 5, c. 115. 46) Plin. 4, 30.

47) Hieroz. 2, p. 369. 48) Plin. 33, 23. Pausan. 5, 12.

49) Od. 4, 74. 15, 459. 50) Plin. 57, 11.

montorium usque aperuisset, Glessarias illas insulas aut Electridas investigarent, quae ad orientem ostiorum Rheni Amisisque sitae, eae sunt, quae Burchaniae Austraniaeque inprimis nominibus celebrabantur. Videntur autem eae esse insulae, quae et borealem Hollandiae et Frisiae et occidentalem Slesvici oram stipantur, quarum prima a Zephyro Texel, ultimae versus Caeciam Ramöe et Fanöe nostratibus dicuntur. Viginti tres enim numerat Plinius, atque in borealibus praesertim succinum inveniri, nostra aetate firmatum est. Tantum autem valuit lucri cupido livorque mercatorum, ut occulerent patriam, vocatis in auxilium vetustis de Phaëthonte et Heliadum luctu fabulis. Cum enim confluerent ad sinum maris adriatici ultimum et ad Istriae oppida, Aquilegiam etiam et Tergestem, quicumque succini caussa boream visuri inde reduces erant, non potuit non generosum electrum nurnum Latinarum, eas oras accolentium, palmarium fieri ornamentum.<sup>51</sup> Unde factum est, ut et Electrides insulae in Adria quaererentur, ubi nullae sunt, et Padus cum Eridano commutaretur. Cum adiisse se Eridani ostia tradiderit Lucianus, ut populos electrum sudantes, Electrides etiam insulas conspiceret, irrisum fuisse a nautis memorat, quippe qui nullum succini vestigium ad ea litora invenire meminerint.<sup>52</sup>

Arabum, qui electrum etiam pretiosius haberent, quam Romani, permultae sunt hallucinationes circa idem. De ambra enim (عنبر) Avicenna agens, corruptum habet locum سباحر جرمانيق, quem Bochartus ita emendat سخاخ زمانيق, *in mari germanico*<sup>53</sup> se vidisse ambram, quod nil aliud quam succinum كاه ربا (kah-raba), paleas attrahens, electrum esse potest.

Cap. CXI. Mirum videri posset, si macer et macis nostratum idem creduntur, aroma medias inter arbores collocari: mirum, ἐκ τῆς βαρβάρου κομίζεσθαι dici, cum

51) Ovid. metam. 2, 364.

52) Lucian. de electro, p. 519. opp. tom. 7. ed. bipont.

53) L. c. p. 866.



ἐκ τῆς Ἰνδικῆς, ut Galenus<sup>54</sup>, dici debuisset. Namque ad barbaras regiones etiam Germania et Britannia pertinebant. Quibus argumentis impulsus Marcellus Vergilius spurium hoc caput et a librario quodam seniori adscriptum existimavit, quando praesertim in vetustissimis codicibus desideratur. Serapionis tamen aetate hoc caput iam legebatur.

Plura vero nobis suadent, μάκρο veterum omnino differre a nostro mace. Cum enim constanter corticem dicant, Plinius etiam<sup>55</sup> corticem radicis magnae rubentem, nomine arboris suae; quid arillus nucis moschatae, nostra nimirum macis, communis habeat cum arboris aut radicis cortice, plane non video. Accedit, solam astringentem vim praedicari, cum tamen aromatica in mace praevaleat.

Arabes autem primi utrumque commutarunt medicamentum. Serapion et Avicenna μάκρο veterum طابلسفر vocant: macem hic autem بسباسة, quam diserte قشور جوز بوا dicit; sed Serapion utrumque eodem capite tractat.

Qualis vero sit arbor, quae corticem eum antidysentericum largiatur, haud satis compertum habemus; quanquam Christ. a Costa arborem describat malabaricam, *Maere* Brachmanis dictam, cuius cortex magni aestimetur. Appellari eam arborem sanctam et sancti Thomae ab Europaeis. Esse vastam et ulmo maiorem. Semen gerere cordis effigie, sapore vero amygdalae aut nuclei persicorum malorum, colore flavo, tunica candida tenuique et pellucida, quasi vesica, tectum, quae in medio folio nascatur colorato, ceteris foliis angustiore, nervoso, crispo et rugoso. Lacteo succo scatere corticem, protinus quidem paullum mordicante, qui vero sapor cum aetate pereat.<sup>56</sup> Non dubito, Costae arborem esse eam, quae μάκρο feneret; sed quaenam est haec arbor? Contorta sine dubio: namque et lactei latices et astringens vis corticis multis ex hac familia communis (Cerberae Odollam et

54) De fac. simpl. 7. p. 66. 55) Lib. 12, 16.

56) Cost. apud Clus. exot. p. 264.

lactariae Hamilt., Wrightiae antidysentericae R. Br., Echiti antidysentericae Roth., aliisque) probare id videntur. Neque tamen vel ex mea vel ex aliorum scientia arbor illa certo definiri potest.

Cap. CXII. *Αἱ φύσκει* (sic cod. X.) ulmorum, seu vesicae aut folliculi, sunt κύπαροι Theophrasti<sup>57</sup>, aut τὰ ἀγγεῖα eiusdem κόμμι φέροντα<sup>58</sup>, ex ichneumonum tenthredinumque morsu nata, in quibus naturalis latex mucosus aut gummosus colligitur.

Cap. CXIII. Cariosi ligni usum in ulcerum putridorum sanie corrigenda posset aliquis e phosphori vi derivare: lucem enim phosphoricam spargere noctu ligna cariosa, notissimum est. Galenus tamen ulni lignum cariosum ei usui praeprimis aptum esse docet.<sup>59</sup> Serapion ultima capituli verba alia legit, ἐν ὀθόλαις nimirum καῖσα καὶ λεία καταπασσομένη. Ergo linteis indita caries lignorum combusta ac ad laevorem trita inspergitur ulceribus. Optio est, utra magis lectio placeat.

Cap. CXIV. De arundinum variis speciebus fusius iam ad Theophrastum<sup>60</sup> egi. Hic pressiore praefero expositionem. Κάλαμος ὁ ναστός, arundo farcta, e qua sagittae conficiuntur, est Theophrasti ἴδιος ὁ τοξικός, ὃν δὴ κρητικὸν τινες καλοῦσιν, ὀλιγογόνατος μὲν, σαρκωδέστερος δὲ πάντων, καὶ μάλιστα κάμψιν δεχόμενος.<sup>61</sup> In Creta autem, licet a P. Alpino peculiaris arundo aculeata describatur<sup>62</sup>, quam Linnaeus *Cenchrum frutescentem* vocavit, praeter *Arundinem arenariam* L., eiusque varietatem, nec Tournefortius<sup>63</sup>, nec recentiores peregrinatores aliam observarunt speciem, quae huc trahi possit. Lingulas tibiarum ex alia arundine confici, quam tibias ipsas, nimirum ex αὐλητικῷ seu δόνακι, Theophrastus negat, sed ζευγίτην dici femineam habitu, εὐσαρκότερον, si aqua diu stagnaverit, βομβυζίαν vero, si inundata loca inaruerint,

57) Hist. pl. 2, 8. 58) Ib. 9, 1.

59) De fac. simpl. 8. p. 118.

60) Comment. germ. p. 176 — 182.

61) Hist. plant. 4, 11.

62) De plant. exot. p. 104.

63) Coroll. p. 59.

Itaque arundo femina Diosc. sola est Donacis varietas, quae et κύριος dicitur. Συριγγίας alius nostro est, e quo calami scriptorii conficiantur. Haec πολύσαρκος dicitur, ut et Serapion legit. Contrariam tamen sententiam et magis probabilem proferunt Theophrastus et Plinius. Ille enim συριγγίαν οὐδέν, ὥς εἰπεῖν, ἔχειν ξύλου καὶ σαρκός, hic etiam, nihil ei esse cartilaginis atque carnis<sup>64</sup>, asserunt. Neque falsam esse nostram lectionem, ex additamento πυκνογονάτου constat, quod cum πυλυσάρκω cohaerens iterum Theophrasto adversatur, qui μανὸν καὶ ὀλιγογόνατον τὸν συριγγίαν vocat. Nil igitur superest, nisi συριγγίου significatum assumere mutatum in tribus saeculis, quae Theophrastum intersunt et Dioscoridem.

Φραγμίτης vulgaris ea species est, quam et nostrorum hominum genus *Arundinem Phragmiten* appellat. Sed superest insignis, in quem incidi, error emendandus. Cum enim legerim ὁ δὲ φλοιὸς καὶ εἰς ἀλωπεκίας θεραπεύει, neque corticem ullum in gramine statuere aliquis possit, nimis properavi, ut hoc novarem, maxime cum ὁ φλεὼς cum ἀνθήλῃ in Theophrasto<sup>65</sup> ut synonymon arundinis occurrat. At vero ὁ φλοιὸς repetitur a Galeno<sup>66</sup>, qui eum σιφθαίριον Aegyptiis dici asserit, et a Paulo Aegineta<sup>67</sup>, ut et de corticis usu loquuntur Plinius<sup>68</sup> et Serapion.<sup>69</sup> Cum cortex culmi dici etiam possit vagina foliorum culmum ambiens, piget me eius inconsiderantiae, eamque deprecor.

Cap. CXV. Πάπυρον esse vocem aegyptiam, nemo negabit, qui aegyptiam esse plantam et ab Aegyptiis ad maxime varios usus adhibitam, secum reputaverit. Haud sine veritatis specie Jablonskius auguratur, vocem esse compositam e βίρ, quod contexere et fiscellam textilem signat, ac πᾶ, planta, ut παβίρ igitur sit planta ad texendum idonea.<sup>70</sup> Strabo τὴν βίβλον vocat, beneque descri-

64) Lib. 16, 66.

65) Hist. pl. 4, 10.

66) De comp. med. sec. loc. 1. p. 408.

67) Lib. 7. p. 239.

68) Lib. 24, 50.

69) C. 128.

70) Jablonsk. opusc. 1. p. 198.

bit, εἶναι ψιλήν ῥάβδον, ἐπ' ἅκρῳ ἔχουσαν χαίτην.<sup>71</sup> Ebraei vocant מרר a מרר *sorbere*, quia aquam continuo sitit bibula planta: Arabes بردي (*bardi*).

Quomodo chartae e papyro parabantur, Plinius docuit<sup>72</sup>, et post eum Melch. Guilandinus<sup>73</sup>: quanquam in eorum descriptionibus dubia non pauca supersint, in quibus solvendis Landolina Sculus et Bartelsius periclitati sunt.<sup>74</sup> Philurae enim praetenuēs, sed quam latissimae, in quas acu dividi perhibet papyrus Plinius, tantum abest ut e tunicis aut tegminibus culmi, quae nusquam adsunt, conficiantur, ut potius ex medulla culmi, detracta epidermide, parari possint. Staminibus nimirum parallelis, ope Nili aquae, quae glutinis vicem gerit, coagmentatis supersternebantur transversa subtemina: prelis dein pressa in sole siccabantur.

Nutrimenti aliquid radici inesse noster contendit, ut commanducantes eam Aegyptii succum exsugant. Herodotus de culmi inferna parte ac radice id testatur.<sup>75</sup> Sic etiam Theophrastus de culmo loqui videtur, qui, postquam radices loco cremiorum comburi dixerat, addit: μασσῶνται ἅπαντες οἱ ἐν τῇ γῶρᾳ τὸν πάπυρον, καὶ ὠμὸν καὶ ἐφθὸν καὶ ὀπτόν· καὶ τὸν μὲν χυλὸν καταπίνουσι, τὸ δὲ μάσσημα ἐκβάλλουσιν.<sup>76</sup>

Charta e papyro confecta combusta et papyrus ipsa in cineres redacta largiebantur kali carbonicum impurum, cuius efficacia in ulceribus purgandis et sanandis recentiorum experientia firmatur.

Cap. CXVI. Tamaricis nomen haud sine veritatis specie in Aegypto e μυρική et τὰ, articulo feminino Aegyptiorum, conflatum esse Rossius suspicatur.<sup>77</sup> Βρωώδη esse et florem et fructum; certum est, si βρούον, ut saepius, pro amento habemus. Tamaricem autem sativam in Ae-

71) Lib. 17. p. 528.

72) Lib. 13, 23.

73) Papyrus, h. e. commentarius in tria Plinii de papyro capita, rec. Hent. Salmuth, Amberg. 1613. 8.

74) Bartels iter siculum germ. 5. p. 63.

75) Lib. 2. c. 92. Diod. 1, 80.

76) Hist. pl. 4, 8.

77) Etymol. aegypt. p. 263.



gypto et Syriâ fructum ferre gallae proximum, aliter exponi nequit, quam dum gallarum similia tubercula et hio similibus insectis, ac in quercubus, produci statuimus: sicut, Seetzenio, Burckhardtio et Ehrenbergio testibus, etiam manna in eadem arbore (*Tamarice* nimirum *gallica*) a Cocco manniparo producitur.<sup>78</sup>

Quoniam semina tamaricis comosa facillime dissilantur, aut, ut salicis fructus (cum Plinio loquar) ante maturitatem in araneam abeunt; infelicem arborem eam a vulgo appellari, perhibet Plinius, quoniam nihil ferat, nec (in Italia saltem) seratur unquam.<sup>79</sup>

Cap. CXVII. *Erica*, propter similitudinem cum tamarice, *arborea* esse videtur. Mel generosum aut probatum dici σπουδαῖον, haud sine exemplis est. Namque et Plutarcho dicuntur σπουδαῖα σπέρματα et μῦρον σπουδαῖον.

Cap. CXVIII. *Αρακάλης* ab Arabibus اراك vertitur, cum طرفة *tamaricem* denotet, describitur autem ab Isaaco Amrami filio, ignoto ceterum auctore<sup>80</sup>, tanquam procerior et magis agitata vento: folia (ramos) esse longa, stricta, viridia; flores ferre nullos, sed adnasci fructus, velut cicceris semina, fusca, in quibus granula aliquot coagmentata. Eadem est ebr. חֲשִׁיזִי<sup>81</sup>. Fructum, seu gallas كرمازج (*khismasedsch*) vocant. Ab Alpino<sup>82</sup> bene descripta, male picta arbor, a Forskoleo primo<sup>83</sup> *Tamaricis orientalis* nomine definita est, quam postea Vahlus *T. articulata* nominavit. Mihi exemplar benigne largitus est Delilius, collega monspeliensis, una cum ipsis gallis, quae, Forskoleo teste, in officinis loco fructus usurpantur. Ramos habet Casuarinae aut Equiseti speciem prae se ferentes, incanos, articulatos, vaginis cylindricis appressis, quarum margo superior in processum brevissimum acutum latera-

78) Linnæa, 2. p. 231. Burckhardt iter germ. 2, p. 953.

79) Lib. 24, 41.

80) Apud Serap. c. 20.

81) 1 Sam. 22, 6.

82) De plant. aeg. p. 32.

83) Flor. aeg. arab. p. 206. 207. *Αρακάλης* etiam dictum fuisse narcissum, testatur Eumachus Corcyraeus apud Athen. lib. 15. c. 8. p. 435. ed. Schw.

lem abit. Hic quidem processus vicem foliorum, quae nulla adsunt, agit. Capsulae sunt bi-trivalves; semina comosa. Gallas gerit pedunculatas, seu potius apici ramulorum insidentes, ciceris mole, fuscas, intus solidas vel granulosas.

Empetrum album, quod huc traxit Amatus Lusitanus, Lusitaniae proprium est, neque ullo modo haec arbor cum eo fruticulo confundi potest. Neque Trianthema fruticosum VahlII, seu *Gymnocarpus fruticosus* Forsk.<sup>84</sup>, quem olim pro ἀκακλίδι habui<sup>85</sup>, huc pertinet.

Cap. CXIX. Ῥάμνος Graecorum, Aesculapio sacra<sup>86</sup>, Περεφόριον dicebatur ab usu ἐν τοῖς ἐναγίσμασι: pro foribus enim suspendebatur, ut Dii inferi expiarentur.<sup>87</sup> Hinc et Nicander ἀλεξιάρην, ἀλεξίκακον vero Euphorion dicebat. Afra seu punica appellatio est manifesto semitica: ἀταδὴν enim est pluralis chaldaeus ܐܬܐܕܝܢ, cuius singularis ܐܬܐܕܐ in vetere testamento pluries obvius est.<sup>88</sup>

Hunc fruticem primus P. Alpinus arabico nomine عوسج (*ausedsch*) Uzeg descripsit ac delineavit.<sup>89</sup> Est frutex, ramis strictis, rigidis, quorum ramuli horizontales spinescunt: folia sunt lanceolata, obtusa, oblique flexa, canescentia: flores albidii, fructus nigri. *Lycium* est *europaeum*. *Lycium afrum* videtur esse ῥάμνος ἑτέρα, λευκότερα. Rhamnum tertium Lobelius<sup>89</sup> in Galloprovincia et Italia reperisse credidit. Sed, quem delineat, frutex est *Mespilus Pyracantha*, baccis ruberrimis longissime differens a Dioscoridis frutice. Equidem olim habui *Rhamnum oleoidem*, sed fructus adversantur. Non video profecto, quinam esse possit hic frutex, nisi fuerit *Paliurus australis* Gaertn., seu *Rhamnus Paliurus* L., cuius fructus est latus (drupa sicca, alata), folliculi prope figura, vertebrae ad instar: aculei etiam potius sunt, quam spinae. Attamen mox ipse is frutex (c. 121.) sequitur, ubi semen manifesto a fructu distinguitur.

84) Conf. Vivian. fl. libyc. t. 10. f. 1.

85) Hist. rei herb. 1. p. 174.

86) Pausan. 3, 14.

87) Schol. Nicand. ther. v. 861.

88) Genes. 50, 10. Iud. 9, 14.

89) Advers. p. 438.

Cap. CXX. Ἁλμος, *Atriplex Halimus* L., nullam admittit dubitationem, cum et recentiores, e. g. Belonius<sup>90</sup>, frequentissimum per Graeciam fruticem, plurimas sepes eo constantes, nomen consonum (ἁλματία) et cymas etiamnum edules observaverint. Nomen graecum a loco natali (ἁλίμω, παραθαλασσίω). Nomina aegyptia a sepibus, quas frutex constituit: ἄσλοερί et ἄσοντρι<sup>91</sup>.

Inter Arabas Beitarides ملوخ (malûch) vocat<sup>92</sup>. In arabica Avicennae editione corruptum hoc nomen مبنیخ legitur, ubi ملوخ scribi debebat.

Cap. CXXI. *Paliurus australis* Gaertn. semen habet lini seminis haud absimile, nitidum ac pinguiusculum, sed magis convexum: cuius usum adversus tussem Theophrastus pariter praedicat.<sup>93</sup>

Cap. CXXII. De Oxyacantha variae sunt veterum auctorum sententiae. Pyracantham vocat Plinius, qui omnino ab alia spina, quam appendicem vocat, quoniam baccae puniceae eo nomine appellentur, probe distinguit.<sup>94</sup> Galenus ὀξυακάνθην fere eodem modo ac Dioscorides describit, nisi quod fructum dicat ἀραιόν loco ἄδροῦ.<sup>95</sup> Nisi, quod suspicor, falsa est lectio; alium fruticem commutavit Galenus, forte Plinii spinam appendicem, quae Berberis Arabum est. Serapion enim امیر بریس (amir berís), seu برباریس (berbarís), quam et اثرار (atsrâr) et اثرات (atsratsrah) dixere, pro ὀξυακάνθη Dioscoridis habet. Eum et Arabes et Latinobarbari<sup>96</sup> ita sequenti sunt, ut post renatas literas oxyacantha Dioscoridis fere ab omnibus diceretur berberis. Valerius Cordus primus est, qui ad h. l. differentiam insignem utriusque monstraverit. Dodonaeus quoque, Matthiolus et alii *Mespilum Pyracantham* in ὀξυακάνθη Dioscoridis recognoverunt. Negotium tamen facessit, quod D. πυροῖνα tantum in fructu habitare perhi-

90) Obs. p. 24. 25. in Clus. exot. Tournef. iter, p. 43.

91) Rossi etym. aeg. p. 19.

92) Bochart, hieroz. 1. 874.

93) Hist. pl. 3, 18.

94) Lib. 24, 70.

95) De fac. simpl. 8. p. 90.

96) Matth. Sylvat. c. 38.

beat, cum duo, tres aut quinque *πυρῆνες* vulgares sint. Sed facillime potest *πυρῆνα* in *πυρῆνας* mutari, praesertim cum Serapion, fidus interpret, grana (حبوب) adesse dicat.

Cap. CXXIII. De Cynosbato similis nasci potest controversia. Graecis solis exemplaribus consultis persuasum habemus, *Rosam caninam* esse *κυνόβατον* veterum, maxime Columella teste.<sup>97</sup> Si quis vero Plinium de cynosbato legerit, tantam reperiet confusionem, tantamque ex incititia iuxta ac properatione natam significatus μεταφοράν, ut aegerrime eam expedire possimus.<sup>98</sup> „Folia esse vestigiis humanis similia.“ Quid legit Plinius, aut quid legere audivit? Temporis parsimonia impulsus, qui et in balneis, et ante lucem, et cum somnus instaret aut eum descerneret, semper legi sibi iusserat et dictare notario, cuius manus hieme manicis erant munitae, consuevit<sup>99</sup>, audivit forte ex Athenaeo<sup>100</sup>, folium cynosbati ἀγνώδες dici, seu ἄγνου foliis simile: somnians videtur, aut non recte pronunciante lectore, ἔγνωδες audivisse, quod ita interpretatus est. Mox addit: ferre uvam nigram, in cuius acino nervum habeat, unde nevrospastos dicatur. Si pedem figimus in uva nigra, facilis est transitus ad *Rubum fruticosum*, cuius fructus nigri sunt. Quomodo vero baccarum semina nervos appellare potuerit Plinius, plane ignoro. Namque nevrospasti explicatio apud Salmasium<sup>1</sup>, quod *κυνόβατος* seu *χαμαίβατος* tendiculae aut nervi modo per terram extensus sit ac, utraque inflexus parte, saepe ambulantium pedes trahat, ipseque trahatur, licet admodum ingeniosa, huc tamen haud quadrare videtur.

Flores *κυνόβατου* albi probant, Rosae caninae varietatem albifloram seu collinam Jacq., leucantham Lois. intelligi.

97) Colum. 11, 8. 4. *Κυνόβατος*, quam nos sentem canis appellamus.

98) Lib. 24, 74.

99) Plin. secund. epist. 3, 5.

100) Lib. 2, 87. p. 271.

1) Homon. hyl. iatr. p. 25.



Cap. CXXIV. *Κύπρος* est *Lawsonia alba* Lam., quae L. inermem et spinosam L. complectitur: קָצָה Ebraeorum<sup>2</sup>, *حِنَّا* (*Henna*) Arabum, celebratissima et hodie per totum orientem, tum ob fragrantiam, tum propter fucum, quem capillis folia faciunt. Trita nimirum flavum aut fulvum impertiunt colorem, apud orientis populos gratissimum.<sup>3</sup> In describendo autem frutice magnopere dissentiunt auctores: noster folia cum oleae foliis, fructum cum sambuci baccis comparat: Plinius dicit arborem zizyphi foliis, semine coriandri, candido.<sup>4</sup> Abul Fadli Arabs folia habet myrtum referencia.<sup>5</sup> Neque tamen id tantopere repugnat Dioscoridi, quam fructuum descriptio apud nostrum et Plinium, licet uterque auctor a veritate aberret. Capsula enim, non bacca, est fructus *Lawsoniae*, globosa ea et polysperma: nonnullam habet cum coriandro similitudinem, nisi quod plura contineat semina. Crediderunt tamen, qui primi post renatas literas Dioscoridem exponere auderent, quia fructus cum sambuci baccis comparatur, *κύπρον* veterum esse *Ligustrum* vulgare.<sup>6</sup> Negavit id primus Anguillara<sup>7</sup>; Belonius etiam et Rauwolfius, qui orientem peragrarunt, *Hennam* Arabum cum *κύπρω* eandem esse, ex *αὐτοψία* probarunt.

Ἐν τῇ Ἀσκάλωνι καὶ Κανώπῃ: sic habet Aldina, quam scripturam reliquae omnes editiones repetunt. Scribunt etiam Ἀσκάλων, Ἀσκάλωνος et Strabo<sup>8</sup> et Stephanus Byzantinus<sup>9</sup>, et ipsi LXX<sup>10</sup>: quamquam ebraeum קָצָה sit oxytonon. *Κάνωβον* vero et *Κάνωπον* ad lubitum scribi a veteribus, exploratum habemus. *Κανώπης* adeo insolens est, ut lubentissime in *Κανώβω* mutassem, ni codices adversarentur.

Cap. CXXV. *Φιλλυρέα* est *Phillyrea latifolia* L.

2) Cantic. 1, 14. Apud incolas Nubiae et hodie dici קָצָה (*Khofreh*) Delilius est auctor. (fl. aeg. p. 12.)

3) Belon. in Clus. exot. p. 135.

4) Lib. 12, 51.

5) Apud Cels. hierob. 1. p. 223.

6) Trag. herb. f. 389. et Valer. Cord. in Diosc. f. 19. b.

7) Sempl. p. 60.

8) Lib. 16. p. 348.

9) Voc. Ἀσκάλων.

10) Jerem. 47, 5.

Eam dixerunt Arabes **محاب** (*mahaleb*), commutatam cum *Pruno Mahaleb*. Hermolaus Barbarus et Marcellus Vergilius **φίλλυρα** *Tiliam* vertunt, **φίλυρα** Theophrasti cum hac arbore australi confundentes. Valerius Cordus nil invenit in hoc capite, quod supervacuum declararet, nisi Ligustri descriptionem. Eos errores bene refutavit Matthiolum, Phillyreae veram iconem tradens.

Cap. CXXVI. **Κίστος** in bonis codicibus Dioscoridis invenitur: Galenus autem, Aëtius, Paullus Aegineta cum grammatico Hesychio scribunt **κίσθος**, quam scriptionem nonnulli praeferunt. Neque reticendum est, Arabes ita legisse; scribunt enim **كست** (*kisth.*)<sup>11</sup>

Duas habet species, solo florum colore distinctas; rubro nimirum, quem masculum, et albo colore, quem feminam vocat. Ille est sine dubio *Cistus villosus*, in Europa australi Africaque boreali satis vulgaris, et praesertim foliis subrotundo-ovatis, rugosis, hirsutis insignis. **Στρουρνά** licet austera folia reddiderim, possunt tamen rigida verti. **Στρουρνός** enim saepius **ισχυρός**, **πυκνός**, **στερεός** est apud Lexicographos et Dioscoridem ipsum.<sup>12</sup> *Cistus* femina est *C. salvifolius*, in Europa australi pariter vulgaris.

Cap. CXXVII. **Ἐποκιστής** vel **ὑποκισθίς** est memorabilis ea herba, *Cistorum* radicibus adnascens, quae et hodie *Cytini Hypocistidos* nomine venit. Est autem herba aphylla, squamis imbricatis flavidis obsita, quarum superiores fulvum, inferiores magis lurido-flavum colorem habent. Unde **τὸ κισθόν**, **τὸ δὲ χλωρόν**, **τὸ δὲ λευκόν** exponi potest. Flos campanulatus omnino cum punici floris calyce comparatur.

Optimas nostra aetate icones descriptionesque exhibuerunt Broterus Conimbricensis<sup>13</sup> et Hookerus Glasgoviensis.<sup>14</sup>

11) Avic. p. 245.

12) Lib. 4. c. 15. Cf. Ruhnken. ad Tim. p. 169. 170.

13) Phytogr. lusit. t. 51. Flor. lusitan. 2. p. 36.

14) Flor. exot. 2. t. 153.

Punicum nomen φυλλεσάδε videtur הַפִּי-הַלֵּב, *mirabilis herba campi*.

Cap. CXXVIII. Ladanum seu Ledum variis Cisti speciebus gignitur: plurima fere copia *Cisto ladanifero*, qui omnino longiora et magis nigricantia habet reliquis speciebus folia. Sed, cum nonnisi in Hispania Lusitaniaque inventus sit, ambigendum est, Dioscorides eum intellexerit. Vulgo *Cistus creticus* is esse creditur, quamvis folia nec longiora sint, nec nigriora reliquis. Si colorem Dioscorides floris addidisset, dubia species esse nullo posset modo, quoniam *C. creticus* roseo, ladaniferus albo flore constanter praediti sunt.

Viscositatem excipi a capris pascentibus, quae et barbis et femoribus adhaereat, antiqua est traditio, unde et ἀποτραγοπώγωνα dixit ladanum Asclepiades.<sup>15</sup> Rufi etiam Ephesii versus nobis Galenus servavit:

Ἄλλο δέ που κατὰ γαῖαν Ἐρέμβων λήδανον εὖροις  
αἰγῶν ἀμφὶ γένεια· τὸ γὰρ καταδύμιον αἰεὶ,  
κίστου ἀνθιέντος ἐπέδμεναι ἄκρα πέτηλα.

Quodsi Straboni fides habenda, Ἐρέμβων nomine antiqui Graeci Arabas, praesertim Troglodytas, appellarunt.<sup>16</sup> Unde efficitur, Rufum intellexisse τὸ λάρμινον, εὐωδέστατον θυμιάμα e Sabaeorum regione<sup>17</sup>, quod et Herodotus Arabibus λάδανον dici perhibet, et a depastis fruticibus hircorum barbis adhaerere ob indolem glutinosam testatur. Eo autem praecipue uti Arabas ad θυμιάματα.<sup>18</sup> Vocem esse arabicam λάδανον, verum est. Scribitur enim apud auctores لذان, derivandum a لذ, *suavis*, praesertim odore. Sitne diversum ladanum Arabum a graeco, merito ambigitur. Quodsi enim Herodotus mirabilia illa de capris barba gluten illud detergentibus narrat, in patria Herodoti spontanea esse arabica planta ladanifera non potuit. Plinius etiam<sup>19</sup> traditiones eas repetens, hoc non alibi fieri addit, quam in Nabataeis, qui sint ex Ara-

15) Galen. de comp. med. sec. loc. 1. p. 425.

16) Lib. 1. p. 112.

17) Strabo lib. 16. p. 437.

18) Herodot. 3, 112.

19) Lib. 12, 37.

bía contermini Syriae. In Creta autem iam rastris peculiaribus loreis ladanum depectitur, quod Tournefortius uberrime docet<sup>20</sup>, confirmante nuperrimo teste Siebero.<sup>21</sup>

Cap. CXXIX. Ebeni lignum, per omnem antiquitatem celebratissimum, Ezechieli iam<sup>22</sup> עֵבֶן dictum, plurali nimirum, ut alia ligna, עֵץ, עֵצִים, quia φάλαγγας ξύλων exportare consueverant.<sup>23</sup> Duae species distinguuntur; aethiopica concolor aterrima, et indica, quae lineas albas fulvasque et maculas frequentes habeat. His addit Theophrastus fruticosam, Cytiso similem, quae *Anthyllis cretica* est, ab Honorio Bello<sup>24</sup> et P. Alpino<sup>25</sup> descriptam.

Ebeni arbores in Aethiopia crescere, certissimum est. Namque et Herodotus Aethiopes Persarum tyrannis, post Cambysem, pependisse tributa et ebore et ebeni lignis testatur<sup>26</sup>: et Plinius ebeni arbores ultra Meroën crescere<sup>27</sup> affirmat: et Virgilius eodem iure solam Indiam nigrum ferre ebum canit<sup>28</sup>, quo et Nilum dicit amnem ab Indis devexum.<sup>29</sup>

Optimum autem ebeni lignum deduci e portubus Africae orientalis, praesertim orae, quae hodie Mozambique appellatur, et ex insulis Mascarenis, atque Rumphius<sup>30</sup>, et Aubletius<sup>31</sup>, et Loureirius<sup>32</sup> testantur. Per omnem autem Indiam orientalem crescere, ac praesertim in Cochinchina vastas sylvas habitare, iidem asserunt. Solerter Rumphius investigavit ligna ebeni africana ac cum indicis comparavit: neque tamen potuit, quin iidem arbori assignaret, cum et africani ebeni ligna nonnunquam maculas et lineas variegatas ostendant. Itaque pro varietate habendum indicum, aut exponenda versicolor indoles e raritate maiore, quam

20) Iter gall. 1. p. 29.

21) Iter cret. germ. 2. p. 66.

22) Cap. 27, 15.

23) Herod. 3, 37.

24) App. ad Clus. hist. p. 309.

25) Exot. 2, 32. p. 278.

26) L. c. et c. 114.

27) Lib. 12, 8.

28) Georg. 2, 117.

29) Georg. 4, 292.

30) Herbar. amboin. vol. 3. p. 2. 4.

31) Append. ad flor. guian. p. 141.

32) Flor. cochinch. p. 752.



lignum forte e nimia soli humiditate acquirit. Neque tamen reprehendendi esse videntur, qui *Diospyri* varias species, *Melanoxydon* Roxb., *Ebenum* et *Ebenastrum* Retz. indicum largiri ebenum, *Ebenoxydon verum* Lour. autem aethiopicum, statuunt.

Prunis impositum id lignum cum iucundo odore citraque fumum comburi, Rumphius haud potuit confirmare.

Cap. CXXX. Aurea rosa est *R. lutea* Dalech.: agrestis vero et ἐπιγειος, *R. arvensis*.

Cap. CXXXII. Fruticem, e quo λύκειον veterum parabatur, esse *Rhamnum infectarium* L., quem *Rh. Lycium* Scopoli<sup>33</sup> nominavit, plurima nobis suadent. Protinus vero consensus descriptionis cum ipsa natura. Est enim frutex, cuius rami spinescunt, cuius radices lignosae et validae per rupium fissuras repunt, cuius rami procumbentes subpallidi duos fere cubitos longitudine aequant. Folia etiam elliptico-oblonga, crenulata, venosa, haud immerito cum Buxi foliis conferuntur. Fructus sunt baccati, nigricantes, piper magnitudine et forma aequantes. His accedit, hunc fruticem per omnem Graeciam Asiamque minorem satis esse vulgarem: pigmentum insuper flavum e baccis coqui, quod granorum avenionensium nomine ubique celebratur. Et hodie, nisi medico, technico tamen, usui commodus putatur is succus.<sup>34</sup> Optimus Clusius etiam iam pridem divinavit, hunc esse fruticem, qui lycium largitus fuerit: spinam dixit infectariam primam.<sup>35</sup>

Quantopere alii sint hallucinati, non opus est enumerare. Sic Honor. Bellus Berberim creticam habuit pro frutice, qui lycium dicit.<sup>36</sup> Sic Matthiolus iconem dedit plantae, quam myropola Dalmatus quidam commoda-

<sup>33</sup>) Flor. carniol. 1. p. 163.

<sup>34</sup>) Pet. Arduino memoria, 1. p. 78. t. 14. Smith prodr. fl. graec. 1. p. 157.

<sup>35</sup>) Clus. hist. 1. p. 111.

<sup>36</sup>) Io. Bauhin. hist. 1. b. p. 60.

rat<sup>37</sup>, sed fictam, imo e vano esse haustam, Anguillara docuit.<sup>38</sup>

Lycium indicum etiam magis in dubio est. Videtur fuisse liquor inspissatus fulvus, astringens, ut cum *Kino*, *Catechu* et *Gambir* nostratum comparari possit. Id etiam Garcias ab Orto suspicatus est, quanquam Acaciae speciem ipsam (leucophloeam aut Catechu W.) perperam crederet fruticem ipsum esse indicum<sup>39</sup>: cui repugnant folia olivae similia. Nec maiore iure P. Alpinus Lycium europaeum pro indico habuit.<sup>40</sup> Equidem existimo, lycium indicum fuisse ex illis succis astringentibus; sed fruticem arboremve definiri non posse, priusquam eas omnes arbores cognoverimus, quae Catechu aut Kino largiuntur.

Cap. CXXXIII. *Ananiam* esse *Acaciam veram* Welld., primi peregrinatores Belonius<sup>41</sup> et P. Alpinus<sup>42</sup> probarunt, cum antea *Prunus spinosa* sic diceretur.

Nomen graecum a radice ἀνάζω, ἀνάζομαι, acuo, unde ἀναχμέρος.<sup>43</sup> Aegyptii *ḥiw*, Ebraei *היב*, omisso *י*; Arabes ipsi *قرب* vocant.<sup>44</sup> Esse autem *ḥiw* vocem aegyptiam, Jablonskius<sup>45</sup> et Rossius<sup>46</sup> probarunt.

Altera acacia in Cappadocia ac Ponto spontanea est leguminosa: *Spartium Scorpius*, per omnem Graeciam et Asiam minorem satis vulgaris herba. Primus id auguratus est Anguillara, qui in Corsica invenerat.<sup>47</sup>

Cap. CXXXIV. *Άγρος* est frutex notissimus, *λύγος* quoque dictus, cuius flexiles rami ad opera textilia adhibebantur<sup>48</sup>, e quibus et coronae necebantur<sup>49</sup>: *λύγος πο-λυανθής* Nicandro dictus.<sup>50</sup> Nomen *Άγρος* natum esse διὰ τὸ ἄγονον εἶναι fertur, quia cupidini venereae refra-

37) Comm. in Diosc. p. 168. 38) Sempl. p. 62.

39) Clus. exot. p. 163. 40) De plant. Aegypt. p. 41.

41) Lib. 2, c. 56. in Clus. exot. p. 123.

42) De plant. Aeg. p. 15.

43) Hom. Od. 1, 99. εἰλετο δ' ἄλκιμον ἔγχος, ἀναχμένον δ' εἰ χαλκῷ.

44) Cels. hierob. 1, p. 503. 45) Opusc. 1, p. 261.

46) Etymol. aeg. p. 273. 47) Sempl. p. 65.

48) Hom. Od. 10, 160. et Eustath. ad h. l.

49) Athen. deipnas. 15, 3. p. 446.

50) Theriac. v. 63.

getur, unde et mulieres in thesmophoriis ramusculos eos sibi substernant.<sup>51</sup> Et Paullus suadet iis, qui nimia spermatis abundantia laborent, summitates ramorum ἄγνου sibi substernere.<sup>52</sup> Ἀμικτομίαων est id, quod sine coitu poluit. *Salix marina* est forte *amerina*, quae ad vitem ligandam adhibebatur. Ad Ameriam Umbriae frequens, inde nomen accepit.<sup>53</sup> Aegyptium nomen σοῦμ aut σοῦν a simile radice, quae *vincire* significet, Rossius derivat.

Avicenna habet persicum nomen, بنج‌نکشت (*bendschendschest*) pessime scriptum<sup>54</sup>, cum potius بنج‌انکشت (*bandsch ankuscht*), i. e. πενταδάκτυλον, legendum sit. Namque folia quinata habet *Vitex agnus* seu ἄγνος Graecorum.

Vim esse vitici calefacientem et astringentem, reperitur et a Galeno<sup>55</sup>, quanquam alio loco<sup>57</sup> folia viticis μετρίως ψύχοντα dicat, et ipsum semen, quod frixum mandatur, refrigerans et siccans praebere alimentum.<sup>58</sup> Tam parum sibi constabat vir πολυλόγος et versatilis, ut et, qui altero loco<sup>59</sup> viticis fructus capitis dolores inferre cum Dioscoride perhibuerat, altero<sup>60</sup> haud ferire caput, quomodo cannabis, edisserat.

Cap. CXXXVI. In ἀργιελαία, quae et κότινος et ἐλαία αἰθιοπική dicitur, cuiusque gummi commendatur, diu haesi, donec comparatis omnibus notis illustrantibus, in *Elaeagno*, eiusque variis speciebus, nondum satis distinctis<sup>61</sup>, pedem figi. Matthiolus iam, et qui eum sequuti sunt, *Elaeagnum spinosam* L., *hortensis* Marsch. Bieb. varietatem, oleam sylvestrem nuncuparunt. Haec enim varietas, عثم dicta, et alia, *orientalis*, نجدل appellata,

51) Schol. Nicandr. ther. v, 71. Plin. 24, 38.

52) Lib. 1. p. 11.

53) Virgil. georg. 1. v, 265. Colum. 4, 30. Plin. 16, 69.

54) Etym. aeg. p. 205.

55) Ed. arab. p. 147.

56) De fac. simpl. med. 6. p. 807.

57) De comp. med. sec. loc. 2. p. 554.

58) De alim. fac. 1. p. 650.

59) De fac. medic. simpl. 6. p. 807.

60) De alim. fac. 1. p. 550.

61) Etiam post egregium Ach. Richardi commentarium Mém. de la soc. d'hist. nat. de Paris, 1. p. 675 — 688.

Delilio teste, per omnem Aegyptum et, ut videtur, per ipsam Aethiopiam satis sunt vulgares.

Haec ergo est arbor, quae lacrimam illam largitur, quam et cum scammonia et cum ammoniaco comparat, nostra aetate plane ignotam. Arabum tamen aetate usitatam fuisse, patet e Serapionis descriptione.<sup>62</sup>

Cap. CXLII. Additamentum, quod codd. vindobonenses habent, *νεότροχα, νεότμητα* legendum et *recens secta* vertendum esse puto.

Cap. CXLV. *Τὰ κάστανα*, aut *καστάνια*, aut *τὰς καστανέας* nomen accepisse a Castanide, quae plurimam gignat earum nucum copiam, iam Nicander docuit.<sup>63</sup> Duas urbes scholiastes nominat, alteram in Thessalia, alteram in Ponto: circa utramque abundare castaneas. Thessalicum oppidum et Herodotus<sup>64</sup> et Strabo<sup>65</sup> *Κασθαναίαν* scribunt. Situm id erat in ora maritima Magnesiae, et sub Pelio monte, inter Meliboeam et Sepiada promontorium. De pontica *Καστανίδι* nihil innotescit.

Alteram appellationem, *σαρδιανὰ βάλανοι*, Galenus a Sardibus Lydiae derivat.<sup>66</sup> Eo magis autem fidem meretur, cum patria Galeni, Pergamum, vix quingenta stadia (tredecim milliaria germanica) a Sardibus distaret. Addit Galenus, leucenas quoque appellari a Leucenis, loco quodam Idae montis. Satis vulgaris est appellatio nucis euboicae, *καρούου εὐβοϊκοῦ*, tum in Theophrasto<sup>67</sup>, tum in Athenaeo<sup>68</sup>, quia in ea insula et circa Magnesiam plurimae eius generis arbores proveniant.

*Λιδὸς βάλανος* est nomen castaneae Theophrasto admodum familiare.<sup>69</sup> Aliis dicitur sic iuglans<sup>70</sup>, aliis ipsa avellana.<sup>71</sup> Galenus vero iuglandem *κάρυον βασιλικόν* et avellanam *ποντικόν* appellat.<sup>72</sup>

62) Serap. c. 5. f. 121. b. 63) Alexiph. v. 271.

64) Lib. 7. c. 183. 65) Lib. 9. p. 669.

66) De probis pravisque alim. succis, p. 778. Plin. 15, 25. Athen. 2, 43.

67) Lib. 5, c. 4. 68) L. c.

69) Lib. 3. c. 8. 10. 70) Diocles apud Athen. 2, 42.

71) Hermonax et Timachidas ib. c. 41.

72) Galen. de fac. alim. 2. p. 609.



Supersunt alia cognomina: λόπιμα et μότα. Λόπιμον κάρυον vocarat Nicander in georgicis<sup>73</sup>, sed distinguere a castaneis videtur Aëtius.<sup>74</sup> Venit autem id cognomen a λοπός, seu λένος, ut eum fructum significet, qui decorticiari possit. Galenus diserte: ἄρισται ἐκείναι (αἱ καστα- νέαι) τῶν βαλάνων εἰσίν· ἔνιοι δὲ λοπίμους αὐτάς ὀνομά- ζουσιν.<sup>75</sup>

Μότα denique dicta fuisse suspicor, quia tam facile ventriculū impleant, quam lintea carpta (μότα), quae ad ἀναπλήρωσιν σαρκός Hesychius et Eustathius adhiberi testantur. Itaque nescio, quo iure Agalochus ἄμωτα dicere potuerit.

Cap. CXLVI. Galla (κηκίς) fructus quercus dicitur, sicut antea simile tuber in tamarice (c. 116.) Ὀμφακίτις dicitur optima, solida, parva et tuberculosa, nullis obnoxia foraminibus. Idem cognomen repetit Galenus<sup>76</sup>: alteram, viliorem, speciem a rusticis patriae appellari οἰνοκηκίδα affirmans, pro quo Hermolaus Barbarus ὀνοκηκίδα legit.<sup>77</sup> Non confundenda est ὀμφακίτις cum ὀμφακίδι, quam Paullus dicit esse cupulam glandis quernae.<sup>78</sup>

Cap. CXLVII. De *Rhoë* nulla existere dubitatio potest, esse *Coriariam*, quae per Galloprovinciam, Graeciam Asiamque minorem satis vulgaris est. Fructus s. semen ὁ ῥοῦς, frutex ἡ ῥοῦς dicitur. Sic etiam Theophrastus<sup>79</sup>: ἔχει δὲ τὸ φαρμακῶδες τοῦτο, ὃ καλεῖται ῥοῦς, ἐν αὐτῷ ὀστῶδες (τι), ὃ καὶ τῆς ῥοῦς διητημένης ἔχει πολλάκις. Et Galenus<sup>80</sup>: Ῥόα ξηρανθέντα καὶ κοπέντα τοῖς ὄψοις ἐπιπάττεται, καθάπερ καὶ ὁ κυρίως ὀνομαζόμενος ῥοῦς. Aspergebatur igitur pro sale obsoniis.<sup>81</sup> Vocatur a Plinio et *Rhus erythros* et *Rhus syriacus*; et a Geoponicis ῥοῦς συριακός.<sup>82</sup> Nicol. demum Myrepsicus ad eandem composi-

73) Athen. 2, 43. 74) Lib. 1. p. 45.

75) De fac. alim. 2. p. 621.

76) De fac. medic. simpl. 7. p. 25. 77) Coroll. 155.

78) Paull. Aeg. lib. 3. p. 97. ἔστι δὲ τὸ κοῖλον, ἐξ οὗ ἐκπέφυκειν ἡ τῆς δρυὸς βάλανος, ὥπερ οἱ βυρσεῖς χρῶνται.

79) Hist. pl. lib. 5. c. 18.

80) Expos. voc. Hipp. p. 554.

81) Plin. 24, 55. 82) Lib. 16. c. 3.

tionem tanquam diversos succus commendat, ῥοῦν μαγειρικόν, συριακόν et βυρσοδεψικόν<sup>83</sup>, quanquam ex hoc ipso Dioscoridis loco pateat, ex uno frutice rhoëm culinarem et coriariam peti. Idem compiler Myrepsicus σουμάκιν iterum distinguit.<sup>84</sup> Est autem arabica appellatio سماق (*som-mák*) Rhois obsoniorum, qui et تمتم (*tomtom*) appellatur.

Descriptio fruticis apud Theophrastum paullo melior est ea, quam Dioscorides profert. Folia enim apte cum foliis ulmi comparantur, villosa indoles indicatur et opposite pinnata. De florum thyrsos composito ita loquitur, ut τὸ ὀλοσχερὲς ὀστλιγγας ἔχειν dicat, ὥσπερ καὶ ὁ βότρυς: pectinatos igitur habere cincinnos, quales uva. Dein etiam utrumque sexum fruticis dioeci distinguit. Noster folia declarat serrata et colore subrubra, qui color nimia oxygenis copia in his fruticibus generatur. Is acor in fructibus Rhois praevallet, ut et hodie a Turcis obsoniis inspergatur ad acorem gratum conciliandum.<sup>85</sup>

Cap. CXLVIII. Palmas et Phoenicem inprimis dactyliferam praeter Aegyptum in omni oriente satis vulgares esse, tritissimum est. Fructus autem eodem nomine antiquitus insignitos fuisse ac arborem, φοινίκων nimirum, Galenus perhibet, recentiores tamen compositum nomen φοινικοβαλάνων praetulisse.<sup>86</sup> Insigne est discrimen inter χυδαίους φοίνικας, *vulgares, sylvestres*, e quibus palmeum vinum confici noster docet<sup>87</sup>, et καρπωτούς, seu καρπωτίδας, praestantissimos, molles dulcesque, qui praesertim in Iudaea circa Hierichuntem culti praedicantur<sup>88</sup>: quos tamen gens Iudaeorum, ex invidia romani nominis et numinum contumelia, χυδαίους appellavit.

Fructus is recens et mollis cum μυρσοβαλάνω comparatur, haudquaquam cum eo fructu, quem Arabes pri-

83) Sect. 10. c. 3. 84) Sect. I. c. 155.

85) Sestini Briefe, 2. p. 143.

86) De fac. alim. 2. p. 606. De prob. pravisque succ. alim. p. 779.

87) Lib. 5. c. 40.

88) Galen. de fac. alim. 1. c. Plin. 13, 9.

mi introduxerunt, cuiusque prima fere mentio fit in spurio libro Aristotelis de plantis, byzantinae certe aetati seniori tribuendo<sup>89</sup>: sed cum glande unguentaria, βαλάνω μυρεψικῇ. Hinc Plinius duplicis arguendus est erroris, si de palma loquitur, quae myrobalanum ferat<sup>90</sup>: nisi cum Reinesio<sup>91</sup> legere malueris: Palma, quae *prae se fert* myrobalanum: sed glandem potius unguentariam vertere debebat. Hic recens fructus dicitur πόμα, quod πόσιν reddit Hesychius. Idem est, quem Plinius et ἄδιψον nominat. Sunt enim fructus immaturi multo sapidiore et melius sitim extinguunt: ut et ii, quos Aristoteles ἀνόρχους, aut εὐνούχους, vocarat, quod sine nucleo essent<sup>92</sup>, quales et in Africa boreali Desfontainius invenit.<sup>93</sup> Caput afficere et Plinius testatur, nomen καρωτοῦ inepte ab hoc affectu derivans.<sup>94</sup>

Arabes hanc palmam نخل (nakhl), fructus تمر (tamr) vocant: distinctis tamen بلح (balah) et رطب (rotab), illo immaturos, hoc maturos fructus signante. Prae-stantissimi fructus dicuntur جميع (dschamia).

Cap. CXLIX. Palmas thebaicas singulare id constituere genus, quod *Hyphaenen coriaceam* Gärtnerus vocavit, Delilius vero *Cuciferae thebaicae* nomine egregie descripsit<sup>95</sup> et eximie pingi curavit<sup>96</sup>, facile sibi aliquis persuaserit, qui patriae rationem habuerit. Attamen, etiamsi in Aegypto superiore proveniat haec palma, admodum tamen rara est, et a Theophrasto vel κόῦξ vel κουκιοφόρον vocatur<sup>97</sup>, qui ipse satis magnam fructus differentiam exponit, qua a palmarum vulgarium fructibus recedit.

Itaque credo, palmas thebaicas phoenicis vulgaris esse varietatem, quam et Strabo citat: ὁ ἐν τῇ Θηβαΐδι φοῖνιξ ἄριστος τῶν ἄλλων φύεται . . Διτὸς δ' ἐστὶν ὁ, τε ἐν τῇ

89) Arist. de plant. lib. 2. c. 10. p. 1071. ed. Pac.

90) Lib. 25, 52.

91) Var. lect. 2, 7. p. 172.

92) Athen. 14, 66.

93) Flor. atlant. 2. p. 444.

94) Plin. 15, 9.

95) Mém. d'Egypte, hist. nat. 1. p. 53.

96) Flor. aegypt. tab. 1.

97) Hist. pl. 1, 10. 2, 6. 4, 2.

Θηβαῖοι καὶ ὁ ἐν Ἰουδαίᾳ, ὃ, τε ἄλλος καὶ ὁ καρνωτός· σκληρότερος δ' ὁ θηβαϊκός, ἀλλὰ τῇ γεύσει εὐστομώτερος.<sup>98</sup> Caryoton vocat palmam thebaicam, quo nomine praestantior ceteris varietatibus insigniebatur.

Χαμαῖζηλος φοῖνιξ, ad finem capitis nominatus, est *Chamaerops humilis* L., per oras maris mediterranei vulgaris. Arabibus dicitur واكل (*wakl*), fructus موكل (*mokl*), qua tamen inscriptione Serapion totum de palmis tractatum (c. 148. 149.) comprehendit.

Cap. CL. De ἐλάτῃ φοῖνικος iam c. 54. praecipimus. Sed plura etiamnum exponenda sunt: protinus quidem cognomen ἐλάτης, βόρασσος, seu, ut Sambuci codex habet, βούρασσος, sic et Asulanus. Eam vocem, transpositis literis, ortam esse e بوسر (*bosr*), quo nomine dactyli immaturi appellantur in Arabia, quodque cum ebraico רפ"ב, uva immatura, congruit, existimat Salmasius<sup>99</sup>; quam quidem opinionem nec refutare potis sum, nec firmitus stabilire. Esset itaque βόσσαρος scribendum. Quod vero Linnaeus palmae peculiare genus *Borassi* nomine insigni-  
verit, nominis indigentia duntaxat excusandum est.

Eandem spatham masculi floris σεβένιον Archigenes apud Galenum<sup>100</sup> appellat.

Quod ἐγκάρδιον palmae dicitur, medulla quidem vertitur, sed ea medulla, quae in nostratibus plantis est, carent palmae, sicut et nullo cortice vestiuntur, cum omnis truncus e fibrarum fasciculis, interiecta tela cellulari, constituatur. Arctiores tamen sunt fibrarum fasciculi versus ambitum, laxiores centro, ut hic quidem medulla, quae telam cellularem complectitur, quodam modo assumi possit. Cycas circinalis, e qua medullam, Sago nomine, abundanter obtinemus, et eo a palmis differt, quod concentrica strata fasciculorum fibrosorum et centralem medullam contineat, quod Brongniarus nuper contra Richardium utrumque probavit.<sup>1</sup>

98) Lib. 17. p. 610. 611. 99) Plin. exercit. p. 934.

100) De comp. med. sec. loc. 2. p. 574. Cf. Hesych. voc. σεβένιον.

1) Annales des scienc. nat. tom. 16. p. 594. tab. 20.



In tenello palmarum caudice omnis pars interior, in adulta ea, quae per comam desinit, in proVectiore, saltem quae in verticis gemma conspicitur, medullae similis, mollis est et edulis; substantia tenera et carnosa, albissima. Ea pars excidi sine interitu totius arboris nequit: hinc cupediorum id genus nonnisi e palmis sylvestribus peti solet.<sup>3</sup> Ἐγκέφαλον id summum caudicis fastigium conicum vocat Galenus.<sup>4</sup> Sed adsunt lateralia et ἀπαλὰ βλαστήματα frondium, quae pariter ac spadices immaturi suave edulium praebent. Arabibus dicitur غصن (Gad) ἐγκέφαλος seu ἐγκάρδιον palmarum.

Cap. CLI. De malo punico. Iones scribere ροιάν cum iota, Atticos ροάν sine iota, auctor est Galenus.<sup>5</sup> Idem quam minimum punica mala corpori praebere alimentum, medicamento potius inservire, quia ventriculū roborēt, docet: teste etiā Hippocratico auctore allegato, qui cardialgiā succo punici, cui ἄλφιτον inspersum erat, curaverit.<sup>6</sup>

Dulcia punica caloris aliquantum circa ventriculū gignere, confirmatur et ab Hippocratico auctore.<sup>7</sup>

Πυρῆνες dicuntur, non nostro sensu, semina punici mali baccata, sicut et Hippocratico auctori<sup>8</sup>, quae οἱ κόκκοι Theophrasto et Iulio Polluci, κόκκωνες Hesychio, et τὰ γίγαρτα aptius Galeno vocantur.<sup>9</sup> Τὸ ἀπόθλημα τῶν πυρῆνων est succus e seminibus expressus: cum enim baccata sint punici semina, intra cuticulā externā continent pulpam mucilaginosā acidulā, facile exprimendam.

Caq. CLII. — CLIV. Κύτινος est calyx coloratus superus Punicae, qui sensu latiori omnino flos dici potest. Galenus τὰς πρωτογόνους ροιάς, primogenita punica, sic

3) Kaempfer amoen. exot. p. 689.

4) De fac. simpl. 8. p. 151.

5) De fac. alim. 2. p. 605.

6) Galen. 1. c. p. 604. Hipp. epid. 2. p. 436.

7) Hipp. de diet. 2. p. 689. Ποίᾱς γλυκεῖης ὁ χυλὸς διαχωρεῖται, καυσῶδες δὲ τι ἔχει.

8) Hipp. 1. c. οἱ δὲ πυρῆνες πάντων σιταῖοιμοι.

9) De fac. simpl. 8. p. 115.

10) De comp. sec. loc. 9. p. 917.

vocat<sup>10</sup>, et Theophrastus diserte: ἐν κυτίνῳ ἄνθος ῥοῶς.<sup>11</sup> Nicander: σίδης πρωτόγονον κυτίοιο αἰδήμονα καρπὸν dicit<sup>12</sup>: ubi Scholiastes: κύτινόν φασι τὸ ἄνθος τῆς ῥοῶς, ὅπερ αὐξηθὲν ῥοιὰ γίνεται. Calyx enim persistens inferne in baccam grandem intumescit, unde *ampullagium* Caecilius Aurelianus κύτιον vertit.<sup>13</sup>

Sed noster alio sensu κύτιον totum florem Punicae cultae vocat, βαλαύστιον autem florem sylvestris: in quo et Galenus consentit.<sup>14</sup> Plinius simpliciter balaustium florem dicit punicae arboris<sup>15</sup>: quod alio loco uberius ita exponit: „In hoc ipso cytino (calyce) flosculi sunt: antequam scilicet malum ipsum prodeat, erumpentes, quos balaustium vocari diximus.“<sup>16</sup>

Σίδια esse τὰ λέπη fructus noster, τὰ λέμματα Galenus scribit. Sunt autem cortices baccarum exteriores, forte una cum dissepimentis loculorum. Nomen a σίδῃ, cognomine ῥοιᾶς boeotico.<sup>17</sup>

Cap. CLV. Myrti varietates plures antiquis iam cognitae fuisse patet. Differunt autem potissimum foliis magis minusve lanceolatis, latioribus et angustioribus, acutis, acutiusculis et obtusiusculis; tum fructibus, qui vel coerulescunt, vel nigri sunt, vel albidii. Postrema varietas Clusio dicitur Myrtus domestica fructu albo<sup>18</sup>; habet autem folia minima, lineari-lanceolata. Myrtus nigra Dioscoridis est latifolia italica vel baetica.

Vinum myrtites crapulam arcere, et ab Aëtio confirmatur. Quin coronam myrteam, quae Naucraticis appellabatur, reprimere exhalationes e vino, Philonides apud Athenaeum docet.<sup>19</sup>

Cap. CLVI. Μυρτιδάνου diversae sunt significationes in veterum scriptis. Hippocratici enim auctores τὸ ἰνδι-

11) Causs. plant. 1, 16. Cf. Hist. pl. 1, 22.

12) Alex. v. 623.

13) Chron. 4, 3. p. 512. ed. Almelov.

14) De fac. simpl. med. 6. p. 847. Βαλαύστιον μὲν ἄνθος ἀγρίας ῥοῶς, οἷόν περ τῶν ἡμέρων ὁ κύτινος.

15) Lib. 15, 54.

16) Lib. 23, 60.

17) Athen. 14, 64.

18) Hist. 1. p. 67.

19) Lib. 15, c. 18.

κόν, dicunt ὁ καλοῦσιν οἱ Πέρσαι πέπερι, καὶ ἐν τούτῳ ἐν στρογγύλῳ, ὁ καλοῦσι Μυρτιδανόν.<sup>20</sup> Itaque fructus subglobosos plantae indicae piperaceae sic vocatur, quem primus Foësius<sup>21</sup>, dein uberius Bodaëus a Stapel<sup>22</sup> perhibuerunt cum cubebis posse aptissime conferri. Sed fruticem ipsum etiam idem Hippocraticus auctor μυρτιδανόν vocat.<sup>23</sup> Ita et Galenus distinguit μυρτιδανόν Hippocraticorum a nostro.<sup>24</sup> Tubera autem ea morbosa mihi videntur, qualia in aliis arboribus γόγγροι Theophrasto, *brusca* Plinio, *Madreures* Gallis, *Marezzi* Italis, *Speckles* Anglis, *Maserkröpfe* Germanis dicuntur. Μυρτιάδας eas in myrti trunco a nonnullis appellari, Galenus testatur.<sup>25</sup> Hinc et loco μυρτίς in Paullo<sup>26</sup> μυρτάς potius legendum. Plinius longe alium sensum cum hac voce coniungit: myrtidanum vocat vinum e baccis myrti paratum.<sup>27</sup>

Cap. CLVII. Arbor constanter apud antiquiores ὁ κέρασος, fructus τὰ κεράσια audiunt. Illa tamen in Geoponicis et aliis recentioribus τὸ κέρασον aut ἡ κερασία dicitur. Nomen a κέρασι, *antennis* navium, quas rami virgati arboris aemulantur. Traditum quidem est: ante victoriam Mithridaticam Luculli non fuisse cerasos in Italia<sup>28</sup>; devectas ab eo ex Ponto, nomen accepisse a Cerasunte, Ponti oppido.<sup>29</sup> Sed explodenda est haec traditio, quoniam cerasi per totam Europam sponte proveniunt, et quia Theophrastus, Diphilus etiam Siphnius, Lucullo maiores, uberius de ea arbore et fructibus edulibus loquuntur. At vero non inficior, nobilitas insitione cerasos e Ponto devectas Luculli aetate fuisse.

Cerasa recentia universim alvum facere bonam, siccata eam sistere, noster docet. Id minus verum, quam

20) Hippocr. de mul. morb. 2. p. 870.

21) Oecon. Hipp. voc. μυρτιδανόν.

22) Ad Theophr. p. 1009.

23) Hipp. de mul. morb. 1. p. 656. μυρτιδανόν κλωνία δύο ἢ τρία.

24) Explan. voc. Hipp. p. 528.

25) De fac. simpl. 7. p. 82. (Cf. c. 21.) 26) Lib. 7. p. 248.

27) Lib. 14, 19.

28) Plin. lib. 15, 30.

29) Larensius apud Athen. 2, 35.

dum consilium ad varias cerasorum species transfertur. Quod Galenus fecit, dum dulcia cerasa ab acidis, haec autem ab austeris distinguit.<sup>30</sup>

Cap. CLVIII. *Κεράτια* sunt legumina *Ceratoniae Siliquae* L., quae, isthmis intercepta, pulpa farcta sunt, in qua semina nidulantur. Pulpa ea mellea saginantur pecora: quodsi vero diu in cratibus legumina quieverint, pulpa ea et hominibus edulis fit, quanquam parum sapidum habeat. Arbor Ionibus *κερωνία*, fructus *σῦκα αἰγύπτια* Theophrasti tempore dicebantur.<sup>31</sup> Is autem falli omnes, qui ea appellatione utantur, docet, quia in Aegypto neutiquam crescat, sed in Syria, Cnido Rhodoque insula. Hallucinari tamen Theophrastum, patet ex omnium, qui nuper Aegyptum obierunt, relationibus.<sup>32</sup> Vocatur ibi arabice *خروب* (*kharrûb*), unde *Caroba* Italorum, *Caroubier* Gallorum. Namque in omnibus mari mediterraneo finitimis regionibus vulgaris est arbor. Romani siliquas graecas fructum dicebant<sup>33</sup>, et quam tenuem habuerint escam, patet ex Horatio<sup>34</sup>: unde et parabola de filio de genere lucem accipit.<sup>35</sup>

Quam vulgaris fuerit fructus, vel inde elucet, quod ponderis species e seminibus desumeretur. *Ὄβολός* enim aequiparabatur sesquilupino (*ἔχει θέρμον ας'*): lupinus *κεράτια β'*: *κεράτιον χαλκοῦς β'* continebat. Scrupulus vero (*τὸ γράμμα*) sex habebat *κεράτια*<sup>36</sup>, unde patet, *κεράτιον* pondus fuisse tribus granis nostris cum triente aequale. Id ponderis nomen transiit tandem in mercatorum et artificum gemmariorum sermonem, ut aurifabri grana duodecim, quatuor vero gemmarii *karatum* vocent.

30) Galen. de fac. simpl. 7. p. 22.

31) Theophr. hist. pl. 4, 2.

32) P. Alpin. de plant. aeg. p. 8. 9. Forskol. fl. aeg. p. 77. Delil. fl. aeg. p. 31.

33) Colum. 5, 9.

34) Epist. 2, 1. v. 123. „Vivit siliquis et pane secundo.“

35) Luc. 15, 16. *Καὶ ἐπεθύμει γεμίσαι τὴν κοιλίαν αὐτοῦ ἀπὸ τῶν κερατίων, ὧν ἡσθιον οἱ χοῖροι.*

36) Cleopatr. apud Galen. opp. tom. 4. p. 467. ed. Basil. Marcell. Burdigal. p. 244. ed. Steph.



Cap. CLXI. *Μελίμηλα* dicebantur poma, in cydonias insita, quae inde dulcedinem singularem adipisci credebantur.<sup>37</sup> Hinc et *γλυκύμηλα* vocabantur, quod cum Serapion scripserit غلقومل, غلقومل legit interpres iudaeus, et *galopomella* reddidit.

Cap. CLXII. Si epirotica poma eadem sunt, quae latine orbiculata vocantur!, durabilibus etiam adnumeranda sunt; Palladius enim perennare dicit.<sup>38</sup> Astrictionem his esse iucundam, cum dulcedine coniunctam, atque stomacho eximie conferre, Athenaeus testatur.<sup>39</sup> Similia iis esse Mordiana, quae pulcherrima Apolloniae nascantur, Mordia cognominatae. Idem est oppidum Apollonia Pisi-diae, Mordiacum olim nuncupatum.<sup>40</sup> Orbiculata in Epiro primum provenisse, Plinius tradit, unde epirotica Graecis dici.<sup>41</sup>

Cap. CLXV. Mala armeniaca a Romanis *praecocia* fuisse appellata, nemini non notum est. Sed quaeritur, sintne nostra armeniaca. Plinius tradit, persica mala post autumnum maturescere, aestate *praecocia*, quae igitur varietatem signant, *avant-pêches* Gallis dictam.<sup>42</sup> Accedit, prunorum varia genera Arabibus dici برقوق (*berkûk*). An ergo ex hoc nomine *praecoca* Columellae<sup>43</sup>, *πρεκόκνια* Galeni<sup>44</sup>, *praecoqua* Martialis<sup>45</sup>? Galenus saltem distinguit *πρεκόκνια* ab armeniacis, illa meliora habens: et Martialis epigramma:

„Vilia maternis fueramus *praecoqua* ramis:

„nunc in adoptivis persica mala sumus,“

indicare videtur, *praecoqua* potius ad persica mala pertinuisse.

Serioribus Graecis vocantur *βερίκοκνια*<sup>46</sup>, quod iterum magis cum arabica prunorum appellatione, quam cum *praecocibus* Romanorum congruit. Hinc Italorum *Arbri-*

37) Geopon. 10, 20.

38) Febr. 25.

39) Lib. 3. c. 20.

40) Steph. Byz. voc. Ἀπολλωνία. 41) Plin. 15, 15.

42) Plin. 15, 11. 43) Lib. 10, 410.

44) De fac. alim. 2. p. 593. 594. 45) Lib. 13, 46.

46) Geopon. 10, 75, 76. Cf. Needham et Nicl. ad h. l.

cocco<sup>47</sup>, Hispanorum *Albaricoque*, Gallorum *Abricot*, patrium *Aprikose*. Hodie armeniaca pruna Arabibus مشمش (*Meschmesch*), persica خوخ (*khúkh*) vocantur.

Cap. CLXVI. Medica mala noster etiam persica nominat, in quo consentientem habet Theophrastum. Is enim, et Mediam et Persidem esse patriam praestantium malorum, quae persica pariter ac medica appellantur.<sup>48</sup> Hinc et κίτριά ea esse et ἐσπερικὰ μῆλα, recte Athenaeus iudicat<sup>49</sup>.

Cap. CLXVII. Nostri aevi medicis haud placebit Dioscoridis praeceptum, pyrorum omnia genera astringere, ideoque addi ad repellentia cataplasmata. Videntur tamen veterum pyra non solum sera fuisse, aut postautumnalia, ut cum Plinio loquar<sup>50</sup>, quae omnino austeri aliquid habere consuescunt; velut amerina, picentina, Naeviana Celsi<sup>51</sup>, graeca praeprimis Plinii, et in his tarentina, quae ἀπίους Τερεντιανούς Galenus vocat<sup>52</sup>: sed fuerunt multa etiam genera, quae mitescendi celeritate et abundantia succi praedicabantur; ut crustumia, cunctis gratissima, mustea Plinii, quae mûlsa Columellae, falerna et favoniana. Haec minus astringunt, quam stomacho apta sunt, ut Celsus recte perhibet. Quin Galenus pyra omnia stomacho grata declarat<sup>53</sup>: illita autem desiccare et modice refrigerare, unde vulnera egregie glutinare ea docet. Pyra sylvestria autem celerius glutinare et fluxus reprimere.

Cap. CLXIX. CLXX. Mespili duo genera enumerat, ἄρωνίαν et ἐπιμηλίδα. Illa sine dubio est *Mespilus Azarolus* Smithii, per Graeciam et Europam australem vulgaris, fructibus rubris, sapidis, paullum astringentibus praedita, in quibus terna aut quina ossicula latent. Sibthorpius quidem *Mespilum tanacetifoliam* Sm. pro μεσπίλω primo Dioscoridis habet, quia et hodie τρικοκκιά nomi-

47) Caesalpinus (de plant. 2, 16.) *Baracocca* vernacula lingua dici asserit.

48) Theophr. hist. plant. 4, 4. 49) Lib. 3. c. 25. 26.

50) Lib. 15, 16. 51) Lib. 2. c. 24.

52) De comp. sec. loc. 9. p. 289.

53) De fac. simpl. med. 6. p. 834.

netur, sed fructus haud adeo edules, minores, flavicundi sunt, nec folia cum ὄξυακάνθης conferri possunt.

Nomen triviale Azarolus, quod primus, ni fallor, Caesalpinus<sup>54</sup> adhibuit, sine dubio ex arabico زعرور (zārūr) corrupto natum est. Ita enim nostra arbor apud Serapionem et Avicennam appellatur.

Altera mespilus, ἐπιμηλὶς et σητάνιος nominata, *Mespilus* nostra *germanica* est, quae per Thraciam, Italiam Germaniamque provenit. Σητάνιος et in Theophrasto occurrit: Idae enim montis incolae distinguere eam ab ἀνθηδόνι, quae *Mespilus tanacetifolia* Sm. est.<sup>55</sup>

Cap. CLXXI. Λωτὸς τὸ δένδρον est λωτὸς τῶν λωτοφάγων<sup>56</sup>, λωτὸς λεβυκός Theophrasti<sup>57</sup>, cuius descriptionem optimam Polybius<sup>58</sup> dedit. Esse arborem medio-crem, spinosam, foliis Rhamni, sed latioribus: fructum initio baccis myrti albis similem, dein vero grandescere, rubere et olivas aequare, nucleum parvum inesse. Suaeveolentem esse, et caricas aut dactylos sapore aemulari. Vinum etiam inde parari, sed haud perennans.

Theophrastus disertis verbis duo describit loti genera, alterum lotophagorum, cyrenaicum alterum. Posterior vero pyro esse simile, folio inciso serratoque: huius lignum esse praestantissimum, unde et ad tibias faciendas adhiberi. Scylax etiam Caryandensis, antiquissimus geographus, Dario nimirum Hystaspi tempore aequalis, duo iam genera loti discriminat; alterius fructum edulem nuncupat, ex alterius autem vinum confici.<sup>59</sup>

Nostra aetate Desfontainius utrumque genus clare exposuit: cum lotophagorum arbusculam in ora Africae borealis ea invenisset, quae deserto Barca ab occidente est finitima. Ibi sinus est inter utramque syrtem<sup>60</sup>, in cuius ora *Zizyphum Lotum* Lam. copiose invenit.<sup>61</sup> Altera vero lotus est *Celtis australis*, cuius lignum et hodie

54) De plant. 3, 14.

55) Theophr. hist. plant. 3, 12.

56) Herod. 4, 177.

57) Hist. pl. 4, 3.

58) Athen. 14, 65.

59) Peripl. p. 114. ed. Gronov.

60) Scylax l. c. Plin. 5, 4.

61) Act. Acad. paris. 1788. p. 443.

admodum celebratur. Nigricans est, durum, ponderosum, alburnique expers. Tibias (φώτιγγες) Alexandrini ex hoc ligno confecerunt<sup>62</sup>, et in Graecia ipsa tibiae nomen λιβύς λωτός, λιβύς αὐλός impertiebatur.<sup>63</sup>

Arabes dicunt Zizyphum Lotum سدر (sadr), fructum vero نبق (nabk). Celtis australis forte المزر (almoss), dicebatur, propter vinosam aciditatem: namque Hispani, innumeras arabicas voces servantes, et hanc arborem Almez vocant, Galli Micocoulier, Perlaro Itali.

Cap. CLXXII. Κρανία, κρανείη τανύφλοιος Homeri<sup>64</sup>, κράνεια Theophrasti<sup>65</sup>, quam bello bonam Virgilius dicit<sup>66</sup>, est *Cornus mascula* L. Arabes graecam appellationem et suam fecerunt. Cornarii emendatio ὁ δὲ τῶν χλωρῶν ξύλων (loco φύλλων) ἰχώρ confirmatur Plinio.<sup>67</sup> Cetero Galenus foliis singularem adscribit adstringentem vim, ut et maxima possint vulnera glutinare.<sup>68</sup>

Cap. CLXXIII. Τὰ οὔρα, sorba, sunt fructus *Pyræ domesticæ* Smith., vulgo pyriformes. Varietas in hortis culta fructus maliformes fert, τὰ μηλίζοντα οὔρα. Esse autem haec sorba in cibo mespilis suaviora, testatur Galenus: succum quidem esse austerum, ἄνευ τοῦ στρυγνὸς εἶναι.<sup>69</sup> Theophrastus et sorborum et cornorum sylvestrium fructus suaviores esse, quam cultarum, perhibet.<sup>70</sup>

Cap. CLXXIV. Pruna, κοκκύμηλα, dicta fuisse, quasi κόκκυγος μῆλα, patet e Nicandri fragmento.<sup>71</sup> Distinguuntur τὰ βράβυλα, quod prunis minora et acerbiora sint.<sup>72</sup> Itaque videntur fructus esse *Pruni insiticiae*, quos *Kriechen* nostrates, Angli *Bullace* nominant. Arborem hanc appellat Theophrastus<sup>73</sup> σποδιάδα, ob σποδοειδῆ colorem. Ipse enim addit, esse prunum sylvestrem, et hodie Graeci eam in Asia minore nominant ἀγριο-

62) Athen. 4, 80. 63) Eurip. Alc. v. 346. Troad. v. 544.

64) Il. 16, 765. 65) Hist. plant. 3, 4.

66) Georg. 2, 447. 67) Lib. 23, 79.

68) De facult. simpl. med. 7. p. 42.

69) De fac. alim. 2. p. 606. 70) Hist. plant. 3, 2.

71) Athen. 2, 33. p. 190. 72) Athen. l. c. p. 191.

73) Hist. plant. 3, 6.



δαμάσκηιά.<sup>74</sup> Galeni tempore in Asia προῦμνον vocabatur.<sup>75</sup>

Damascena pruna ab omni antiquitate praeferuntur.<sup>76</sup> Optima esse grandia, laxa, cum mediocri astrictione. Sed Galenus et praedicat hispanica seu iberica, quia nihil astrictionis prae se ferant. Ceterum in eo, quod pruna habeat κακοστόμαχα, adversantur Dioscoridi plures antiqui auctores. Sic Diphilus Siphnius pruna esse μέσως εὔχυλα, εὐφθάρτα, εὐέκκριτα, ὀλιγότροφα docuerat.<sup>77</sup> Nec Galenus pruna accusat, quod stomachum offendant, licet minimum corpori alimentum praebeant. Paullus Aegineta pruna simpliciter alvum ducere, recentia magis, minus siccata, perhibet.<sup>78</sup>

Decoctum foliorum e vino paratum faucium affectus, dum colluatur, reprimere, confirmat Galenus<sup>79</sup>; sed taxat Dioscoridem, quod pruna damascena siccata ventrem sistere dixerit, cum et ipsa palam etiam subducant.

Cap. CLXXV. *Arbutus Unedo* est κόμαρος Graecorum, cuius baccae μυαίικυλα dicebantur. Unedonis autem nomen antiquitus aliam habuisse significationem, inde aliquis effecerit, quod Galenus testetur, a rusticis Italiae sic vocari ἐπιμηλίδα, quae *Mespilus* nostra germanica est.<sup>80</sup> Sed Plinius, magis idoneus italicarum rerum iudex, tam diserte de unedone, ea nimirum arbore, quam Graeci κόμαρον vocent, loquitur, ut fructum etiam cum fragis comparet.<sup>81</sup> Itaque deceptum fuisse Galenum, probabile est.

Stomachum offendi esu fructuum ac capitis dolores excitari, confirmatur et a Galeno<sup>82</sup> et ab Athenaeo. Ara-

74) Sibth. prodr. fl. graec. 1. p. 339.

75) Galen. de facult. simpl. medic. 7. p. 33. De fac. alim. 2. p. 619.

76) Galen. de fac. alim. 2. p. 613. Athen. 1. c.

77) Athen. 1. c. p. 192. 78) L. c.

79) De fac. simpl. medic. 7. p. 33.

80) De fac. alim. 2. p. 619. De fac. simpl. med. 6. p. 876.

81) Lib. 15, 28. „Quod solum pomum simile fructui terrae gignitur,“ legendum est.

82) De fac. simpl. med. 7. p. 33.

bibus fructus dicitur التين الدب (*altîn aldeb*), *ficus lupi*, aut عصير الدب (*âzîr aldeb*), *mustum lupi*: arbor ipsa قطلب (*kothleb*). Quod ἀχρωῶδες in esu fructuum noster appellat, id Arabes ita vertunt, ut, in esu remanere aliquid in ore simile ii, quod e comestione ficuum supersit, scribant: sunt autem granula.

Cap. CLXXVI. Ἀμυγδαλῆς nomen grammatici Alexandrini inde derivabant, quod putamen sub cortice viridi multas habeat ἀμυγᾶς, *foveolas* s. *fissuras*.<sup>84</sup> Ebrietatem arceri amygdalis amaris ante potum comestis, in omnium antiquorum ore erat.<sup>85</sup>

Cap. CLXXVII. Pistacia provenire praeprimis in Syria, certum est, vel testimonio Galeni, qui ad Berrhoeam, oppidum Syriae ad orientem Antiochiae, uberiora esse tradit.<sup>86</sup> Non procul ab eo oppidum aliud erat Batna, descriptum a Iuliano imperatore<sup>87</sup>, cuius nomen forte a pistaciorum ubertate derivandum. Namque תפפ, appellatio ebraea pistaciorum<sup>88</sup>, a תפפ, *venter*, derivatur, quia nûces ab altera parte ventricosae sunt. Sic oppidum Gaditanorum propter similem causam תפפ vocatum est.<sup>89</sup>

Sed aliae etiam patriae pistaciorum occurrunt. Theophrastus meminit terebinthi arboris apud Bactros, cuius fructus amygdalis simillimus ad Pistaciam veram nos ducit.<sup>90</sup> Eas terebinthos iam Alexander in Bactriana invenit.<sup>91</sup> Ad Choaspen fluvium Indiae, vel Mediae potius, Nicander πιστάκι ἀμυγδαλόεντα indicat.<sup>92</sup> Psittacen urbem ad Tigrin, e septentrione Selenciae et Ctesiphontis sitam, Stephanus Byzantinus nominat patriam pistaciorum, quae ψιττάκια, more Graecorum recentiorum, Noni<sup>93</sup>, Geoponicorum<sup>94</sup> et Eustathii<sup>95</sup> nominat.

Nomen ipsum persicum est بستق, quod regem no-

83) Lib. 2. p. 194.

84) Etym. magn. v. h. Athen. 2, 39.

85) Plutarch. sympos. 1, 6.

86) De facult. alim. 2. p. 612.

87) Epist. 27. ad Liban.

88) Gen. 43, 10.

89) Ios. 13, 26.

90) Hist. plant. 4, 4.

91) Strabo lib. 15. p. 182.

92) Ther. v. 891.

93) De morb. curat. c. 91. 217. 240.

94) Lib. 10. c. 12.

95) Ad Il. 20. p. 1211.

tare, Hesychius ipse docet<sup>96</sup>: quippe dicebantur regiae nuces, sicut iuglans apud Graecos. Hinc βιστάμια Posidonius Stoicus apud Athenaeum scripsit.<sup>97</sup> Cum vero et پستق scriberetur a Persis, et Arabes eum fructum constanter فستق redderent, scriptiones πιστάμια et φιστάμια aut ψιττάμια ortae sunt, quarum posterior apud eundem Athenaeum exstat.

Ceterum hepatis esse utilissimum hunc fructum, et Galenus testatur<sup>98</sup>: stomachum tamen nec iuvare nec laedere, addit.

Cap. CLXXX. Συκαμινέαν ἢ μορέαν Dioscorides eodem sensu sumit. Ita et Galenus, quanquam antiquum atticum nomen συνάμυνα fuisse et in μόρα transiisse tradat.<sup>99</sup> Et Athenaeus συνάμυνα a solis Alexandrinis μόρα vocari perhibet, neque tamen eo minus et Aeschyli et Sophoclis, utique Atheniensium, testimonia allegat, μόρα ab iis dici, quae serius ita vocabantur.<sup>100</sup>

Adscripta huic capiti appendix a solo Sambuco inventa μόρα ἄγρια praedicat, χαμαιβάτω similia, sed magis astringentia. Quodsi χαμαιβάτος Theophrasti<sup>1</sup> Rubus est caesijs: haec mora sylvestria pertinent ad numerosas huius speciei varietates, quae succum magis astringentem habent.

Cap. CLXXXI. Ficus Sycomorus, ficui vulgari omnino similis, folia habet cordato-ovata, repando-angulata, Mori igitur albae foliis similia. Provenit autem abundanter in Aegypto et Palaestina, שמקמיה Ebraeis, جبير (Dschümmeis) Arabibus dicta. Theophrastus τὸν συνάμυρον ἐν Αἰγύπτῳ nominat ob eandem foliorum cum mori foliis similitudinem: singularem exponit differentiam, quod fructus non e ramis et frondibus, sed e trunco ipso proveniant: fructum haud prius maturescere, quam ferreis

96) Lex. p. 729. Βίσταξ, ὁ βασιλεὺς παρὰ Πέρσας.

97) Lib. 14. c. 61.

98) De facult. alim. 2. p. 612. De fac. simpl. med. 8. p. 102.

99) De fac. alim. 2. p. 385.

100) Lib. 2. c. 86.

1) Hist. pl. 3, 18.

unguibus scalptus sit.<sup>2</sup> Eundem et nostra aetate morem valere, Forskoleus testatur.<sup>3</sup> Galenus fructum cum parva ficu alba comparat: facultatem mediam esse mororum ficorumque: unde nomen sortita sit arbor. Ridiculos autem eos esse asserit, qui externam fructus faciem cum moris pariter ac ficis conferant.<sup>4</sup> Itaque etiam ridiculus Diodorus, qui arborem modo ficos ferre modo mora nugatur.<sup>5</sup>

In Caria et Rhodo sponte crescere, haud facile crediderim, nisi transplantata fuerit ex Aegypto et Palaestina: namque praeter F. Caricam vulgarem, nullam aliam Ficus speciem in Asia minore spontaneam cognosco.

Cap. CLXXXII. In ficu cypria exponenda haereo. Folia a Theophrasto<sup>6</sup> et Plinio<sup>7</sup> ulmi foliis, ab Oribasio platani, a Serapione et Avicenna sycomori foliis assimilantur. Lectiones Dioscoridis variae etiam: sed vetusti codices cum Theophrasto congruunt. Rauwolfius ficum cypriam icone expressit<sup>8</sup>, neque a veritate multum aberrare mihi videor, si ad Sycomori varietates, cultu ortas, accenseo.

Cap. CLXXXIII. Ad caput de ficibus pauca animadvertenda reperio. Protinus vero de *ἐρινεῶ*, quem nomen habere ab *Ἐρινεῶ*, dorica urbe, quae viles producat ficos, Tzetzes est ambignus testis.<sup>9</sup> Sylvestres ficus autem Theophrastus cum omni antiquitate ita vocat. Sed nominari sic etiam a nonnullis *ὀλύνθους* noster asserit. Utrosque tamen fructus Theophrastus ita distinguit, ut τὰ *ἐρίνα* ficos vernaes dicat, *ὀλύνθους*, autem eas, quae folia sequantur<sup>10</sup>: *ἐρίνα* igitur *σῦκα* sunt *ἐάρινα*, cum *ἐρινεοῖς* non confundenda. Galenus probe τοὺς τῶν ἡμέρων *σῦκων* *ὀλύνθους* a τῶν *ἐρινεῶν* *σῦκοις* distinguit.<sup>11</sup>

Cap. CLXXXVII. Persea arbor fructu esculento in

2) Theophr. hist. pl. 4, 2. Diod. Sic. 1, 181.

3) Flor. aegypt. arab. p. 180.

4) De fac. alim. 2, p. 616.

5) Lib. 1. c. 34.

6) Hist. pl. 4, 2.

7) Lib. 13, 15. 8) Append. ad Dalech. p. 21.

9) Ad Lycophr. v. 980. p. 898. ed. Müller.

10) Causs. plant. 5, 1. 9.

11) De fac. simpl. med. 8. p. 155.



hoc capite vel ab auctore ipso, vel a librariis confunditur cum herba *περσίου*, h. e. *στρόγγυ μανικῷ* (*Solanum sodomium*). Fuisse et huius<sup>12</sup> et perseae arboris<sup>13</sup> cognomen, patet e citatis locis. Posterior herba potuit omnino e Persia advecta in patria insaniam produxisse, sed climate mutato vis forte infirmior reddita est. Traditionem eam repetit etiam Galenus.<sup>14</sup>

Nostra arbor procera erat et pulchra aspectu: habitu et foliis cum pyro comparatur: folia habebat sempervirentia: fructum viridiusculum, amygdalae similem, nucleum, ut prunum, sed minorem et haud adeo durum: lignum praedicatur tanquam solidissimum et nigrescens. Haec e Theophrasto.<sup>15</sup>

Praeterea plerique veteres, licet concedant, in sola Aegypto perseam coli<sup>16</sup>, tamen vel a Perseo primo satam<sup>17</sup>, vel ex Aethiopia advectam, et quidem Cambyse imperante, fuisse.<sup>18</sup> In Aethiopia, ad Diram promontorium, ubi arbores myrrhiferae et sycomori crescant, perseam etiam copiosam esse, Strabo testatur.<sup>19</sup>

Interpretes arabici, maxime Beitharides et Abdollatif perseam vertunt *لبخة* (*lebkhat*), unde corruptus locus Avicennae<sup>20</sup> de *النبج* emendandus.

Post renatas literas P. Alpinus Sebesten Aegyptiorum sylvestrem et domesticam ita descripsit ac iconibus illustravit<sup>21</sup>, ut haec quodammodo cum ea effigie congrueret, quam Matthiolus antea ediderat.<sup>22</sup> Meliorem iconem exhibuit Commelynus.<sup>23</sup> Hanc arborem, a Linnaeo *Cordia Myxa* nominatam, Schreberus Perseam esse probavit.<sup>24</sup> Diversam vero protulit Delilius sententiam. Ar-

12) Diosc. 4, 74.

13) Theophr. hist. pl. 2, 2. Galen. de comp. med. sec. loca, 2. p. 569.

14) De fac. alim. 2. p. 617.

15) Hist. pl. 4, 2.

16) Pausan. 5, 14.

17) Nicand. alex. v. 99.

18) Schol. Nicand. ther. v. 764. Diod. Sic. 1, 34.

19) Lib. 16. p. 416. 17. p. 629.

20) Ed. arab. p. 136.

21) De plant. Aeg. p. 50. 51.

22) Comment. in Diosc. p. 237.

23) Hort. amstelod. 1. tab. 7.

24) Usteri Mag. 4. p. 46. s.

borem nimirum eam, quam Forskoleus<sup>25</sup> هالج (*haledsoh*) vocarat, Ximeniam ellipticam L., esse perseam veterum. Cum egregie utramque arborem, Cordiam Myxam<sup>26</sup> et hanc, quam Balanitem aegyptiacam appellat<sup>27</sup>, delineari curaverit, quivis sine negotio iudicare potest, utri arbori respondeat descriptio veterum. Equidem libenter fateor, magnopere me dubitare, quin haec arbor sit perseae veterum. Etenim folia binata ovalia nihil habent cum pyri foliis commune: rami sunt spinis validis armati, de quibus veteres silent. Fructus ipse est viscosus, nec ullam ipse Delilius praedicat suavitatem.

Ne autem quispiam tanti esse momenti existimet, quae Plutarchus, sacerdotum aegyptiorum praestigias proferens, de forma et fructus et foliorum tradit.<sup>28</sup> Isidi sacram fructum ferre cordis, folium linguae effigie: namque altero concipi sapientiam, altero enunciari. Nugae sacerdotales!

Tandem φαλάγγια κρανοκόλαπτα consideratu digna sunt, quae in Thebaide circa hanc arborem obvia sint. Aëtius, ni fallor, solus est, qui paullo disertius de hoc animali agit.<sup>29</sup> Esse phalangium viride, oblongum, quod stimulum sub collo gerat, cuius morsu nascantur capitis dolores, vertigines, alique id genus affectus. Negotium maius facessit, Nicandrum animal versibus illustrare, quod sub foliis Perseae vivat, phalaenae simile,<sup>29a</sup>

τοῦ καὶ σμερδαλέον νέει κάρη αἰὲν ὑποδράξ  
ἔσκληκός, νηδὺς δὲ βαρύνεται αὐτὰρ ὁ κέντρον  
αὐχένι τ' ἀκροτάτῳ κεφαλῇ τ' ἐνεμάξατο φωτός.

Hoc animal recte quidem in scholiis κρανοκολάπτης vocatur; sed quomodo phalaenis simile haberi possit, equidem plane non intelligo. Alius scholiastes addit, in capite stimulum gerere, quatuorque alis praeditum esse. Cum vero insecta nulla tetraptera stimulum capiti affixum gerant, omnis haec quaestio vel penitus deserenda, vel ita

25) Flor. aeg. arab. p. 197.

26) Flor. aeg. t. 19.

27) Ib. t. 28.

28) De Is. et Osir. p. 548. ed. Wyttenh.

29) Tetrab. 4. s. i. c. 18.

29a) Theriac. v. 765.

exponenda est, ut statuamus, dipterum esse insectum e familia tabanorum, *Chrysops* forte aut *Haematopota* quaedam. Haec enim in proboscide aculeos quaternos senosve involutos continent, quibus gravissimas proferunt punctiones.<sup>29a</sup>

## LIB. II.

Cap. I. De *Echino esculento* nulla existere dubitatio potest. Incola maris mediterranei, testam habet calcaream subglobosam, cuius historiam Aristoteles bene adumbravit.<sup>30</sup> Arabes id animal قنفذ (*konfod*) et أطوم (*athûm*) vocant.

Cap. II. Ἐχῖνος ὁ χερσαῖος est *Hystrix cristata*, مدجج (*modadschedsch*) Arabum.

Cap. III. Ἰππόκαμπος: *Syngnathus Hippocampus* nostratum. Mirabilia narrat de usu eorum adversus rabiem caninam Aelianus.<sup>31</sup> Namque per se comestos delirationem et aquae immensam producere cupidinem: ea autem impulsum piscatorem filiis a cane rabido morsis piscem hunc assum alioque modo paratum exhibuisse, eo-que facto salvasse.

Cap. IV. Fabius Columna primus in singulari commentario<sup>32</sup> probavit, plura testaceorum genera pretiosum purpurae colorem largiri. Eum sequutus Mich. Rosa multo doctius varias conchas πορφυροφόρας illustravit.<sup>33</sup> Sunt autem praepimis *Helix ianthina*, testa diaphana, purpureo-violacea; dein *Murex brandaris* et *trunculus*, et aliae forte cochleae, quae florem illum, τὸ ἄνθος, in mediis fancibus gerunt, cuius exigua quantitas pretium mire augebat.<sup>34</sup> Primum locum occupabant tyriae purpurae ant phoeniciae, secundum laconicae.<sup>35</sup>

Cap. V. VI. *Buccina* sunt maxime *Harpa* et *La-*

29b) Meigenii descr. system. insect. europ. 2. tab. 14.

30) Hist. anim. 4, 5. 31) Hist. anim. 14, 20.

32) Purpura. Rom. 1616. 4.

33) Delle porpore degli antichi. Modena 1786. 4. Conferatur etiam Schneiderus in app. annotationum ad Ulloae notit. amer. 2. p. 406.

34) Plin. 9, 60.

35) Pausan. 5, 21.

*pillus*, quorum columellae mediae ob firmiorem compagem ad urendam calcem adhibebantur.

Cap. VII — IX. Miror, Dioscoridem ὀστρέων mentionem non facere, quarum testae ustae a Galeno praeprimis commendantur.<sup>36</sup> Si quid recte intelligo, ostreae videntur id nomen post Dioscoridis aetatem accepisse. Namque antiquiores fere sub ὀστρείοις s. ὀστρέοις ὀστρακοδέσματα comprehendebant, itaque buccina, mytilos, purpuras, tellinas et alia genera. Dein vero a Romanis cupedias eas vorare discentes, Graeci distinxerunt ὄστρεα, familiam totam ab ὀστρέω, genere, quod et nos ostream vocamus. Nec in Platone, nec in aliis scriptoribus, quos Athenaeus citat, ὄστρεον alio ac generali totam tribum complectente sensu invenio. Arabes etiam titulo صدف (*zadaf*) conchas plerasque comprehendunt: بدلان (*bada-lân*) ostream stricto sensu dicunt.

Cap. X. Operculum *Strombi lentiginosi*, ob dorsum verrucosum cum Murice trunculo comparandi, dicebatur ὄνυξ. Id crenatum odorem spirat Valerianae similem. Multo tamen fragrantius est operculum *Pleurotomae babylo-niae* et *Pl. Trapezii*, nigricans. Posterius Ebraeis gratum suffimentum תלהית vocatur<sup>37</sup>, Arabes autem اطغار الطيب (*atsfâr althibh*) vocant. Βλαττίου βυζαντίου nomine Nic. Myrepsicus et Io. Actuarius τὸ ὀστέον ῥινὸς τῆς πορφυρᾶς commendant, quod operculum esse Muricis πορφυροφόρου videtur. Nomen id βλάττιον e latino senioris aetatis derivandum: namque purpura antiquorum a saeculo inde quarto *blatta* dicebatur.<sup>38</sup>

Ceterum traditionibus mercatorum deceptum fuisse Dioscoridem de conchyliis nardum depascentibus in lacubus Indiae, exploratum habeo. Nec enim nardus in lacubus crescit, nec pabulum conchyliorum est. Avicenna aliter haec tradit. Esse nimirum insulam in mari indico, nardi feracem, ubi et ungues odorati inveniantur.<sup>39</sup>

36) De fac. simpl. medic. 11. p. 345.

37) Exod. 30, 34.

38) Bochart. hieroz. 2, p. 616.

39) Ed. arab. p. 128.



Habet plura alia loca, e quibus ungues odorati devehantur, quae vero, ob textum misere corruptum, false forte legimus. Sic بكر القلسم (*bahr alkolsum*), mare rubrum, *Koreisch*, *Mekkah*, *Dschidda* et *Abadan* lego, urbium et regionum arabicarum nomina, quarum pauca illustravit Salmasius.<sup>40</sup>

Cap. XI. *Κοχλίας χερσαῖος* est *Helix Pomatia* nostras, quae apud Romanos in vivariis alebatur.<sup>41</sup> Optimas existimari, quae e Sardinia, Africa, Sicilia, Chio et Astypelaea (insula maris aegaei) advehantur. Ultimas efficacissimas et ipse Plinius habet.<sup>42</sup> Is etiam africanas cochleas ob fecunditatem a Solitanis, quibus nobilitas praecipua tribuenda, distinguit. Habere autem nomen a promontorio Solis in Africa videntur, quia alio Plinii loco<sup>43</sup> ex africanis laudatissimae Solitanae dicuntur. Siculas tamen Plinius mediocres appellat, quoniam magnitudo duras faciat et sine succo.

Quae frutetis et vepribus adhaeret, *Helix* nostra *fruticum* aut *arborum* esse videtur. *Σέσελον* hanc speciem vocari, testatur et Athenaeus ex Epicharmo.<sup>44</sup> Sic et Hesychius: *Σέσηλοι*, *κοχλῖαι*, *Λάκωνες*: pro quo Apellas apud Athenaeum *σέμελον* habet.

Nullas cochleas Plinius docet cibis gratas esse, neque veteres, neque recentes, Fluviatiles et albas virus habere, nec sylvestres stomacho utiles, alvum solvere.<sup>45</sup>

Usum medicum, quem hic exponit Dioscorides, confirmat et Galenus.<sup>46</sup>

Cap. XII. Cancrorum fluviatilium cinerem adversus rabiem caninam magnopere laudat et Galenus.<sup>47</sup> Cum ture et gentiana ita miscet, ut turis pars una, quinque autem gentianae ad decem partes cancrorum sumantur. Eam medicinam paratam semper habuisse Aeschrionem empiricum et Pelopa, utrumque ipsius magistrum; Pe-

40) Homon. hyl.iatr. p. 154.

41) Plin. 9, 82.

42) Lib. 50, 11.

43) Lib. 50, 15.

44) Lib. 2. c. 65.

45) L. c.

46) De fac. simpl. med. 11. p. 555.

47) L. c. p. 556.

lopa caussis etiam huius remedii investigandis operam dedisse.

Cap. XIV. *Σκορπίος θαλάσσιος* est vel *Scorpaena Scrofa* (Bloch t. 102.) vel *Cottus Scorpius* (Bloch t. 40.) Hunc indicant Aldrovandi (de pisc. p. 202.) et Iohnstonius (pisc. t. 47.), nostratibus nomine *Knurrhahn* notum; at, marisne mediterranei sit incola, nescio.

Cap. XVI. *Δράκων θαλάσσιος* est *Trachinus Draco* (Bloch t. 61.), quem nostrates *Petermännchen*, Galli *la vive*, Sueci *Fjärsing* vocant, maribus europaeis communis.

Cap. XVI. *Σκολόπενδρα χερσαία* est *Scolopendra morsitans*: *σκολόπενδρα θαλασσία* videtur *Aphrodite aculeata*.

Cap. XVII. *Νάρκη* est *Raia Torpedo*. Huius usus adversus capitis dolores confirmatur a Galeno.<sup>48</sup> Scribonius Largus, Dioscoridi tempore aequalis, contra podagram suadet torpedinem pedibus subiicere, stantibus in litore, quod mare alluit.<sup>49</sup> Diphilus Laodicensis in commentariis ad Nicandrum perhibuerat, non totum piscem, sed partem duntaxat, succussus electricos producere.<sup>50</sup> Observavit forte a collo potissimum, atque ab animali illo apparatu Voltano, qui circa branchia adest, succussiones eas progredi? Sic et Theophrastus et Clearchus iam animadverterunt, transire torrentem electricum et per fustes aliaque, quae manibus gestentur, instrumenta.

Arabes dicunt piscem *رعد* (*ri'ád*) a rad. *رعد*, *contremiscere, percelli*.

Cap. XVIII. *Ἐχίδνα* et *ἔχis* a plerisque veteribus distinguuntur, ut mas et femina. Et primus quidem Nicander, *ἐχίδνης* variam esse formam magnitudinemque. Minores gigni in Europa, easque super extremis naribus cornutas esse et albidas.<sup>51</sup> Asiaticam vero *ἔχιδναν*, Nicander addit, ulnarem et longiorem esse, capite supra lato, cauda ab extremo corpore mutila, duris horrente squamis,

48) L. c. p. 365.

49) C. 41.

50) Athen. [7, 95.

51) Nicandri ther. v. 210. s.

— Καὶ ὁ ὑπὲρ ἄκρους

ῥώθωνας κεραοὶ τε καὶ ἀργίλιπες τελέθουσιν.

lentoque incessu fluctuare. Contra τὸν ἔχιν caput acutum habere, longitudine varia, crassitudine ventris minore: cauda sub extremo corpore attenuata et squamis attrita. Huius dentes duos esse venenatos, plures vero echidnae, quam toto ore mordere dicit. Aelianus addit, ἔχως morsum spasmos inducere, ἐχιδνῆς secus: locum ab hac morsum pallere: quem ἔχης momorderit, lividum esse.<sup>52</sup> Echidnam asiaticam, eodem modo, quo Nicander, descriptam, commendat et Galenus ad theriacam.<sup>53</sup> Haec ergo esse videtur *Coluber aegyptius*: ἔχης forte *C. Ammodytes*: echidna vero europaea *C. Berus*. Duobus dentibus plures videmus plerumque in *C. Bero*, sunt autem minores principalibus.<sup>54</sup>

De carne viperarum amplius exstat locus<sup>55</sup> Galeni, ubi tum vires eius carnis contra lepram exemplis illustrat, tum modum parandi. In quo notandum est, eum ἄλογον putare caudae resectionem<sup>56</sup>: quanquam alibi diserte dicat, quatuor digitorum mensura amputandam esse.<sup>57</sup>

Cap. XIX. Senectam anguium colligi praeprimis, cum in latebris delitescant, et esse tunc ἐπίπαχόν τινα παχύτατον, Galenus tradit.<sup>58</sup> Memorabile est, ἔχως nomen hic femininum esse, cum praeter Oppianum<sup>59</sup> omnes alii scriptores τὸν ἔχιν masculinum habeant. Cum Oppianus pariter ac noster Cilix esset, huic provinciae peculiaris videtur dictio.

Cap. XX. Leporis marini naturam primus post renatas literas aperuit Fab. Columna iconeque illustravit.<sup>60</sup> Habuit autem *Thetida leporinam*. Sed probabilius arbitramur, *Aplysiam depilantem*, cuius naturam Cuvierus eximie aperuit<sup>61</sup>; ea appellatione designari. De urtica marina (*Actinia senili*) aptius infra disseretur.

52) Hist. anim. 10, 9. 53) De theriac. ad Pison. p. 265.

54) Cf. Schneider ad Arist. hist. anim. tom. 4. p. 419—423.

55) De facult. simpl. med. 11. p. 311. s.

56) Ib. p. 317.

57) De theriac. ad Pison. p. 265.

58) L. c.

59) Cyneget. 3, 439. ὅτε φυσιώσαν ἔχιν πολέεσαν ἰδεῖναι.

60) Aquatil. et terr. observ. ad calc. ecphras. stirp. p. XXVI.

61) Ann. du mus. 2. t. 1—4.

Cap. XXI. Quae de leporis terrestris cerebro, capite aliisque partibus in usum vocandis habet, leguntur etiam apud Galenum. <sup>62a</sup>

Cap. XXII. Τρυγών θαλασσία est *Raja Pastinaca*. Quod quanquam optimorum auctorum testimonio satis stabilitum esse videatur; obsunt tamen quaedam, quae negligere nefas esset. Τὸ κέντρον ἀπὸ τῆς οὐρᾶς πέφυκεν ἀνεστραμμένον ταῖς φολίσιν: difficillimus est locus, quem tangere aut cui mederi non ausus sum, cum consensum librorum animadverterem. Namque φολίδες maximam efficiunt difficultatem, cum, quae in serpentibus sunt, in piscibus λεπίδες dicuntur, nullae plane in *Raja* observentur. <sup>62b</sup> Nihil igitur superest, nisi πτερύγια, pinnus dorsales et abdominales, intelligere. Victa hac difficultate, stimulus haud ἀνεστραμμένος, sed ἀπεστραμμένος est τοῖς πτερυγίοις. Recta enim et stricta directione progreditur sub cauda. Cum autem haec flexa sit ac recurvetur ad corpus, alterutra lectio praeferenda: τὸ κέντρον ἀπὸ τῆς οὐρᾶς αὐτῆς πέφυκεν ἀπεστραμμένον ταῖς φολίσιν: vel: τὸ κέντρον ἀπὸ τῆς οὐρᾶς αὐτῆς πέφυκεν ἀνεστραμμένης ταῖς φολίσιν.

Fabulas de pernicioso effectu, si hoc κέντρον pupugrit piscis vel hominem vel bestiam, saepe repetitas, nolo refellere, neque recoquere, quod narratum est de morte arboris repentina, si aculeus hic defigatur in truncum. <sup>63</sup> Iaponiae contra incolae gestant eundem aculeum tanquam φυλακτήριον contra serpentium morsus. <sup>64</sup>

Cap. XXIII. Difficultatem parit, quod καὲν ἐν τῷ ἰδίῳ ὀστράκῳ dicatur, ἄχρις οὗ τὸ πλακῶδες αὐτοῦ ἀποστῇ. Si καὲν referatur ad ὀστρακον praecedens, absurda foret dictio. Duplici autem ratione illustrandus est locus. Vel enim intelligitur: καὲν τὸ ζῶον σὺν ἰδίῳ ὀστράκῳ: vel, quod magis placet, respicitur ad duplicem ossis sepiae sub-

62<sup>a</sup>) De facult. simpl. 11. p. 354.

62<sup>b</sup>) Aelian. hist. anim. 11, 37. Καλεῖται δὲ σελάχεια, ὅσα οὐκ ἔχει λεπίδας· εἶεν δ' ἂν μύραινα, γόγγρος, νάρκη, τρυγών κ. τ. λ.

63) Aelian. hist. anim. 8, 26. Plin. 9, 72.

94) Kaempferi iter iapon. germ. p. 165.



stantiám, externám laevem et fere siliceam, internam grumoso-crustaceam. Posteriori sensui accommodata est nostra interpretatio. Ceterum Galenus cum fossili sale mixtum os sepie adversus pterygia oculorum commendat.

Cap. XXIV. Ἡ τρίγλη est *Mullus barbatus*, cupe-  
diae gulosorum. Τρίγλην, non τρίγλαν, scribendum esse,  
Athenaeus docet.<sup>65</sup> Idem iam barbatum (γενεᾶτιν) a ve-  
teribus vocatum fuisse asserit. Carnem esse duram, pin-  
guedinis expertem valdeque nutrientem, et Diocles apud  
Athenaeum et Galenus<sup>66</sup> docent. Quam immensi pretii  
a gulonibus romanis emti sint nulli, vel e Plinio<sup>67</sup>, Sue-  
tonio<sup>68</sup>, aut Iuvenali<sup>69</sup> constat. Tantaque erat luxuria,  
ut parvi penderetur recens mullus, nisi qui in ipso con-  
vivio, γαρελαίῳ vinoque exstinctus, vitroque inclusus, mo-  
riretur, ut iucundissimo aspectu continuo mutatorum ex-  
spirantis piscis colorum fruerentur convivae.<sup>70</sup>

Cap. XXV. Testiculorum hippopotami laudes contra  
serpentium morsus e Nicandro forte mutuatae sunt. Is  
enim suadet:

— ἡ κάστορος οὐλοὸν ὄρχιν  
ἡ ἵππου, τὸν Νεῖλος ὑπὲρ Σαῖν αἰθαλόεσσαν  
βόσκει.<sup>71</sup>

Plinius quoque drachmam testiculi huius ex aqua bibi  
tradit.<sup>72</sup>

Cap. XXVI. Cum piscibus et cancris in fluminibus  
degere fibros, verum est, sed falsum, eos piscibus can-  
crisque nutriri. Sic autem Serapio vertit. Ceterum no-  
tabile est, castoreum arabice dici جند بادستار (*Dschond  
bâdestar*), cuius derivationem ignoro.

Mirabitur autem quispiam, castorei folliculos conti-  
nuo testes (ὄρχεις) dici, et cum suillis comparari, cum  
tamen ipsá dissectio τῶν φουσῶν doceat, alienam esse fa-

65) Lib. 7. c. 125.

66) De fac. alim. 3. p. 715.

67) Lib. 9, 31.

68) Tiber. c. 34.

69) Sat. 4. v. 15.

70) Senec. quaest. nat. 3, 17. 18. Mirabiliorem etiam colorum  
mutationem observarunt in expirante Coryphaena Hippuro. (Bloch  
tab. 174.)

71) Ther. v. 565. s.

72) Lib. 28, 31.

bricam a testium structura. Sed perstitit is error, donec a Rondeletio edoctus Matthiolus folliculorum eorum situm et ductus excretorios in vivo animali indagasset, quo facto et ipse et Saracenus sibi persuaserunt, esse organa huic animali peculiaria, neque cum testiculis confundenda.

Efficacissimum castoreum veteres habuerunt ponticum.<sup>73a</sup> Ex Africa etiam Plinius, ex Hispania Strabo advehi, licet vilius, asserunt. Iam rarissimi fibri in Gallia narbonensi, in Garumna, Rhodano et Matrona fluviis, in Danubio et Albi paullo frequentiores: in Vistula, Borysthene, Duina, Volga et fluviis Sibiriae ac Canadae praeprimis aestimantur.<sup>73b</sup>)

Magnopere differt Galeni tractatus de castoreo a nostro. E ratiociniis potissimum statuit calidam volatilemque naturam huius remedii, quod commendatu dignum habet praeprimis in iis spasmodis, qui a plenitudine oriri dicuntur.<sup>74</sup> Noster vero, soli experientiae confisus, ea omnia congerit, quae observatio docuisse videretur.

Cap. XXVII. *Γαλή κατοικίδιος* non est felis, sed mustelae species, quae cicur ad captandos mures, glires aliasque eiusmodi bestiolas adhibebatur; sicut e Turditania Hispaniae africanae mustelae ad venandos cuniculos instructae magna abundantia Puteolos Ostiamque exportabantur.<sup>75</sup> Quatenus vero fuerit Mustelae species, merito ambigitur: equidem nec *M. vulgarem* (*Wiesel* nostratum, *la belette* Gallorum, *la donnola* Italicorum, *Weasel* Anglorum) habeo, quia magis Europae boreali familiaris est; nec *Mustelam Foinam* (*Steinmarder* Germanorum, *la fouine* Gallorum, *la martora* Italicorum, *the martin* Anglorum) quia ob foetorem *κατοικίδιος* esse nequit. Neque crediderim, *M. Furonem*, quam *Frettchen* nostrates, *le furet* Galli, *furetto* Itali, et *ferret* Angli vocant, hanc esse veterum *γαλήν*, etiamsi Buffonius in eam abeat sen-

73<sup>a</sup>) Strabo lib. 3. p. 437. Plin. 32, 13.

73<sup>b</sup>) Herodotus (4, 109.) fibros apud Gelonos, graecam nationem prope a meri caspio (*λίμνη μεγάλη*) indicat.

74) De fac. simpl. medic. 11. p. 337.

75) Strabo lib. 3. p. 386. Hinc dicitur *γαλή ταρτησία* Aelian. var. hist. 14, 4.

tentiam.<sup>76</sup> Est enim, Blumenbachio teste, varietas potius *M. Putorii*, cum qua etiam copulatur: venatrix ea nostrorum cuniculorum recentioribus temporibus tandem orta esse videtur, cum nusquam fera, sed usquequaque sit cicur. Superest *Mustela sardoa*, *Boccamele* in australibus eius insulae, *Donnola di muro* in borealibus dicta, quam facillime cicurem reddi, mellis iuxta ac cuniculorum avidam esse, Cettius, Mimaut et Marmora, novissimi Sardiniae descriptores, testantur. Vero est simillimum, hanc esse *Mustelae* speciem, quam Shawius in Africa boreali invenit, نمس (*Nems*) incolis dictam.<sup>77</sup> Ex Africa autem facillime in Hispaniam et Sardiniam transvehi potuit.

Aristoteli dicitur ἰκτις, quam τιθασσὸν γίνεσθαι σφόδρα, τὰ δὲ σμήνη κακουργεῖν, τῷ γὰρ μέλει χαίρειν asserit.<sup>78</sup>

Huius mustelae carnem arefactam in comitiali morbo salubrem et Galenus praedicat.<sup>79</sup>

Cap. XXIX. Σίλουρος est lectio codd. C. et N., tum et Plinii<sup>80</sup> et Paulli Aeginetae<sup>81</sup>, et interpretum priscorum. Serapion cum vertat حرب (*hherba*), quod chamaeleontem signat, legisse videtur αἰολοῦρος. Quae lectio si unquam affuit, tum variegatos caudae colores, tum mobilitatem eius significat: ab Hesychio enim αἰόλος redditur et ποικίλος et εὐκίνητος. Simili modo Alexandrini veteres σίλουρον dictum esse παρὰ τὸ σεῖν τὴν οὐράν scribunt:<sup>82</sup> quanquam Bochartus malit σίλουρον vocari loco ψιλοῦρον, quemadmodum ψίττακος in σίττακον mutatus sit.<sup>83</sup> Quae quomodo cunque se habeant, αἰλουρος scribitur hic piscis et a Galeno<sup>84</sup>, quem sequuntur nostro loco Aldina cum senioribus editionibus.

Est vero *Silurus Glanis*, quem etiam γλανίδος no-

76) Hist. des anim. quadrupèd. 7. p. 255.

77) Iter afric. 1. p. 311. 78) Hist. anim. 9, 7.

79) De fac. simpl. 11. p. 321. 80) Lib. 32, 31.

81) Lib. 7. p. 253. 82) Athen. 7, 27.

83) Hieroz. 2. p. 752.

84) De fac. simpl. 11. p. 321.

mine Aristoteles<sup>85</sup>, Athenaeus<sup>86</sup>, Aelianus<sup>87</sup> et alii descripsisse dicuntur. Dubium tamen movet Pausanias, qui τὰς γλάνεις Hermi et Maeandri similes quidem esse ταῖς γλάνισιν Istri et Rheni, Nili et Euphratis asserit, quae ἀνδροφάγοι sint: colore tamen distingui moribusque.<sup>88</sup>

Cap. XXX. Σμάρις est *Sparus Smaris* L., quam alii μαρίδα, alii κυνὸς εὐνά (εὐνάν) vocarunt.<sup>89</sup> Aristoteles mutare colorem τὴν σμαρίδα, ac ex albido nigrescere, dum ver instet, tradit.<sup>90</sup>

Ἴηλος, qui absumi dicitur capite smaridis usto, est clavus pedum, callosum tuberculum e pressione ortum.<sup>91</sup> Θύμος, quod θύμιον Celsus appellat, est tuber verruculosum, asperum, rubescens et facile cruentum, quod vel maxime in obscoenis partibus obvium, aliis tamen locis infestum erat.<sup>92</sup>

Cap. XXXI. Μαινίς est *Sparus Maena*, piscis in mari mediterraneo et atlantico satis vulgaris, quem la Mendole Galli, *Laxirfisch* Germani vocant.<sup>93</sup> Et hunc colorem mutare eadem, qua σμαρίδα, ratione, Aristoteles testatur.<sup>94</sup> Galenus, quemdam capita μαινίδων sale condita ac usta ad sedis fissuras adhibuisse et ad uvulam diu induratum, refert.<sup>95</sup>

Cap. XXXII. Κωβιός est *Cottus Gobio*, quem nostrates *Kaulkopf* vocant, piscis fluviatilis et, si qua in maribus occurrit, πρόσγειος, dum et ova in arenam sub saxis et lapidibus occulit.<sup>96</sup> Κώθωνα vocasse Siculos eum

85) Hist. anim. 8, 20. 86) Lib. 7. c. 88. 120.

87) Hist. anim. 12, 14. 88) Pausan. 4, 34.

89) Athen. 7, 92. 137. Coray emendavit: κυνὸς οὐράν. Schweighäuser ad Athen. h. l. tom. 4. p. 335.

90) Hist. anim. 8, 29.

91) Paull. 6. p. 208. Ὁ μὲν ἴηλος τύλος ἐστὶν περιφερὴς, λευκὸς, ὁμοιωμένος ἴλου κεφαλῇ, μάλιστα ἐν τοῖς πέλμασι τῶν ποδῶν καὶ τοῖς δακτύλοις. Ὀδύνην τε καὶ δυσέργειαν ἐν τῷ βαδίζειν ἐμποιοῦν.

92) Cels. 5, 28, 14. Paull. 6. p. 201. Ὁ μὲν θύμος ὑπεροχὴ τίς ἐστιν, ποτὲ μὲν ἐνερευθῆς, ποτὲ δὲ λευκὴ, κατὰ τὸ πλεῖστον ἀπρονος, ἐμπερὴς τοῖς τοῦ θύμου κορύμβοις.

93) Bloch's auslând. Fische, 5. p. 80.

94) Hist. anim. 8, 29. 95) De fac. simpl. med. 11. p. 333.

96) Aristot. hist. anim. 6, 12. 8, 15.



garum extemplo docent Geoponici e piscibus cum muria et origano coctis: denique αἱμάτιον dictum, praestans, e thynni intestinis cum branchiis, sero et sanguine, adperso sale. Quo per duos menses reposito, et vase forato, effluit γάρρον αἱμάτιον, quod fueritne γάρρον μέλαν, ῥωμαῖστὶ λεγόμενον ὀξυπόρον Galeni<sup>19</sup>, nescio.

Memorabilis est locus de vi gari intestinorum ulcera compescendi, in ischiade vero irritandi. Lucem accipit e Galeno<sup>20</sup>: Ἀλμὴ τῶν ταριχηγῶν ἰχθύων ὁμοίως τῷ γάρρῳ πρὸς τε τὰς σηπεδόνας ἀρμόζει, καὶ πρὸς ἰσχιάδας καὶ δυσεντερίαν ἐπιμένει, τῇ δὲ δριμύτητι τοὺς μὲν τὸ ἰσχίον ἐνοχλοῦντας χυμοὺς ἐπισπᾶται καὶ διὰ τῶν ἐντέρων ἐκκενοῖ, τὰ δὲ σηπεδονώδη τῶν ἐλκῶν ἐν τῇ δυσεντερίᾳ περικλύζει τε καὶ ξηραίνει.

Cap. XXXV. Qui ad iusculum hoc suadentur pisces, sunt qui iuxta scopulos orae maritimae degunt. Φυκίδες primum nominantur, quas Aristoteles fucis vesci et squillis, στιβάδα s. stratum sibi parare, albidum alias colorem verno tempore in varium mutare refert.<sup>21</sup> Vero mihi simile est, *Sparum* esse vel *Pagrum* vel *Denticem*, quorum utrumque fucos depascere et cancos vorare certum est: utrumque etiam hodie condiunt Graeci.—<sup>2</sup>Ιουλὶς est *Labrus Iulis*, formosissimus europaeorum piscium, ad oras maris mediterranei non rarus, haud ultra sex pollices longus, fasciis seu vittis alternatim flavis violaceisque insignis. Morsu infestat, quasi culex pupugerit. (Bloch t. 287.) — *Περκίδα* eamdem esse ac *πέρκην*, nostram *Percam fluviatilem*, nomenque sortitam esse a colore nigricante (περκῶ, περκινῶ), facile crediderim, si modo exploratum haberem, non solos marinos, sed et fluviatiles hic enumerari.

Cap. XXXVII. *Κουβαρίδες* hoc nomine nusquam alibi occurrunt. Vocantur a Galeno ὀνίσκοι κατοικίδιοι. Esse autem animalcula multipeda, in aquariis vasis et sterquiliniis obvia, quae ad digitorum contactum in orbem semet

19) De compos. med. sec. loc. 3. p. 637.

20) De fac. simpl. med. 11. p. 377.

21) Hist. anim 3, 4. 24..

contrahant.<sup>22</sup> Et alibi: sub situlis ea animalcula frequenter animadverti, vocari in Asia proprie *καύμους*, quia fabis similia sint, ubi sese in globum convolverint, fusco colore.<sup>23</sup> Caelius Aurelianus *porcelliones*<sup>24</sup>, Marcellus Empiricus *cutiones*<sup>25</sup>, Arabes *بنات وردان* (*henât wardân*), i. e. filias aquatoris, et *حمير* (*hamîr*), asellos, vocant.

Cap. XXXVIII. De *σίλφη*, *Blatta orientali*, nihil addendum invenio.

Cap. XXXIX. Pulmonis marini nomine comprehenduntur plures *Medusae* species, quarum in mari mediterraneo degunt *M. proboscidalis*, *phosphorica* et *amarantea*. Nec *Phoreyniae* multum absimiles sunt, in quibus *Ph. Forskolea* (*Medusa aequorea*) vulgatissima est. Occurrunt tamen et *Ph. mollicina* et *Mesonema*.

Cap. XLV. Lichenes equorum iuxta descriptionem nihil dubii relinquunt. Sunt calli genuum, qui ex attritu aut levi vulneratione orti, Graecis posterioribus *μάρομαρον*<sup>26</sup>, Gallis *l'éparvin*, Germanis *Spath*, Italis *spavenio* dicuntur. Ortos esse auctor perhibet *κατ' ἐπιγραφὴν*, post aut propter levem vulnerationem, Namque *ἐπιγράφουμαι*, leviter vulnero, est significatus, quem sero ex Budaeo, H. Stephani antecessore, didici.<sup>27</sup>

Cap. LIII. Pullorum gallinaceorem, qui *νόσσακες* vocantur, iusculum temperare ac corrigere dicitur pravos humores. *Ἐπίκρασις* autem est ratio curandi cacochymiam, dum paullatim vacuatis pravis humoribus bonos substituere conamur.<sup>28</sup> Sic de uvis passis dicitur<sup>29</sup>, τὰ

22) De compos. med. sec. loc. 3. p. 634.

23) De fac. simpl. med. 11. p. 366, 367.

24) Chron. 1, 4.

25) Ed. Stephan. p. 283. Sed alio loco (p. 275.) *cutiones* longe alium habent significatum. Sunt scarabaei pilosi, fulvi, in sepibus lapidosi habitantes, qui lotium sic dictum, seu liquorem peculiarem saniosum exonerant, si tanguntur. Pertinent forte ad *Arctiae* speciem (*russulam* aut *purpuream*) quae, sicut *Bombyx vinula*, liquorem virosum eiaculantur.

26) Hippiatr. ed. Gryn. p. 163.

27) Budaei comment. lingu. graec. p. 326.

28) Galen. meth. med. 9. p. 640. Cf. supra p. 65.

29) Galen. de fac. alim. 2. p. 582.

γε μὴν ἐπικρατικὸν (ἐπικραστικὸν) ὑπάρχει ταῖς γλυκαῖαις αἰεί. Et de vinis fulvis: ἐπικραστικοὶ δ' εἰσὶ καὶ θρεπτικοί· καὶ διὰ τοῦτο καὶ ταῖς εὐχυμίαις συντελοῦσιν . . . τρέφουσι δὲ μᾶλλον τῶν λεπτῶν, κακοχυμίαν δὲ πάντων τῶν οἴνων ἐπανορθοῦνται, χρηστὸν αἷμα γεννῶντες.<sup>30</sup> Paullus aliter, imo haud satis recte ad ratiocinia dogmatica expressit: ὁ τοῦ παλαιοῦ ἀλεκτρονόου ζωμὸς σὺν ἀλσὶν ἐπὶ πλεῖστον ἐψηθέντος ὑπακτικὸς γίνεται· ὁ δὲ τῆς ἀλεκτορίδος τοῦναντίον ἐπικρατητικὸς.<sup>31</sup> Si vera est lectio ἐπικρατητικὸς, contraria est haec sententia Galenicæ saltem theoriæ, cui adhaerere consuerat Paullus. Galenus enim animalium volucrum carnes mucosas (gelatinosas) esse humidamque ac ideo facilius per alvum secedere docuit.<sup>32</sup> Ἀλεκτορίδες autem æque ac Aeliano<sup>33</sup> pulli gallinacei sunt, cum et τῷ παλαιῷ ἀλεκτρονόῳ opponantur, licet Galeni tempore gallinae, antiquitus vero omnes aves cohortales ita vocarentur.<sup>34</sup> Itaque et in Paulo ἐπικρατικὸς loco ἐπικρατητικὸς legendum.

Cap. LVII. Locusta Africae propriae, qua vescebantur incolae Leptis, (duo autem erant oppida, Leptis minor, et altera, Plinio dicta<sup>35</sup>) dicebatur ἀσίρακος; punicum nomen, quod e doctoribus talmudicis מִרְסָא (asera) Bochartus exposuit.<sup>36</sup> Ἀκριδοφάγους autem Libyæ et Aethiopiæ primus fere memorat Agatharchides<sup>37</sup>, dein Plinius<sup>38</sup>, Strabo<sup>39</sup> et Eustathius<sup>40</sup>, qui ἀττέλαβον, speciem locustæ appellat. Est *Gryllus migratorius*, grandioribus omnino membris, dum larva est, alis caret.

Avicenna refert, جراد (dscherâd) locustæ speciem verrucas eradicare, quod nuperis *Grylli verrucivori* efficacia confirmatur.

Cap. LVIII. Φῶνις est *Falco ossifragus*, avis nota. Φήνης nomine post Homerum Aristoteles habet, cinereum

30) Galen. meth. med. 12. p. 837.

31) Paull. lib. 7. p. 237. 32) De fac. alim. 3. p. 701.

33) Hist. anim. 7, 47. 34) Galen. l. c. p. 700.

35) Lib. 5, 3. 4. 36) Hieroz. 2. p. 450.

37) Phot. bibl. cod. 250. p. 453.

38) Lib. 6, 35. 39) Lib. 16. p. 411.

40) In Dionys. perieg. v. 209.

colore, aquila vulgari maiorem.<sup>41</sup> Et ipsi Arabes فينه (*finah*) dicunt.<sup>42</sup>

Cap. LIX. Κορυδαλλός, Aristoteli ac Aeliano κορυδαλός et κόρυδος, est *Alauda cristata*, quam galeritam Plinius vocat.<sup>43</sup> Κοιλιακούς forte in κωλικούς mutandum, cum Galenus in hoc affectu alaudam assam commendat.<sup>44</sup>

Cap. LX. Galenus, etiamsi hirundines uistas earumque cinerem commendat<sup>45</sup>, nihil tamen de lapillis in ventre habet. Alexander vero Trallianus paullo aliter has fabellas tradit<sup>46</sup>: Ἐν τοῖς νεοσσοῖς τῶν χελιδόνων ἀνατμηθεῖσι εὐρίσκονται λιθάρια δύο, ὧν τὸ μὲν ἐν μέλαν, τὸ δὲ ἕτερον λευκόν. Καταπεσόντος τοῦ ἐπιληπτικοῦ, ἐπιτίθει, καὶ ἐγείρεις αὐτόν· τὸ μέλαν δὲ λαβὼν, περιάπτε δέρματι. Τὰ δὲ λιθάρια ταῦτα λέγεται διδόναι τὰς χελιδόνας τῷ πρώτῳ νεοττῷ· ἅπερ οὐ καλῶς εὐρίσκονται, εἰ μὴ διὰ τῆς ἀνατομῆς τῶν νεοττῶν ἁπάντων.

Chelidonias, ut vocat, gemmas primus descripsit Georg. Agricola.<sup>47</sup> Esse lapillos semiglobosos, intus cavos, ab altera parte dilute rivos, ab altera purpureos et nigro-maculatos. Addit C. Gesner<sup>48</sup>, ψήγματα ea, quae Strabo dicat circa pyramidas Aegypti inveniri<sup>49</sup>, sibi videri ad hos hirundinarios lapillos pertinere. Sunt autem chelidoniae gemmae e genere iaspidum et chalcedoniorum, quas superstitio aut inscitia in hirundinum ventriculis quaesivit.

Cap. LXIII. Cornu cervi dicitur γομφιάσεις παρηγορεῖν, quod cum aliis interpretatus sum: *molarium dentium vitia mitigare*. Etenim, cum in doloribus dentium generatim a Celso<sup>50</sup>, Scribonio Largo<sup>51</sup> et Plinio<sup>52</sup> vel

41) Hist. anim. 8, 5. Cf. et eupor. 2. p. 309.

42) Bochart. hieroz. 2. p. 187.

43) Lib. 11, 37.

44) De theriac. ad Pis. p. 243. Cf. et de fac. simpl. med. 11. p. 360.

45) De fac. simpl. medic. 11. p. 359.

46) Lib. 1. p. 79. ed. Guinth. Andem.

47) De nat. fossil. 6, p. 307.

48) De avibus lib. 3, p. 556.

49) Lib. 17. p. 568. 50) Lib. 6. c. 9.

51) C. 11, n. 60.

52) Lib. 28, 49.



cornu cervi per se, vel in aceto coctum, vel etiam ustum suadeatur; cum Galenus τοὺς σειομένους ὀδόντας confirmari cornu cervi raso, adusto et cum vino trito testetur<sup>53</sup>, et alio loco τὰ οὐλα τὰ πλαδαρὰ προστέλλεσθαι dicat<sup>54</sup>; haud credimus aliud quid, quam molarium dentium vitia, mobilitatem et dolores intelligi. Accedit et antiquus interpres, Serapion, qui *dolorem dentium γομφίασιν* reddit.

Cap. LXIV. Cantharidum duas species cognovisse Dioscorides videtur, alteram in frumentis legendam, alteram variegatam, cingulis luteis transversis alarum (elytrorum) notatam. Haec efficacissima dicitur, *Mylabris Dioscoridis* nostratibus dicta, Cichorium habitans per omnem orientem, ut et apud Chineses officinalis sit.<sup>55</sup> Primus Ferdinandus Imperatus probavit, Cantharidem hanc a se dictam *fasciatam*, veram esse Dioscoridis.<sup>56</sup> Dein Hasselquistius nomine *Chrysomelae Cichorii* descripsit.<sup>57</sup> Linnaeus ad Meloës genus traxit<sup>58</sup>, Fabricius peculiare genus *Mylabris* constituit. Sitne prior species *Meloë Proscarabaeus*, ambigo. Nostra saltem *Lytta vesicatoria* non est, quae fraxinos potissimum, ligustrum et sambucum habitat. Imbecillas declarat, quae unius coloris.

Cap. LXVI. Βούπρηστις insectum dicebatur, ut Ety-mologus scribit, διὰ τὸ τοὺς γευσάμενους μεγάλως πύμπρασθαι. Et Nicander de bupresti, facere eam ventris inflationem tympaniticam aut hydropicam, dictamque esse βούπρηστιν,

ἢ καὶ πούδαμλεις, ξηγάστορας ἄλλοτε μόσχους  
πύμπραται, ὅπποτε θῆρα νομαζόμενοι δατέονται.<sup>59</sup>

Quòdnam autem insectum hoc nomine vèteres designaverint, ambigitur. Cum Galenus forma et vi cantharidibus assimilem buprestin declaret<sup>60</sup>, haud plane absurdum est,

53) De theriac. ad Pis. p. 240.

54) De fac. simpl. med. 11. p. 334.

55) Linn. amoen. acad. 6. p. 138.

56) Hist. nat. p. 901. f. 1. 57) Iter Palaestin. p. 410. n. 191.

58) Amoen. acad. 5. tab. 3. f. 188. icon.

59) Alex. v. 344.

60) De fac. simpl. med. 11. p. 364. Paull. lib. 7. p. 235. ζῶφριόν  
ἐστι τῇ κανθαρίδι παραπλήσιον.

Lyttam vesicatoriam divinare. Sed nolo in incerta requidquam certi pronunciare.

Πιτυοκάμπαι, erucæ pinubus infestæ, varii generis sunt. *Liparis monacha*, *Lasiocampa pini*, *Hadena piniperda*, *Phalaena geometra piniaria* larvas gignunt, pinetis pariter obnoxias.

Cap. LXVII. Eccui non nota fabula de salamandra ignicola, imo ignem exstingente? Quam primus, ni fallor, Aristoteles promulgavit<sup>61</sup>, tametsi alio loco statuatur, nullum in igne vivere animal posse.<sup>62</sup> Theophrastus veram credens eam traditionem, exponere studet e frigido laticis mucosoque, quo salamandra scateat.<sup>63</sup> Nicander quoque similem explicationem affert.<sup>64</sup>

— — Οὐδέ τί οἱ φλόξ

σίνεται ἀσβέστη, ῥαγόν δέρος ἄκρα τε γυίων.

ubi schol.: ῥαγόν δὲ δέρος φησὶ τὸ διεθρόωγός· διέθρόηκται γὰρ τὸ δέρμα τῆς σαλαμάνδρας, δι' ὧν ῥωγάδων ὁ ἰδρῶς αὐτῆς καταστάζων τὸ πῦρ σβεννύει. Similem Galenus expositionem innuere videtur: namque salamandram ad certum usque terminum ab igne nihil pati perhibet, comburi tamen, si longiore spatio igni sit admota.<sup>65</sup> Bene igitur noster dixit, perperam credi, salamandram igne haud uri, quod iam Sextius ante eum negarat.<sup>66</sup>

Sed dicamus, unde nata sit fabula. *Salamandra terrestris* est e lacertarum familia, in latebris et speluncis degens, tetra adspectu, nigricans, luteo-maculata, tuberculis glandulosis ante et pone oculos, serie duplici verrucarum dorsalium praedita, e quibus tenacis muci tanta manat copia, ut prunas ignemque exilem omnino exstingui probabile sit. Neque virosa eius laticis foetidi indoles prorsus neganda, quamlibet nimis veteres id exornarint.<sup>67</sup>

Cap. LXVIII. Aranearum duas enumerat species, quarum alteram ὀλκόν aut λύκον appellat, *A. retiarum*;

61) Hist. anim. 5, 17.

62) Meteor. 3, 4.

63) De igne, p. 726. ed. Schneid.

64) Theriac. v. 819, 820.

65) De temperam. 5. p. 674.

66) Plin. 29, 23.

67) Plin. 1. c.

alteram, quae densam telam orditur, nostram habeo A. domesticam.

Cap. LXX. Σήψ, ἣν ἔνιοι σαύραν ἐκάλεσαν χαλκιδικήν, in Thessaliae monte Othry a Nicandro indicatur, δίψιος dictus, et colorem, secundum soli, in quo habitat, colorem, varium habere fertur.<sup>68</sup> Nicander brevibus lacertis assimilatur<sup>69</sup>: scholiastes addit, χαλκίδα dici, quia virgulas seu vittas aeneas dorsales habeat: longitudinem esse quatuor palmorum: in petris habitare Syriae, Libyae et Cypri. Contrariam sententiam Pausanias profert.<sup>70</sup> Esse enim anguem, vipera longe minorem, cinereum, variegato-maculatum, capite lato, collo angusto, cauda abbreviata: incedere versus latera flexum. Ab Aëtio itidem serpens declaratur bicubitalis, tarde progrediens, capite lato, ore acuto, toto corpore albo-maculato.<sup>71</sup>

Quae cum ita sint, Zygnis videtur esse tridactyla: lacerta adeo brevibus pedibus instructa, ut omnino anguibus simillima sit, vittis dorsalibus aeneis praedita. Primus eam in agro similis coloris italico observavit Fab. Columna, qui et icone illustravit.<sup>72</sup> Chalcidem potius dicendam esse cum Aristotele, qui et ζυγνίδα vocat<sup>73</sup>, aut χαλκήν σαύραν cum Hesychio, quam χαλκιδικήν, probabile est. Venenatos esse morsus, dubitari nequit, cum et armenta, praesertim in Sardinia, ubi Cicigna dicitur, graviter laedantur.<sup>74</sup>

Cap. LXXI. Scincus officinalis est satis nota lacerta africana dodrantalis, quae olim in aphrodisiacis primum fere locum obtinebat. Est et in Mauritania peculiaris species, Scincus algiriensis dicta, quae dimidio minor, quatuor vittas longitudinales flavas habet. Haec forte eadem est, quae hic notatur. Arabes corrupto graeco nomine اسکנקور (iskankur) appellant. Alii vero وری (marel) di-

68) Theriac. v. 145. Aelian. 16, 40.

69) Theriac. v. 817. 70) Lib. 8. c. 4.

71) Lib. 15. c. 26.

72) Hist. anim. 8, 23.

73) Obs. aquatilis et terrestris. p. XXXVI.

74) Fab. Column. l. c. p. XXXVIII. Franc. Cetti anfibj e pesci di Sardegna. Sassari 1777. 8.

cunt lacertam libycam, crocodilo niliaco (تمساح) similem.<sup>75</sup>

Cap. LXXII. *Μυογαλῇ* iam summo philosopho ob periculosos morsus suspecta est, praecipue grvida. In iumentis inde existere pustulas.<sup>76</sup> Nicander quoque morsum *μυγαλῆς* exitialem perhibet<sup>77</sup>, quem sequuntur Plinius<sup>78</sup> et Aelianus.<sup>79</sup> Aëtius de ea<sup>80</sup>: esse colore *γαλῇ* similem, magnitudine vero murem aequare: os oblongum habere ac exiguam caudam: dentes autem tenues, eosque duplici ordine dispositos in utraque maxilla, quo fiat, ut quatuor dentium series monstret, ac vulnera ab eo animalculo morsa quadruplicem dentium ordinem probent. Sanguinem quidem protinus mundum profluere, dein vero saniosum, pustulas sequi et inflationes.

Quae quanquam ab antiquitate credita sint, nostrae tamen observationi adversantur. *Μυογαλῇ* s. *μυγαλῇ* nequit esse quicquam, praeter *Soricem araneum*, cuius dentes secundarii et lacunarum omnino speciem quamdam duplicis seriei in utraque maxilla praese ferunt. Sed Matthiolus iam incolarum agri tridentini testimonium citat, nihil venenati in his esse animalibus. Buffonius etiam, nec posse mordere propter angustiam oris, nec inflationes equorum aut armentorum, quas vulgus huic morsui adscribit, ex eodem nasci, docet.<sup>81</sup>

Cap. LXXXI. Butyrum etiam ex ovillo caprinoque lacte confici, Galeno incognitum fuit, qui e solo bubulo lacte fieri existimavit.<sup>82</sup> Ceterum butyri confectionem Graecos a Scythis didicisse, disertis verbis auctor Hippocraticus docet: "Εοικε δὲ τοῦτο, ὥσπερ οἱ Σκύθαι ποιέουσιν ἐκ τοῦ ἵππειου γάλακτος· ἐγχείοντες γὰρ τὸ γάλα ἐς ξύλα κοῖλα, σείουσιν· τὸ δὲ ταρασσόμενον ἀφριεῖ καὶ διακρίνεται, καὶ τὸ μὲν πῖον, ὃ βούτυρον καλέουσιν, ἐπιπολῆς δι-

75) Bochart. hieroz. I. p. 1055. 1056.

76) Hist. anim. 8, 23.

77) Theriac. v. 815. 78) Lib. 8, 83.

79) Hist. anim. 2, 37.

80) Lib. 13, 14.

81) Hist. des quadrup. 7. p. 319.

82) De fac. simpl. 10. p. 272.



σταται.<sup>83</sup> Cuius auctoris si aetas nota esset, butyri introductionem in Graeciam indigitare possemus. Id saltem certum est, nemini veterum, nec ipsi Herodoto, nec Aristoteli cognitum fuisse butyrum: sed, postquam colonias in Tauria et Scytharum vicinia collocassent Graeci, cum re ipsa nomen a Scythis accepisse.<sup>84</sup> Hinc haud absona est Oppiani fictio<sup>85</sup>, Aristaeum Proconnesium, qui diu Issedonas ceterosque Hyperboreos frequentarat<sup>86</sup>, lactis coagulationem, ideoque butyri confectionem in Graeciam introduxisse. Lusitanos quoque monticolae butyro uti olei vice, Strabo tradit.<sup>87</sup>

Orientis nomades ab omni inde antiquitate butyrum confecisse, quamvis credibile est, in Ebraeorum tamen memoriis valde dubia est eius mentio: namque *חָמֶזֶת* potius lac coagulatum significare videtur. Nec tamen Arabes prisci verbo quodam peculiari butyrum a quovis adipe discernere valent: sola vox *زبد* (*zobbād*), qua medici utuntur, pariter cremorem lactis quam butyrum significat.

Cap. LXXXV. *Πιτύα* derivatur a *πήσσειν*, *πῆττειν*, ut *πητιτύα* melius scribatur.<sup>88</sup> Alii dum *πυτία* scribunt, a *πύος*, *colostrum*, τὸ πρῶτον γάλα, nasci perhibent.

*Ἰππάκη*ν, quam Hippocrates iam dicit *τυρόν ἱππων*<sup>89</sup>, Hippocraticus auctor quoque, quod caseus sit, diserte exponit.<sup>90</sup> Neque cuiusquam loci memini, ubi *ἱππάκη* aliud quid significaret.

Varia animalia bisulcā hic nominantur, in quibus *δορκῆς* *Antilope Dorcas*, *πλατύκερως* *Cervus Dama*, *δόρκος* *Cervus Capreolus* esse videntur. Non sum nescius, Marcellum Vergilium *πλατυκέρωτα* tanquam adiectivum τῇ *δορκάδι* adscribere, itaque loco καὶ legere *δορκάδος τῆς πλατυκέρωτος*, in quo et C. Gesnerum et Bochartum ha-

83) Hipp. de morb. 4. p. 357. ed. Lips.

84) Coray ad Hipp. de aëre, aquis et locis, p. 284.

85) Cyneg. 4, 271.

86) Herod. 4, 13.

87) Lib. 3. p. 414.

88) Theod. Gaza grammat. p. 629. ed. Neophyt. Hinc et Suidas: *Πιτύα*, ὁ ὀπὸς ὁ τυρέων τὸ γάλα.

89) De aëre, aqua et locis, p. 357.

90) Hipp. de morb. 4. p. 358.

bet sequaces.<sup>91</sup> Nihilominus, si δορκάς a δέσκειν nomen habet, alii fere nulli animali tam apta haec appellatio est, quam Antilopi ii, cuius oculi formosissimi et visus acutissimus dicuntur. Haec Syriam habitat et Asiae minoris regiones, quae Notum spectant, sed in Lycia non transire eam montes Syris vicinos, Plinius perhibet.<sup>92</sup> Aristoteli quidem et capreolus δορκάς dicitur, sed serioribus temporibus hac ratione distincta fuisse animalia, ut δόρκος capreolus, δορκάς vero sola antilope vocaretur, probabile est. In qua sententia si fallor, χαλεπὸν οἶμαι σὺν Γαληνῷ, ἄνθρωπον ὄντα, μὴ διαμαρτάνειν ἐν πολλοῖς.

Βούβαλος est *Antilope Bubalis*, quae Africam borealem habitat.<sup>93</sup>

Cap. LXXXVI. Βίκος et βικίον peregrina habentur nomina, imo cum ebraeo בִּיקָא componuntur, pro quo LXX interpretes posuerunt.<sup>94</sup> Βίκος tamen, στάμνος ὥτα ἔχων Hesychio, antiqua vox est, qua iam Herodotus utitur.<sup>95</sup>

Cap. LXXXVI. Καλλιώνυμος est piscis, mari mediterraneo satis communis, *Uranoscopus scaber*, cuius grandem vesicam felleam iam Aristoteles praedicat.<sup>96</sup> Esse autem eundem cum οὐρανοσκόπῳ, inde iam Rondeletius<sup>97</sup>, Schneiderus<sup>98</sup> et Coray<sup>99</sup> effecerunt, quod Diphilus Siphnius apud Athenaeum<sup>100</sup> dicat: Οὐρανοσκόπος δὲ, ὁ καὶ ἄγνος καλούμενος, ἢ καὶ καλλιώνυμος, βαρύς. Legimus vero: Οὐρ. δὲ, καὶ ὁ ἄγν. καλ., ἢ κ. καλλ., βα-

91) Hieroz. 1. p. 966.

92) Plin. 8, 83. Cum Lycia nullo modo Syriae sit contermina, *Ciliciam* substituendam esse, Harduinus suadet. Possetne tamen Solymorum Pisidia natio, quae interiisse iam Eratostheni dicebatur, (Plin. 5, 33.) intelligi? Namque et Syros et Phoenices ultra Amanum et Taurum montem antiquitus immigrasse, et Solymos Pisidiaepunice loquutos fuisse, traditur. (Ioseph. antiqu. iud. 1, 7. contra Ap. 1, 12.)

93) Ζορκάδες καὶ βουβάλεις ἐν Λιβύῃ. Herod. 4, 192. Ζόρκες Straboni dicuntur lib. 12. p. 76.

94) Ierem. 19, 1. 95) Herod. 1, 194.

96) Hist. anim. 2, 11. Aelian. hist. anim. 13, 4.

97) Apud Gesner. de pisc. p. 138.

98) Exc. 2. ad Aelian. p. 573.

99) Ad Xenocr. de aqual. p. 68. 100) Lib. 8. c. 52.

ρεῖς. Itaque cum Schweighaeusero dubium linquimus hoc argumentum. Sed multo clarius est argumentum, quod ex Oppiani descriptione petitur<sup>1</sup>; qua καλλιωνύμου formam illustrat, oculum nimirum utrumque sursum versos ferre, et grande os inter oculos. De eo pisce Galenus: ὡς οὐτός γε, καὶ εἰ μὴ βούλοιτο, πρὸς τὸν οὐρανὸν αἰεὶ βλέπει.<sup>2</sup> Dixerunt eum piscem et Graeci ἡμεροκοίτην et κλέπτειν, quia interdiu dormiat, noctu vero praedam quaerat.<sup>3</sup> Naturam et vitae genus Callionymi egregie illustravit Belonius.<sup>4</sup>

<sup>c</sup>Ταῖνα iam ab Aristotele<sup>5</sup> ita describitur, ut *Hyae-nam striatam* vel *oricutalem* agnoscere facile possimus. Est autem bellua, tum in Aegypto et Africa, tum per Syriam et Asiae calidiores regiones satis vulgaris. Ieremiae (12, 9.) צבנאי, Arabibus صبع dicitur.<sup>6</sup>

Cap. XCVIII. Ustio arabica, a nostro primum memorata, testimonium utilitatis etiam ab Archigene Apameensi accepit. Antyllus vero, Archigeni tempore aequalis, crudeliter magis, quam secundum artis regulas, eam ita administravit, ut hallucis ventrem ad os ipsum ureret, dein ad crustam deliciendam et suppurationem servandam varia adhiberet cataplasmata.<sup>7</sup> Plinius fimum caprinum fervens eius lateris, cuius coxa patitur, manu tenendum, fimumque ad eum usum punctis aereae acus tollendum esse tradit.<sup>8</sup> Et Plutarchus huius ustionis mentionem facit.<sup>9</sup>

Arabica autem dicta fuit ustio, quia ab Arabibus forte didicerunt Romani, cum, Augusto imperante, Aelius Gallus Romana arma primus in eam terram inferret.<sup>10</sup> Arabes enim ab omni antiquitate ustiones adeo frequenter adhibuerunt, ut, quisquis non ureretur, eum

1) Halient. 2, 200. 2) De usu part. 3. p. 182.

3) Hesych. et Caray I. c.

4) Apud Gesner. de aquat. 4. p. 159.

5) Hist. anim. 6, 28. 3, 7. 6) Bochart. hieroz. 1. p. 332. s.

7) Aët. lib. 12. c. 3. 8) Lib. 28, 56.

9) De sera numinis vindicta, p. 415. Γελοῖος ὁ φάσκων, ἄδικον εἶναι, τῶν ἰσχυίων πορνεύων κατεῖν τὸν ἀντίχειρα.

10) Plin. 6, 23. Strabo 16. p. 447. Dio Cass. 55, 29.

perituum esse opinarentur.<sup>11</sup> Singularem plane curandi rationem Aretaeus in coxendicis affectu suadet: Capram herba iride pastam mactandam esse, intra ventrem stercore plenum pedes oculendos.<sup>12</sup> Albucasis, summus ex Arabibus chirurgus, e Dioscoride solummodo citat hanc curandi methodum.<sup>13</sup>

Κροκόδειλος χερσαῖος, dein memoratus ob stercus mulieribus utile ad colorem faciei nitoremque producendum, an idem sit cum σκίγκω, qui et κροκόδειλος χερσαῖος dicitur (c. 71.), merito ambigimus. Nec enim auctor hoc loco, nec interpretes prisci ullo loco scincum dicunt, cuius stercore utantur mulieres. Itaque coniecturae locus est, alteram speciem crocodili aegyptiaci intelligi, quam, χειροθήθη τοῖς ἱερεῦσι, in Arsinoë divino cultu celebratam Strabo praedicat.<sup>14</sup> Hunc crocodilum, Σοῦχος dictum, δίκαιον vocavit Damascius<sup>15</sup>, ut opponeret hippopotamo, ἀδίκω ζώῳ, sicut Chiron, δικαιοτάτος Κενταύρων<sup>16</sup>, ita propter mansuetudinem morum vocatur.<sup>17</sup> Nomen σοῦχος, quanquam Bochartus ab arabico سوخ, *natare*, deducere conatus sit, aptius παρωνομάζει Godofredus Hilarius, dum cum aegyptiaco Djok, jok, *virtus, perfectio*, componit.<sup>18</sup> Is etiam peculiarem constituit speciem, ab Aegyptiis olim cultam, *Crocodilum Suchum*, cuius diagnosin loco citato uberius exponit. Sed aquatilis et fluviatilis pariter erat ac Crocodilus vulgaris.

Hinc confugiendum est ad Lacertarum alias species terrestres, quarum alteram spithameam, marmoratam dicimus *Mellionem*, ad pyramides aegyptias inveniendam, quae in petris et latibulis degit, وړ (warel) Arabibus veteribus hodiernisque dicta. Huius autem stercus pretiosum (έντιμον) dicit Galenus: id mulieres τρυφῶσαι ο-

11) Reiske miscell. med. ex mon. Arab. p. 13.

12) De curat. chron. 2, 12.

13) Albucas. chirurg. sect. 41. p. 84. ed. Channing.

14) Lib. 17. p. 581.

15) Phot. bibl. 242. p. 342.

16) Il. 11, 832.

17) Pindar. pyth. 3, 3. Χείρωνα, νόον ἔχοντ' ἀνδρῶν φθλον.

18) Ann. du mus. 10, p. 75.



rientis antiquis iuxta ac nostris temporibus conquirunt, ut faciei cutem et tensam et splendentem reddant.<sup>19</sup>

*Κροκόδειλοι* tamen *χερσαῖοι* appellabantur etiam aliae lacertae. Namque et de scinco noster ait: *κροκόδειλος χερσαῖος*, *ιδιογενής*; et *Lacerta nilotica*, צב Ebraeis, ضب (*dhab*) et حرداؤن (*cherdaun*) Arabum, est *κροκόδειλος χερσαῖος δίπληγος* vel *τρίπληγος* auctorum<sup>20</sup>: et minores obviae erant<sup>21</sup>, quibus assis libentissime vesci Iones gastronomus Archestratus testatur.<sup>22</sup>

Cap. C. Mirabilia sunt; quae Theophrastus de lyncurio narrat.<sup>23</sup> Esse durissimam gemmam, ut et sigilla ex ea scalpantur, esse pellucidissimam, eaque facultate praeditam, ut et trahat corpuscula, succini ad instar; et non modo festucas, sed et lamellas aeneas ferreasque tenuissimas. Nasci autem e lyncis urina lapidescente, quam invidiosum animal sub terra occultet. Repetit eadem Plinius, sed pariter ac noster irridet, cum aevo ipsius nulla omnino eius appellationis gemma visa sit.<sup>24</sup> Traditionem autem eam ita exponere conatus est C. Gesnerus<sup>25</sup>, ut statuatur, electrum s. succinum ex aliquo Liguriaemporio in Graeciam olim advectum, Ligurium protinus dictum, deinceps, ne mirabilium studio aliquid derogetur, Lyngurium nominari coepisse, addita ea fabula. Iam vero regesserit quispiam, duritiem eam, quam Theophrastus gemmae suae tribuat, a succino alienam esse, neque posse sigilla e succino formari. Attamen multa et elegantissima instrumenta e succino conficiuntur. Nec necessaria erat veterum sigillis ea, quae in nostris exigitur, duritia, quando cerae soli imprimebantur: ut et ligno a larvis insectorum serpentino modo arroso uterentur.<sup>26</sup>

Watsonii tamen sententiam, lapidem electricum, qui

19) Galen. de fac. simpl. 10. p. 508. Horat. epod. 12, 10. „Color stercore fucatus crocodili.

20) Herod. 4, 192. Pausan. 2, 28.

21) Strab. 12. p. 156. 22) Apud Athen. 7, 112.

23) De lapid. p. 693. 24) Plin. 37, 13.

25) De quadruped. p. 772. G. Agricola (de nat. fossil. lib. 5. p. 266.) vel succinum fuisse lyncurium, vel belemniten, autumat.

26) Theophr. hist. pl. 5, 1. Hesych. voc. *θρυπώβρωτος*.

*Turmalinus* nostratibus dicitur, sub lyncurii appellatione a veteribus intelligi<sup>27</sup>, haud plane reiicere ausim. Namque Turmalinus tum pellucidus est plerumque, tum durissimus, punicei saepe aut flavi aut prasini coloris, quam frequentior sit fuscus color. Ad sigilla egregie aptus est, nec adeo rarus, quin veteribus potuerit innotescere. Occurrit enim in Saxonia, Helvetia, Gallia meridionali ipsaque Hispania, unde Phoenicum navigia eum forte in Graeciam advexerunt. Multo tamen facilius est explicatio Beckmanni<sup>28</sup>, hyacinthi (vel chrysolithi) speciem intelligi, quippe cum omnes gemmae vim habeant communem, si calefactae tritu fuerint, corpuscula levia attrahendi.

Turmalini forte primum vestigium in Serapione quaerendum.<sup>29</sup> *Hager albuzedi*, lego *Hadschar alburitus* (حجر البوريثس), est ipsi gemma rubra, minus tamen splendens, quam hyacinthus, quae ex orientalibus regionibus (India orientali) advecta, festucas attrahat. Ἀλλὰ τοῦτο μὲν οἶον ὁδοῦ τι πάρεργον εἰρήσθω.

Cap. CI. Σίμβλιον, vulgarem scripturam, cum Marcello Vergilio mutavi in ὑβλαῖον, quod illud tantum esset mel ex alvearibus, neque ullo modo posset ad praestantiam mellis designandam adhiberi. Probatur autem Plinii interpretatione, qui optima mellis genera hymettium habet et hyblaeum.<sup>30</sup> Loco Cycladum insularum Plinius ponit Calydnam insulam. Iam vero patet e Strabone<sup>31</sup> et Eustathio<sup>32</sup>, sporadum insularum nonnullas Calydnas fuisse appellatas, et in his peculiariter dictam Calydnam s. Calymnam, hodie Calamine vocatam, cuius mel ἀστιῖον καὶ τῷ ἀττικῷ ἐνάμιλλον praedicatur. Diophanes in Geoponicis<sup>33</sup> Ἀριστον μέλι τὸ ἀττικόν, καὶ τοῦ ἀττικοῦ τὸ ὑμήττιον, καλὸν δὲ καὶ τὸ γινόμενον ἐν ταῖς νήσοις· τοῦ δὲ σικελικοῦ τὸ ὑβλαῖον, καὶ τοῦ κρητικοῦ τὸ ἀκραμαμ-

27) Philos. transact. 51. p. 396.

28) Beitr. zur Gesch. der Erfind. 1. p. 244.

29) Cap. 399. fol. 188°.

30) Plin. II, 13.

31) Lib. 10. p. 351.

32) Ad Dionys. perieg. v. 550.

33) Lib. 15. c. 7.

μώριον, καὶ τοῦ κυπρίου, καὶ τοῦ κῶου τὸ καλύμνιον s. τοῦ καλυμνίου τὸ κῶον, quoniam Cos etiam oppidum fuit insulae Calymnae.<sup>34</sup> Hyblaeae autem apes, Hyblaeum mel quantopere celebrentur a poëtis, tritissimum est.<sup>35</sup>

Cap. CII. Sardoarum herbarum amaritudo a poëtis diffamata<sup>36</sup> melli originem dedit, quod cum papavere ad bellaria mixtum Horatio<sup>37</sup> adeo infestum dicitur,

„ut gratas inter mensas symphonia discors.“

Mel autem illud amarum nostra aetate gratum et salubre putatur. Non ex Artemisiarum floribus, sed ex Arbuti etiam apes colligunt mel, aestate ad finem vergente. Hinc in Sardinia Octobri et Novembri demum conquiritur. Necesse autem est, Iunio mense dulcis mellis plurimam eripi copiam alvearibus, ut dein cogantur apes novam comportare penum, quae, e serioribus floribus collecta, amarorem illum gratum habet.<sup>38</sup>

Cap. CIII. Mel ponticum, quod insaniam facit, infamiam obtinuit ex ἀναβάσει Xenophontea. Priusquam enim Trapezuntem adirent, a melle eius regionis comesto multi insanire coeperunt, ut et nonnulli perirent.<sup>39</sup> Aristoteles venenatam eius mellis indolem a buxi specie repetit<sup>40</sup>, cui sententiae adstipulantur Diodorus Siculus<sup>41</sup> et Aelianus.<sup>42</sup> Plinius vero contrahi flore rhododendri (Nerii), quo silvae scateant.<sup>43</sup> Eius insani (μαινομένου) mellis crateras propinarunt Heptacometae, montium Trapezunti vicinorum incolae, Pompeii cohortibus, per eos montes iter facientibus: eoque poto iam mente abalienatos facile interfecerunt.<sup>44</sup> Nostris demum temporibus confirmata eius mellis pontici et caucasici inebrians indoles floribus Rhododendri pontici et Azaleae ponticae tribuitur.<sup>45</sup> Perniciosum similiter mel, e floribus Kalmiae

34) Plin. 4, 23. 35) Virg. ecl. 1, 55. Martial. 7, 88.

36) Virg. ecl. 7, 47. 37) De arte poët. v. 374.

38) Hörschelmann Gesch., Geogr. und Statistik von Sardinien, p. 405. 39) Xenoph. anab. 4, 8.

40) Mirab. auscult. c. 17. p. 43. ed. Beckm.

41) Lib. 14. p. 665. ed. Wesseling. 42) Hist. Anim. 5, 42.

43) Lib. 21, 45. 44) Strabo lib. 12. p. 88.

45) Tournfort. in act. acad. paris. 1704. p. 345. iter gall. 2. p.

latifoliae collectum, nuperis observationibus prope Philadelphiam Pennsylvaniae institutis semet ostendit.<sup>46</sup>

Cap. CIV. Mellis species, quae hic sacchari nomine insignitur, triplicis est originis. Vel enim ex Arundine saccharifera, seu *saccharo officinarum* L., vel e *Bambusa arundinacea* Schreb., vel e *Calotropide gigantea* R. Br., *Tamarice gallica* aut *Hedysaro Albagi*. Ultima mellis species ea esse videtur, cuius in Libano frequentis Galeus meminit, quod *δροσόμελι* et *ἀερόμελι* dictum, coriis super terram pansis et arboribus excussis, colligi dicit.<sup>47</sup> Id est *ترنجبین* (*tarandschabin*) vel *ثلنجبین* (*thalendschubin*) Arabum.<sup>48</sup> In Arabia felici nec Bambusam nec Saccharum sponte nasci, exploratum habeo, sed Manna hac concreta, sacchari indici vice, utuntur.<sup>49</sup>

Mel vero arundinum, *μέλι καλάμιον* Arriano dictum<sup>50</sup>, duplex esse potest, vel naturaliter ad nodos Bambusae concretum, *طباشیر* (*thebâschir*) dictum, vel ex culmis arundinis sacchariferae coctum, *سکر* (*sakhr*) et Arabibus dictum, licet nomen indicum sit. Concretum saccharum, salis forma, quod Archigenes iam *ἄλα ἰνδικόν* appellavit<sup>46</sup>, naturale illud concrementum ad nodos Bambusae fuisse videtur, quod Garcias ab Orto primus illustravit.<sup>51</sup> Idem esse cum *μέλιτι καλαμίνω*, Salmasius probavit.<sup>53</sup>

Nostri vero sacchari prima, ni fallor, mentio in Mosis Chorenensis appendice geographica historiae armeniacae<sup>54</sup> obvia est. Cum ineunte saeculo quinto scripserit,

101. Lambert in Recueil de voy. au Nord. 7. p. 137. Schriften der berl. Naturforschenden Gesellsch. 1782. vol. 3. p. 473. Klaproth iter caucas. 1. p. 455.

46) Barton in Amer. philos. transact. vol. 3. p. 145.

47) Galen. de fac. alim. 3. p. 739.

48) Beitharides apud Rhazeum de variol. ed. Channing. p. 179. a Terendschubin e *Tamarice* distinguit *شیرخشک* (*schîrchoschkh*) ex *Hedysaro Albagi* et *عشیر* e *Calotropide gigantea*.

49) Niebuhr Beschr. von Arab. p. 147. Burckhardt 2. p. 953. 956.

50) Peripl. maris erythr. p. 3. 51) Paull. Aegin. 2. p. 50.

52) Clus. exot. lib. 1. c. 12.

53) Homon. hyl. iatr. p. 257.

54) Ed. Whiston, p. 364.



memorabile est, tunc iam saccharum ad ripas Euphratis inferioris, in Elymaide cultum fuisse. Armenius id appellat *schacham*. Arabes, quorum commercia cum India orientali ex tempore felicissimo Abbassarum florentissima erant, arundinem sacchariferam in Hispaniam et Siciliam transplantarunt, ac utrobique cultura cum proventu sacchari per medium aevum continuavit.<sup>56</sup>

Cap. CV. Cera optima dicitur nostro pontica, tum cretica. Galenus primum locum tyrrhenicae<sup>57</sup>, Didymus, ad picem saltem liquidam conficiendam, sardoae<sup>58</sup> tribuit. Plinius candidissimam, simili modo, ac a Dioscoride, paratam, punicam appellat.<sup>59</sup> Talem tractam dicit Aëtius, cuius vocis latinam originem negare nequimus, sicut *τρακταίαν* pro *λευκαίναν* in Etymologico magno barbaram sapit aetatem.

Cap. CVII. *Πυρός αιτάνιος* est idem ac *τριμηνιαῖος*, itaque *Triticum aestivum*. Eam vocem Galenus<sup>60</sup> et lexicographi veteres ita exponunt, ut *τήτες* et *σητες* attice vel ionice dici ἐν τούτῳ τῷ ἔτει statuunt: *σητάνιος*, *σιτάνιος*, aut, quemadmodum Theophrastus scribit, *σιτανίας πυρός* est triticum hornum, quod mense Martio serere Geoponici iubent.<sup>61</sup>

*Σειδαλις* Galeno est graccum nomen antiquum. Romani autem, et quibus ipsi imperabant, Galeni tempore purissimum panem triticeum siligineum (*σιλιγγίτην*) vocabant, huic proximum *σειδαλίτην*: tertio loco veniebat medius, *συγκόμιστος*, qui et *αὐτοπυρίτης*: quarto demum impurus, ὁ *πιτυρίας*.<sup>62</sup>

Cap. CIX. *Ζύθον*, ex hordeo confectum, esse aegyptiae originis, in confesso est per totam antiquitatem.<sup>63</sup> Vox ipsa, Dioscoridi et Galeno<sup>64</sup> mascula, neutra est

56) Edrisi geogr. nub. p. 149. Casiri bibl. escurial. 1. p. 330.

57) De comp. med. sec. loc. 5. p. 318. et pluribus aliis locis.

58) Geopon. 6, 5.

59) Lib. 21, 49.

60) Galen. comm. 2. in Hipp. de articul. p. 606. ed. Basil. graec.

61) Lib. 3. c. 3. 62) De alim. fac. 1. p. 483. 484.

63) Herod. 2, 77. Diod. Sic. 1, 34. Theophr. causs. plant. 6, 11. Strab. 17. p. 633.

64) De fac. simpl. med. 6. p. 832.

apud reliquos, ut τὸ ζύθος, vel etiam τὸ ζῦθος scribatur. Origo graeca etiamsi in aprico esse videatur, a ζύμη repetenda, ut docti viri voluerunt<sup>65</sup>: aegyptiacam tamen esse vocem, iserte veteres testantur, quod aliter exponere nequeo, quam a graecis in Aegypto colonis formatam fuisse hanc vocem, quam nec doctissimus Iablonskius certitudine quadam ex aegyptiaca lingua derivare potuit.<sup>66</sup>

Modus zythi parandi aliquid singulare habet. Formulam, quam Zosimus Panopolita reliquit, primus Reinesius e codice manuscripto aperuit<sup>67</sup>, dein Iablonskius<sup>68</sup>, post eum Grunerus<sup>69</sup> edidit. Farinam autem hordei in massam coactam in aleno (κλουβῶ) coquebatur, ex qua dein fiebant panes seu orbiculi, quibus cum fermento mixtis et in aquam demissis spontanea nascebatur ebullitio: ea absoluta aqua dulcis per cribrum colabatur. Is ipse est modus, quo hunc potum in Syria etiamnum parari Belonius observavit.<sup>70</sup>

Zythus, senioribus temporibus a Romanis *posca* dictus, ausam praebeuit corruptae et infimae graecitatis appellationi φοικῆς, de quo Symeon Sethus<sup>71</sup> omnia ea praedicat, quae de zytho dicta fuerant. Transiit φοικῆς in فوكا (fuka) Arabum: sic enim zythum vertit Avicenna.

Denique et apud alias nationes usitata erat haec portio. Sic de Lusitanis id refert Strabo.<sup>72</sup> Nominabatur Graecis etiam πῖνον et βούρον, alio forte, ac ζύθος, modo confecta.<sup>73</sup>

Cap. CX. Κοῦρμι celtica vox ab Adelungio<sup>74</sup> habetur, cum etiam nunc comessatio dicatur a monticulis Britanniae *Curme*.

Cap. CXI — CXV. Ζεά duplex est, altera ἀπλῆ, altera δίκοκκος, quae semen in duplici tegmine coniunctum gerit. Ad idem genus et ὄλυρα accensetur. Et hanc πο-

65) Lennep. etymol. 1. p. 312.

66) Opusc. I. p. 77.

67) Var. lect. lib. 8. p. 485.

68) L. c. p. 78.

69) Zosimi de zythorum confectione. Solisbae. 1814. 8.

70) Obs. 2, 98. p. 155.

71) De cibar. fac. p. 80. 81. ed. Gyrard.

72) Lib. 5. p. 414.

73) Athen. 10, 67.

74) Mithridates, 2. p. 55.

λύλοπον<sup>75</sup>, ut ζιάν πολυχίτωνα, Theophrastus<sup>76</sup> vocat. Hesychius de ὀλύρα· εἶδος σπέρματος, ἢ βρωμά τι, μεταξύ σίτου καὶ κριθῆς· οἱ δὲ, αὐτὴν κριθήν· ἄλλοι, καρπὸν τινα σιταῖον, ζιάν· τινὲς, ζέαν. Itaque simillima est ὀλυρα τῇ ζειᾷ, ut et ex utraque χόνδρος et τράγον pararetur.<sup>77</sup> Ζειάν igitur sine dubio esse *Triticum Speltam*, ὀλυραν vero varietatem, *Tr. Zea* ab Hostio dictam statuo. Ἀπλῆν vero ζιάν esse *Triticum monococcon*, deterius ceteris frumentum, autumo. Haec est τίφη Theophrasti, μονοκάλαμος καὶ λεπτοκάλαμος<sup>78</sup>, eandemque in Macedonia Thraciaque βρίζαν nominari, Galenus testatur.<sup>79</sup> Longe alium loquendi usum notat in Mnesitheo Cyziceno, qui τίφην optimam frumenti speciem, deteriorem ζιάν dixerat, in frigidis regionibus cultam: illam cum ὀλύρα, hanc cum βρίζα Macedonum aut τίφη Theophrasti Galenique eandem habemus. Suspisor, et Strabonis ζιάν, quam colit in Illyriae inopibus regionibus tradit<sup>80</sup>, esse eandem cum τίφη Theophrasti.

Κρίμνον esse farinam crassiorem et negligentius molitam, notissimum est. Peculiariter vero hordei tosti ramenta farinacea sic vocabantur. Diserte enim Galenus<sup>81</sup>: Κρίμνα καλεῖται τὰ τοῖς ἀλφίτοις ἐμφερόμενα τῆς πεφρυγμένης κριθῆς μόρια μεγάλα, διαπεφυγότα δηλονότι τὴν ἐν τῇ μύλῃ κατεργασίαν ἀκριβῆ. Sed idem alio loco<sup>82</sup>: Κρίμνον, τὸ παχυμερὲς οὕτως ὀνομάζεται τοῦ τε πυρίνου καὶ τοῦ ἐκ τῶν ζειῶν ἀλεύρου. Itaque, ut noster, e tritico et zeae speciebus etiam confici κρίμνον docet, et πόλτον s. πολτόν, (utroque enim modo scribitur) esse sorbitionem e κρίμνω.

Ἀθήραν satis clare Dioscorides exponit. At vero haud plane consentiunt alii auctores. Proxime quidem accedit Plinius, qui ex olyra decocta fieri medicamentum statuit, quod Aegyptii atheram vocent, infantibus utilis-

75) Hist. pl. 3, 4. 76) Causs. pl. 4, 6.

77) Galen. de fac. alim. 1. p. 519. Comm. in Hipp. de victu acut. 1. p. 455.

78) Theophr. hist. pl. 3, 1.

79) De fac. alim. 1. p. 514.

80) Lib. 7. p. 418.

81) Comm. 2. in Hipp. progn. p. 140. ed. Basil. graec.

82) De fac. simpl. med. 7. p. 45.

simum; sed et adultos eo illinere.<sup>83</sup> Hesychius interpretatur eam vocem: βρωμα διὰ πυρῶν καὶ γάλακτος ἡψημένον παρ' Αἰγυπτίοις. Pollux<sup>84</sup> ἔντος (pultem) vocat e tritico. Quae omnia quodam modo congrua nulli fere dubitationi ansam praebent. Iam vero Hieronymus θήραν dici Aegyptiis far tradit, quod corrupte etiam ἀθήραν nominant.<sup>85</sup> Ex hoc quidem loco Iablonskius effecit, θήραν, aut θάραν, corrupte ἀθάραν, ἀθήραν, esse دُرَّ (durrah) Arabum, seu *Sorghum vulgare*, frequentissimum frumenti genus per totum orientem<sup>86</sup>: quod, licet iam ab Ezechiele תִּירָה nomine dicatur<sup>87</sup>, licet triticum babylonicum, cuius folia quatuor digitorum latitudinem apud Herodotum<sup>88</sup> habeant, forte ad hoc pertineat frumentum, haud quaquam tamen, ut statim Iablonskio assentiar, persuadeor.

Quid τράγος fuerit, optime Galenus exponit.<sup>89</sup> Confici nimirum ex olyra nobilissima decorticata: eo plerosque uti protinus aqua decocta, dein, ea effusa, sapa aut vino dulci aut mulso, pineis etiam nucibus additis. Alio loco<sup>90</sup> e zae variis speciebus (ἐκ ζειῶν) τράγον parari tradit, neutiquam sibi contradicens, cum ὄλυρα ζειᾶς species aut potius varietas sint. Et Geoponici ex olyra generosa ut et e tritico alexandrino macerato, decorticato ac siccato confici τράγον iubent.<sup>91</sup>

Χόνδρος est id, quod nostrates *Perlgrauen* vocant, quem manifesto noster e zea parari iubet, quanquam Theophrastus eundem confici etiam ex hordei specie indica ignota ac ex oryza doceat.<sup>92</sup> Parandi modus, uncinis inclusus, e Geoponicis forte a librario quodam mutuo acceptus, ad albedinem obtinendam gypso arenaque utitur. Ἀλικά (e latino *alica* sumta vox) seniores Graeci a Paulo Aegineta inde a χόνδρω distinguunt<sup>93</sup>, sed nusquam

83) Lib. 22, 67.

84) Lib. 6, 62.

85) Quaest. in Genes. opp. tom. 2. coll. 543. ed. Mart.

86) Opusc. 1. p. 13.

87) Ezech. 4, 9.

88) Lib. 1. c. 193.

89) De fac. alim. 1. p. 519.

90) Comm. 1. in Hipp. de vict. acut. p. 455.

91) Lib. 3. c. 3.

92) Hist. plant. 4, 4.

93) Paull. Aegin. 1. p. 23.



memini, quam ratione differant, legere: nisi alica simplici, *χόνδρος* vero artificiali aut magis composito modo, ut prior evaderet ac candidior, pararetur.

Cap. CXIX. CXX. *Κέγχρος* est *Setaria italica* Pal. Beauv. (*Panicum* L.) *ἔλυμος*, *Panicum miliaceum*: utrumque in Ponto, loco aliorum *σιτηρῶν* abunde seri, Strabo est auctor.<sup>94</sup> *Σιτηροῖς* autem utrumque recte a nostro annumerari, vel inde patet, quod et Galenus interdum in frugum penuria ad panem conficiendum et *κέγχρον* adhiberi et *ἔλυμον*<sup>95</sup> scribat, et Columella utrumque frumentis accenseat.<sup>96</sup> Taxandus igitur Galenus, dum *ἔλυμον ὀσπρίους* adscribit<sup>97</sup>, maxime cum *ὀσπρία* sola legumina vocet, e quibus panis non conficiatur.<sup>98</sup>

Cap. CXXIV. *Τῖλῖς* a *τῆλε*, *procul*, nomen habet, quia cornua longe proiicit. Sic et *itasi* aut *itasin* aegyptiace longa cornua habens significat.<sup>99</sup> *Αἰγόνερος* dici *τῖλιν* in Asia minore, *καλλιτέρως* a Rufo Ephesio, Galenus testatur.<sup>100</sup> *Panicum* nomen Bochartus iam exposuit: *זֶרַע פִּשְׁתֵּה* (*zera pischte*), lini semen.<sup>1</sup>

Cap. CXXVI. *Ciceris* nomen Rossi deducit ex aegyptiaco *ἐρσίς*, quod transiisse in graecum *αἰσέρ* aut *κίερα*, cuius cum vestigium in graeca lingua evanuit, servarint Romani in *cicere*.<sup>2</sup> Quod ratiocinium, cum soli testimonio Isidori Hispalensis nitatur, qui *cicer* e graeco sumtum dicit<sup>3</sup>, non satis solidum mihi videtur.

*Ciceris* autem species duas enumerat, sativum et arietinum, seu *κρίον*: tres habet Theophrastus, *κρίον*, *ὀροβιαῖον* et *τὸν ἀνὰ μέσον*.<sup>4</sup> Diocles praeferebat album *cicer* nigricanti, itemque buxum, et milesium *τοῖς λεγομένοις κρείοις*.<sup>5</sup> *Κρείους* autem dicta esse cicera propter magnitudinem, cum *Κρεῖος* nomen gigantis apud Hesio-

94) Lib. 12. p. 81.

95) De fac. alim. 1. p. 525.

96) Lib. 2. c. 9.

97) De fac. simpl. med. 6. p. 875.

98) De fac. alim. 1. p. 524.

99) Rossi etym. p. 76.

100) De compos. med. sec. loc. 1. p. 426.

1) Canaan, p. 751.

2) Etymol. aeg. p. 54.

3) Orig. 17. 4.

4) Hist. pl. 3, 5.

5) Athen. 2, 44.

um sit<sup>6</sup>, qui et *Κοῖος* Apollodoro<sup>7</sup>, Eustathii est sententia.<sup>8</sup> Verumtamen Columella<sup>9</sup> et Plinius<sup>10</sup> *κροῖον* arietinum vertunt, quod legumen arietino capiti simile sit, ille etiam *ὀροβιαῖον* puniceum dicit. Et Galenus exigua fuisse cicera ac nigricantia, in Bithynia maxime provenientia, quae *κροῖοι* dicantur.<sup>11</sup> Esse autem flatulentum e cicericibus edulium, solis rusticis usitatum, idem et scriptores ab Athenaeo allegati testantur.

Cap. CXXVIII. De *κνάμω αἰγυπτίῳ*, *Nelumbio specioso*, tum in historia rei herbariae, tum in commentario ad Theophrastum uberius disserui. Ne igitur saepius dicta iterum repetam, ad illustrandum locum nostrum sequentia sufficiant. *Κολλοκασίαν* radicem plantae edulem noster vocat, alii totam plantam; esse autem id nomen aegyptium, facile credideris, etiamsi Wahlilii etymologia minus placeat.<sup>12</sup> Esse enim a *κῶλ*, *convolvere*, *plicare*, et *κᾶσχ*, *arundo*, derivandum, quod icon Clusii<sup>13</sup> illustret. At vero ea icon *Arum Colocasiam* repraesentat, quae a Plinii inde temporibus<sup>14</sup> saepissime cum *Nelumbio* commutata, nihil convoluti ostendit aut plicati. — *Κιβώριον* aut *κιβώτιον* fructum ideo dici noster asserit, quia faba seratur, glebae humenti indita atque ita in aquam demissa. Ridiculam hanc etymologiam declarat Salmasius<sup>15</sup>, ego intellectu difficillimam. Namque, si *κιβώτιον* idem est ac *κιβώριον*, multo facilius est *παρωνομασία* a *κιβωτός*. Fuisse igitur poculi genus, quod Gracci ita appellarunt<sup>16</sup>, et ad huius similitudinem et fructum *Nelumbii* ita vocatum fuisse, existimo, licet sciam, Galenum asserere, quod ipsa faba *ἐπιχωρίως κίθη καὶ κιβώριον* dicatur.<sup>17</sup> Loco *κίθη* autem mallem *κίστη* scribi, ut melius cum *κιβωτίῳ* aut *κιβωρίῳ* congruat.

6) Theog. v. 134.

7) Bihl. 1, 1. 3.

8) Ad Iliad. XIII. p. 925.

9) Lib. 2. c. 10.

10) Lib. 18, 32.

11) De fac. alim. 1, p. 533.

12) Ad Abdollatif. germ. versum.

P. 66.

13) Hist. 2. p. 74.

14) Lib. 21, 51. Multo aptius aegyptiaca etymologia ab implexis colocasiae foliis in poculorum speciem sumi potest.

15) Homon. hyl. iatr. p. 198.

16) Athen. 11, 54.

17) De theriac. ad Pamphil. p. 303.

Cap. CXXXII. *Βρεχού*, nomen lupini aegyptiacum, a voce *βρέχ* Rossius derivat, quae idem est ac graecum *βρέχεν*.<sup>18</sup> Dicti ita lupini, quia necesse est eos ante usum *ἐμβρέχεν*, seu macerare. Quatenam vero sit lupini species culta, quatenam agrestis, haud eruere possum. Vulgares per Graeciam sunt *L. hirsutus* et *pilosus*. *Lupinum angustifolium* Sibthorpius et Smithius habent pro *θέριον ἀγρίον*.<sup>19</sup>

Cap. CXXXV. *Γογγύλην ἀγρίαν* Sibthorpius<sup>20</sup> habet *Cordilocarpum laevigatum* Desf. seu *Erucariam aleppicam* Gaertn.<sup>21</sup> Multa tamen dubia nascuntur e sedula comparatione descriptionis a Dioscoride datae. Et primum quidem nomen ipsum *γογγύλη* indicare videtur, radicem rapaceam adesse, quae haudquaquam in *Erucaria* est. Dein folia digitum lata dicunt, quae pinnatifida, laciniis angustis, linearibus sunt. Demum *καλυκώδεις λοβοί* dicuntur, unde auguror, calycem clausum persistentem sic vocari. Est autem deciduus in *Erucaria*: silicula postremo capituliformis neutiquam adest, sed teres articulata.

Multo magis quadrat *Cordilocarpus muricatus* Desf.<sup>22</sup>, tum quod folia pollicem lata sunt, tum quod pedunculi cum calycibus turgent post anthesin ac speciem pericarpium externi prae se ferunt. Fructus est utique capituliformis: ultimus enim locus dilatatur in globum subrotundum echinatum stylo coronatum. Nihilominus dubius etiam haereo, cum extra Numidiam planta nondum inventa sit.

Cap. CXXXVI. *Βουνιάδα* Speusippus *ῥαφανίδι καὶ γογγυλίδι* similem dixerat. Diphilus Siphnius praedicarat meliorem rapa, dulciorem et concoctu faciliorem.<sup>23</sup> Galenus *ῥαφανίδας* et *βουνιάδας* easdem esse radices perhibet.<sup>24</sup> Plinius, alterum raporum buniada appellari, raphanoque et rapo simile esse.<sup>25</sup> Quae cum ita sint, Bras-

18) Etymol. aegypt. p. 41.

19) Flor. graec. 2. p. 60. 61.

20) L. c. p. 32.

21) De fruct. ac sem. 2. t. 145.

22) Flor. atlant. 2. t. 152.

23) Athen. 9, 8.

24) De fac. alim. 2. p. 622.

25) Lib. 20, 11.

sicae campestris varietatem *Napobrassicam* hoc nomine comprehendi, coniectura consequor.

Cap. CXXXVII. *Θορπάθ* est vox punica, congrua cum arabico *ترفة* (*torphath*), *tuber*, ob tuberosam radicem.

*Ραφανίδα* praesumptam vomituris conferre, me in memoriam *συρμαίας* reducit, quam procerum dici raphanum Erotianus asserit<sup>26</sup>, quem nonnulli cum marina aqua comedentes purgari dicuntur: eiusque purgandi modus *συρμαϊσμός* appellatur. Huc et Diocles Carystius ad Antigonus Regem<sup>27</sup>: *Δεῖ δὲ τὸν μέλλοντα συρμαΐζειν, προφαγεῖν ῥαφανίδας λεπτὰς, κάρδαμον, εὐζωμον κ. τ. λ.*

Cap. CXXXVIII. *Ραφανὶς ἀργία* licet diserte Armoracia Romanorum esse dicatur: contraria tamen sunt folia *λαμψάνης*, contraria est etiam radix gracilis, quae praegrandis et vasta etiam in Cochlearia Armoracia, sponte crescente. Accedit Galeni locus<sup>28</sup>, ubi *ῥαφανὶς ἀργία* eadem dicitur, quam Asiae incolae *ῥαπιάν* vocent. Si *λαμψάνη* est Raphanus Raphanistrum, vel ad *Brassicam campestris*, et quidem spontaneam, referenda *ῥαφανὶς ἀργία* esse videtur, cuius radix, dum sponte crescit, omnino gracilis est, licet culta tuberosa fiat: vel consilium transferendum potius ad *Raphanum maritimum* Smith.<sup>29</sup>, cuius folia etiam lyrata sunt, cuiusque radix, licet succulenta, haud tamen tuberosa est. Crescit ea in Armorica<sup>30</sup> et ad oras Britanniae.

Cap. CXXXIX. Sententiam, quam iampridem protuli, *σίσαρον* et Plinii siser esse nostrum *Sium Sisarum* L., iam mutandam esse censeo, ac quidem ob sequentes rationes:

1. *Sium Sisarum*, non nisi in China boreali spontaneum, vel per Minoritas monachos, a Papa in Asiam orientalem saeculo decimo tertio missos, vel per alios peregrinatores, Marcum forte Paullum, introductum, veteribus

26) Expos. voc. Hipp. p. 88.

27) Fabric. bibl. graec. 12. p. 588.

28) De fac. alim. 2. p. 622.

29) Engl. bot. t. 1643.

30) Loisel. fl. gall. p. 730.



cognita esse nequivit. Iam vero videmus, sisari iampridem mentionem fieri, e. g. ab Epicharmo Syracusio.<sup>31</sup> Dein etiam erraticum s. spontaneum siser habet Plinius<sup>32</sup>, quod de nostro dici nequit.

2. Accedit, indolem amariusculem, quam et Plinius et Galenus<sup>33</sup> in sisaro notant, a nostro sisaro alienam esse.

3. Dein et Plinius testatur, neminem posse tres siseris radices edendo continuare, quod iam Retzio obstitit, quominus sisarum nostrum idem crederet ac antiquorum.<sup>34</sup>

Quae cum ita se habeant, ad partes eorum transeo, qui *Pastinacam sativam* habent σίσαρρον antiquorum. Eorum primus est Fuchsius<sup>35</sup>, quem sequuntur acutissimi auctores Anguillara<sup>36</sup> et Fab. Columna.<sup>37</sup> Pastinacae enim radices saepissime admixtum leviusculum amarorem habent, facileque fastidium cient, unde pauci homines tres integras radices edendo continuare possunt. Ubique etiam in pascuis et pratis per omnem Europam spontanea ab antiquissimis inde temporibus culta fuit. Generositas praecipua in locis Rheno inferiori vicinis praedicatur, unde quotannis Tiberius imperator flagitavit.<sup>38</sup>

Cap. CXL — CXLI. Rumicis species quinque enumerantur. Prima, ὀξύλάπαθον dicta, ab omnibus pro Rumice *acuto* L. habetur, quod ob descriptionis defectum nec affirmare ausim, nec negare. Secunda species, hortensis est R. *Patientia*. Tertiam humilem, mollem, dixerim R. *scutatum*, qui omnino in Europa australi copiosus est. Quartus ab omnibus habetur pro R. *Acetosa*, cuius folia omnino quodammodo cum foliis R. *scutati* componi possunt. Denique Ἰνπολάπαθον videtur R. *Hydrolapathum* Huds. esse, qui ad fossas et in paludibus provenit.

Cap. CXLII. Λαμψάνην Matthiolus pro Sinapi arvensi habuit, in quo plerique eum sequuntur. Fab. Co-

31) Athen. 3, 91.

32) Lib. 20, 17.

33) De fac. simpl. med. 8. p. 124.

34) Flor. Virgil. p. 173.

35) Hist. stirp. p. 750.

36) Semplici, p. 112.

37) Phytobaz. p. 68. t. 19.

38) Plin. 19, 28.

lumna vero *Raphanum Raphanistrum* in Apulia vulgarem, incolis Lampsanam dictum, cuius etiam herba vescantur, hoc nomine insignivit.<sup>39</sup>

Cap. CXLIII. Bliti nomen aegyptiacum *ῥιπλάμ* Rosius ita exponit, ut olus vile, cibi gratia satum dicat.<sup>40</sup> Congruum nomen graccum *βλητόν*, reiectu dignum, vel propter inertiam ac vilitatem, vel etiam ob insulsum fatuumve saporem. Est autem *Amarantus Blitum*. Cum *εὐκοίλιον* dicat Dioscorides, Hippocraticus vero auctor *θερμόν, οὐ διαχωρητικόν*<sup>41</sup>, duae differentes plantae eiusdem nominis fuerunt.

Cap. CXLIV. *Μαλάχη*, cuius folia edebantur ac etiam nunc eduntur a Graecis, est *Malva sylvestris*.<sup>42</sup> Sibthorpius quidem<sup>43</sup> *Althaeam roseam* habet *κηπευτήν*; sed haec distinguitur a Galeno<sup>44</sup> *δενδρομαλάχης* nomine, quae et *ἄλθαία* vocetur. Sylvestrem autem hortensi meliorem esse, Diphilus Siphnius<sup>45</sup> contra nostrum fatetur. Egrege Phantias Eresius descripserat<sup>46</sup> fructum Malvae: esse placentae similem, ac pectinatum illud cum placentae crepidine comparari posse, aut cum echinis marinis *περιγεγραμμένοις*, in medio vero esse centrum umbilicatum. In qua descriptione nemo est, quin fructum Malvae sylvestris noscat.

Cap. CXLV. *Ἀτράφαξις* est *Atriplex hortensis*.

Cap. CXLVI. Brassicam auxilio esse contra *ἀμβλυωπίον*, obscuritatem visus, non sine contradictione est, quanquam et Plinius<sup>47</sup> et Paxamus<sup>48</sup> cum nostro sentiant. Galenus tamen<sup>49</sup> et lentem et brassicam aequaliter siccare, eamque ob rationem visum hebetare docet, nisi forte totus oculus fuerit humidior. Tunc igitur comestum visui prodesse.

Brassicam in Aegypto propter amaritudinem haud edu-

39) Ecpbras. 1. p. 261. t. 263.

40) Etym. aeg. p. 178.

41) Hipp. de diet. 2. p. 687.

42) Walpole travels, p. 245.

43) Flor. graec. 2. p. 43.

44) De fac. simpl. med. 7. p. 67.

45) Athen. 2, 52.

46) Ibidem.

47) Lib. 20, 34.

48) Geop. 12, 17.

49) De fac. alim. 2. p. 632.

lem esse, et alii veteres confirmant. Sic Diphilus Siphnius<sup>50</sup>, et si ex Rhodo Alexandriam semen brassicae feratur, unum in annum dulcem ferre brassicam, dein vero amarescere testatur. Plinius quoque eadem, quae noster.<sup>51</sup> Nostris vero temporibus nil simile observatur: namque et Forskoleus et Delilius brassicam oleribus aegyptiacis accensent, sine circumscribente additamento. Crediderim, propter aestuosum clima amarescere, quotannis vero novum semen e temperatis advehi regionibus.

Crapulam discuti brassicae esu, tralaticium est. Sed crudam brassicam ex aceto ante coenam sumendam esse, Cato suadet.<sup>52</sup> Coctam tamen etiam et Aegyptii et Sybaritae praesumere ante comessiones consueverant.<sup>53</sup> Antipathiam insuper mirabilem brassicae et vitis finxerunt antiqui, ut in vineis brassicam serere noxium putarent.<sup>54</sup>

Τὸ κῆμα sunt propagines, cauliculi iuniores, seu πρωτότομοι καυλοί, quos adversus renum affectus Archigenes commendavit.<sup>55</sup> Non confundendum igitur τὸ κῆμα cum cymis brassicae, seu Brassica cauliflora et asparagoide (*Chou-fleur* Gallorum, *Cavolo-fiore* Italicorum, aut *Broccoli*), quam suavissimam, difficilem tamen in coquendo, et renibus contrariam Plinius declarat.<sup>56</sup> Id omnino contrarium est ii, quod noster de κήματι asserit, quod igitur perperam per cymam redditur, cum potius propago sit.

Cap. CXLVII. Κράμβην ἀγρίαν Sibthorpius existimat *Brassicam* esse *creticam* Lam.<sup>57</sup> Verumtamen, cum haec laevis sit, nec extra Cretam observata; eius opinionis patrocinium a me alienum puto. Multo magis quadrat Br. *incana* Tenor., quippe quae hirsuta est, et per Italiam inferiorem ac Siciliam non raro occurrit. Haec ergo a Romanis Brassica rustica vocari potuit.

50) Athen. 9. 9.

51) Lib. 20, 35.

52) De re rustic. c. 156.

53) Athen. 1, 62.

54) Theophr. hist. pl. 4, 16. *Πάφανον* tamen dicit attico more brassicam. Cf. Galen. de fac. alim. 2. p. 635. Geopon. 5, 11.

55) Galen. de comp. medic. sec. loc. 10. p. 331.

56) Lib. 20, 35.

57) Flor. graec. 2. p. 30.

Cap. CXLVIII. *Κράμβη θαλασσία*. Patres rei herbariae ad unum omnes in eo consentiunt, plantam orarum maritimarum, quam *Convolvulum Soldanellam* vocamus, illo nomine intelligi. Folia huius plantae comparari possunt cum foliis Aristolochiae rotundae, quamquam multo minora sint: ramuli rubent, e quibus concisis lacteus succus salso-amaricans stillat.

Cap. CLII. *Ἀρνόγλωσσον* cognomina ἐπτάπλευρον, πολύνευρον e structura foliorum exponenda. Nomen aegyptium melius scribitur ἄσουθ, ut in codice Apuleii Vossiano et in libro arabico inedito apud Kircherum.<sup>58</sup> Id autem idem significare, quod προβάτειον, Rossius probavit.<sup>59</sup> Nomen punicum ἀττιρκόν corruptum esse ex ebraeo נֶרְקִי יִרְצִי, *herba nervorum*, Bocharti est sententia.<sup>60</sup>

Plantaginem maiorem plerique habent ἄρνόγλωσσον τὸ μείζον, sed scapus angulatus cubitali altitudine repugnat. Itaque, cum et a medio ad verticem semine cinctus dicatur, est vel Pl. *asiatica*, vel *altissima* Iacqu. Τὸ μικρόν autem ἄρνόγλωσσον Pl. *Lagopoda* habet Sibthorpius, *lan-ceolatam* patres rei herbariae: sed folia laevia, mollia (i. e. subcarnosa), angusta, scapi ad terram inclinati, (ascendentes) flores demum seu potius autherae flavae monent, Pl. *maritimam* intelligi.

Cap. CLIII. Sii nomen barbarum λαουβέροδε forte corruptum e λάουεο ἔρβα: *laver* enim antiquum romanum nomen<sup>61</sup>, *lavero* aut *lavari* italum est plantae aquaticae<sup>62</sup>, quam et *crecione* dicunt; *Veronica Anagallis* L., quam Sii appellatione Fuchsius primus delineavit.<sup>63</sup> Sium latifolium vel angustifolium habent alii.

Sium Cratevae Anguillara idem habet cum Sisymbrio altero Dioscoridis (c. 155.) Id autem esse *Nasturtium officinale* R. Br., nemini dubium esse potest: vocatur id etiam in Italia *crecione*.<sup>64</sup>

Cap. CLIV. Sisymbrium primum idem auctor habet

58) Oedip. 3. p. 70.

59) Etym. aeg. p. 21.

60) Can. p. 752.

61) Plin. 26, 32.

62) Anguill. p. 114. Fab. Column. phytob. p. 72.

63) Hist. stirp. p. 724.

64) Anguill. p. 114.



*Mentham sylvestrem*, quàm Italis dici *sesembro* affirmat: Cyrus Pollinius *sosembro matto* scribit.<sup>65</sup>

Cap. CLVI. *Κρίθμον* nomen servavit ad Linnaeum usque, qui genus *Crithmi maritimi* stabilivit, a me cum *Cachry* iunctum. Nihil repugnat in Dioscoridis descriptione, nisi folia latiora portulacae, cum manifesto angustiora sint. At eiusmodi errores a nostro auctore haud alieni.

Cap. CLVII. Nomen *Coronopodis* punicum ἀτιροσίτη a Bocharto ita exponitur, ut ἀτίρ mutet in ἀτούρ, quo iterum verso in ebraeum *אשור*, *vestigium*, σίτη nomen *pici* coniungit.<sup>66</sup> Nescio tamen, statui possit connubium ebraicae et graecae vocis. Equidem haberem *חֲצִיר וְפֶתַח*, *herba picis*, vel *חֲצִיר בְּתוֹ*, *herba hyemis, perennans*. Ergo *Plantago Coronopus*, *Serraria* et *macrorrhiza* Poir., quae species certo ab antiquis haud distinguebantur. Arabice dicitur *coronopus* رجل الغراب (*redschl algorab*) aut *أطريبال* (*atariabelâl*.)

Cap. CLVIII. Σόγχου res species enumerantur: ἀκανθωδιστέρα, τρυφερώτερα, καὶ δεινρῶδης πλατύφυλλος. Prima est *Helminthia echioides* Willd., cuius folia et a nostrae aetatis Atheniensibus tum cocta tum cruda in acetariis esitantur<sup>67</sup>. Secunda species est *Sonchus oleraceus*, tertia *S. palustris* vel *uliginosus* MB. Nomen punicum γαθουονήμ lego *גָּדוּר עֵינִים*, *incisura superficiei*, vel, dum ῖ in ῥ mutatur, *גָּדוּר עָלִים*, *incisura foliorum* (φύλλα ἐσχισμένα τὴν περιφέρειαν legi.)

Cap. CLIX. *Κιχώριον* nomen aegyptium habet Plinius.<sup>68</sup> Hodie saltem evanuit illud nomen, et vel *σείριου*<sup>69</sup> vel *هندب شکوریه* (*hendeb schikhurieh*)<sup>70</sup> vocatur. *Schikhurieh* est nomen gallicum *chicorée*. Rossius, ut originem *κιχωρίου* aegyptiacam tueatur, σὶμ σόρεμ olus erraticum exponit.<sup>71</sup> Cum vero duplex mutatio σ in ζ et χ

65) Flor. veron. 2. p. 250. 66) Can. p. 763.

67) Flor. graec. 2. p. 151. 68) Lib. 19, 39.

69) Wilkins de lingua copt. p. 110.

70) Forskol fl. aeg. p. LXXII. 71) Etym. aeg. p. 89.

postuletur, plausibus haud satis digna videtur ea etymologia.

Σέρως πλατύφυλλος est *Cichorium Intybus*, στενόφυλλος καὶ ἔμπικρος *Cich. Endivia*.

Cap. CLX. *Κονδρίλλης* duae species citantur, altera erecta, cichorio similis, sed tenuior tota, quae gummi largitur; altera folio oblongo, circumroso humique strato, caule vero succi pleno, radice flavescente et succi plena. Illam habemus *Chondrillam iunceam*, e cuius radice et hodie in Lemno insula gummi quaestui faciunt.<sup>72</sup> Alteram Sibthorpius auguratur esse *Apargiam tuberosam* Willd. s. *Thrinciam tuberosam* Cand., cuius radices polymorphas, filiformes, fusiformes, fasciculatas, napiformes, subglobosas, in solo macro graciliores, in calcareo digiti fere minimi crassitiem obtinentes, solerter describit Brotero.<sup>73</sup> Primus Matthiolus nomine Cichorii constantinopolitani a Busbequio acceptum icone illustravit.<sup>74</sup> Dein utramque Fab. Columna egregie explanavit.<sup>75</sup> *Ῥίζα ἑπακμος*, *vegeta radix* versa, potest, ut Marcellus Vergilius iam monuit, meliori iure dici *acuta cuspidē praedita*: radiculae enim singulae in longum filum terminantur.

Cap. CLXI. *Κολόκυνθα* hic scripta *κολοκύντη* Theophrasto et Athenaeo audit. Mutatus autem fuit, lapsu temporum, significatus. Nicander iam *σικύας* nominavit, quae alias *κολοκύνται* dictae fuerant.<sup>76</sup> Euthydemus *σικύας Ἰνδικάς*, quia semina ex India apportata essent.<sup>77</sup> Ex adverso Menodorus Erasistrateus *τῶν κολοκυντῶν τὴν μὲν Ἰνδικήν, ἣ καὶ αὐτὴ καὶ σικύα, τὴν δὲ κολοκύντην* dixit. Hellespontii vero, quae longae erant, *σικύας*, rotundas vero *κολοκύντας* dixere. Megalopolitae *σικύαν Ἰνδικήν, σικωνίαν*, Antiochenses *σικυόν* vocarunt.<sup>78</sup> Hunc loquendi usum sequitur Galenus: ipsius *σικυός* enim *κολόκυνθα* Dioscoridis, *Cucumis sativus* esse videtur<sup>79</sup>, sic-

72) Flor. graec. 2. p. 128. Cf. Galen. de fac. alim. 2. p. 627.

73) Flor. lusitan. 1. p. 326.

74) Comm. in Diosc. p. 388.

75) Phytobas. tab. 3. 4.

76) Athen. 9, 14.

77) Athen. 2, 53.

78) Athen. 1. c.

79) Galen. de fac. alim. 2. p. 567.

ut Geoponici iterum cum nostro κολοκύνθας dicunt cucumeres.<sup>80</sup> Serapionis interpres inscribit hoc caput *haraha*, quod corruptum puto e خیار (*khiâr*), cucumis.

Cap. CLXII. Σίκυς ἡμερος Atticis dicebatur σικυόν, quem Theophrastus hoc nomine habet.<sup>81</sup> Galenus clariori nomine μηλοπέπων tractat.<sup>82</sup> Serapion بطيخ (*bathich*) citrullum dicit, πέπονα vero قرع (*korra*).

Cap. CLXIII. Πέπονος vocem Galenus a πεπανός, τουτέστι πεπεμμένον derivat.<sup>83</sup> Eadem vero obvia est vauietas in usu loquendi, ac quae circa alias cucurbitaceas observatur. Spreusippus σικύαν vocarat τὸν πέπονα: alii σικυὸν πέπονα, cucumerem nimirum maturum.<sup>84</sup>

Cap. CLXIV. Nomen lactucae aegyptiacum ἐμβροσί Rossius ita exponit, ut ἐλμροσίς, et litera λ elisa, ἐμροσίς vocandum esse suadeat.<sup>85</sup> Significat autem ὑπνωτικόν, seu vigilias tollens. Galenus, hanc vim in se ipso expertus, μόνον μοι, inquit, ἀλιξιφάρμακον ἀγρουπνίας ἦν ἐσπέρας ἐσθιομένη θριδακίνη.<sup>86</sup>

Cap. CLXV. Θρίδαξ ἀγρία dicitur *Lactuca Scariola* esse, sed ob amplius folium, caulem elatum et laticis cum meconio, cui miscebatur, affinitatem, ad *L. potius virosam* reducenda est, cum qua iam iunxerunt Lobelius<sup>87</sup> et Dalechampius.<sup>88</sup>

Dictam fuisse ab Aegyptiis *iobonsos*, Apuleius<sup>89</sup> tradit, quam vocem Rossius *iobonsose* scriptam per lactucam sylvestrem explicat.<sup>90</sup>

Cap. CLXVI. Γγγίδιον: *Daucus Gingidium*.<sup>91</sup>

Cap. CLXVII. Σκάνδυξ: olus apud Graecos vulgare ac adeo vile, ut Aristophanes ioculariter Euripidi obiecerit, matrem eius ne olus quidem legitimum venditasse, sed scandicem.<sup>92</sup> Cum anthrisco comparat Plinius, nisi

80) Geop. 12, 19.

81) Hist. pl. 1, 12.

82) De fac. alim. 2. p. 566.

83) De fac. alim. 2. p. 565.

84) Athen. 2, 78.

85) Etym. aeg. p. 48.

86) De fac. alim. 2. p. 626.

87) Advers. p. 39.

88) Hist. pl. p. 523.

89) -C. 31. p. 190.

90) Etym. aegypt. p. 74.

91) Cf. Galen. de fac. alim. 2. p. 640.

92) Plin. 22, 33. Aristoph. Acharn. 473.

quod folia tenuiora sint ac odoratiora. Haec planta ab instauratoribus rei herbariae satis illustratur, *Scandix* nostra *australis* habenda. Honor. Bellus enim, ob saporem odoremque gratum etiam a Graecis hodiernis nomine *σχάνδι* comedi, testatus est<sup>93</sup>, missis simul ad Clusium seminibus, e quibus is plantam educatam primus icone illustravit.<sup>94</sup> Fab. Columna Aniso-marathri nomine exposuit<sup>95</sup>, quem sequutus est C. Bauhinus.<sup>96</sup>

Anthriscum Plinii esse nostrum Chaerophyllum sativum, ut C. Bauhinus coniicit<sup>97</sup>, vero simile habeo, cum Columella id iam cognoscat.<sup>98</sup> *Ἀνθρίσκος* Theophrasti<sup>99</sup>, *ἐνθρουσικόν* Aldinae editionis, *ἐνθρουσκον* codicis urbinatis et Pherecratis<sup>100</sup>, vel idem est, vel Scandicis australis varietas latifolia, quam Londesius *falcata* dixit.

Cap. CLXVIII. *Κανκαλίς* ita in Dioscoride descripta est, ut ad *Caucalida maritima* Lam. coniectura valeat. A Theophrasto iam oleribus adnumeratur.<sup>1</sup> Nicandri scholiastes *λάχανον ἄλμυρόν* vocat. Belonius<sup>2</sup> et Honor. Bellus<sup>3</sup> satis vulgarem in Graecia, et inter acetaria edulem, nomine *Cascalitra* et *κανκαλίδα* invenerunt. Sibthorpii sententia, *Tordylium officinale* hodie *κανκαλίδα* dici<sup>4</sup>, vera omnino esse potest: neque tamen vel ipse ad *κανκαλίδα* veterum reducit: neque foliorum Tordyllii forma cum Dioscoridis descriptione congruit.

Cap. CLXIX. *Εὐζωμον* dictum esse ob suavitatem in condiendis obsoniis, Plinius testatur.<sup>5</sup> Punicum nomen *ἀσουρίν* esse ebraeum *תציר*, *herba*, cum *ruc*, e latino *eruca*, compositum, coniectura consequitur Bochartus<sup>6</sup>, cui aegerrime assentior, quamlibet meliorem *παρωγομασίαν* offerre nequeam. Planta est *Brassica Eruca* L., quae etiamnum in Europa australi in acetariis comeditur.

93) App. ad Clus. hist. p. CCC.

94) Ib. p. CXCIX.

95) Ecphras. p. 90.

96) Prodr. p. 78.

97) Πλάξ theatr. bot. p. 152.

98) Lib. 11. c. 3.

99) Hist. pl. 7, 7.

100) Athen. 7, 102.

1) Hist. pl. 7, 7.

2) Obs. p. 201.

3) App. ad Clus. p. CCCI.

4) Flor. graec. I. p. 180.

5) Lib. 20, 49.

6) Can. p. 753.



Si quis eo solo vescatur, facile capitis dolores ciere, hinc lactuca fere misceri, Galenus est testis.<sup>7</sup>

Sylvestris eruca, quae, in Hispania spontanea, sinapis loco adhibetur, nil aliud esse videtur, quam eadem species, cuius semina omnino sinapis vice cutem rubefaciunt.

Cap. CLXX. "Ὠκίμω Ocimum esse nostrum Basilicum, persuasum habeo, quamvis plura sint, quae repugnare videntur. Et primum quidem Theophrastus lignosas radices lignososque caules tradit.<sup>8</sup> Ad quod respondeo, non solum Ὠκίμω, sed etiam εὐζώμω, quod tamen certo eruca est, eandem tribui lignosam indolem. Dein et de ocimo<sup>9</sup>, et de ricino<sup>10</sup>, et de aliis plantis, quae annuae sunt in temperata Europa, observatum est, in calidioribus climatibus lignescere. Ad haec regesserit forte quispiam, ocimum Theophrasti surculis propagatum esse aut multiplicatum propaginibus<sup>11</sup>: sed et hoc haud sine exemplo est in annuis aut biennibus saltem plantis: e. g. in Brassica oleracea eiusque varietatibus viridi ac bullata.

Accedit, quod nostram sententiam tuetur, fragrantiam herbae a Dioscoride tantopere praedicari, ut et olfactu sternutamenta plura excitet: et Theophrastum loqui de mutatione ocimi in serpyllum.<sup>12</sup> Quod cum Gargilius Martialis repetat, addit, flores esse modo purpureos aut roseos, modo albos.<sup>13</sup> Galenus etiam opsonii loco inseruire cum oleo et garo tradit.<sup>14</sup>

Iam vero negotium facessit ocimum Romanorum, certe diversum a nostro, cum pabulum esset mixtum e variis herbis, et ita ob celeritatem proveniendi vocitatum.<sup>15</sup> Compositum fuisse e faba, vicia et ervilia, admixta etiam melius avena graeca, Plinius diserte docet.<sup>16</sup>

Grave illud discrimen instauratores rei herbariae, e.

7) De fac. alim. 2. p. 639.

8) Hist. pl. 1, 6.

9) Belon. app. ad Clus. hist. p. 112. Forskol. fl. aeg. p. LXVIII.

10) Brocchi in Bibl. ital. 1822. Mai. p. 219.

11) Hist. pl. 7, 2.

12) Causs. pl. 5, 7.

13) Pallad. Apr. 3.

14) De fac. alim. 2. p. 640.

15) Cato c. 27. 54. Varro de re rust. 1, 23.

16) Lib. 18, 42.

g. Hermolaus Barbarus<sup>17</sup>, iam perspexere, ut etiam autumarent, Graecorum plantam potius ὄζιμον, fragrantiae caussa, scribendam esse. Seriores Graeci ὠκίμον cum βασιλικῷ coniungunt, commendato eo ad sternutamenta et odoramenta cārdiaca.<sup>18</sup> Serapion nostram plantam بادرج (baderûdsch) vocat<sup>19</sup>: tribuit ei odorem caryophyllaceum, easdemque vires, quas Galenus aliique in ὠκίμῳ celebrant.

Cap. CLXXI. Orobanche Dioscoridis sine dubio nostra est *Orobanche caryophyllea*, quae etiam hodie apud Graecos λύκον nomine venit.<sup>20</sup> Fabis innasci posterioris sementis, erutu difficillimam esse, Walpolius testatur.<sup>21</sup> Nomen λέων et ὀσπρολέων in Geoponicis recurrit.<sup>22</sup> Theophrasti vero ὀροβάγγην aliam esse plantam, quia ἐπιβάλλει ὥσπερ πλεκάνη τὰς βοτάνας<sup>23</sup>, cum Anguillara<sup>24</sup> exploratum habeo. Nec refragarer, si quis hanc pro *Cuscutae* specie vènditaret.

Cap. CLXXII. *Tragopogon crocifolius*, cuius radix est esculenta, iisdem fere verbis describitur a Theophrasto.<sup>25</sup>

Cap. CLXXIII. Ὀρνιθόγαλον, s. ὀρνίθος γάλα Nican-dri<sup>26</sup>, nomen habet ab albo florum colore: ὀρνίθων γάλα dictum fuit albumen ovorum gallinaceorum.<sup>27</sup> Dicebatur de Samo insula, omnium bonorum, praeter vinum, feraci, ὅτι φέρει καὶ ὀρνίθων γάλα.<sup>28</sup> Et de beato felicique viro, ὅτι ἀμέλξει ὀρνίθων γάλα.<sup>29</sup>

Ebraice dicta fuit planta ירורי יונים, *stercus columbinum*<sup>30</sup>, ob floris albidum cum herbaceo mixtum colorem, sicut in stercore plerarumque avium herbivorarum ea mixtio observatur. Est enim *Ornithogalum umbellatum*,

17) Coroll. 374.

18) Théophan. epit. c. 20, 103. Symeon Seth de cib. fac. p. 11.

19) Cap. 157.

20) Flor. graec. 1. p. 440.

21) Memoirs, p. 244. 245.

22) Lib. 2. c. 42.

23) Hist. pl. 8, 8. Causs. pl. 3, 15.

24) Sempl. p. 89.

25) Hist. pl. 7, 7.

26) Athen. 9, 12.

27) Schol. Lucian. de mercede cond. p. 231.

28) Strab. lib. 14. p. 523.

29) Lucian. de mercede cond. p. 281.

30) 2 Reg. 6, 25.

quod, per omnem orientem proveniens, bulbos habet edules, licet a pauperibus duntaxat petantur. Haec Linnaei expositio biblici loci multo plus valet, quam septem et quod excedit ἐξηγήσεις, quas Bochartus enumerat.<sup>31</sup>

Κάγχου aut κάχους significare gemmas arborum, patet e Theophrasto.<sup>32</sup>

Cap. CLXXIV. Ὕδνον, quod Thraces ὕτον<sup>33</sup>, Aëtius et Graeci recentiores ἕτνον appellant, *Tuber* esse cibarium videtur. Κεραύνιον dicebatur, quod post tempestates et tonitrua valida copiose provenire observatum esset.<sup>34</sup> In Laconia frequentia sunt tubera, quae ope virgae divinatoriae investigantur.<sup>35</sup>

Cap. CLXXV. Σμίλαξ κηπαία est sine haesitatione idem genus ac φασιόλος (c. 130.), sed alia species. E volubili enim indole et seminibus variegatis, partim rufescentibus, patet, esse nostram σμίλακα *Phaseolum vulgarem*, seminibus variegatis, qui ex India orientali Alexandri forte temporibus allatus, a Theophrasto et δολίχος nominatur.<sup>36</sup> Eum ipsum dolichon suo aevo vel λοβόν, vel φασηόλον dici, Galenus testatur.<sup>37</sup> Sed probabile etiam est, φασιόλου nomine notari *Phaseolum nanum*. Alvo facile δολίχους secedere, Hippocraticus auctor docet.<sup>38</sup> Diocles autem primus videtur φασηόλων nomen introduxisse.<sup>39</sup> Ita φασηόλους virides in coenis pro bellariis Lacones dedisse, Polemon tradit.<sup>40</sup>

Cap. CLXXVI. De μηδικῇ, *Medicagine sativa*, ambigi nequit, cum omnia congruant. Nomen sortita est a patria Media.<sup>41</sup> Fructus, qui hic corniculi modo contortus dicitur, πολυκαμπές καὶ σκαληνόν a Plutarcho vocatur.<sup>42</sup>

31) Hieroz. 2. p. 38 — 44.

32) Hist. pl. 3, 5. 14.

33) Theophr. hist. pl. 1, 6.

34) Theophr. l. c. In Athenaeo 2, 59. perperam scribitur γερά-  
ρειον. Cf. Plutarch. sympos. 4, 2.

35) Walpole mem. p. 284.

36) Hist. pl. 8, 3.

37) De fac. alim. 1. p. 542.

38) De diaet. 2. p. 677.

39) Galen. de fac. alim. 2. p. 545.

40) Athen. 2, 46.

41) Strabo lib. 11. p. 560.

42) Quod hand possit suaviter vivi sec. Epic. p. 444.

Cap. CLXXVII. *Ἀράκη* vario modo patres rei herbariae interpretati sunt. Fuchsius et Matthiolus *Viciam sepium*<sup>43</sup>, Dodonaeus *Lathyrum Aphacam*<sup>44</sup>, Dalechampsius *Viciam angustifoliam*<sup>45</sup> pro ea acceperunt. E quibus Dodonaei opinio probabilis quidem est ob altitudinem plantae, sed *λεπτόφυλλος* dici non potest, cum stipulae foliaceae latiusculae sint. Multo magis congruit *Vicia angustifolia*, sed fructus minores, angustiores saltem, sunt quam viciae sativae. Equidem ob staturam potissimum ambigo, fluctuans inter *Viciam bithynicam*, (quae tamen seminibus variegato-maculatis gaudet,) *V. luteam* et *hybridam*.

Cap. CLXXVIII. Porrum *καρτόν*, *sectivum*, dici, non novum est. Sic, praeter *εὐπόριστα*<sup>46</sup>, et Galenus *κρόμνα*, τὰ κάρτα καλούμενα habet.<sup>47</sup> Posset tamen aliquis ad aegyptiacum *κόρθου* consilium transferre, quod natum esse vel e כרר, radice ebraea, *secare*, vel كرات arab. *porrum*, et نوم, *allium*, ut *σκοροδόπρασον* exprimat.<sup>48</sup> Sed nimis anxie e peregrinis linguis consarcinatae *παρωμασίαι* minus arrident.

Cap. CLXXIX. In *Allio Ampelopraso* constituendo nullum superest obstaculum. Namque et in Graecia frequens est, et sententiae doctorum virorum congruunt.

Cap. CLXXX. *Cepa longa* (*κρόμμυον τὸ μακρόν*) videtur esse Theophrasti *γήτειον*, ὥσπερ ἀκέφαλόν τι καὶ αὐχένα μακρὸν ἔχον.<sup>49</sup> Est *Cepa hyemalis*. Quid *Cepa flava* sit, nescio. Notae enim cepae aut candidos aut purascentes, rufos etiam bulbos gerunt, aut candidos. Cum vero Plinius<sup>50</sup> et Serapion<sup>52</sup> rufescentes loco flavarum habeant, cum Marcello Vergilio *πυρρόν* aut *ερυθρόν* loco *ξανθοῦ* ponendum: vel, quod satius duco, *ξανθόν* etiam colorem rufum significare. Sic enim Plato<sup>51</sup>: *λαμπρόν τε ἐρυθρῷ λευκῷ τε μιγνύμενον ξανθὸν γέγονε*.

43) Fuchs. hist. stirp. p. 110.

44) Hist. pl. p. 545.

45) Hist. pl. p. 478. 46) Lib. 2. c. 117.

47) Meth. med. 12. p. 815.

48) Rossi etym. aeg. p. 92.

49) Hist. pl. 7. 4.

50) Lib. 19, 52.

51) Cap. 354.

52) Tim. c. 68. p. 119. Ed. Lindau.



Cap. CLXXXI. Nuclei aut fibrae, bulbilli laterales ἀγλιθεις hic dicuntur, γέλγεις Theophrasto, γελγίδεις Hesychio, Goellinge aut Brutzwiebeln Germanis vocantur. Ὀφιοσκόροdon<sup>53</sup> est Io. Bauhino *Allium arenarium*, *Scorodoprasum* vero probabilius Sibthorpio.<sup>55</sup>

Τὸ μυτιωτόν, (ὁ μυτιωτός Hesychio) est intritum e variis obsoniis paratum: dicebatur autem a foetore, παρὰ τὸ μυσάττεσθαι αὐτοῦ τὴν ὁσμήν.<sup>55</sup> E caso, allio, ovis, oleo et porro confici alibi docetur.<sup>56</sup>

Cap. CLXXXII. In σκοροδοπράσω definiendo valde dissentiunt auctores, neque aliquid e veterum descriptione cognoscimus, quam quod et porri et cepae indolem iungat. Tragus iam et Valer. Cordus nostrum vulgatissimum *Allium Scorodoprasum*, Lobelius et Clusius A. *Ampeloprasum*, Sibthorpius *Allium descendens* accipiunt.

Cap. CLXXXIV. Κάροδαμον est *Lepidium sativum*. Nomen omnino a καρδία derivandum, quia τὴν ἱκμάδα τῆς φροντίδος ἀνασπᾷ, ut Comicus ait<sup>57</sup>, cor autem sedem animae iuxta Aristotelem Stoicosque constituat, et animam eo prudentior cogitetur, quo siccior.<sup>58</sup> Aegyptium nomen σέμεθ similem habere significatum, Rossius probavit.<sup>59</sup>

Babylonicum dicit noster optimum esse. E Persia enim originem habet<sup>60</sup>, in persicis aromatibus enumeratur<sup>61</sup>, et persicum nomen σκάφος citatur<sup>62</sup>, quod quem habeat cum arabica appellatione حَرْف (chorf) nexum, ignoro. Antiphanes vero milesium optimum iudicat.<sup>63</sup>

Cap. CLXXXV. Θλάσπι (Hippocratici et Paullus Aegineta scribunt ἡ θλάσπης) nomen habere a fructu ἐντε-

53) Hist. pl. 2. p. 599.

54) Flor. graec. 1. p. 533.

55) Schol. Aristoph. vesp. v. 62.

56) Schol. Aristoph. equit. v. 782.

57) Aristoph. nub. 234. 235.

58) Galen. quod animi mores sequantur corp. temp. p. 786. Καὶ γὰρ Ἡράκλειτος οὕτως εἶπεν· ἀγὴν ξηρὴν, ψυχὴν σοφωτάτην, τὴν ξηρότητα ἀξιών εἶναι οὐρέσεως αἰτίαν. Diogen. Apollon. apud Theophr. de sens. p. 665.

59) Etym. aeg. p. 190.

60) Olivier voy. dans l'emp. Othom. 3. p. 120.

61) Xenoph. cyrop. 1, 2.

62) Schol. Aristoph. nub. v. 234.

63) Athen. 1, 50.

θλασμένῳ, confirmatur et a Galeno, qui ἐνθλασμά τι μικρόν in fructu adesse asserit<sup>64</sup>, quod sine dubio ad emarginatam apice siliculam Thlaspeos reducendum. Non desunt tamen, qui peregrinam statuunt originem, quam Rossius ex aegyptiaco λαψι eruere conatur<sup>65</sup>, licet adsit appellatio alia aegyptiaca σονιτέμπος, de qua nihil habet, quod lucem afferat. Descriptio Dioscoridis optime quadrat in *Thlaspi Bursam*. Sed Galeni thlaspeos duo genera e Cappadocia obscura sunt, sicut et Cratevae persicum sinapi, quod infra (c. 204.) ad Capparin refertur. Thlaspi Cratevae, in hoc capite citatum, ab Anguillara<sup>66</sup> habetur pro *Lepidio campestri* R. Br., Thl. cappadocicum pro *Iberide umbellata* L. Posteriori sententiae libenter adstipulor.

Cap. CLXXXVI. Δράβη fere omnium consensu est *Lepidium Draba* L.

Cap. CLXXXVII. Ἐρύσιμον Anguillaræ est *Sisymbrium polyceraton*.<sup>67</sup> Nomen aegyptiacum ἐρεθμοῦ, ἐρετμό, λεπτῦνον significare et radicem esse, e qua graeca appellatio exstiterit, Rossius perhibet.<sup>68</sup>

Cap. CLXXXVIII. Piperis genera duo iam a Theophrasto distinguuntur, rotundum longumque. Illi colorem tribuit rubicundum, qualis in maturis baccis omnino apparet, sed dein nigrescit. Piper longum esse nigrum et semina continere, qualia papaveris: fortius etiam esse priori.<sup>69</sup> Noster spicam oblongam, obtusam, quam Piper longum exhibet, cum siliquis comparat, et ad immaturum fructus statum consilium transfert. Virides enim spicae seu semimaturae decerpuntur cum pulpa, intra quam semina nidulantur: ita ad solis aut foci aestum exsiccata indurescunt in corpus cylindricum, pallide cinereum, tuberculatum, granulis exiguis oblique dispositis.<sup>70</sup>

64) De antidot. 1. p. 81.

65) Etym. aeg. p. 66. Nempe nullum originetenus graecum nomen in ε desinere dicitur, nisi μέλι, τὲ, σέσση, σίνγη. Athen. 2, 73. Eustath. ad, II. II. p. 784.

66) Sempl. p. 171. 67) L. c. p. 173.

68) L. c. p. 52.

69) Theophr. hist. pl. 9, 20.

70) Rumph. herb. amb. 5. p. 333.

Piper album medicamentis, nigrum magis condimentis aptum declarat, licet et in hoc quoddam reperiatur, quod *βράσμα* vocat.

Plinius haec et alia, hallucinationum plena, miscet.<sup>71</sup> Et protinus quidem iuniperis similes habet arbores, quae piper gignant. In quo vehementer fallitur: namque frutices sunt scandentes, foliis nervosis, glabris, cordatis in P. longo, late ovatis in P. nigro. Fructus autem quodammodo cum iuniperi fructibus comparari possunt. Recte tamen Plinius fructus P. longi siliquaeformes, priusquam dehiscant, decerptas sole torreri dicit. Sed iam pergit: paullatim maturitate dehiscentes ostendere candidum piper, quod dein solibus tostum colore rugisque mutari et *carbunculari*. Sic fieri semina cassa et inania, quod vocent *brechma*, sic Indorum lingua significante abortum. Fallitur ergo, dum piper nigrum candidum e longo nasci perhibet: fallitur, dum *βράσμα*, vocem mere graecam, in *brechma* mutat, et indicam existimat. Significat enim bullas ex effervescentia natas.<sup>72</sup>

Galenus immaturos ideoque subhumidos habet longi piperis fructus, qui propter humiditatem etiam facile foraminula obtineant, dum reponantur. Piper etiam album semimaturum (*οἶον ὄμφαξ*) habet, nigrum fieri *ὑπερωπτημένον καὶ ὑπερεξηραμμένον*.<sup>73</sup> Is error tandem nuperis evanuit temporibus. Compertum enim habemus, omne piper maturum demum nigrescere, quoniam testa exterior eum colorem adipiscitur. Ea autem testa maceratione in aqua secedente, *βράσμα* illud nasci, piper ipsum vero candidum reddi.<sup>74</sup> Cum hic verus sit nucleus, testa nigra vero ad baccam pertineat, piper nigrum omnino albo virtute inferius indicamus.

Quod nomen attinet, sine dubio indicum est. *Pipel* piper longum, *Mirtsch* nigrum Indis dicitur.<sup>75</sup> Ex illo Arabes formarunt suum *فلفل* (*Folfel*) et *دار فلفل*

71) Lib. 12, 14.

72) Salmas. Plin. exerc. p. 724.

73) De fac. simpl. med. 8. p. 97.

74) Marsden hist. Sumatr. p. 105.

75) Fleming in Asiat. research. 11. p. 174.

(*Dâr folfel*): ista voce piper nigrum, hac piper longum significante. Fructum huius Avicenna<sup>76</sup> aptius cum amento salicis (الكلاف) comparat.

Quid radicem piperis veteres vocarint, non liquet. Equidem putarim, radicem Galangae, quam Arabes introduxerunt, hoc titulo intelligi. Avicenna tamen peculiari nomine فلفلموية (*Folfelmujath*) anumerat.<sup>77</sup>

Cap. CLXXXIX. Ζιγγίβρις, arabica vox زنجبيل (*Zindschebíl*), arabicam originem signat. Licet hodie haec radix ex India orientali apportetur, crescere eam tamen in Arabia Forskoleus testatur.<sup>78</sup> Troglodytarum regio est ora Africae orientalis, quae Arabiae, qua Zephyrum spectat, adversa est.<sup>79</sup> Ibi etiam zingiber nasci, Rumphius est testis.<sup>80</sup> Hinc sententiam mutavi, Saraceno assentiens, qui inter Τρωγλοδυτικῇ et Ἀραβίᾳ καὶ esse ponendum auguratur, cum et Plinius atque interponat. Radix zingiberis recens condita, qualis Dioscoridis aetate in Italiam asportabatur, multo praestantior est ea, quae ex inveterata extra patriam paratur. Viridis etiam radix in India, in frustula secta, cum aliis herbis, instar acetarii, editur.

Cap. CXC. Ὑδροπέπερι nullam prorsus difficultatem habet. In omni Europa vulgare *Polygonum Hydropiper* iam a Fuchsio bene illustratum<sup>81</sup>, admodum acri sapore praeditum est. Μασχάλαι hic dicuntur ochreae seu stipulae concavae, caulem, qua folia exeunt, ambeunt. In Theophrasto haec vox gemmarum significatu occurrit.<sup>82</sup> Ceterum axillarum concavarum informatio ad utrumque significatum applicari potest.

Cap. CXCI. In παρμικῇ Fuchsius iam *Achilleam Ptarmicam* agnovit.<sup>83</sup> Quem plerisque sequentibus, Matthiolus praeterea addidit παρμικὴν, quae *Xeranthemum*

76) Edit. arab. p. 159.

77) Ib. p. 237.

78) Flor. arab. p. 211.

79) Agatharchides in Phot. 250. p. 454. Strabo 16. p. 424. Plin. 5, 8. 7, 2.

80) Herb. amboin. 5. p. 156.

81) Hist. stirp. p. 842.

82) Hist. pl. 3, 13. Caus. 1, 6.

83) L. c. p. 638.



*annuum* est, cui et accedit Sibthorpius. Planta quidem est omnino rupestris: folia enim oleae foliis similia sunt: neque tamen capitula florum parva sunt, neque acri odore, neque sternutamenta cient, aut cum anthemidos floribus ullo modo comparari possunt. His demum adiunxit Dalechampius *Arnicam montanam*<sup>84</sup>, quae nullo modo quadrat. Itaque in Achillea Ptarmica subsistimus, quamquam loca natalia non satis respondeant: nascitur enim per omnem Europam in pascuis, potius et pratis, quam in montibus et petris.

Cap. CXCI. *Στρούθιον* punice dicebatur *שורש*, *radix*, e quo *συρίς* corruptum esse, Bochartus iam monuit.<sup>85</sup> Sic Plinius: Tingentibus et *radicula* lanas praeparat, quam *στρούθιον* a Graecis vocari diximus.<sup>86</sup> Aegyptium nomen proprie *οἶνον* esse, quod *radix purgatoria* sit, Rossius probat.<sup>87</sup> Unde graeca appellatio originem habeat, fateor me nescire. Sed quaenam sit planta, neutiquam dubito, cum *Saponariae officinalis* indoles usquequaque congruat. Misit tamen Ferd. Imperatus ad C. Bauhinum *Gypsophilam Struthium*, cuius radix et Neapolitanis saponis vice inserviat, *کنندس* (*khondus*) creditum Arabum.<sup>88</sup> An vero haec in Graecia crescat, haud liquet, cum *Saponaria* sit frequentissima.

Cap. CXCI. Cyclaminis nomen aegyptium Rossius *porcinam* herbam interpretatur, quia pabulum subus gratum praebeat.<sup>89</sup> Similem autem appellationem in omnibus propemodum linguis deprehendimus. *Pamporcino* enim Italica, *Pain de pourceau* Gallica, *Pan de puerco* Hispanica, *Sow-bread* Anglica, et ipsis Zeylanensibus *Urulu*, ab *uru*, quod porcum notat<sup>90</sup>, dicitur. Apuleius aliud habet cognomen *Palalia*, quod Rossius a *natibus* derivat, quibus applicatur. Unde arabica nomina *بخور مريم* (*bachur Mariae*), suffitus Mariae, et *عرطنيثا* (*arthanitsa*) originem

84) L. c. p. 1169.

85) Can. p. 753.

86) Lib. 24, 58.

87) L. c. p. 140.

88) C. Bauhin. pinax, p. 206.

89) L. c. p. 64.

90) Burm. thes. zeyl. p. 84.

ducant, me plane latet. Sed posterior appellatio in medium aevum transiit.

Cyclaminis vires in accelerando partu confirmantur a Io. Gerardo<sup>91</sup>, sed ipsa etiam superstitio de transgressu periculoso mulieris praegnantis sequentibus verbis repetitur: „It is not good for women with child, to touch or take this herb, or to come near unto it, or stride over thesame, where it groweth: for the natural attractive virtue therein contained is such, that without controversy, they that attempt it in manner above said, shall be delivered before their time. Which danger and inconvenience to avoid, I have, about the place, where it groweth in my garden, fastened sticks in the ground, and some other sticks I have fastened also cross-way over them, least any women should by lamentable experiment find my words to be true, by stepping over thesame.“ Eam superstitionem editor Iohnsonius et muliebrem indicat et e vano haustam frivolaque.

Cap. CXCIV. Mirum est, quantopere hariolati sint, qui cyclaminis alterius explicationem tentarunt. Alii Cucubalum bacciferum<sup>92</sup>, vel Solanum Dulcamaram, alii Tamum communem huc traxerunt. Nonnulli ingenue fassi sunt, semet interpretari hanc plantam non posse, e. g. Anguillara et Valer. Cordus: Matthiolus et Dodonaeus penitus omiserunt. Equidem C. Gesneri opinionem, esse *Loniceram Periclymenum*<sup>93</sup>, ceteris probabiliorem existimo.

Cap. CXCV. *Δρακοντία μεγάλη* a Brunfelsio iam<sup>94</sup>, Fuchsio<sup>95</sup>, Trago<sup>96</sup>, praesertim Dodonaeo<sup>97</sup> illustratur. Est *Arum Dracunculus* L., planta, quae a Carniolia inde per omnem Europam australem crescit. Caulis est purpureo-maculatus: folia pedata, foliolis lanceolatis: quae forma omnino ad Rumicis acuti aut Hydrolapathi folia accedit: *ἀντεμπλεκόμενα* dicuntur, quia mutuo secum nexa aut im-

91) Herb. emacul. p. 845.

92) Luc. Ghini apud Dalech. p. 1429.

93) Ad Valer. Cord. in Diosc. f. 45<sup>a</sup>.

94) Herb. i. p. 64.

95) Hist. stirp. p. 235.

96) Herb. p. 296.

97) Hist. stirp. p. 329.

plicitá sunt. Plinius, frequenter commutari hanc plantam cum aro, sibi que triplici effigie demonstratum esse dracontium, tradit.<sup>98</sup> Arabes أروف (*luf*) dicunt.

Cap. CXCVI. Δρακοντία ἑτέρα a Dodonaeo<sup>99</sup> exponitur. Est *Arum italicum* Lam. Ari radices, licet recentes acrimoniam noxiam habeant, coctas tamen, aut siccatas, aut aceto maceratas edules esse et bonum praebere nutrimentum, novum non est. Valet id praeprimis de Aro esculento, Colocasia et virginico. In Balearibus vel huius, vel alius speciei, *Ari* forte *criniti* Ait.<sup>100</sup>, radices multo melle coctas placentarum loco in conviviiis apponere consuerunt.

Cap. CXCVII. Arum Dioscoridis post renatas literas duplicem passum est interpretationem, alteram a Luca Ghinio, alteram a Ludovico Anguillara defensam. Ille Colocasiam, hic Arum vulgare subesse voluit.<sup>1</sup> Utriusque radix esculenta est, dum coquitur aut torretur; sed magis Colocasia: haec etiam caulem purpureum gerit. Sed et de Aro maculato vulgari Anguillara testatur, in Slavonia panis speciem e radice confici, et in Albania coctam comedi, raparum ad instar. Dein cum in bonis codicibus folia dicantur μικρότερα (haud μακρότερα) τοῦ δρακοντίου, cum ἀσπιλότερα, minus maculosa, haud prorsus ἀσπιλα esse perhibeantur, porro cum radix comparetur cum radice δρακοντίου et alba dicatur, magnopere a Colocasia recedit: quippe quae radicem ingentem extus rufescentem, folia bipedalia, peltata gerat, rarissime etiam floreat, tum ab Anguillara, tum a Columna<sup>2</sup> et ab Aro Dioscoridis et a Faba aegyptia, cum qua etiam commutabatur, diversa probatur. Haec est sine dubio, de qua Plinius<sup>3</sup>: „Est inter genera (bulborum) quod et in Aegypto aron vocant, scillae proximum amplitudine, foliis lapathi, caule recto duum cubitorum, baculi crassitudine, radice mollioris natura, quae edatur et cruda.“ Bene

98) Lib. 24, 92. 93.

99) L. c.

100) A. muscivorum L. suppl. p. 410. Bot. reg. t. 831.

1) Sempl. p. 127.

2) Ecphr. 2. p. 3.

3) Lib. 19, 30.

etiam Galenus Arum vulgare a cyrenaico distinguit, quod in Italiam advehatur: hoc Colocasia esse videtur.<sup>4</sup> Vulgaris radix coquebatur, priore aqua effusa, in aliam calidam coniicienda. Mandi etiam aquae cum sinapi aetove incoctam, cum oleo et garo, atque cum condimentis iis, quae e sale caseoque parentur.

Quomodo *Arum Dioscoridis* Sibthorpii, quod in Cypro insula vulgare invenit<sup>5</sup>, cuiusque radix esculenta sit, ab Aro maculato et italico differat, non liquet.

Cap. CXCVIII. Ἀρίσαρον natum esse ex ἀρίς ἢ ἱσαρον, *aris*, quae similis aro, auguratur Salmasius.<sup>6</sup> Namque Plinius scribit: „Est et *aris*, quae in Aegypto nascitur, minor tamen minoribusque foliis, et utique radice, quae tamen olivae grandis magnitudinem implet.“<sup>7</sup> Sic et ἀρίς Galeno<sup>8</sup> ac Hesychio plantae genus est.

Duo autem Arisara italica Anguillara proponit<sup>9</sup>: alterum foliis angustis lanceolatis, haud procul a Roma, in Dalmatia et Peloponneso crescens, alterum foliis hederaceis, quod in Etruria proveniat. Illud est *Arum tenuifolium*, a Matthiolo<sup>10</sup> et Clusio<sup>11</sup> delineatum: alterum vel A. *Arisarum* vel *proboscideum*: utrumque enim Caetanum Savi in Etruria indicat.<sup>12</sup>

Cap. CXCIX. Ἀσφόδελος Dioscoridis omnino idem ac Theophrasti esse videtur. Sed Galeni longe differt. Primum enim de radice loquitur simplici, et figura et amarore scillae radicem aemulante. Amaritudinem quidem evanescere, si, ut lupini, paretur; sed se novisse tamen rusticos, qui, grassante fame, vix tandem compluribus elixationibus, lotionibus macerationibusque in aqua dulci eam edulem reddiderint.<sup>13</sup> Haec nullo modo nostra esse potuit, sed Dodonaeo assentiendum, qui *Ornithogalum stachyoides* pro eo pinxit.<sup>14</sup>

4) De fac. alim. 2. p. 649.

5) Flor. graec. 2. p. 245.

6) Plin. exercit. p. 919. Ceterum cognomina ἱσαρον et ἱαρον, quae ad Dracontiam citantur, recta sunt. Ultimam a Lusitanis servatur, Arum enim dicitur *iaro*. (Brotero fl. lusit. 2. p. 381.)

7) Lib. 24, 94.

8) Expos. voc. Hipp. p. 442.

9) Sempl. p. 176.

10) Comm. in Diosc. p. 450.

11) Hist. pl. 2. p. 74.

12) Botan. etrusc. 4. p. 101. 102.

13) De fac. alim. 2. p. 652.

14) Hist. stirp. p. 209.



*Asphodelus* priscorum Pelasgorum<sup>15</sup> et Odysseae<sup>16</sup>, quem sacrum habuerunt Graeci, in tumulis serentes<sup>17</sup>, quem comedere gestivit Pythagoras<sup>18</sup>, est *Asphodelus ramosus* L., cuius radices teretes, oblongae et fasciculatae sunt. Caulis vocatur ἀνθέρικος<sup>19</sup>, sed et ἀνθέριξ<sup>20</sup>, e quo cicadarum decipulae conficiebantur. Quid quod Numidiae incolas, quos *Asphodelodes* Diodorus Siculus appellat<sup>21</sup>, tuguria ex antherico struxisse Hellanicus tradit.<sup>22</sup>

Cap. CC. Βολβὸς ἐδωδίμος, γνώριμος πᾶσι, ideo non describitur. Neque Theophrastus aliquid addit, nisi quod cum aliis liliaceis comparet, foliaque dicat angusta.<sup>23</sup> Dodonaeus primus<sup>24</sup>, et post eum Dalechampius<sup>25</sup>, *Muscari* et *botryoides* et *raemosum*, maxime vero *comosum* βολβοῦ ἐδωδίμου esse species statuerunt, annuente Anguillara, qui in Creta, Corcyra et Zacyntho, ut et Italia ipsa, bulbos eos edules crescere et perperam pro Hyacinthis haberi, statuit.<sup>26</sup> Confirmatur a Sibthorpio, qui βουρβοῦ aut βολβό nomine *Muscari comosi* bulbos comedi ab incolis insularum testatur.<sup>27</sup>

Cap. CCI. Βολβὸν ἐμετικόν Matthiolus habuit *Muscari moschatum*, Dodonaeus *Narcissum Ionquillam*, Lonicerus *Scillam bifoliam*, Sibthorpius *Ornithogalum stachyoides*, Camerarius *Narcissum poëticum*. In confesso autem est, Narcissorum variorum bulbos emetica vi polle-  
re<sup>28</sup>, quam et in ipsis floribus Galli investigarunt. Hinc Dodonaeo assentior, qui Narcissi Ionquillae bulbos eo fine adhibitos fuisse statuit.

15) Hesiod. op. et dies v. 40. 41.

Νήπιοι, οὐδ' ἴσασιν, ὅσῳ πλέον ἤμισυ παντὸς,  
οὐδ' ὅσον ἐν μαλάχῃ τε καὶ ἀσφοδέλῳ μέγ' ὄνειρε.

16) Od. II, 539. 24, 13. 14.

17) Porphy. apud Eustath. in Od. II, 539. Ἀσφοδελόν scribi locum, qui asphodelum contineat, ἀσφοδέλον vero plantam ipsam.

18) Porphy. vit. Pythag. p. 195.

19) Theophr. hist. pl. 7, 13. Schol. Nicandr. ther. v. 534.

20) Theocr. id. 1, 52. 21) Lib. 20. c. 57. 22) Athen. 10, 6.

23) Hist. pl. 7, 13. 24) Hist. stirp. p. 217. 218.

25) Hist. pl. p. 1502. 26) Sempl. p. 119.

27) Flor. graec. I, p. 238.

28) Candoll. Essai sur les propriétés méd. des plantes, p. 345. Bullet. de pharm. 1811. n. 3. p. 128.

Arabes بصل القى (*basel allaki*) bulbum vomitorium, et esculentum بصل الزير (*basel alzir*) vocarunt.

Cap. CCIII. De Pancratio variae sunt sententiae. Principem meretur locum Anguillara, qui nil esse nisi rubram varietatem *Scillae maritimae* contendit, quae, quo candidiorem habeat bulbum, eo melior esui sit. Hinc in inopia duntaxat legitimae scillae confugiendum ad pancratium.<sup>29</sup> Lobelius, quanquam et hoc largitur, tamen primus *Pancratium* constituit *maritimum*<sup>30</sup>, quod nullo modo Dioscoridis planta esse potest, quia bulbus extus albus est.

Avicenna, qui altero loco de أسقيل (*iskil*) tractat<sup>31</sup>, quam بصل الفار (*bazol alfâr*), cepam muris, vocat, quia mures occidat, altero loco عنصل (*anzal*) adducit<sup>32</sup>, quem etiam بصل الفار appellat, cuiusque folia lilio similia, et oleum (دهن) ad nigredinem proclive sit. Loco دهن in valde corrupto textu forte لون, *color*, legendum. An vero scillam rubram, seu pancratium intellexerit, dubito.

Cap. CCIV. In capparis nominibus maxima est varietas, ut et sinapi persicum et thlaspi, quae iam c. 185. obveniebant, etiam huc trahantur. Nomen punicum mire corruptum est. Capparis enim ebraice אֲבִינֹחַ, plur. אֲבִינֹחִים dicitur.<sup>33</sup> Hinc ἄβινωθ legendum. Ceterum descriptio optima.

Marmaridae, quemadmodum loco Margaritarum, Marcello duce, scripsi, habitabant regionem Cyrenaicae ab oriente conterminam, „a Paraetonii ferme regione ad Syrtin usque maiorem porrecti.“<sup>34</sup>

Quaenam sit acerrima illa Capparis ex oris rubri maris et Africa delata, quae pustulas in ore excitet, nescio, nisi Forskolei Capparis Redif s. oblongifolia intelligatur, quae omnino nociva dicitur.<sup>35</sup> Revocata autem est a Candolleo ad Niebuhriae, a me ad Cratevae genus.

29) Anguillar. simpl. p. 120. 30) Advers. p. 57.

31) Ed. arab. p. 126. 32) Ib. p. 230.

33) Eccles. 12, 5. 34) Plin. 3, 5. Strab. 17. p. 699.

35) Forsk. fl. arab. p. XCVIII.

Cap. CCV. *Λεπίδιον* est *Lepidium latifolium*, quod et Plinius hortensiis peregrinis adnumeratum describit<sup>36</sup>: exire in cubitalem altitudinem, foliis laurinis, sed molli-  
bus. Id inter urentia collocat.<sup>37</sup> Dodonaeus eam plan-  
tam bene illustravit.<sup>38</sup> Nomina *Pfefferkraut* Germano-  
rum, *Pepper-wort* Anglorum, *Piperella* Italorum, *Her-  
va pimenteira maior* Lusitanorum acrem piperisque ae-  
mulam indolem notant. Serapion شيطرج (*scheiteradsch*)  
vocat, sub quo nomine Avicenna longe aliam plantam  
adducit.

*Λεπίδια* et *λέπιδιον*, quae cum κοττάνοις tanquam usi-  
tata Tyriis edulia occurrunt<sup>39</sup>, neutiquam huc pertinent:  
κόττανα (ebr. קטן, parvus) e parvis sicibus parata ab He-  
sychio ipso exponuntur. *Λέπιδιον* Phoenicum (ea enim  
forma orientalis vera esse videtur) in ebraico idiomate  
radicem non habet. Arabice autem dicitur لفتية (*leftyah*),  
e rapis paratus cibus: لفاظ (*lefâts*), species oleris: لفيته  
(*lafithah*), puls crassa. Haec ideo apposui, ut Schweig-  
haeuseri hallucinationes emendarem.

*Ἰβηρίς* est *Lepidium Iberis* L. Cum ipso *λεπίδιον*  
nonnunquam commutatur, praecipue a Paulo: qui ἰβηρί-  
δος; folia laurina, sed multo maiora habet.<sup>40</sup>

Cap. CCVI. Ranunculi cognomina plurima apud Apu-  
leium leguntur, in quibus punicum *Atzicurur*.<sup>41</sup> Id  
קריה קריה cum Bocharto legendum.<sup>42</sup> Herba ranae igitur  
dicitur, siquidem قر arabica vox ranae, quae alioquin  
صفدا (Dafda) vocatur, ad punicam linguam transiisse  
videtur. Ranunculus herba persico nomine apud Avicen-  
nam كبيكج (*khabikhadsch*) insignitur.

Ranunculi prima species est *asiaticus*, in Cilicia, Ca-  
ria et aliis Asiae minoris regionibus vulgaris; radice gru-  
mosa, foliis ternatis biternatisque pubescentibus, floribus

56) Lib. 19, 51.

37) Lib. 20, 70.

38) Hist. stirp. p. 716.

39) Athen. 3, 88. 9, 34.

40) Paull. Aegin. p. 123.

41) De virt. herb. c. 10. p. 163. ed. Ackerm.

42) Can. p. 762.

luteis, coccineis (puniceis etiam et albis.) Altera species magis hirsuta, elatior, foliorum incisuris pluribus, quae in Sardinia abundet, est *R. lanuginosus*; quam et Morisius in Sardinia indicat.<sup>43</sup> Tertiam speciem Sibthorpius habet *R. muricatum*, Graeciae familiarem. Quarta denique, solo flore lacteo insignitam, idem auctor credit *R. aquatilem*: sed albo flore plures subesse possunt, e. g. *R. alpestris*, *rutaefolius*, *aconitifolius*.

Cap. CCVII. Ἀνεμώνην, vocem profecto graecam, originem habere ex ἀνέμων, lexicographi veteres consentiunt. Neque avocamur ab ea sententia Rossii etymologia, qui arabicam appellationem anemones شقيبان نعم (schkiak nāman) huc trahit.<sup>44</sup> נעם Ebraeis et نعم Arabibus utique iucundum esse significat. Sed شقيبان fuit nomen aviae Noeman, regis Arabum, quod ad bellum florem, Camusio teste, transiit. Stat ergo inconcussa graeca origo. Punicum nomen χοῦφρους sine negotio ᾤον radicem in memoriam revocat, quae gratum habere ac iucundum significat, unde videntur Tyrii aut Carthaginenses ᾤον, iucunditatem, amoenitatem floris, formasse.

Tres autem species Anemones enumerantur, quarum prima est ἡμερος, *A. coronaria* L.; altera ἀργία, *A. stellata* Lam., tertia foliis nigricantibus, quae *A. nemorosa* Sibthorpio videtur. Secundam dein egregie a Papaveris speciebus, ἀργεμώνην et ῥοιάδι, distinguit, ut ad saturiorem Anemones colorem, ad praecociorem florem atque ad defectum laticis colorati consilium transferat.

Cap. CCVIII. Ἀργεμώνη est *Papaver Argemone* L., capsulis clavatis hispidis, flore puniceo, foliis bipinnatifidis lineari-lanceolatis.

Adulterinum esse de altera Argemone additamentum, Marcello libenter largior: neque, quaenam sit planta, constare potest, cum omni descriptione careat. Tria argemonis genera facere Romanos, Plinius testatur, quorum primum est illa anemone, quae perperam argemone appellatur; secundum argemone ipsa<sup>45</sup>, tertium, quam

43) Moris stirp. sard. elench. 1. p. 3.

44) Etym. aeg. p. 131. 132.

45) Lib. 25, 56.



lappam canariam vocaverit, cuius radix iucundum turis odorem spiret.<sup>46</sup> Hanc ultimam Anguillara habet *Caucalidem gnandifloram*.<sup>47</sup> Equidem ob radicem suaveolentem et semina usquequaque adhaerentia praetulerim *Geum urbanum*, quod tamen Gei nomine in eodem auctore adest.<sup>48</sup>

Cap. CCIX. Anagallidis punicum nomen ἀσιόρρυσος Bochartus exponit ita, ita scribat תציר רישפה *herba veneni*, i. e. ἀλεξιφάρμακος. ושא׳ enim ebraeum abit in syriacum ܐܬܠܝܝܬ, quae nostra est forma.<sup>49</sup> Viperae utique morsis mirifice opitulatur anagallis. Fuit et nostro aevo insignis anagallidis fama in curanda hygrophobia a canis rabidi morsu.<sup>50</sup> Contra ἀμβλυωπίαν auxilio esse creditur et hodie a Persis, cum equis, quibus cataracta minatur, anagallidis contusae succum gossypio exceptum ad oculos applicent.<sup>51</sup>

Cap. CCX. In cognominibus Hederae notabilis est Dionysi seu Bacchi appellatio, cui sacra fuit ab omni antiquitate. Νύσιον nomen a Nysa, urbe inter Indum et Copham, colonia Bacchi, in cuius vicinia montem Meron vitibus ac hedera opertum Alexandri comites invenerunt<sup>52</sup>, cum alioqui hedera exul sit Asiae interioris.<sup>53</sup> De Osiride, qui idem saepe cum Baccho habetur, pariter narratur, Nysam condidisse, hederamque ibi plantasse<sup>54</sup>, dictumque fuisse Διόνυσον, quia Δεῦ s. rex Nysae sit.<sup>55</sup> Hinc et Aegyptiis hedera dicebatur Χηνόσιρις aut Σχενόσιρις<sup>56</sup>: χήν enim s. σχήν herbam significat.<sup>57</sup>

Tres genericas differentias hederae D. enumerat, quae tot varietates unius speciei sunt: albam, quae et maculis foliorum et fructibus albis: nigram, quae fructibus croceis aut nigricantibus insignis est, et sterilem, quae humi

46) Lib. 24, 11, 116.

47) Sempl. p. 217.

48) Plin. 26, 21.

49) Bochart Can. p. 753.

50) Bruch diss. de anagallide. Argent. 1768.

51) S. G. Gmelin iter, 3. p. 349.

52) Strabo 15. p. 13. Philostr. apud Phot. p. 324. 532.

53) Theophr. hist. pl. 4, 4.

54) Diod. Sic. 1, 19.

55) Etym. magn. p. 251.

56) Plutarch, de Is. et Osir. p. 365.

57) Iablonsky opusc. 1. p. 400.

repiť et folia habet angulata, seu triloba et conformia. Loco ἐρουθρά enim cum Scaligero, e Theophrasto<sup>58</sup>, εὔρουθμα scribendum esse satius duco. Ex alba varietate corymbos compactos et subglobosos quandoque nasci, idem Theophrastus testatur, quam κορυμβίαν appellent. Est hoc idem cognomen, quod apud nostrum κορυμβήθρα. Athenis dicebatur Ἀχαρνικόν. Hedera fructibus aureis, χρυσόκαρπος nostro, a Tournefortio describitur, qualem in Thracia invenerit.<sup>59</sup>

Folia hederæ ad ambusta et ad ulcera quævis conducere, creditur et hodie in Suecia.<sup>60</sup> Ὁ μύσχος τῶν φύλλων est germen, sive gemma, e qua folia prorumpunt; sed legitur et μίσχος<sup>61</sup>, petiolus.

Cap. CCXL. *Chelidonium maius* nomen ad nostra usque tempora non mutavit. Ad Arabes graecum nomen transiit: vocant enim خاليدونيون (*chaliduniun*), exponunt autem خطانی (*chottâfi*), hirundinariam.

Cap. CCXII. *Chelidonium minus* est *Ranunculus Ficaria*. Si rem vere examinemus, ἀναυλος non est, sed caulis protinus decumbit, dein assurgit, petiolis amplexicaulibus adeo elongatis, ut tres pollices aequent: hinc ἀπηρτημένον vocatur ἐκ μύσχων (μίσχων). Radices sunt tuberosae, fasciculatae. Tubera sunt exilia, tritici grana interdum ita aemulantia, ut in annonae caritate pro tritico sumtae et, in noxam valetudinis, coctae sint. Post inundationes vastantes saepe incredibilis eius tritici copia per terram sparsa superstitionem pauperum auget.

Cap. CCXIII. Othonnam herbam Rondeletius credidit in herba venti Monspelienſium, quae *Phlomis Herba venti* L. est, reperire: nec tamen quicquam congruit, cum flores sint purpurei, verticillati, neque folia ullo modo cum Erucae foliis comparari possint.<sup>62</sup> Caesalpinus igitur assensu dignior est, si *Tagetem erectam* huc

58) Hist. pl. 3, 18.

59) Iter gall. 2, p. 15.

60) Linnæi iter per Gothiam occid. suec. p. 201.

61) Evpor. 2, 78.

62) Lobel. advers. p. 229.

trahit.<sup>63</sup> Foliis enim pinnatis, serrulatis omnino ad Eru-  
cam accedit: quae cum pellucido-punctata sint, πολύτρη-  
τα, ὡς περ στήτοπα, „crebro (cribro?) perforata“ Pli-  
nio<sup>64</sup> dici potuerunt. Flos croceus est, latiusculis foliis,  
quod flosculi radiales ampli esse solent. Sponte crescere in  
Aegypto et Forskoleus<sup>65</sup> et Delilius<sup>66</sup> asseverant. In Ara-  
biae montibus prope Hadje spontaneam idem Forskoleus  
invenit.<sup>67</sup> Nihilominus dubia movent folia ψαφαρά dicta,  
et silentium de gravissimo odore, quem tota herba spar-  
git. Neque quicquam comperimus de acrimonia succi  
aut de vi eius abstergente.

De lapide aegyptio ὀμωνύμφω nil innotescit, nisi quod  
a Galeno et Paulo saepius citetur.

Cap. CCXIV. Myosotidis nomen punicum λῶβ ἀτολ-  
λαφάθ scribit Bochartus<sup>68</sup>, λῶβ e graeco λοβός, quae auris  
ima est pars, et ἡβύς, *vespertilio*.

Duae sunt species, prima ad ἐλξίνην (4, 86.) referen-  
da, foliis minoribus, glabris differens, in qua *Parieta-  
riam creticam* latere auguror.<sup>69</sup> Altera *Myosotis palustris*  
L. esse videtur: namque radix subrepens, caulis fistulo-  
sus, flores minuti coerulei egregie quadrant. Contraria  
sunt radicis crassities, quae digitum aequet, et folia ἀνὰ  
δύο πεφυκότα ἐκ διαστημάτων, quod et Plinius reddit:  
„per intervalla assidue geminata.“<sup>70</sup> Multo minus quadrat  
*Lithospermum purpureo-coeruleum*, quod subesse Sibthor-  
pius existimavit.<sup>71</sup> Confundit etiam magis, quod herba  
scolopendrio (non scolopendris) similis dicatur. Mallem  
Gentianae quamdam speciem, asclepiadeam vel Pneumo-  
nanthen conicere: sed obstant radices harum graciles,  
floresque multo maiores. Itaque satius duco, cum An-  
guillara inscitiam fateri, quam cum doctis viris palari  
ac falli.

65) De plant. 12, 43. Lobel. l. c. p. 318.

64) Lib. 27, 85.

65) Flor. aeg. p. LXXIII.

66) Flor. aeg. p. 26.

67) Flor. arab. p. CXX.

68) Can. p. 753.

69) Fab. Column. phytobas. p. 120. tab. 36.

70) Lib. 27, 80.

71) Flor. graec. 1. p. 114.

Cap. CCXV. Mirum, desiderari in synonymis isatidos nomen gallicum *glastum*, in Plinio iam obvium<sup>72</sup>; e quo Galli dein *guasde*, *guède*, Itali *guado*, Germani *Waid* fecerunt. *Vitrum* idem est, vox eodem modo corrupta, quo corpora Gallorum infecta terrorem inimicis iniicere credebantur.<sup>73</sup> Utraque vero isatis et sativa et sylvestris ad eandem speciem, *Isatidem tinctoriam*, pertinere videtur.

Quam apposuit librarius *ισάτις ἀγρία* longe diversa est, congrua cum *Saponaria* (Gypsophila Sm.) *Vaccaria*, quod Lobelius iam divinavit.<sup>74</sup>

Cap. CCXVI. Telephii cognomen punicum credo esse *תפרין*, *herba unguium*, quod folia cum unguibus comparari possunt. Non solum plerique patres rei herbariae, sed et Sibthorpius<sup>75</sup> consentiant in *Cerinthos* specie, quam *minorem* habemus. Hinc et *ἀνθη μῆλινα* restituere mallet.

### LIB. III.

Cap. I. *Ἀγαρικὸν τὸ ἄρξεν* remotam aliquam habet similitudinem cum silphii radice: hinc ab insciis ipsum pro radice habebatur. Est autem utrumque, et mas et femina, fungus: femina Agarici, mas Boleti generi adscribendum. Cum et Plinius in glandiferis Galliae arboribus agaricum nasci tradat<sup>76</sup>, uterque et Plinius et Dioscorides verum agaricum officinarum, seu *Boletum Laricis*, qui in solis laricum truncis nascitur, cum *Agarico dryino* Pers., satis simili, lamellis tamen insignito, aut cum *ostreato* Iacqu. confudisse videntur. Uterque enim quercubus et fagis innascitur.

Salmasius in codice optimo legisse testatur: *τινὲς δὲ, ἐν σητίνοις δένδροις κατὰ σῆψιν γενέσθαι*. Hanc scriptionem

72) Lib. 22, 1.

73) Iul. Caes. de bello gall. 5, 14. Marcell. Burdigal. 2, 23.

74) Advers. p. 143.

75) Flor. graec. 1. p. 120.

76) Lib. 16, 13.



ante oculos habuisse Arabas, existimat, quia *in corrosis arboribus ex putredine nasci* interpretentur. Credit igitur Salmasius, Arabas τὰ σήτινα δένδρη σητόβρωτα exposuisse, quanquam tineae vestes quidem, sed nunquam arbores arrodant. Ipse vero addit, σήτινα δένδρη esse e ἡψι Ebraeorum formatum, ac notare τὰ κέδρινα δένδρη.<sup>77</sup> Memorabile profecto exemplum, quam ineptas saepe nugae eruditionis ostentandae cupido proferat.

Cum Agarum sit promontorium, Agarum etiam dicatur fluvius in lacum Maeotidem effusus, populus, qui Ἄγροι Straboni vocatur<sup>78</sup>, forte etiam Ἀγαροι legendus, et ipsa regio Ἀγάρια, quemadmodum Goupylus scripsit. Mirum omnino videtur, ex angulo illo petittum fuisse fungum, quem Romani saltem e Rhaetia, Vindelicia et Norico multo facilius obtinuissent. Attamen et nostro aevo ex ultimis uralensibus montium iugis, ut et ex ipsa Syria agaricum mittitur, quod Europaei praestantissimum habent.<sup>79</sup>

Stomachicis utile esse, haud facile credideris, si nauseabundum agaricum gustaveris. Quia etiam nec alvum purgare observatum est sine nausea et vomitionibus, in desuetudinem nostra aetate abiit, ut potius armentis iumentisque exhibeatur, quam hominibus. Aëtius iure suo Dioscoridi adversatur, dum stomacho infestum agaricum declarat.<sup>80</sup>

Cap. II. Radix *Rha* dicta, e locis supra Bosporum (cimmerium) allata, nomen sortita est a Rha fluvio, Tanai vicino<sup>81</sup>, in cuius vicinia haec radix crescebat.<sup>82</sup> A Ptolemaeo primo descriptus amnis Sarmatiae orientalis terminos constituit, unde et Agaricum et Rha e Sarmatia venire dicebantur. Radix *pontica* iam a Celso<sup>83</sup> et Scribonio Largo<sup>84</sup> laudatur. Pontica autem radix et Rha

77) Homon. hyl. iatr. 165. 166.

78) Lib. II. pag. 584.

79) Spielmann mat. med. p. 641. Pallas fl. ross. 1. p. 3.

80) Aët. 5, 43.

81) Utrumque flumen ita flectitur, ut ad Zarizyn et Sareptam septem milliaria germanica tantum a se distent.

82) Ammian. Marcell. 22, 8.

83) Lib. 5. c. 25.

84) Cap. 42. n. 167.

ponticum appellabatur, quoniam, qui Pontum euxinum navigarent, afferre consueverant. Est *Rheum Rhaponticum* L., quod nostro aevo in Sibiria circa Krasnojarsk, optimum vero circa Udinsk crescere fertur.<sup>85</sup> Quin etiam deserta limosa inter Volgam, qua in mare caspium evolvitur, et Uralum fluvium, patriam Rhapontici designat Coxius.<sup>86</sup> Unde nomen *Rhacoma* natum sit, quo Plinius radicem appellat<sup>87</sup>, plane nescio. Seniores Graeci et Serapion, qui روند (*rewand*) vocat, nihil iis addunt, quae Dioscorides habet. Sed ex Mesues inde temporibus, saeculo nimirum decimo, cum laetissime floreret Arabum commercium, alia Rhei species e remotissimis orientalibus plagis, Kukum, provincia Chinae finitima, divulgabatur, cuius radix graveolens purgandi vi insignis erat.<sup>88</sup> Hanc demum speciem posteriores Graeci ῥέουμ βάρβαρον latine vocarunt<sup>89</sup>, Latinobarbari cum Arabibus vero rheum *indicum* aut *chinense*. Quod cum, Matthaei Sylvatici exemplo<sup>90</sup>, probe a pontico distinguerent, mirum est, Ruellium et alios tamen utrumque iterum coniungere, dum differentiam Rhei pontici, astringentis, et indici vel chinensis, purgantis inde exponerent, quod illud vel e septentrionalibus regionibus veniat, vel iuniores sistat minusque perfectas radices.<sup>91</sup> Graviter etiam lapsi sunt, qui, Dodonaeo praeeunte<sup>92</sup>, *Serratulam Rhaponticam* Cand., plantam in alpestribus Europae australis obviam, pro Rha pontico haberent. Tandem P. Alpinus plantam veram singulari libello egregie illustravit.<sup>93</sup>

Cap. III. Gentiana nomen habuit a rege Illyriorum Gentio, qui, latrocinii maritimi accusatus et populo romano suspectus, (ante aerae nostrae initium 168.) a L.

85) Pallas Reisen in verschied. Prov. des russ. Reichs, 3. p. 9.

86) Account of the russian discov. p. 336.

87) Lib. 27, 105.

88) Notices et extraits des manuscrits, 2. p. 4. 16.

89) Nic. Myreps. 1, 21. 155.

90) Pandect. cap. 589. 590. Marcus Paulus Venetus in montibus tanguticis Rheum chinense invenit. (Ramusio it. 2. f. 45.)

91) Anguillara p. 187. 188.

92) Hist. stirp. p. 389.

93) De Rhapontico libellus. Patav. 1612. 4.

Anicio praetore bello victus, in triumphum deductus et Spoletium in carcerem missus fuit.<sup>94</sup> Quam vero ob causam nomen regis, scelesti hominis, qui fratrem occidit, quo tutius regnaret, haec planta ferat, ignoro: e vano saltem hausta est mollissima Marcelli Vergilii cantilena, qua regis Gentii virtutem, herbarumque amorem Caesaris gloriae praefert. Invenit forte, dum ad otium captivus coactus esset.

Descriptio plantae aliquid habet ambigui. Cum enim post renatas literas, unanimi doctorum viroꝝ consensu, *Gentiana lutea* pro Dioscoridis planta venditata fuerit; offendimur protinus comparatione foliorum cum foliis iuglandis, cuius loco Plinius folia fraxini ponit.<sup>95</sup> Multo satius fuisset, plantaginis folia sola comparare; namque iis similia sunt folia omnium earum gentianarum, quae officinales dici possunt. Dein nec rubicundum colorem in foliis animadvertimus, sed potius flavescentem. In *Gent. asclepiadeae* caule foliisque utique rubedinem quamdam obviam habemus. Folia vero minute fissa in medio, maxime in summo caule, sine dubio sunt flores, quorum verticilli pedicellati quodvis geniculum ambeunt. Capsula Gentianarum est compressa, bivalvis, adeoque latiusculus fructus cum sphondylío conferri potest: τὸ ἀχρῶδες vero ad semina minuta, fere acerosa reducendum est. Hinc potius sic legendum: καρπὸν δὲ ἔχων ἐν κάλυξι πλατὺν, κοῦφον, πρὸς τὸν τοῦ σφονδυλίου, τὰ σπέρματα δὲ ἀχρῶδη. Sed codicum auctoritas deest. Cum Plinius *lactucae* magnitudinem foliis apponat, ipse etiam *Serapion* *lactucae* folia comparet, necesse est, in textu antiquissimo *θριδάκος* aut *θριδακίνης μέγεθος* lectum fuerit.

Loca natalia vere indicantur. *Gentiana* enim *lutea*, purpurea ac punctata in montium alpinorum iugis et quidem locis eorum udis crescunt.

Radicem odoris expertem falso declarat Plinius, cum omnino odora sit.

<sup>94</sup>) Liv. 40, 42. 44, 50. 45, 43.

<sup>95</sup>) Lib. 25, 34.

Cap. IV. *Aristolochiae* tres species ad hunc usque diem antiqua nomina servarunt: *rotunda* nimirum, *longa* et *Clematidis*. At vero in *A. rotundae* descriptione haeremus, cum flores albi, labellum vero solum rubrum dicantur. Suspicio, aliam subesse speciem, quam iam Clusius<sup>96</sup> *Aristolochiae rotundae* alterius nomine indicavit, Linnaeus varietatem habuit: Fontanesius vero *A. luteam*<sup>97</sup>, Kitaibelius *pallidam*<sup>98</sup> dixit. Flores eius sunt albidii, flavescentes, aut luteoli, labello interne atro-rubente. Obvia est per Graeciam, Italiam et Pannoniam.

Simili modo haesitamus in *A. longa*. Linnaeana enim species habet flores herbaceos, haud purpureos<sup>99</sup>, unde ad aliam speciem, *A. creticam* Lam., consilium transferendum. Haec enim flore grandi atro-purpureo insignis<sup>100</sup> est. Folia et *A. longae* et huius cordata, haudquaquam ἐπιμηκέστερα τῆς στρογγύλης dicenda. Flores relinquunt in utraque fructum pyriformem, angulato-striatum in *A. cretica*, cuius flos etiam graveolentior est, quam *A. longae*.

Malem cum Anguillara tertiae *Aristolochiae*, *Clematidis*, folia asaro similia dicere, sed obstant interpretes omnes. Florum color solus esse videtur, cur rutae similis dicatur: est enim herbaceus, nec ullam formae similitudinem habet.

Nomen aegyptium *Aristolochiae* σιφοέφ a Rossio vertitur: *serpentes abigens*.<sup>1</sup>

Cap. V. *Glycyrrhiza* est sine dubio *glandulifera* Kit., quae per omnem Asiam mediam provenit. Namque et folia tactu glutinosa et fructus asperi id probant. Eadem iam in Theophrasto<sup>2</sup> nomine σκυθικῆς ῥίζης περὶ τὴν Μαυῶτιν occurrit. Iterum florum color solus hyacinthi similitudinem revocat: quoad formam, nulla est.

Cap. VI. In cognominibus Centaurii maioris est πηλεθρόνιον, loco πλεκτρονιάς, legendum. Πηλεθρόνιος enim

96) Hist. pl. 2. p. 70.

97) Choix de plantes, tab. 8.

98) Plant. rar. hungar. 3. t. 240.

99) Nicand. ther. v. 511. ἄνθεα δ' ὑσγίνω ἐνερεῦθεται.

100) Desfont. choix de plantes, tab. 7.

1) Etym. aeg. p. 207.

2) Hist. pl. 9, 13.



apud Hesychium ὁ Χείρων, ἀπὸ τοῦ πελεθρόνου, ἐν ᾧ ἐτράφη. Et Scholiastes Nicandri<sup>3</sup>: Πελεθρόνιον δὲ τόπος ἐστὶ τοῦ Πηλίου ἀνθώδης· διὸ καὶ οὕτω καλεῖται ἀπὸ τοῦ πέλειν ἐκείσε τὰ ἄνθη· θρόνα γὰρ τὰ ἄνθη λέγεται. Ipse autem Nicander de hac nostra planta canens:

— — ἡ δ' ὑπὲρ αἰῆς

ρίζα καὶ οὐ βυθόωσα Πελεθρόνιον νάπος ἴσχει.<sup>4</sup>

Planta ipsa est *Centaurea Centaurium* L., quam Matthiolus icone illustravit, in monte Gargano Apuliae inventam. Ex alpibus Penninis meam habeo, et miror, ad hunc usque diem nec in Peloponneso, nec circa Smyrnam repertam fuisse.

Iam vero dubium nascitur, comparato Nicandri loco mox citato, ubi aurei flores dicuntur: unde efficitur, aliam Nicandri ac Dioscoridis plantam fuisse. Sitne Nicandri planta *Centaurea Centauroides* L., flore luteo, quam Sibthorpius in Peloponneso invenit, quaeritur.

Succum radices rubrum noster, αἵματώδη Theophrastus pronunciat.<sup>5</sup>

Cap. VII. De Centaurio minori, *Erythraea* scilicet *Centaurio* Pers., nulla exstitit unquam dubitatio, cum iam ante Brunfelsium Io. Iac. de Manliis de Bosco saeculo decimo quinto eam plantam bene agnoverit.<sup>6</sup>

Cap. VIII. Chamaeleon albus, planta acaulis, e medio capitulum promens echino marino simile, floribus purpurascentibus, cuius radix viscum quoddam exsudat, quo et pro mastiche mulieres utuntur, aliud esse nequit, quam *Acarna gummiifera* Willd. (*Atractylis* L.), in litoribus maris mediterranei satis vulgaris. Cognomen ἱξία ἱξίνην Theophrasti<sup>7</sup> in memoriam revocat, quae ἀπὸ τῆς ῥίξης σπερματικὸν ἄκανον ἔχει, ὥσπερ μῆλον, εὖ μάλα ἐπικε-

3) Ther. v. 440.

4) Ib. v. 505.

5) Hist. plant. 9. 1. secundum Schneideri emendationem.

6) Luminare maius f. 72. b. Venet. 1496. fol.

7) Hist. pl. 6, 4. De albo chamaeleone Nicand. ther. v. 661.

Τὸν δ' ἑτερον δῆεις αἰεὶ πετάλοισιν ἀγαυρόν·  
μέσση δ' ἐν κεφαλῇ φύεται πεδύεσσα, μολοβρῆ,  
ἱξία δ' ὑλαργήεσσα, μελιζωρος δὲ πάσσαυται.

κρυμμένον ὑπὸ τῶν φύλλων. Οὗτος δ' ἐπὶ τοῦ ἄκρου φέρει τὸ δάκρυον εὐστομον, καὶ τοῦτό ἐστιν ἡ ἀκανθική μαστίχη. Ad eandem speciem pertinere ἰξίνην Theophrasti, bene perspexit Anguillara, qui primus hanc plantam, quam in patria observarat, adumbravit. Lacrimam esse gustui gratam: condi etiam capitulum melle et saccharo, praesertim circa Urbinum.<sup>8</sup> Postea et Honor. Bellus<sup>9</sup> et Fab. Columna<sup>10</sup> et P. Alpinus<sup>11</sup> uberius eam plantam illustrarunt. Nostra aetate et Tournefortius<sup>12</sup>, et Cavanillesius, qui in Valentia<sup>13</sup>, et Fontanesius, qui in Numidia eam vidit<sup>14</sup>, diserte et de mastiche, seu visco, et de eduli capitulo egerunt. Oliverius etiam usum eius liquoris mastichini testatur.<sup>15</sup>

Cap. IX. Inter cognomina Chamaeleonis nigri militant κυνόμαχον et κυνόξυλον, quia canes enecare dicitur<sup>16</sup>: κυνόξυλου loco Plinius κυνόζολος legit, et ita vocatum esse herbam propter odoris gravitatem autumat. Consentit, Rossio docente<sup>17</sup>, aegyptium cognomen dipsaci, qui et chamaeleon dicitur, σενιόρ, pro quo Apuleius rectius legit σεμμιώρ, herba canina. Aliud cognomen οὐλοφόνον exponitur a scholiaste Nicandri<sup>18</sup>, τὰ οὐλα βλάπτων, ἢ ὅλον φονευτικόν. Citat et Plinius id cognomen, quod additum esse tradit, quia herba iuvenco anginae modo strangulet. At vero et codices quidam Pliniani οὐλόφυτον habent, quod exitiosam plantam denotat. Ὠκιμοειδὲς vocatur et Nicandro: dicit enim: ὠκιμοειδὲς ὁδωδε: ergo ab odore ocimi aemulo ita vocatur. Aegyptium cognomen σοβέλ a virtute medica adversus lepram petatum esse, Rossius docet.<sup>19</sup>

Graphice describitur herba, ita ut generatim quidem cum Theophrasto congruat, qui totam plantam ὤσπερ σκιάδιον dicit. Recognovit eam primus Anguillara, in

8) Sempl. p. 157. 158.

10) Ecphras. 1. p. 12.

12) Iter gallic. 1. p. 15.

14) Flor. atlant. 2. p. 252.

15) Iter gallic. 2. p. 169. Cf. et Sieberi iter creticum, 1. p. 398.

16) Theophr. hist. 5, 12. Plin. 22, 21.

17) Etym. aeg. p. 190.

19) L. c. p. 203.

9) Ad Clus. hist. p. 301.

11) Exot. p. 125.

13) Icon. 3. p. 14. t. 228.

18) Alexiph. v. 280.

Samnio, Apulia et Sclavonia inventam.<sup>20</sup> Icone rudi adiecta meliorem exhibuit Matthiolus, cui ex Apulia miserat plantam Aloys. Maranta.<sup>21</sup> Linnaeus nominavit *Carthamum corymbosum*. Ipse ante triginta annos in horto educavi bellam aspectu plantam, floribus numerosissimis corymbosis coeruleis et purpurascentibus. Maiorem spithama non vidi. Sibthorpius in campis aridis clivosisque et maritimis Graeciae Archipelagique frequentem invenit.<sup>22</sup>

Quod Tragus Carlinam vulgarem<sup>23</sup>, Fuchsius Echinopa sphaerocephalum<sup>24</sup>, et maiore hic probabilitate dixerit chamaeleonem nigrum, non miremur, cum ista aetate plantae australes minus cognitae essent.

Cap. X. Cum Crocodilium nusquam plenius describatur, cognitione certa omnino caremus. Instauratorum igitur ingens fuit dissensus, Carlinam vulgarem aliis<sup>25</sup>, Echinopa sphaerocephalum aliis<sup>26</sup>, nonnullis etiam *Eryngium maritimum*<sup>27</sup> hoc nomine insignientibus. Cum Plinius nasci in sabuletis tradat<sup>28</sup>, legisse videtur ἐν τόποις ἀμυώδεσι loco δρυμώδεσι: qua lectione, tanquam veriori, ut et odore radice amplae fretus, probabilem suam sententiam Caesalpinus protulit. Accedit coeruleus capitulorum color, qui tamen in Echinope, quanquam debilis, etiam adest, et ipsum spurium additamentum de semine duplici rotundo, scutiformi. Eryngii maritimi radix etiam a recentioribus celebratur adversus lienis iocinorisque infarctus et ad refocillandas vires, cui usui in Anglia saccharo condita aptior redditur.<sup>29</sup>

Cap. XI. Dipsacus, sitibundus, nomen a contrario accepit, quoniam, collecta roris pluviaeque aqua in cucullis, quos folia circa caulem formant, sitim abigere videtur. Hinc et labrum et lavacrum et concha Veneris

20) Sempl. p. 139.

21) Comment. p. 491.

22) Flor. graec. 2. p. 161.

23) Hist. f. 322.

24) Hist. stirp. p. 822.

25) Dalech. p. 1475.

26) Lobel. adv. p. 363. Obs. p. 481.

27) Caesalp. 13, 29.

28) Lib. 27, 41.

29) Parkinson theatr. p. 988. Engl. bot. 718.

appellabatur. Ob spinosam indolem chamaeleon et crocodilium dictum fuit. De aegyptio nomine iam supra c. 9. sermonem habui.

Descriptio egregia est. *Dipsacus* est *fullonum* vel *sylvestris*, quam Gallidragae Xenocratis nomine tractat Plinius.<sup>30</sup> Vermiculi, quos praeter Ruellium et alii in medulla capituli invenerunt, sunt larvae curculionis, quae variarum plantarum caules forare consuescunt.

Cap. XII. Spinam albam Fuchsius<sup>31</sup> et Dodonaeus *Silybum marianum* Gärtn. crediderunt, at folia non sunt angustiora, quam Acarnae gummi ferae, nec hirsuta: nec minusculum est capitulum florum, sed amplum. Anguillara<sup>32</sup> *Echinopa* supponit, quem in Creta inventum Lamarckius dixit *lanuginosum*; sed flores sunt, ipso Anguillara fatente, azurei, cum spina alba purpureos gerat. Caesalpinus<sup>33</sup> describit *Cirsium eriophorum* Scop., quod tamen amplissimis capitulis lanatis differt. Tragus, fluctuans inter varias plantas, tandem pedem figit in *Onopordo Acanthio*.<sup>34</sup> Ut alios silentio praeteream, Sibthorpius dubie *Cirsium Acarnam* Cand. subesse coniicit<sup>35</sup>, quanquam alio loco simili dubitatione *Echinopa lanuginosum* designet.<sup>36</sup> Equidem in *Cirsio Acarna* libentius acquieverim, si modo spinarum flavidarum, quibus folia obsessa sunt, mentio fieret.

Cap. XIII. De spina arabica inveniendi plerique desperarunt, cum sola similitudo cum spina alba nos ducere nequeat. *Onopordon arabicum* esse, quis probare auderet? Matthiolus vult, hanc esse plantam, quam Mauritanii (Arabes) Suchaha appellant. Sed شوك quivis carduus, شوكة spinosus frutex vocatur.

Cap. XIV. Scolymus in Europa saltem australi vulgaris notitiae est. Theophrasto iam radix lacteo humore scatens ac edulis celebratur<sup>37</sup>: edulis etiam herba a Numenio, qui ἀρχμυρὴν σκόλυμον appellat.<sup>38</sup> Clusius utramque

30) Lib. 27, 62.

32) L. c. p. 143.

34) L. c. f. 324.

36) Ib. p. 201.

38) Athen. 9, 12.

31) Hist. stirp. p. 55. 56.

33) Lib. 13. c. 40.

35) Flor. graec. 2. p. 151.

37) Hist. pl. 6, 4, 9, 12.



et radicem et herbam iuniorem a Salmanticae incolis commedi testatur<sup>39</sup>: delineat autem et *Scolymum maculatum* et *hispanicum* L. Et in Graecia esse gratum edulium, σκολύμβρου et ἀσκολύμβρου nomine, testantur Belonius<sup>40</sup> et Sibthorpius.<sup>41</sup>

Nomen graecum aegyptiae esse originis, ubi σκόλμης aculeatus dicatur, perhibet Rossius<sup>42</sup>, neglecto, quod hic dicitur γνουῦς, aegyptio cognomine.

Cap. XV. Duplici et plane diverso modo patres rei herbariae de Poterio coniectarunt. Matthiolus<sup>43</sup> enim et Clusius<sup>44</sup> *Astragali* speciem produxerunt, quae quivis ob spinarum abundantiam, ob lanuginem spissam, qua ramuli obsidentur, et propter gummosum etiam liquorem e radice manantem facillime pro ποτηρίῳ Dioscoridis habuerit. Est autem *Astragalus Poterium* Pall., quem Linnaeus varietatem Tragacanthae censuit. Alteram opinionem defendere studuerunt Pena et Lobelius<sup>45</sup>: esse scilicet *Poterium*, quod *spinosum* Linnaeus dixit. Haec quidem opinio etiam mihi placuit, cum textum ederem, quia Astragalum illum nondum comparaveram. Iam vero, cum praesertim tomentum illud lanuginosum et radicis gummi etiam atque etiam considero, cum lego, tomentum illud fomitis loco etiam hodie in Graecia inservire<sup>46</sup>, non possum quin ad Clusii Matthiolique sententiam accedam. Poterium enim spinosum est στοιβή Theophrasti<sup>47</sup> et Dioscoridis, quae et hodie στιβίδα<sup>48</sup> et ἀστοιβή<sup>49</sup> dicitur. In Asia minore vocatam suo aevo κολυμβάδα, et propter aromaticas vires ad vina condienda adhibitam fuisse, testatur Galenus.<sup>50</sup> Si ad Astragali speciem eam referendum est Poterium, vindicari etiam lectio vulgaris ἄνθη λευκά potest: is enim est color florum. Uterque frutex amat colles arenosos, non aquosos, ut Plinii lectio falsa vult.

39) Hist. 2. p. 153.

40) Obs. 1, 18. p. 24.

41) Flor. graec. 2. p. 147. Walpole p. 245.

42) L. c. p. 200.

43) Comm. p. 498.

44) Hist. 1. p. 108.

45) Advers. p. 377. Obs. p. 491.

46) Tournefort iter gall. 1. p. 61.

47) Hist. pl. 1, 10.

48) Honor. Belli ad. Clus. p. 308.

49) Sibthorp. fl. graec. 1. p. 233.

50) De antid. 1. p. 18.

Cap. XVI. *Acanthium* Dioscoridis est vel *Onopordon Acanthium* vel *O. illyricum*, sicut Sibthorpius etiam interpretatur. Lanuginem posse depecti et coadunatam bombycinam fieri, probabilius est, quam Plinii traditio, vestes ea bombycinis similes in oriente texti.<sup>51</sup>

Cap. XVII. Ἀκανθα Dioscoridis dicitur a Nicandro ἄκανθος ἀλδήης.<sup>52</sup> Virgiliine mollis acanthus, et „flexi vimen acanthi“<sup>53</sup> idem sit, qui et Theocrito ὑγρὸς ἄκανθος<sup>54</sup> et Plinio iuniori acanthus mollis et, paene dixerim, liquidus nuncupatur<sup>55</sup>, dubitandum. Protulit quidem Rauwolfius acanthum in Libano inventum<sup>56</sup>, quem Dioscoridis et ipse et Gronovius et Linnaeus dixerunt: sed folia integerrima margine spinosa pinxit, cum Dioscorides ἐσχισμένα ὡς τὰ τοῦ εὐζώμου dicat, de spinoso autem ambitu taceat. Neque quisquam posteriorum Rauwolfii plantam recognovit. *Acanthum* interea *mollem* habeamus, mollem et liquidum dictum, dum cum Acantho spinoso comparatur. Etenim bracteae concavae, foliaceae, dentato-spinosae, e quibus flores albi prodeunt, κυττάρια ἀκανθώδεα dicuntur.

Ἀκάνθην ἀγρίαν Sibthorpius contendit esse *Silybum syriacum* Gaertn., quod et a Graecis ἀγριοάγκαθι vocetur, et copiose in omnibus Archipelagi insulis occurrat.<sup>57</sup> At, si scolymo simile vocatur et brevior est statura, assensum cohibeo, cum *Silybum* illud, quod probe cognosco, bicubitalis sit aut orgyalis altitudinis. *Cirsium* potius *stellatum* All. esse videtur, quod omnino cum *Scolymo* conferendum, multo brevius est.

Superest, ut de παιδέρωτι, cognomine Acanthi hortensis, disseramus. Vocabatur autem in antiqua Graccia, quicquid aspectu pueri teneri colorem lacteo-roseum referret, παιδέρως, quasi παῖς ἐράσιμος. Ita praeter gratissimum acanthum et arbuscula in atrio templi Veneris apud Sicyonios culta παιδέρως dicebatur, quam nusquam

51) Lib. 23, 66.

52) Ther. v. 645.

53) Ecl. 3, 45. Georg. 4, 122.

54) Id. 1, 55.

55) Epist. 5, 6.

56) Iter german. 4. n. 285.

57) Fl. graec. 2. p. 154.

alibi in Graecia visam testatur Pausanias.<sup>58</sup> Folia habuisse minora Esculi (φηγού), maiora Ilicis (πρίνου), quorum forma quercina, facies alterutra albida, sicut in Populo alba, esset. *Quercus* sine dubio fuit, et quidem vel *gramuntia* L., vel *Ballota* Desf.: haec praesertim glandibus esu gratis insignis, quam Sicyonii forte ex Hispania aut Mauritania advexerunt. Cerefolium etiam paederota nominatum fuisse, Plinius tradit.<sup>59</sup> Idem opalum gemmam, propter eximiam gratiam laevoremque corpori puerili similem<sup>60</sup>, et aliam gemmam, candidarum ducem.<sup>61</sup> Hunc ad sigilla annulis includenda adhibitam fuisse, patet ex Hesychio, qui σφραγίδος ὄνομα, παιδέρωσ appellat. Sed idem etiam ἀλείμματος ἢ μύρου εἶδος eodem nomine insignitum fuisse testatur. Hinc meretricum artificia ad pallorem faciei emendandum Alexis apud Athenaeum<sup>62</sup> describit:

Λευκόχρως λίαν τίς ἐστι; παιδέρωτ' ἐντρίβεται.

Et Demetrius Poliorcetes capillos rufos arte reddidisse et faciem παιδέρωτι fucasse fertur.<sup>63</sup> Unde facile Salmasio largior, unguento usos fuisse Graecos, anchusae radice vel fuco marino imbuto, quo faciei pallidae ruborem conciliarent iuvenilem aut puerilem.

Cap. XVIII. Ἀωνίς, quam et ὀωνίδα vocabant, antiquitus αἰγινύρου nomine appellatam fuisse, patet ex iis, quae Anguillara e Crateva citat.<sup>64</sup> Proinde et αἰγίνυρος Theophrasti, cuius spinis utebantur veteres ad caprificandas ficos<sup>65</sup>, cuiusque flores ἱκανῶς ἐρυθροί dicuntur<sup>66</sup>, eadem est planta. Et Dodonaeus<sup>67</sup> et Lobelius<sup>68</sup> eandem recognoverunt: est *Ononis antiquorum* L., nostrae spinosae simillima, nisi quod g. abrior sit magisque spinosa. Testimonia autem fide digna non desunt, et nostram Ono-

58) Lib. 2. c. 10.

59) Lib. 19, 54.

60) Lib. 37, 22.

61) Lib. 37, 46.

62) Lib. 13. c. 23.

63) Aelian. var. hist. 9, 9.

64) Sempl. p. 145.

65) Hist. pl. 2, 8.

66) Schol. Aristoph. ran. v. 310.

67) Hist. p. 743.

68) Il. 2. p. 28.

nidem ad lotium promovendum et calculosos affectus mitigandos profuisse.<sup>69</sup>

Cap. XIX. Ut λευκακάνθην, cuius meminit iam Theophrastus<sup>70</sup>, interpretemur, nil adminiculi adest, nisi esse Cardui genus, radice tuberosa. Descripsit primus eam plantam in Etruria observatam Anguillara<sup>71</sup>, neque quidquam obest, quin *Cirsium tuberosum* All., in pratis pascuisque Germaniae vulgare, coniectemus.

Cap. XX. Tragacantham sudare e truncis *Astragali cretici* Lam., quem in Ida monte inventum Tournefortius egregie adumbravit<sup>72</sup>, hucusque exploratum habuimus. De ea Theophrastus: Ταύτην δὲ πρότερον ὥοντο μόνον ἐν Κρήτῃ φύεσθαι, νῦν δὲ φανερά καὶ ἐν Ἀχαΐδι τῆς Πελοποννήσου καὶ ἄλλοθι, καὶ τῆς Ἀσίας περὶ τὴν Μηδειαν.<sup>73</sup> Et alio loco: Ἐν Ἀχαΐᾳ δὲ ἦτε τραγάκανθα πολλή, καὶ οὐδὲν χείρων, ὥς οἴονται, τῆς κορητικῆς, ἀλλὰ καὶ τῇ ὄψει καλλίων.<sup>74</sup> Manifestum igitur est Theophrasti testimonium, Tragacanthae gummi in Creta colligi. Adversatur vero Belonius, qui nusquam id produci in Ida monte asserit, quanquam duo eius plantae genera ibi crescant.<sup>75</sup> Cum Belonio consentiant Oliverius et Sieberus, quorum hic ne vestigium quidem in omni Creta huius gummi ibi collecti invenire potuit.<sup>76</sup> His accedit Sibthorpii effatum, qui, quanquam haud inficietur, et Astragalum creticum, qui et in Ionia crescat, gummi illud fundere, veram tragacantham tamen fatetur in Achaia Peloponnesi, in Parnasso, ut et circa Thessalonicem, in Cypro denique generari, ac e Patris quotannis in Italiam transvehi.<sup>77</sup> Est autem peloponnesiaca alia *Astragali* species, quam *sempervirentem* Lamarckius, *aristatum* Heriterius appellavit, a cretico, cui admodum similis, differens foliis viridibus, licet pilosis, non incanis, pedunculis brevissimis et dentibus calycis subulatis, qui ovati in cre-

69) Berg. mat. med. p. 600.

70) Hist. pl. 6, 4.

71) Sempl. p. 147.

72) Iter gall. 1, 22.

73) Hist. pl. 9, 1.

74) lb. c. 15.

75) Obs. 1. p. 25.

76) Reise nach Creta, 2. p. 72. 323.

77) Flor. graec. 2. p. 90.



tico sunt. Utrūque et affines, A. *Arnacantham* MB., *plumosum* W., *Poterium* Pall., *tumidum* W., *Pseudo-Tragacantham* Pall., *compactum* W., coram habeo, quorum nonnulli et in regionibus caucasicis crescunt, ut vere igitur Theophrastus Mediam patriam indicare potuerit. A. aristatus etiam in Gallia provinciali et in pyrenaeis montibus provenit.

Cap. XXI. Eryngii cognomen apud prophetas σίσερο-  
τος transpositum esse ε σιτέρο, *menses ciens, emmenago-*  
*gum*, Rossius autumat.<sup>78</sup> Punicum nomen esse a חרד, stupor, derivandum, Bochartus statuit.<sup>79</sup> Quod ut exponat, ad falso intellectum respicit Aristotelis locum<sup>80</sup>: Τῶν δ' αἰγῶν ὅταν τις μιᾷ λάβηται τοῦ ἡρύγγου τὸ ἄκρον (ἔστι δὲ ὅλον θριξί,) αἱ ἄλλαι ἐστᾶσιν ὥσπερ μεμωρωμένα καὶ βλέπουσιν εἰς ἐκείνην. Id quidem Plinius<sup>81</sup> recte interpretatur: „Villum de mento caprarum pendentem, quem aruncum (ex ἡρύγγω formata vox) vocant: hoc si quis apprehensam ex grege unam trahat, ceterae stupentes spectant.“ Quomodo intellexerit Theophrastus, qui, loco ἡρύγγου, ἡρυγγίου scribit<sup>82</sup>, non liquet. Male certe intellexerunt de planta ἡρυγγίῳ Plutarchus<sup>83</sup> et scholiastes Nicandri.<sup>84</sup> Hinc igitur autumat Bochartus, stuporem illum caprarum a Carthaginensibus perperam ad herbam ipsam traductum fuisse.

Hispanorum cognomen κέντουμ κάπιτα scribendum esse existimo: nam et Danis *Hundred hoved* planta dicitur.

Quaenam vero species *Eryngii* intelligatur, dictu haud proclive est. Etenim folia radicalia, cordata, integra, qualia hic indicantur, communia sunt E. *plano*, *tricuspidato* et *dichotomo* Desf., in Europa australi pariter obviis. Involucra longissima, rigida, pungentia, quae hic notantur, adsunt in E. *dichotomo*, quod etiam colore capitulorum coeruleo est insigne. E. *plani* capitula sunt amethystina. E. *tricuspidati* primum albida, demum coerule-

78) Etym. aeg. p. 327.

79) Can. p. 753.

81) Lib. 8, 76.

83) Sympos. 7, 2.

80) Hist. anim. 9, 4.

82) Fragm. 15. p. 836.

84) Ther. v. 645.

scunt. Proinde tres eae species comprehensae in unam apparent. Radix earum aromatis aliquid spirat: folia germinantia asparagorum ad instar comeduntur, praesertim Eryngii maritimi.

Cap. XXII. *Ἀλόης* nomen syriacum mihi cum Salmasio<sup>85</sup> videtur. E Syria enim et Phoenicia primum in Graeciam apportata, *الوأي* (*aluai*) a mercatoribus dicebatur<sup>86</sup>, quae vox an in semitica radice *עלה*, *ascendere*, *evehi*, originem habeat, nescio, auguror tamen, cum planta brevi tempore satis procera fiat. Arabes vocant *صبر* (*saber*), optimam speciem *مقر* ab amaritudine, alteram *سولع*. Quodsi unquam in Andro insula provenerit, advectam fuisse a Phoenicibus autumo, sicut et in Cypro Sibthorpius invenit.<sup>87</sup> Quid quod Sieberus Agaven americanam, quasi spontaneam, certo introductam, in Ida monte frequentem vidit.<sup>88</sup>

In Arabia autem sponte crescunt plures species, quae parem liquoris illius resinosi copiam largiuntur: 1) *Alœ* nimirum *arabica* Lam., foliis albo-maculatis, dentato-spinosis, spinis recurvatis fuscis, floribus flavis. 2) *A. socotrina* Cand., caule dichotomo frutescente, foliis glaucescentibus, margine confertim serrulatis, albo-spinosis. 3) *A. vulgaris* Cand., caule suffruticoso, foliis glaucis emaculatis sinuato-spinosis. Utriusque flores rubri, non albi sunt, ut Dioscorides scribit.

Cap. XXIII. *Ἀψινθίου παρωνομασία* triplex invenitur, vel, Stephano teste, ab oppido Thraciae *Ἀψίνθω*, vel a voce obsoleta *ψίνθος*, *τέρψις* Hesychio, vel denique, Phavorino et Suida testibus, *ἀπίνθιον* dictum, *ὃ οὐκ ἂν τις πίνῃ διὰ πικρότητα*.

Iam quaeritur, quatenus species Artemisiae intelligenda sit, utrum *A. Absinthium*, an *A. pontica*. Utraque pariter vulgaris per Europam Asiamque mediam, differt tum laciniis foliorum illius oblongis obtusis, huius

85) Homon. hyl. iatr. p. 7.

86) Sic et in Ev. Io. 19, 59. *ἄλὼν* syriace redditur.

87) Fl. graec. 1. p. 259. 88) Iter creticum, 1. p. 438. 439.

vero linearibus, tum odore illius ingrato, huius vero sub-aromatico; simili quoque sapore A. pontica praestat, cum A. Absinthium amarissimo (βαθυπικρὸν) gaudeat. Hinc et Galenus ponticam speciem et aromatica indole et astringente vi antecellere alias species docet.<sup>89</sup> Mihi igitur videtur, utramque speciem hic comprehendi: namque insignis amaritudo Absinthii, vermibus aliisque animalculis inimica, eodem modo praedicatur, ac astringens indoles et aromatica.

Cap. XXIV. Absinthium marinum vocari et σέριφον, seu σερίφιον, Rossius ex aegyptiaca lingua ita exponit, ut ξρίφιον proprie scribendum esse doceat, quod absinthium marinum significet: eliso autem μ, et mutata aspirata vocali in σ, sicut ὑπέρ in *super*, ὕς in *sus* transeant, natam esse eam appellationem.<sup>90</sup>

Absinthium marinum, quod *Artemisiam maritimam* Linnaeus dixit, in Tauro Cappadociae copiosum esse, non mirum, siquidem ad lacus nostros salso mediterraneos etiam provenit. Est autem ingens lacus Tatta inter Galatiam, Cappadociam et magnam Phrygiam, et contigua huic regio usque ad Taurum. Ἡ μὲν οὖν Τάττα, inquit Strabo<sup>91</sup>, ἀλοπήγιόν ἐστιν αὐτοφυές: et Plinius saltem tattaeum iuxta ac cappadocicum praedicat.<sup>92</sup> Circa eum lacum salsum Artemisia maritima pariter crescere potuit ac circa Τάφοςιριν (*Ταπόσειριον* ab aliis scriptam), quae, Alexandriae vicina, inter stagna et maris oram sita erat.<sup>93</sup> Sed commutari etiam haec species facillime potuit cum similibus A. *orientali* Willd., quae in Armenia, et *inculta* Delil, quae in Aegypto crescit. Pecora autem Artemisiae variis speciebus pasci et pinguescere, nostra etiam experientia confirmatur.

Cap. XXV. Σαντόμιον esse veram lectionem, e Plinio patet et Serapione. Santonum enim regio in Aquitania super Garumnā fluvium erat.<sup>94</sup> Sic et Galenus

89) Meth. med. 11, 16. p. 789.

90) Etym. aeg. p. 192.

91) Lib. 12. p. 184.

92) Lib. 31, 41.

93) Strabo 17. p. 526.

94) Plin. 4, 33. Strabo lib. 4. p. 40.

σαντόνικον, nunquam σαροδώνιον, cum absinthio comparat<sup>95</sup>, nomine derivato ἀπὸ τῆς Σαντονείας χώρας. Quodsi autem Artemisias in Gallia spontaneas comparamus, nulla alia Absinthio similis est, quam Art. *palmata* Lam., quam in Gallia occidentali, ut et in Hispania, provenire persuasum habemus.<sup>96</sup> Eam, e Santonum agro acceptam, primus, admodum rudi icone, nomine Xantonici vulgaris illustravit Lobelius<sup>97</sup>, cum antea nonnulli, Ruellio duce, Artemisiam ponticam pro Santonico haberent.<sup>98</sup> Linnaei Art. *santonica*, in Tataria crescentem et Persia boreali, veteribus cognitam fuisse, vix credibile est.

Cap. XXVI. Ἀβροτόνου nomen scholiastes Nicandri διὰ τὸ πρὸς ἄψιν ἄβροδὸν καὶ ἀπαλὸν φαίνεσθαι exponit. Duo autem genera hic enumerantur: femina arborescens, albida, foliis minutim incisis, corymbis aureis, et mas sarmentosum, gracilibus ramulis, sicut absinthium. De illo, abrotano femina, controversia fuit patrum rei herbariae. Fuchsius videtur Art. *ponticam* pro ea habere<sup>99</sup>; Dodonaeus Art. *arborescentem* L.<sup>100</sup>; Matthiolus<sup>1</sup> et Clusius<sup>2</sup> *Santolinae* varias species, *Chamaecyparissum* praeprimis et *squarrosam* W., pro ea planta venditarunt. Equidem, quanquam Anguillaram habeam adversarium<sup>3</sup>, ultimae accedo sententiae, quia plura stant pro hac planta argumenta, quam pro A. arborescente. Corymbi enim aurei, folia minutim incisa, et fragrantia plantae praedicari in Santolina vel maxime possunt.<sup>4</sup>

Abrotanum mas ab omnibus fere interpretibus pro nostra habetur Art. *Abrotano*, quanquam similitudo cum Absinthio haud conspicua sit, foliorum nimirum glabrorum laciniis filiformi-setaceis. In Asia tamen minore provenire, certum est.<sup>5</sup> Non sine veritatis quadam specie Anguillara plantam, cuius semina ex Arabum aevo con-

95) De fac. simpl. 6. p. 804.

96) Cand. flor. gall. 4. 196. Lapeyr. fl. pyren. p. 504.

97) Observ. p. 436. 437. 98) Caesalp. 12, 4.

99) Hist. stirp. p. 7. 100) Hist. stirp. p. 21.

1) Comment. p. 513. 2) Hist. 1. p. 341.

3) Sempl. p. 166. 4) Cf. Caesalp. 12, 7.

5) Caesalp. 12, 6.



tra lumbricos adhibita fuerunt, quamque Linnaeus *Art. iudaicam* nominavit, huc quadrare contendit.<sup>6</sup> Absinthio enim multo similior est: provenire autem scimus in Aegypto, Syria, Numidia, Arabia et Persia australi. Esse הַצִּיִּי Ebraeorum suspicamur, testimonio etiam veterum paraphrastarum freti, quamvis LXX. ubique aliter interpretentur.<sup>7</sup> *Schiha* (شحي) Arabum, cuius semina anthelminthica ab Avicenna celebrantur<sup>8</sup>, hanc esse plantam, Rauwolfius quoque probavit.<sup>9</sup> Quodsi vero haec planta Abrotanum mas Dioscoridis fuerit, cur anthelminthicae eius virtutis haud plane meminit?

Cap. XXVII. Hyssopi et nomen et notitia ex Aegypto proficiscuntur. Siquidem prima eius fit mentio, cum Ebraei pascha ante exitum ex Aegypto celebrarent. Itaque et ebraeum nomen חִיִּסְוִי et graecum *ὑσσώπος* aegyptiacae originis esse videntur, quamvis Iablonskius id explicare nequiverit.<sup>10</sup>

Quaenam sit planta, in contentionem venit, dum in Dioscoride certe nullum indicium in hoc capite saltem invenimus. Sed mox, cum organum describit, folia hyssopi foliis similia facit, umbellam vero haud rotatam esse dicit, quasi innuere velit, talem esse hyssopi inflorescendi modum. Confirmatur id capite de chrysocoma, ubi noster: *ἔχον κόμην κορυμβοειδῆ, ὁμοίαν ὑσσώπῳ*. Accedit, et Cratevam<sup>11</sup> et scholiasten Nicandri<sup>12</sup> plantam maiornae (*σαμψύχω*) similem pronunciare. Cum eadem maiorana et سفا (*sufa*) suum comparat Isaac Ebn Amram, noni, ut videtur, saeculi scriptor, cum iam a Serapione et Mesue seniori citetur. Nasci in montibus domus sanctae (Hierosolymorum): per terram spargi ramis pulverulentis, foliis viridibus, sed postea citrinis, suaveolentibus.<sup>13</sup> Denique ex antiquo codice vindobonensi Dodonaeus iam ico-

6) L. c. p. 167.

7) Cels. hierob. 1. p. 482.

8) Ed. arab. p. 256.

9) Iter germ. 4. n. 456. App. ad Dalech. p. 36.

10) Opusc. 1. p. 367.

11) Apud Anguill. p. 196.

12) Ther. v. 876.

13) Serap. c. 270. Bochart. hieroz. 1. p. 588.

nem mutnatam exhibuit, quae nullo modo cum Hyssopo nostrate, multo magis cum Origani specie congruit.<sup>14</sup>

Nisi nimiae temeritatis suspicionem praebere videar, *Origanum aegyptiacum* in Aegypto, *syriacum* dein, satis simile, in Palaestina ab Ebraeis adhibitum: posterius etiam ab Isaaco Arabe descriptum; *Origanum* denique *smyrnaeum* a Dioscoride intellectum dicerem. Utrumque posterius enim praesertim spicis congestis umbellato-fastigiatis, foliisque ovatis, Maioranae simillimis, conspicuum est. Quam saepe autem nos recentiorum Graecorum appellationibus decipi possimus, patet e nomine ὑσσώπον, quod, Sibthorpio teste<sup>15</sup>, et Satureiae graecae et iulianae tribuunt, quae nullo modo cum Hyssopo Dioscoridis congruunt.

Lobelius iam nomine Hyssopi Graecorum legitimi Origani speciem promulgavit, quae nescio an eadem cum *O. Onitide*, sicala planta, sit.<sup>16</sup>

Fab. Columna habet *Teucrium Pseudhyssopum* Seheb.<sup>17</sup>

Hyssopi autem nostratis, in Gallia australi et Italia spontanei, neque in Graecia, Syria, aut Aegypto obvii, vestigium in Mesue iuniori quaerunt, qui *Sufa* suo folia حاشا (*hhascha*) largitur: quae vox cum thymum denotet, medii aevi scriptores italicam gallicamque plantam eo nomine insignierunt. Primam iconem exhibuit Tragus.<sup>18</sup>

Sibthorpii coniectionem, ὑσσώπον ὀρεινὴν Dioscoridis esse *Thymbram spicatum* L., applausu haud dignam iudico, quia a sola similitudine eius fruticis lignosi cum Hyssopo nostrate petita esse videtur. *Thymbram verticillatam* L. pari iure sic dixerat Dalechampius.<sup>19a</sup>

Cap. XXVIII. Stoechadis nomen derivatur ab insulis Stoechadibus, quae e regione Massiliae sitae sunt, iam Hières dictae.<sup>19b</sup> *Γαλατίαν* autem in textum recepimus, loco *Γαλλίας*, quod codd. C. et X. habent, quia et Strabo, civis Dioscoridis et tempore aequalis, Gallos ubique dicit

14) Hist. stirp. p. 288.

15) Flor. graec. 1. p. 596. 397.

16) Obs. p. 264.

17) Ecphras. p. 67.

18) Herb. f. 18.

19a) Hist. pl. 934.

19b) Strabo 4. p. 24.

*Γαλάτας*, et portus habet *γαλατικούς*, et nomen Celtarum, qui Narbonitin incolant, *διὰ τὴν ἐπιφάνειαν*, dein ad omnes *Γαλάτας* transiisse<sup>20</sup>, unde et terram ipsam *Κελτικήν* nominat. Galatia asiatica appellationem ab ipsa gente celtica sortita est, quae, cum diu longisque erroribus vagata, ab Attalicis regibus eam terram accepit, quae Gallograecia postmodum et Galatia dicta est.<sup>21</sup> Hinc *Γαλατίαν τῆς Ἀσίας*, et *τῆς Εὐρώπης*, seu ut noster c. 25. loquitur, *κατὰ τὰς Ἀλπεῖς*, semper distinxerunt Graeci scriptores eius aevi. Deinde vero *Γαλλίας* nomen a Romanis didicerunt.

Planta, de qua sermo est, *Lavandula Stoechas* nobis dicitur, a Fuchsio, ni fallor, primo illustrata.<sup>22</sup>

Cap. XXIX. Origanum heracleoticum Cunilam gallinaeam Plinius<sup>23</sup>, gallicam Apuleius<sup>24</sup> vocat. Matthiolus id primum recognitum illustravit<sup>25</sup>, quod et Linnaeus antiquo nomine *Origani heracleotici* accepit. Spicae terminales longae, pedunculatae, laxe imbricatae videntur id exponere, quod *σινιάδιον ὥσπερ διηρημένον* dicitur. Nec dissentit Sibthorpius, qui id in Graeciae montosis siccis haud rarum vidit.<sup>26</sup>

Cap. XXX. Si Onitis Origano similis foliis albidioribus, corymbisque cohaerentibus sibique incumben- tibus distinguitur, est vel O. *Onites*, quod foliis subtomentosis ac spicis aggregatis praeditum est, vel O. *creticum*, quod multo magis fasciculatas oblongasque habet spicas, cuius folia, quanquam haud albescant, hirsutiuscula tamen et canescentia sunt. Illud Matthiolus nomine Origani III, Onitis, folio subrotundo pictum exhibuit<sup>27</sup>: illud etiam Sibthorpius vindicat.<sup>28</sup> Hoc vero tuetur Tournefortius<sup>29</sup>, neque possum quin huic astipuler. Utamque autem speciem, Oniten e Sicilia, creticum e Creta ipsa acceptum, probe cognosco.<sup>30</sup>

20) Ib. p. 37.

21) Strabo lib. 12. p. 175. 176.

22) Hist. stirp. p. 773.

23) Lib. 20, 62.

24) C. 122.

25) Comment. p. 519.

26) Flor. graec. 1. p. 418.

27) L. c.

28) L. c.

29) Instit. p. 199.

30) Ὀρίανος λευκή et μέλαινα Theophrasti (hist. 6, 2.) magnopere dubiae sunt. Cum haec dicatur ἄκαρπος, in mentem venit

Cap. XXXI. *Origanum sylvestre*, foliis origani, floribus albis umbellatis, dixerat Nicander πανάκτειον κονίλην<sup>31</sup>, ubi scholiastes Petrichi testimonio suffultus, ab inventore Conilo nomen obtinuisse plantam affirmat, et e Diocle alia cognomina ἡράκλειον, ὀρείανον et πανακίδα citat. Alio loco<sup>32</sup> ἔγχνοα folia κονίλην tribuuntur, quae lectio si vera, folia lanata designat; sed scholiastes legit ἔγχλοα, et tamen φύλλα αὔχμηρα, quasi somniabundus, interpretatur. Neglecta hac expositione, subsistamus in priore lectione, quae congrua Dioscoridi est. Hinc igitur vereor, ut recte iudicarint instauratores rei herbariae, Brunfelsius inprimis et Valer. Cordus, dum *Origanum vulgare* Dioscoridis ἀγριορίανον esse existimant. Multo probabilior sententia Gerardi<sup>33</sup>, qui *Origanum sylvestre album* constituit, varietatem vulgaris, quae bracteis calycibusque decoloribus, floribusque albis, foliis etiam incanis differt.<sup>34</sup>

Cap. XXXII. *Tragoriganus duplex* est, alter latifolius valde, glutinosus, alter gracilibus ramis foliisque angustis. Illum origano aut serpyllo sylvestri similem habet auctor. Fruticulus valde aut satis glutinosus nullus obuius est, nisi *Stachys glutinosa* L.<sup>35</sup> *Thymum Mastichinam* L. habet Clusius.<sup>36</sup> Alterum *Tragoriganum omnino Thymus Tragoriganum* L. esse videtur.<sup>37</sup>

Nomen τραγορίανον dictum esse, quod hirci illud pascentes lascivi evadant, scholiastes Nicandri tradit.<sup>38</sup>

---

Origani Maru varietas, quae apud nos sine partibus fructificationis occurrit. Origani albi nomine venire apud Graecos eam plantam, quam Dioscorides hyssopum cilicium vocarit, Anguillara auctor est. (Sempl. p. 91.) Fuit igitur *Origanum* vel *smyrnaeum* vel *heracleoticum*, cuius acerrimam speciem ex Arcadia habebant. (Athen. 2, 77.) Tenedium origanum tamen etiam alio loco laudatur. (Ib. 1, 50.) Salsamentis gratiam addere dicebatur. (Ib. 2, 77.) Quin ipsae mulierculae sibi et amasiis strata ex origano suaveolente parare consueverant. (Aristoph. eccles. 1022.)

31) Ther. v. 626.

32) Ib. v. 762.

33) Herb. p. 626.

34) Crantz stirp. austr. p. 283.

35) Zanonii istoria p. 119. t. 81. Whelerus in Parnasso invenit (iter p. 350.)

36) Hist. 1. p. 555.

37) Alpin. de plant. exot. t. 78.

38) Alexiph. v. 308.



Cap. XXXIII. Pulegium est vulgaris notitiae, *Mentha Pulegium*, per omnem Europam temperatam vulgaris. Herba acris est, oleo aethereo acerrimo praegnans, unde cuti applicita arrodit partes, rubefacit et immunda ulcera purgat. Emmenagogum tutum crediderunt etiam recentiores.<sup>39</sup>

XXXIV. De dictamno Dioscoridis cretico nunquam exstitit controversia, quanquam floribus fructibusque carere perperam statuat. Optime Virgilius:<sup>40</sup>

Dictamnū genitrix Cretaea carpsit ab Ida,  
puberibus caulem foliis, et flore comantem  
purpureo; non illa feris incognita capris  
gramina, cum tergo volucres haesere sagittae.

Est *Origanum Dictamnus* L., cuius iconem fere primam Dodonaeus exhibuit.<sup>41</sup>

Idem etiam recognovit *ψευδοδίκταμνον*, *Marrubium Pseudodictamnium* L., quod non solum in Creta, sed in omni Graecia satis frequens est.

Tertium, foliis *σισυμβρίου* aemulis, et cuius flores *ὀριγάνου ἀγρίου* speciem prae se ferre dicuntur, Pona primus declaravit *Marrubium acetabulosum* L.<sup>42</sup>, non Cretae soli proprium, ut Sibthorpius vult, sed et in insulis maris aegaei et in Palaestina a Sieberio inventum. Haereo tamen in floribus nigricantibus, origani sylvestris flores referentibus: multo magis haereo in odore suavissimo, quem praecipue ducem eligo, ut *Thymum Mastichinam* L., in Hispania non solum, sed in omni etiam Graecia obvium<sup>43</sup>, esse hunc dictamnium tertium coniiciam.

Cap. XXXV. Salviae cognomen aegyptium *ἄνουσί* esse legendum, quod salutiferum interpretatur, perhibet Rossius.<sup>44</sup> Quenam salviae species intelligatur, potest omnino ambigi. Vero tamen est haud absimile, *Salviam* nostram *officinalem*, quae in asperis omnis Graeciae locis provenit, hac appellatione comprehendi.

39) Haller stirp. helv. n. 221.

40) Aen. 12, 412.

41) L. c. p. 231.

42) Mont. bald. p. 10.

43) Flor. graec. i. p. 423.

44) Etym. aeg. p. 12.

Cap. XXXVI. *Mentha sativa* (ῥόδουσμον Graecis, نعناع (nānā) Arabibus) vulgaris est notitiae. Nec *Mentha sylvestris*, quam Romani menthastrum vocarunt, controversa unquam fuit. Primus eam delineavit Tragus.<sup>45</sup>

Cap. XXXVII. Eo magis in contentione positae sunt Calaminthae, quarum tres species succincte, ut solet, enumerat auctor. Primam montanam, foliis ocimi similibus, sed albidis, Lobelius existimavit invenisse, cum Calaminthae alterius incanae nomine divulgaret.<sup>46</sup> Est mihi *Thymus Barrelieri*, quem Linnaeus *Melissam creticam* vocarat. Barrelierus enim Calaminthae, pulegii odore, eam delineavit.<sup>47</sup> In Graecia, Sicilia et Gallia australi eam provenire exploratum habemus. Alteram, pulegii odore, et Matthioli et plerique seriores pro *Thymo Nepeta* Scop. habent, nullo, praeter odorem, indicio. Ut tertiam vero divinarent, longum est, hallucinationes instauratorum narrare: nuperrimus scrutator Sibthorpius in *Melissa* a se vocata *altissima* substitit, quod nec affirmare auisim, nec negare, cum omnia nos deficient indicia.

Cap. XXXVIII. *Thymum Dioscoridis* legitimum, quem Brunfelsius, Tragus ac Fuchsius pro *Thymo vulgari* habuerant, Matthiolus primus in *Thymo cretico* Brot. (*Satureia capitata* L.) recognovisse videtur.<sup>48</sup> Est frutex elegans, ramis lignosis albidis rigidulis, foliis fasciculatis lineari-lanceolatis glabris patentibus, capitulis terminalibus arcte imbricatis, bracteis oblongis coloratis ciliatis, floribus purpureis. A Lusitania inde ad Palaestinam in oris maris mediterranei omnibus reperitur. In Hymetto, Atticae monte, abundans, apibus gratissimus, παράσημα τῶν Ἀθηναίων sistebat θυμόν ὑμῆτιον cum ἰσχάσι.<sup>49</sup> Et nostris temporibus laudationes mellis aromatici ex Hymetto monte non desierunt.<sup>50</sup> Theophrastus thymi semen cum flore quodammodo permistum cum iis etiam seri, esse etiam

45) Herb. f. 8<sup>a</sup>.

46) Obs. p. 275.

47) Icon. t. 1166.

48) Comment. p. 531.

49) Athen. 1. p. 50. Hinc et Virgilio thymum cecropium (georg. 4, 270.) et hyblaëum (ecl. 7, 37.) dicitur.

50) Wheler it. p. 47. Sibthorp. apud Walpole, p. 244.

lanuginem, cum qua seratur et e qua germinet.<sup>51</sup> Quippe sunt bracteae ciliatae ante calycem amplectentes, quae persistent, dum maturescit semen. Bene animadvertit, thymum, nisi afflatum maris sentiat, haud provenire: hinc in vicinia orae, sicut olea, nec in Arcadia, crescere. Hinc τὸ θύμον, in interiore Africa, qua non pluere dicitur, obvium, nostra non esse potest planta, quando et βολβός et ἀγριοκρόμμυον cognomina θύμον edulis habentur.<sup>52</sup>

Cap. XXXIX. Θύμβρα est *Satureia Thymbra* L., fruticulus omnino Thymi cretici similis, ramis lignescens, foliis subfasciculatis spathulato-linearibus acutis hispidis punctatis, verticillis florum densis basi foliatis, floribus pariter purpureis. In Graecia, Asia minore, Africa boreali et Sardinia non raro provenit. Ut veteribus ciborum condimentum gratum erat<sup>53</sup>, ita et hodie herba sicca contusa cibis inspergitur ad gratum odorem saporemque conciliandum.<sup>54</sup> Eam plantam in Creta inventam Honor. Bellus primus recognovit<sup>55</sup>; Clusius icone expressit, haud laudabili, quia et folia et verticilli a naturae forma desciscunt.<sup>56</sup> Meliorem exhibuit, Thymi cretici inscriptione, Barrelierus.<sup>57</sup>

Cap. XL. Ἐρπύλλον Graecorum *Thymum* nostrum *Serpyllum* esse, omnes consentiunt. Neque tamen facile dixerim, cur Nicander κροαίδια dicat et scholiastes κροατοειδὴ κατὰ τὰ φύλλα<sup>58</sup>: namque in foliis saltem nihil cornuum simile animadvertimus. Sed Rossio haec appellatio ansam praebeat, ut aegyptium cognomen, quod μηρονζόπ legit, exponeret. Esse enim ad literas factam interpretationem τῆς ζυγίδος κροατοειδοῦς.<sup>59</sup> Serpyllum hortense, coronarium et odore maioranam imitans a plerisque cum Dodonaeo<sup>60</sup> pro *Thymo vulgari* habetur. Ζυγίδα, quam

51) Hist. pl. 5, t. 6, 2.

52) Schol. Aristoph. Plut. v. 183. Hesych. θύμον, τὸ σκόροdon.

53) Aristoph. nub. 420. θυμβρενίδειπνος.

54) Sibthorp. apud Walpole p. 244.

55) Ad Clus. p. 304.

56) Hist. t. p. 358.

57) Ic. t. 898.

58) Theriac. v. 909.

59) Etym. aeg. p. 115.

60) Hist. p. 273.

iam Philinus Cous dixit <sup>61</sup>, Clusius bene illustravit. <sup>62</sup> Est *Thymus Zygis* L.

Cap. XLI. Σάμψυχον vocem esse aegyptiam, testatur Plinius <sup>63</sup>, quam diverso modo exponunt copticam linguam callentes. Iablonskius enim herbam unguentariam vertit <sup>64</sup>, Rossius herbam crocodili. <sup>65</sup> Quod hic aegyptium nomen σοφό vocatur, vere est syriacum [20] hyssopi (c. 27.), maioranae similis. Avicennae dicitur مرزندجش (*morsandschusch*), quod e μαίζουράνα corruptum videtur. Antiqua appellatio tandem transiit in مردقش (*mardakusch*), quo nomine hodie in Aegypto et Arabia maiorana insignitur. <sup>66</sup>

Ἀμάρακον autem Theophrasti eandem esse plantam <sup>67</sup> ac σάμψυχον Nicandri <sup>68</sup> et σάμψυχον Dioscoridis, testimoniis Dioclis Carystii <sup>69</sup> et Plinii <sup>70</sup> et Dioscoridis ipsius nititur, quanquam Nicander ipse, Galenus et Paulus Aegineta diversis locis et ἀμάρακον et σάμψυχον tradant.

Proferam sententiam veritati proximam. *Origanum Maiorana* L. originis est indicae et arabicae. Ex Arabia in Aegyptum migrasse, indeque in Graeciam, aegyptio σαμψύχον nomine, sed semper in hortis culta fuisse videtur. In Creta autem et Cyzico alia et simillima species spontanea est, *Origanum Maru* L., quam *Maioranoi-*dem Willdenovius dixit. Differt vero a Maiorana, tum radice perenni, tum foliis ovatis obtusis incano-tomentosis, tum ramis filiformibus. Folia Maioranae contra elliptica sunt et glabriuscula. Cetero florendi modus idem in utraque. *Origanum Maru* igitur fuisse ἀμάρακος videtur, quem mollem Virgilius vocat. <sup>71</sup> Maru cretici nomine P. Alpinus adumbravit. <sup>72</sup> Esse Maioranam hortensem

61) Athen. 15, 28.

62) Hist. 1, 358.

63) Lib. 21, 35.

64) Opusc. I. p. 260.

65) Etym. aeg. p. 182.

66) Forskol. flor. aeg. arab. p. LXVIII. CXIV.

67) Hist. pl. 6, 7.

68) Ther. v. 617.

69) Athen. 15, 27.

70) Lib. 21, 35.

71) Aen. 1, 698.

72) Plant. exot. p. 288.



perennem tenuiorem Morisonii, Willdenovius statuit, sed nec icon quadrat, nec synonyma congruunt.

Cap. XLI. *Μελίλωτος* sine dubio est *Melilotus officinalis* Lam., per omnem Europam satis vulgaris, cuius odor fortis notissimus εἰς πλείω χρόνον διαμένει<sup>74</sup>, ut et herbaria, saeculo elapso, eum oleant.

Quaenam vero sit *Melilotus* Campaniae foeni graeci aemula infirmoque odore, haud facile dixerim, cum ambigua sit ea similitudo, sive colorem floris, sive fructus formam complectatur. Si floris colorem spectaveris, adest *Mel. vulgaris* Willd., seu *leucantha* Cand., floribus albidis insignis, si habitum et, quodammodo saltem, leguminis formam, *Mel. coerulea* Desv. citari potest ob legumina acuta. Multo minus Fuchsii sententia approbanda videtur, qui *Trigonellam corniculatam* L. *Melilotum italicum* vocat<sup>75</sup>, licet flores odoratissimi sint.

Cap. XLII. Marum Dioscoridis cum Dodonaeo<sup>76</sup> plerique habuerunt plantam, quam Linnaeus *Thymum Mastichinam* dixit. Alii, Matthiolo duce<sup>77</sup>, *Teucrium Marum* L. sic nominarunt, quod, etiamsi fragrantissimum, nullam tamen floris habet cum organo similitudinem. Neque extra Hispaniam provenire certum est. Hinc Sibthorpius *Origanum sipyleum* huc reduxit, tum quia in Asia minore sola et Euboeae monte, praesertim inter Bursum et Smyrnam, invenit<sup>78</sup>, tum quia flores ad *Origanum*, nempe heracleoticum et creticum, accedunt. At folia albidiora? *O. sipyleum* gaudet foliis glaucis, glabris: ergo cohibeo consensum.

Cap. XLIII. Acini herbae difficultates sensisse non videntur, qui, Ruellio, Fuchsio<sup>79</sup>, Lobelioque praeconibus<sup>80</sup>, eam plantam huc traxerunt, quam Linnaeus *Thymum Acinon* dixit, in omni Europa vulgarem, nullo modo odoratam, nec coronariam. Cum Plinius asserat, Ae-

76) Hist. 3. p. 359.

74) Theophr. caus. pl. 6, 14.

75) Hist. p. 526.

76) Hist. p. 271.

77) Comm. p. 537.

78) Flor. graec. 1. p. 417. Magnesia et Tralles 400 stadia (15 milliaria germanica) a Smyrna distant.

79) Hist. p. 895.

80) Advers. p. 215.

gyptios serere acinon et coronarum causa et ciborum, esseque ocimum, nisi hirsutior esset et admodum odorata<sup>81</sup>, ecquis non satius duxerit, cum Anguillara insecitiam fateri, quam ad tam vilem plantam confugere? Planta aegyptia hortensis omnino Fabio Columnae visa est ad Ocimi ipsius speciem pertinere<sup>82</sup>, quam dein Linnaeus O. *Monachorum* vocavit. Sed, quanquam hirsutam caule dicat plantam Columna, folia tamen aequae glabra sunt ac Ocimi Basilici. Quae cum ita sint, O. *pilosum* potius Willdenovii, aut *suave* eiusdem (O. *urticaefolium* Roth.), quorum patriam ignoramus, quae tamen ex omni aetatum memoria in hortis coluntur, huc pertinere persuasum habeo.

Cap. XLIV. Temeritatis accusandus insuetae Anguillara, si omne hoc caput mutilum et laceratum e capite Cratevae de Asaro sumtum esse, atque a librario sciolo quodam ita assutum, ut et in Oribasio et Paullo, quae ibi reperiuntur de Baccharide, adscripserit, perhibet.<sup>83</sup> Plinius omnino et bacchar ab asaro distinguit: e radice odorata unguenta conficiebantur, quorum frequens fit apud veteres mentio.<sup>84</sup> Anguillaram refellere studuit Matthiolum; a Lacuna et Iul. Moderato, pharmacopola Ariminensi, acceptam plantam pro vera Baccharide habet.<sup>85</sup> Haec, licet male delineata, est *Conyza squarrosa* L., quae, licet fortem aromaticum spiret odorem, fragrans tamen aut suaveolens dici nequit. Neque flores purpurei et subalbicantes, sed flavo-rubicundi recte dicendi sunt.

Leon. Rauwolfius longe aliam Baccharidos nomine plantam in medium protulit: *Guaphalium sanguineum* L., quam in Libano invenit.<sup>86</sup> Est omnino planta cubitalis, tota albo-lanata, floribus corymbosis belle purpureo-albi-

81) Lib. 21, 101.

82) Phytobas. p. 23. 24.

83) L. c. p. 25—28.

84) Hipp. de nat. mul. p. 535. 549. Erot. expos. voc. Hipp. *Βάχχαρις, εἶδος βοτάνης καὶ μύρον*. Athen. 15, 41. Lucian. Lexiph. p. 187. Plin. 21, 77.

85) Comm. p. 538.

86) Iter german. II. 285. App. ad Dalech. p. 33.

cantibus. Eius etiam meminit Breynius.<sup>87</sup> Barrelierus ab alio bene delineatam operi suo inseruit.<sup>88</sup> Russelius circa Halepum Syriae<sup>89</sup>, Sieberius in locis Palaestinae petrosis invenit mecumque communicavit. Cuius quanquam adspectus satis congruit cum Dioscoridis descriptione, de odore tamen nihil constat, neque in sicca planta percipi potest.

Cap. XLV. *Ruta montana et hortensis* antiqua nomina retinuerunt. Vires, praesertim montanae et sylvestris, a recentioribus fere eodem modo observatae sunt ac a Dioscoride. Planta enim tantae est acrimoniae, ut per triplices chirothecas ad legentis manus penetrare, et capiti nudo imposita erysipelas et pustulas ulcerosas excitare testetur Clusius.<sup>90</sup> Epispastici quoque loco non semel adhibita fuit.<sup>91</sup> Adversus venena pestifera acetum ex ea confectum per plura saecula valuit.

Rutam hortensem esui aptiorem esse, quae iuxta ficus proveniat, haud absonum est, quoniam in laeto solo acrimoniam noxiam perdit. Sed aliena a ratione tradunt Aristoteles<sup>92</sup> et Theophrastus<sup>93</sup>, inseri posse ficubus rutam.

Cap. XLVI. Rutam sylvestrem Dioscoridis cum Linnaeo nominamus *Pegantum Harmala*. Videtur *ἄρμαλα* arabicae esse originis, *أرملة*. Ita enim planta in arabicis scriptoribus et ab Aegyptiis appellatur. *Χουρμα* Afrorum eadem vox est, omisso *ῥ* finali. Cum vero Galenus dicat: *Βήσσαρα σπέρμα ἐστὶν ἐν Συρίᾳ γεννώμενον τοῦ ἀγρίου πηγάνου, ὃ δὴ οἱ ἐντόπιοι ἄρμαλα καλοῦσι*<sup>94</sup>, cum nec radicem arabicam eius vocis deprehendamus, Rossii coniectura audienda esset, compositam esse vocem ex *הר*, *mons*, et *מול*, *moly*<sup>95</sup>, nisi contrariam haberemus ebraicae linguae ingenio eiusmodi compositionem. Postponi enim *הר* debuisset, non anteponi. De syriaca ipsa et aegyptia appellatione exponenda nil inveni.

87) Cent. p. 146.

88) Barrel. ic. t. 34.

89) Hist. nat. Alepp. t. p. 195.

90) Hist. 2. p. 138.

91) Haen rat. med. II, p. 66.

92) Problem. 20, 18.

93) Caus. pl. 5, 6. Plutarch. sympos. 5, 9.

94) De comp. med. sec. loc. 9. p. 257.

95) Etym. p. 37.

Planta ipsa a Dioscoride bene descripta est, ut nec capsula trilocularis cum seminibus angulatis, haud proprie triangularibus, taceatur. Crescit autem ad oras maris mediterranei, ponti euxini et maris caspii.

Cap. XLVII. *Μῶλυ* nomen Rossius autumat aethiopicae esse originis, ubi radix, etiam arabica *خمل*, *evellere*, *extrahere* signat, ut intelligatur *χαλεπὸν δέ τ' ὀρύσσειν*, ut cum Homero loquar.<sup>96</sup> Ea vero derivatio nimis anxia et quasi ex angulo quaesita mihi videtur, cum finalis littera *خ* haud ita reiici possit.

In moly definiendo haud parum desudarunt patres rei herbariae. Folia dicuntur graminea, flores lactei coloris, caulis tenuis, quatuor cubitorum: quae proceritas cum incredibilis sit, Clusius iam loco *πήχεων δακτύλων* esse legendum statuit.<sup>97</sup> Ita is cum Matthiolo<sup>98</sup> *Allium subhirsutum* L. subesse arbitratur. Alii ad *All. magicum* L. consilium transtulerunt, Dodonaeo praeunte.<sup>99</sup> Id omnino habet caulem procerum, ut tres saltem pedes superet, sed florem purpurascentem, qui tamen in frigidioribus locis omnino albidus est<sup>100</sup>, sicut et in Germania hortis semper occurrit. Quam Sibthorpius in Caria, Mysia et Cypro inventam plantam *Allium Dioscorides* dicit, caule interdum tri-vel quadricubitali, propius nec descripsit, nec eius specimen reportavit, undede eo nihil plane praedicari potest<sup>1</sup>, nisi forte varietatem esse *A. magici* proceram. Ceterum instauratores rei herbariae Moly nomen genericum stabilierunt, et inter alias species etiam luteum habuere<sup>2</sup>, quod Linnaeus tandem, arbitrio magis quam iure, *Allium Moly* vocavit.

Fabulosa esse, quae Plinius narrat de allata sibi e Campaniae saxis radice XXX pedes longa, et ne sic quidem solida, sed abrupta, quam ad Moly pertinere opinatur, exploratum habemus.<sup>3</sup>

96) Rossi p. 126. Od. 10, 305.

97) Plant. hispan. p. 256. 257.

98) Comm. p. 544.

99) Hist. p. 985.

100) Broter. fl. lus. 1. p. 546.

1) Flor. graec. 1. p. 222.

2) C. Bauhin. pin. p. 75.

3) Lib. 25, 8.



Cap. XLVIII. Πάνακες Ἡράκλειον uno fere ore patres rei herbariae declarant *Heraclei* speciem, quam Linnaeus *Panaces* vocavit. Repugnant vero tum lutei flores, quos πάνακες Dioscoridis gerit, tum liquorem resinosum, ὀποπάναξ dictum, ex ea planta colligi. Est igitur potius *Ferula Opopanax* mihi, quam Linnaeus binis locis *Pastinacae* et *Laserpitii* generibus adscripsit. Panacis peregrini nomine e seminibus inter grumos opopanaxis inventis educatam plantam Dodonaeus primus illustravit.<sup>4</sup> Tum Lobelius<sup>5</sup> se prope Monspelium inventum *Panax heracleum* exhibuit. Egrege hanc plantam nostra aetate adumbravit Kitaibelius.<sup>6</sup> Ingenue tamen fateor, dubia nonnulla superesse: protinus enim ambitus foliorum quinquepartitus potius ad *Heraclei* speciem quadrat: dein etiam lanugo alba non adest in caule, sed setis albidis hispidus est. Videntur autem minoris esse momenti, quando etiam patria congruit. *Ferula Opopanax* enim praesertim in Peloponneso et Boeotia a Sibthorpio indicatur.

Cap. XLIX. Πάνακες Ἀσκληπιόν a Matthiolo obscura icone, nulla addita descriptione, traditur. Aliam iconem Dodonaeus exhibet, quae *Cachryn*, ut videtur, *Libanotida* L. repraesentat.<sup>7</sup> Fabius Columna *Thapsiam Asclepium* L. sic vocat.<sup>8</sup> Equidem ob odorem totius plantae suavissimum mallet *Echinophoram tenuifoliam*, in Graecia vulgarem, et a me iam diu cultam, huc referre.

Cap. L. Πάνακες Χειρώνιον a Theophrasto<sup>9</sup> aliter describitur. Folia habere lapatho similia, sed maiora et hirsutiora, florem aureum, radicem demum exilem<sup>10</sup>; amare pingua loca. Noster vero suum Pelio monti tribuit, folia origani habere, florem pariter aureum. Similia canit Nicander:<sup>11</sup>

4) L. c. p. 309.

5) Adv. p. 312.

6) Plant. hungar. 5. t. 211.

7) L. c. p. 308.

8) Ecphras. 1. p. 86. 87.

9) Hist. pl. 9, 11.

10) Loco ῥίζαν μικράν schol. Nicandri v. 504. legit μικράν.

11) Ther. v. 500 — 505.

Πρώτην μὲν Χείρωνος ἐπαλθία ῥίζαν ἐλέσθαι,  
 Κενταύρου Κρονίδαο γερώννυμον, ἣν ποτε Χείρων  
 Πηλίου ἐν νιφέντι κυχῶν ἐφράσσατο δειρῇ.  
 τῆς μὲν ἀμαρακώεσσα χυτὴ περιδέδρομε χαίτη,  
 ἄνθεα δὲ χρύσεια φαίνεται, ἣ δ' ὑπὲρ αἰῆς  
 ῥίζα, καὶ οὐ βυθώσασα Πηλεθρόνιον νάπος ἔσχει.

Quaenam sit planta, haud ausim certo pronunciare. *Helianthemum vulgare* Pers., quod Matthiolus huc refert<sup>12</sup>, nullas habet, quod sciam, medicas vires. Theophrasti plantam Anguillara habet *Inulam Helenium*.<sup>13</sup> Sed Nicandri Dioscoridisque planta ob tonicas et balsamicas vires et ob locum in montibus Graeciae natalem, videtur potius<sup>1</sup> esse *Hypericum organifolium* Willd., quod in Graeciae Asiaeque minoris montibus provenire comperimus. Ultra autem, quo progrediar, quam ut veri videam similia, non habeo.

Cap. LI. Ligustici exemplum docet, quam parum exacta sit plantarum descriptio apud veteres. Duae potissimum sunt plantae, quae sibi tum ob patriam, tum propter usum domesticum apud incolas Liguriaee, nomen *λινυστικου* Dioscoridis poscant. Prima est *Ligusticum Levisticum*, sed quis folia lata, subcoriacea, lucida cum foliis Meliloti comparaverit, nedum ut dicat teneriora? Quis cauliculum tenuem pronunciaverit, qui vulgo digiti aut pollicis etiam crassitiem habet? Quis denique suaveolentem habuerit plantam, odore forti quidem, sed nequaquam grato, insignem?

Altera planta est *Laserpitium Siler*, cuius caulis omnino gracilior est, cuius folia quodammodo cum Meliloti foliis conferri possunt, sed solidum semen neutiquam adest, cum alatum sit.

Sed adest tertia planta, quae etiam magis a descriptione recedit, *Imperatoria Ostruthium*, quam Anguillara huc refert<sup>14</sup>, cum Matthiolus secundam, primam autem Brunfelsius et Tragus tueantur. Totam descriptionem man-

<sup>12</sup>) Comm. p. 546.

<sup>13</sup>) L. c. p. 89.

<sup>14</sup>) L. c. p. 211.

cam puto esse et erroneam: sed si optio est, satius duxerim, ad Matthioli sententiam accedere, ut *Laserpitium Siler*, et varietatem quidem angustifoliam, quam Sileris montani nomine Dodonaeus exhibuit<sup>15</sup>, pro *λινυστικῶ* Dioscoridis habere.

Cap. LII. *Σταφυλίνου* nomen aegyptium Rossius legit<sup>16</sup> *πὰ βεβίρε*, quod signet *bryoniae similis*. Nomen punicum Bochartus e syriaco idiomate *ܚܡܐ*, *nigrescere*, derivat.<sup>17</sup>

Quod ad *σταφυλίνου* significatum attinet, nequit alia esse planta, quam *Dauci Carotae* vel varietas sylvestris, vel etiam *Daucus guttatus* Sibth. Abortientes enim centri umbellae flosculi, qui in carnosum, purpureum corpus mutantur, iis speciebus peculiares sunt. Quare etiam patet, *Pastinacam* nostram neutiquam huc trahi posse, etiamsi Columella dicat, *pastinacam edomitam σταφυλίνον* esse.<sup>18</sup> Nec Theophrasti *σταφυλίνος ἄγριος* certo huc pertinet, cum medicorum nonnulli *κέρας* eum nominare dicantur<sup>19</sup>, quod potius cum *Amми Visnaga* Lam. congruit.

Cap. LIII. *Seseli* massiliense primus Fuchsius illustravit.<sup>20</sup> Iconem autem exhibuit *Dauci Gingidii*. Eum sequitur Dodonaeus. Valer. Cordus illo nomine insignit *Laserpitium Siler*. Quam Matthiolus exhibet, obscura iterum est, forte *Ligusticum pyrenaicum* Gouan. Aliam exhibuit Lobelius<sup>21</sup>, male pictam, quam etiam Anguillara agnoscit, *Seseli tortuosum*. Optime id exprimitur in senioribus Matthioli editionibus. Cum in eo et Clusius quiescat, viresque plantae admodum medicatae videantur, in eo etiam subsistamus.

Cap. LIV. *Seseli* aethiopicum optime ab Anguillara describitur<sup>22</sup>, quale in Gallia Narbonensi proveniat. Est *Bupleurum fruticosum* L.

Cap. LV. *Seseli* peloponnesiacum habetur a Matthiolo ac plerisque eum excipientibus pro *Ligustico pelopon-*

15) L. c. p. 310.

17) Can. p. 754.

19) Hist. pl. 9, 15.

21) Adv. p. 352.

16) L. c. p. 30.

18) Lib. 9, 4. 5. et 11, 3. 35.

20) L. c. p. 786. 787.

22) L. c. p. 212.

*nesiaco*, cui quanquam Lobelius et Dodonaeus *Thapsiam villosam* opponant, repugnat tamen omnis descriptio. Quam Anguillara habet, *Myrrhis odorata* Scop., maxime placet ob odorem gratum. Angelica sylvestris L., quam Sibthorpius, licet interrogans, huc trahit, longe aliena est.

Cap. LVL Tordylium, quod et seseli creticum dicitur, nomen suum servavit. Est *Tordylium officinale* L., cuius semen subrotundum scutiforme bene hic exprimitur. Additamentum spurium male intellectam seminum formam complectitur.

Cap. LVII. De Sisone definiendo desperarunt paene omnes rei herbariae instauratores, quamvis Dalechampsius<sup>23</sup> aliique eius loco plantam eam ponant, quae anomum officinarum medii aevi largiebatur, a Linnaeo *Sison Anomum* vocatam. Consentit seminis forma cum colore ac sapore, neque video, cur in Syria crescere nequeat, cum in Asia minore a Sibthorpio inventa sit planta.

Cap. LVIII. Anisum in nullam venit contentionem. Planta, in Aegypto et Graeciae arvis spontanea, in hortis Germaniae frequenter culta, a Linnaeo ad Pimpinellae, a me ad Sisonis genus relata est.

Cap. LIX. Nec Carum ambiguum est, servato ipso nomine. Radices teneriores omnino inter acetaria recipiuntur.

Cap. LX. Nec quisquam in Anetho haerebit, vulgari hortorum incolae, spontanea per Europam australiorem, Asiam minorem, ipsamque Africam australem. Pastinacae generi eam accenseo. Cognomen aegyptium Roscius probabili coniectura ex arabico *عز*, *odoratus*, proficisci consequitur.<sup>24</sup>

Cap. LXI. Cuminum sativum est *Cuminum Cuminum* L., in Aegypto Asiaque minore spontaneum. Dicitur Hippocraticis *κύμνον αἰθιοπικόν*<sup>25</sup>; βασιλικόν vero in

23) L. c. p. 708. 709.

24) L. c. p. 8.

25) De morb. 3. p. 321. De intern. aff. p. 492. De nat. muliebr. p. 558. de morb. mul. 1. p. 655.



nostris saltem editionibus non legitur. E semiticis dialectis origo vocis *κύμνον* petenda esse videtur, cum *קִמְנָ* Ebraeis multo antiquius sit.<sup>26</sup>

Cap. LXII. Cymini sylvestris duae species enumerantur, quorum primum bene descriptum a Matthiolo et aliis pro *Lagoecia cuminoide* L., in Graecia frequente, declaratur. Alterum est controversum. Valer. Cordus enim *Nigellam arvenssem* habet, cuius folia Cymini sativi similia, semina in corniculis erectis Nigellae sativae seminibus similia sunt. Conr. Gesnerus *Delphinium Consolidam* ita vocatum esse arbitratur.<sup>27</sup> Lobelius *Hypecoum procumbens* et *pendulum* adducit, iconibus expressa.<sup>28</sup> Quodsi autem concedimus, folia Hyp. penduli quodammodo accedere ad foliorum Cumini sativi formam, siliquae corniculatae neutiquam erectae, sed semper pendulae sunt. Quibus bene reputatis, Valerii Cordi sententiam dignam esse censeo, quam amplectemur.

Cap. LXIII. Ammi aethiopicum aut alexandrinum a Dodonaeo, ni fallor, primo recognitum<sup>29</sup>, et a Forskoleo ad Linnaeum missum, ab hoc *Ammi copticum* appellatum, ex India potius orientali originem habet. Ibi enim semina, *Adiowaen* nomine, tanquam aroma acre, praepriis usitata<sup>30</sup>, ad nos etiam ex India orientali advehuntur.

Cap. LIV. De Coriandro nulla exsistere potest difficultas. Nomen punicum est manifesto ebraeum *קִינָא*, *كزبر* Arabum.

Cap. LXV. Hieracium maius a Conr. Gesnero<sup>31</sup> primo recognitum, cum *Arnopogone picroide* Willd. satis congruit, unde et, licet cum dubitationis signo, a Sibthorpio<sup>32</sup> ad eam speciem reducitur. Longum est, quas reliqui instauratores rei herbariae captarunt, plantas enumerare. Sic a Matthiolo *Crepis biennis*, a Tabernaemon-

26) Ies. 28, 23. *Καρναβάδιον* est nomen Cymini apud seriores Graecos. (Geopon. 2, 28.)

27) De hort. German. f. 265<sup>b</sup>.

28) Adv. p. 330. 331.

29) L. c. p. 301.

30) Fleming in Asiat. research. 11. p. 170.

31) De hort. Germ. f. 261<sup>b</sup>.

32) Flor. graec. 2. p. 121.

tano Cr. *Dioscoridis* nomine Hieracii maioris insigniuntur. Punicum nomen Bochartus ex arabico ستن (*satal*), aquila, derivat.<sup>33</sup> Sic et ἱεράκιον μικρὸν σιθιλιεσάδῃ appellatur: ebraice קֶהֱלִי קָטָן. Etymologiam vocis ἱεράκιον fabulosam Plinius tradit<sup>34</sup>: accipitres scalpendo herbam succoque oculos tingendo obscuritatem discutere.

Cap. LXVI. Hieracium minus *Dioscoridis* pari fere iure rati sunt C. Bauhinus *Hypochoerin* esse *glabram*, Sibthorpius *Scorzoneram elongatam* Willd.

Cap. LXVII. Apium hortense, in omni antiquitate celebratissimum, spontaneum est in locis asperis Graeciae<sup>35</sup> et ad sepes Sardiniae.<sup>36</sup> Plantatum in περιήποις, atriis hortorum, fuisse legimus<sup>37</sup>: unde proverbium de eo, qui rem nondum orditus est: οὐδ' ἐν σελίνοις εἰσί. Herbam petroselini mammis impositam tubercula discutere, et nostra experientia probatur. In puncturis etiam insectorum ex adminiculis praestantibus est.<sup>38</sup>

Cap. LXVIII. Apium palustre vocatur a Linnaeo *graveolens*, vulgaris notitiae.

Cap. LXIX. Ὁρειοσέλινον olim pro *Selino Oreoselino* Scop. habui, sed hoc nec in Graecia provenire videtur, nec spithamam duntaxat altus est caulis. Dodonaeus tamen ita iudicat.<sup>39</sup> Anguillara esse Chaerophyllum nostrum sativum perhibet.<sup>40</sup> Conr. Gesnerus *Athamantam Libanotida* pro eo venditat.<sup>41</sup> Ex his sententiis ultima magis arridet. — Nomen aegyptium ἀνωσίμ Rossius vult ad *petras nascens* significare.<sup>42</sup>

Cap. LXX. Πετροσέλινον μακεδονικόν est *Athamanta macedonica* mihi (Bubon L.). Galenus eam plantam ἐστρεατικὸν πετροσέλινον vocat a regione, ubi gignatur. Paucum omnino in Macedonum terra provenire, quamvis a Macedonibus in omnes nationes divendatur. Sed nasci

33) Can. p. 754.

34) Lib. 20, 26. Cf. Aelian. hist. anim. 2, 43.

35) Flor. graec. 1. p. 205. 36) Moris elench. 1. p. 21.

37) Schol. Aristoph. vesp. v. 478.

38) Tissot avis au peuple, p. 359.

39) L. c. p. 696. 40) L. c. p. 125.

41) De hortis Germ. f. 247<sup>b</sup>. 42) Etym. aeg. p. 13.

etiam in Epiro, unde prius in Thessalonicen, et ex eo portu in omnes regiones apportari.<sup>43</sup> Tanta autem eius erat seriore aetate consumptio, ut κατ' ἐξοχήν κοδιμέντον (condimentum) appellaretur.<sup>44</sup> Μακεδονίσιον σπέρμα tamen vocat Nic. Myrepsicus.<sup>45</sup>

Cap. LXXI. Ἱπποσέλινον, quod etiam nunc *Smyrnium Olusatrum* vocatur, distinguitur a σμυρνίω capitis sequentis, sicut et Galenus probe ea discriminat.<sup>46</sup> Crudum hipposelinon haud mandi, idem perhibet, noster utique, sed muria conditum. Plantam, in Europa australi vulgarem, iam Fuchsius bene illustravit.<sup>47</sup>

Cap. LXXII. Smyrnium Amani montis, quod et in Italia, Galloprovincia ipsaque Pannonia provenit, est peculiaris species, quam *Sm. Dioscoridis* dixi, quod auctor noster eam satis apte descripsit. Matthiolus primus nomine Smyrnii cretici exhibuit<sup>48</sup>: nostris vero temporibus Kitaibelius eximie illustravit.<sup>49</sup> Radix est napiformis, pollicaris, extus fusca, intus albida, sapida. Folia radicalia triternata sunt, caulina superiora cordato-hastata, amplexicaulia, flavescentia. Caulis est superne quadrialatus. Aliam speciem, *Sm. perfoliatum* L., primus Dodonaeus<sup>50</sup> huc traxit, quod caule tereti differt.

Cap. LXXIII. Ἐλαφόβοσκον sine dubio est *Pastinaca sativa*: sicut et οἶσαρον (2, 139.) forte huc pertinere diximus. Nomen punicum Bochartus egregie exposuit ex ebraica lingua: רָפָא רִפְּה, *desiderium rupicaprae*.<sup>51</sup> Cervis enim, quorum pabulum gratum noster dicit, quique in Africa desunt, Afros rupicapras substituisse.

Cap. LXXIV. Ad foeniculum nihil habeo, quod addam.

Cap. LXXV. Ἱππομάραθρον dictam fuisse plantam foeniculo similem, διὰ τὸ μέγεθος, ergo multo altiore, asserit Galenus<sup>52</sup>, et Strabo peregrinantium mendaciis

43) De antidot. 1. p. 76. 77.

44) Geopon. 12, 1.

45) Sect. 1, 1.

46) De fac. alim. 2. p. 637.

47) L. c. p. 327.

48) L. c. p. 366.

49) Plant. hungar. 1. t. 23.

50) L. c. p. 698.

51) Can. p. 755.

52) De fac. simpl. 7. p. 68.

oneratus, retulit, in Mauritania hippomarathrum, staphylinum etiam et scolymum ad duodenum cubitorum proceritatem ascendere, crassitudinem autem palmorum quaternum.<sup>53</sup> Honor. Bellus<sup>54</sup> et Anguillara<sup>55</sup> plantam credunt recognovisse: est *Cachrys Morisonii* Vahl.

Alia hippomarathri species *Seseli* esse videtur, vel quod Rivinus primus et post eum Linnaeus *Hippomara-thrum* vocavit, vel aliud. Tabernaemontanus sic appellavit *Cnidium Silaum* mihi. Equidem nihil decernere ausim. — Nomen aegyptium, *σαμψοίς* scribendum, comminutionem calculi indigitare, Rossius perhibet.<sup>56</sup>

Cap. LXXVI. In Dauci tribus speciebus prima sine dubio est *Athamanta cretensis*, quam et Lobelius et Matthiolus huc trahunt. Daucum secundum iam Tragus et Lobelius pro ea planta declarant, quam Lapeyrousius *Peucedanum Cervariam*, Linnaeus Athamantam Cervariam vocarunt. Daucum tertium Honor. Bellus male habuit *Peucedanum nodosum* L., rarissimam Cretae plantam<sup>57</sup>, quae tamen statim floribus luteis recedit. Equidem *Seseli ammoides* congruere video, quod et in arvis Graeciae Sibthorpius invenit.

Cap. LXXVII. *Δελφινίου* duas species ad genus Delphinii pertinere, exploratum est. Delph. *Aiacis*, quod saepe rubro flore obvium est, primam, et secundam speciem, ni fallor, D. *tenuissimum* Sibth. exprimit. In Attica saltem posterius provenit.

Cap. LXXVIII. *Πύρεθρον* Dioscoridis Tragus primus declarat esse *Anthemida Pyrethrum* L.<sup>58</sup>, sequentibus Fuchsio<sup>59</sup> et Dodonaeo.<sup>60</sup> Huic sententiae refragatur *σκιάδιον*, quod in flore agnosci nequit, nisi ad vagam saepe Dioscoridis dictionem refugiamus. Ut *σκιάδιον*, umbella, servetur, Matthiolus sine patria et descriptione plantae iconem, ut videtur, plantae exhibuit Pyrethri veri no-

53) Lib. 17. p. 645.

54) Ad Clus. p. 300.

55) L. c. p. 124.

56) L. c. p. 183.

57) L. c. p. 301.

58) L. c. p. 173.

59) L. c. p. 641.

60) L. c. p. 347.



mine<sup>61</sup>, quam repetiit Dalechampius.<sup>62</sup> Haereo autem, sitne *Ligusticum simplex* Vill., an *Phellandrium Mutellina* L., quam recte Gaertnerus *Mei* generi adscripsit. Tertiam plantam adiecit Conr. Gesnerus<sup>93</sup>, quam et cum Dalechampio communicavit.<sup>64</sup> Ea *Meum athamanticum* Iacqu. esse videtur. In tam perplexis appellationibus satius duco, ad pristinam Tragi redire.

Cap. LXXIX. *Λιβανωτίς* triplex est. Prima foliis foeniculi, sed crassioribus latioribusque, seminibus teretibus ac angulosis seu sulcatis, sine omni dubio est *Cachrys Libanotis* L., quae in Sicilia et Africa boreali indicatur. Primus eam Matthiolus agnovit.<sup>65</sup>

Altera, semine lato odoratoque, sphondylii formâ, ad *Ferulae* genus pertinere videtur: forte *F. nodiflora* L., quam in Sicilia, Mauritania, Cypro, Asia minare et ipso Caucaso spontaneam esse comperimus.

Tertia *ἄκαρος*, et in Theophrasto obvia<sup>66</sup>, certo explanari nequit. Tabernaemontani saltem coniectura<sup>67</sup>, *Prenanthes* esse *purpuream*, defendenda non est.

*Κάχρυ* est fructus primae libanotidis, qui Theophrasto *κάχρυς*<sup>68</sup>, ipsaque planta *καχρυφόρος*<sup>69</sup>, ut Nicandro *καχρυόεσσα* et *καχρυφόρος* vocatur.<sup>70</sup>

De libanotide, quae ros marinus Romanorum, pauca addenda sunt. Prima eius, ni fallor, mentio sit a Virgilio, dum canit (georg. 2, 213.):

„Vix humilis apibus casias roremque ministrat.“  
et iterum (aen. 6, 230.)

„Spargens rore levi et ramo felicitis olivae.“

In serioribus nomen *δενδρολιβάνου* acquisivit, quo Geoponici (11, 16.) appellant, et quod etiamnum valet.

Cap. LXXX. *Σφονδύλιου* nomen servatum est in *Heracleo Sphondylío* L. Nomen aegyptium plantae e co-

61) L. c. p. 574.

62) L. c. p. 1170.

63) De hort. Germ. f. 274<sup>b</sup>.

64) L. c.

65) L. c. p. 375.

66) Hist. pl. 9, 11.

67) Herb. p. 313.

68) Hist. pl. l. c.

69) Ib. 3, 5.

70) Ther. v. 40. 350.

ptica lingua exposuit Rossius.<sup>71</sup> Esse nimirum ἀπεσῆρ, τῇ κεφαλῇ ἐμβροχόμενος.

Cap. LXXXI. Νάρθηξ est *Ferula communis* L. Ad-  
ditamentum de hac planta sagapenum largiente iure suo  
spurium habet Marcellus: deest etiam in cod. C., unde  
uncinis includenda erant verba: ὁ γοῦν νάρθηξ ad finem  
usque.

Cap. LXXXII. Πευκέδανος aut πευκεδανόν nomen  
habet a πένκη, cuius foliis folia Peucedani comparantur.  
Est autem *Peucedanum officinale* L., cuius radix succo  
scatet protinus albido, cum siccescit vero, luteo, unde et  
Anglis *sulphur-wort* planta dicitur. Theophrastus falli-  
tur, dum eum laticem supervacuum habet.<sup>72</sup> Efficacia  
eius et a Io. Bauhino confirmatur.<sup>73</sup>

Cap. LXXXIII. Μελάνθιον est *Nigella sativa*, vul-  
garis notitiae.

Cap. LXXXIV. De Silphio plura scribere possem,  
quam quae hic locus caperet. Haec enim studia, dum  
adolescerem, auspiciatus<sup>74</sup>, aetate constanti continuavi, et,  
cum iam consenui, de iis non desistam. Et primum qui-  
dem de nominibus.<sup>75</sup>

Σίλφιον dicitur hic tota planta, quemadmodum et  
apud Herodotum<sup>76</sup>, quanquam Galenus innuat, radicis  
appellationem sensim ad omnem transiisse plantam.<sup>77</sup> Ra-  
dicem solam σίλφιον nominant Antiphanes<sup>78</sup>, Iul. Pollux<sup>79</sup>  
et scholiastes Nicandri.<sup>80</sup> Theophrastus caulem plantae  
μαγύδαριν, folium μάσπετον, semen φύλλον vocat<sup>81</sup>, cum  
noster radicem μαγύδαριν, caulem μάσπετον, quam alii  
καυλόν, vocet. Hesychius: μαγύδαρις, ὁπὸς σιλφίου. Μά-  
σπετα, τὰ πρῶτα τοῦ σιλφίου πέταλα. Quae quidem ap-

71) L. c. p. 13. 72) Hist. pl. 9, 20.

73) Hist. pl. tom. 3. p. 376.

74) Apol. des Hippocr. 2. p. 339. Beitr. zur Gesch. der Med. 1.  
p. 210.

75) Gesch. der Bot. 1. p. 66. Comment. in Theophr. p. 224.

76) Lib. 4. c. 169.

77) Comm. in Hipp. de victu acut. 4. p. 877.

78) Athen. 1, 50.

79) Lib. 6. c. 67.

80) Alexiph. v. 308.

81) Hist. pl. 6, 3.

pellationes probant, quanti aestimata sit planta, nobilissimum liquorem, ὀπός vulgo aut ὀπὸς κυρηναϊκός Graecis, laser Romanis dictum, largiens. Cum autem mediae aetatis Graeci βαροβαροφωνεῖν coepissent, pluraque etiam ex Agarenorum (Arabum) lingua mutuare; pretiosus is liquor ἡνιτζίον nomine insigneabatur<sup>82</sup>, quod corruptum esse ex arabico انجدان (*andschedân*), aut potius persico هينكسه (*kindschisah*), plantae nomine<sup>83</sup>, videtur. Cetero et حلتيت (*hhaltit*) nomen plantae apud Arabas satis vulgare est. Haec de appellationibus, iam ad patriam.

Antiquissima plantae memoria, ab Herodoto servata, patriam exacte designat Cyrenaicam regionem, a Platea insula ad Syrtis usque os.<sup>84</sup> Theophrastus locum Africae amplum occupare silphium tradit, maiorem scilicet quatuor stadiorum millibus (centum mill. german.) ab Evesperidibus usque. Maiorem autem partem circa Syrtis colligi. Pèculiare huic plantae memorat, quod loca culta fugiat.<sup>85</sup> Hippocraticus auctor, saepius tentatam fuisse σιλφίου culturam vel in Ionia, vel in Peloponneso, sed frustra: extra Cyrenaicam regionem haud provenire.<sup>86</sup> Strabo addit, furtim e Cyrene Carthaginem devehì, hinc autem exportari in omnes regiones.<sup>87</sup> Hinc et τὸ ἐκ Καρχηδόνης σίλφιον ab Antiphane celebratur.<sup>88</sup>

Cyrenenses annis septem prius, quam ipsi urbem habitassent, apparuisse (φανῆναι) affirmabant.<sup>89</sup> Cum vero fugeret loca culta, cum culturam eluderet, saeculorum decursu raritas gliscebatur, ut Strabonis aetate deficere coeperit, quando barbarae nomades, incursionibus palantes, omnes paene radices pretiosae plantae evulsissent.<sup>90</sup> Et Scribonius Largus, par aetate<sup>91</sup>: Laser cyrenaicum, si poterit inveniri: sin minus, syriacum.

82) Constantin. Porphyrog. de cerimon. app. ad libr. 1. p. 270. ed. Reiske.

83) Kämpfer amoen. exot. p. 539.

84) Herodot. 4, 169. Cf. Scylax p. 45. ed. Hudson.

85) Hist. pl. 6, 3.

86) Hipp. de morb. 4. p. 327.

87) Lib. 17. p. 688.

88) Athen. 1, 50.

89) Theophr. l. c.

90) Strabo 17. p. 696.

91) Lib. 16. c. 67.

Interea enim e Media Persiaque per Syriam ac Armeniam alia species laseris, fere succedanea, multo tamen minoris efficaciae, ac gravioris odoris invecta erat. Hinc Plinius: „Diu iam non aliud ad nos invehitur laser, quam quod in Perside aut Media et Armenia nascitur large, sed multo infra cyrenaicum.“<sup>92</sup> Namque et publicani, qui pascua conduxerant, maius ita lucrum sentientes, depopulabantur plantam pecorum pabulo, ut Plinii memoria unicus duntaxat caulis repertus Neroni missus sit.

Silphium cyrenaicum ob gratissimum saporem fragrantemque odorem et propter virtutem calefacientem ac diaphoreticam, alexipharmacam quoque, apud Alexandriae inprimis et omnis Graeciae incolas, in deliciis erat.<sup>93</sup> Quin propagines et cauliculi salibus conditi acceptissima erant obsonia.<sup>94</sup>

Reditus autem Cyrenensium e vendito silphio tam ampli erant, ut et in numis effigiem plantae, una cum Iovis Ammonis, vel Batti qui coloniam condiderat, icone ponerent.<sup>95</sup> Unde et proverbium *Βάττου σίλφιον*.<sup>96</sup> Ex illa effigie in monetis cognoscimus plantam umbelliferam, vaginis foliorum amplissimis, caulem amplectentibus, foliis non satis evolutis, in quibus Anguillara formam Ferulae foliorum dispicere sibi visus est.<sup>97</sup> Theophrastus folia *σέλινω* similia tradit: id vero lucis parum nobis fenerat, cum Apii Petroselini folia infima longe recedant a summis. Posset aliquis in cyrenaico silphio *Ferulam tingitanam* conicere, qualem Hermannus<sup>98</sup> et Rivinus<sup>99</sup> icone expresserunt. Amplissimae saltem vaginae et umbella compacta, quae et in numis Cyrenensium conspiciuntur, congruunt: abundat ferula quoque latice resinoso. Se-

92) Lib. 19, 15.

93) Aristoph. Av. 534. 1578. 1581. Athen. 4, 69. 7, 120.

94) Athen. 7, 86.

95) Io. Rhod. ad Scribon. Larg. p. 127. Bodaeus ad Theophr. p. 598. Vivian. flor. lib. in titulo.

96) Hesych. h. v. Aristoph. Plut. 926. *Οὐδ' ἄν, εἰ δοίης γέ μοι τὸν Πλοῦτον αὐτὸν καὶ Βάττου σίλφιον.*

97) L. c. p. 152.

98) Paradis. bat. p. 165.

99) Flor. pentapet.



men autem Theophrasto dicitur *φυλλῶδες*, et qui nuper Cyrenaicam regionem peragravit, P. della Cella, aurea id ala esse cinctum docet.<sup>100</sup> Maximum id vidit, pollicis fere longitudine, latitudine dimidia: vidit quoque vaginas foliorum amplissimas; folia pinnata, foliola multipartita, laciniis simplicibus trifidisque, omnibus linearibus, elongatis, hirsutis, margine revolutis. Flores quanquam non observavit, exploratum tamen habet Vivianus, plantarum a Cella collectarum interpretes, esse *Thapsiae* speciem novam, et quidem *Silphium* dicendam.<sup>1</sup> Quae quomodo differat a *Thapsia gummifera* mihi, statim patet e foliis huius ternato-decompositis, foliolis ovatis pinnatifidis subcuneatis, glabris, opacis. Haec *Laserpitii gummiferi* nomine a Desfontainio ad Algiriam Numidiae inventa et delineata fuit.<sup>2</sup> Broterus *Laserpitium thapsiaeforme* dixit.<sup>3</sup>

P. Alpinus *σίλφιον* seu laserpitium e seminibus e Thracia delatis educasse in horto patavino sibi visus est: plantam delineatam habeo *Angelicae* speciem dubiam.<sup>4</sup> Eandem credidit Bodaeus in horto coluisse; sed et descriptio et icon in *Angelicam* potius *lucidam* L., americanam plantam, quadrant.<sup>5</sup>

Accedo ad medicum laser seu persicum, quod loco cyrenaici Dioscoridis aetate percubuerat. Esse id *Ferulae* genus, quod *Asam foetidam* Linnaeus vocavit, persuadet nobis Kaempferi egregia icon optimaque descriptio.<sup>6</sup> In Persia sola plantam nasci, et quidem tum circa Herat, emporium provinciae Khorasan, tum in provincia Lâr, persico sinui vicinam, testatur. Proinde medicum aut armenium dicebatur laser, quod mercatores Mediae Armeniaeque id advehere consueverant.

*Μαγύδαρις* alia libyca incerta est, ni forte *Ferula*

100) Viaggio da Tripoli alle frontiere occid. dell' Egitto. Genov. 1819.

1) Vivian. flor. libyc. p. 17.

2) Flor. atlant. t. 1. p. 72.

3) Flor. lusitan. t. 1. p. 427. Phytogr. lusitan. t. 34.

4) De plantis exot. p. 210. 211.

5) Comment. in Theophrast. p. 598.

6) Amoen. exot. p. 556.

tingitana fuerit, de qua supra disserui. Syriacam eius nominis plantam habet Theophrastus, quae et in Parnaso monte proveniat, pariter ignotam, quam haesitans olim ad Peucedanum alsaticum traxi, in montibus Graeciae et ipso Caucasio proveniens. Caucasici silphii meminit Arrianus.<sup>7</sup>

Cap. LXXXV. *Σαγαπηνόν* est succus ferulaceae plantae medicae secundum Dioscoridem, cui Galenus addit, plantam eam *πάνακι* esse similem<sup>8</sup>: sed quodnam intellexerit *πάνακις*, dubium est. Alio loco plantae nomen esse *σαγαπηνόν*, ideoque succum potius *ὀπὸν σαγαπηνοῦ* nominandum esse, perhibet.<sup>9</sup> In Arabibus, qui *سكبينج* (*sekhbinedsch*) id vocant, Mesue iunior confundit etiam magis historiam naturalem, dum arborem esse, oleandrum montanam, quae eum largiatur succum, contendit.<sup>10</sup> Nos penitus deficit ulterior cognitio: sed coniectura consequimur, plantam esse *Ferulam persicam*, quam Hopeus *Assam foetidam* dixit.<sup>11</sup>

Cap. LXXXVI. De nominis Euphorbii ratione audiamus Plinium<sup>12</sup>: „Invenit patrum nostrorum aetate rex Iuba, quam appellavit Euphorbiam, medici sui nomine. Frater is fuit Musae, a quo divum Augustum conservatum indicavimus. Sed Iubae volumen quoque exstat de ea herba, et clarum praeconium. Invenit eam in monte Atlantae, specie thyrsi, foliis acanthinis.“ Haec fruticis descriptio discrepat a Dioscoride, qui *δένδρον ναρθηκοειδές* dicit. Galenus autem diserte: *Ὅπός ἐστι φυτοῦ τινος ἀκανθώδους, ἐν τῇ τῶν Μαυρουσίων γῇ φανομένου*.<sup>13</sup> Magis differt Mesuae indicium: esse arborem desertorum hispidam, foliis prioribus hirsutis, quibus delapsis succedant alii Polium marinum referentia.<sup>14</sup> Porro Leo Africanus herbam cum carduo sylvestri comparat, inter cuius

7) Anab. 3, 28.

8) De antidot. 1. p. 55.

9) De fac. simpl. 8. p. 117.

10) Mesue f. 79<sup>b</sup>. ed. Venet. 1562.

11) Philos. transact. 75. p. 36.

12) Lib. 25, 38.

13) De compos. med. sec. loc. 9. p. 271.

14) Mesue f. 80<sup>b</sup>.

ramos fructus quidam prodeant, crassitudine viridis cucumeris, ad cuius etiam similitudinem grana quaedam perparva emittant. Eos fructus, ulnam excedentes, stipitum specie ex humo prodire.<sup>15</sup>

His rite reputatis efficitur, etiamsi lectio δένδρον ναρθηκοειδές legitima sit, falsas tamen relationes nostrum sequuntum esse: multo minus Mesuae descriptionem defendi posse, nisi ad longe aliam, et forte *Euphorbiam mauritanicam*, consilium transferamus, quae foliis lanceolatis glaucis quodammodo ad Polium accedat. Sed frutex, qui et hodie euphorbium largitur, est *Euphorbia officinarum*, Africae occidentali et Mauritaniae speciatim peculiaris, quae multangularis caespitosa, aculeis geminis, a Commelino bene repraesentata est.<sup>16</sup> Nec reiiciendae sunt duae aliae species: *Euph. antiquorum*, triangularis ramosa, marginibus angulorum sinuato-aculeatis, quam Commelinus pariter e Mauritania accepit.<sup>17</sup>

Modum collectionis, quem noster narrat, nuperi peregrinatores nec refutarunt, nec confirmarunt. Id tamen verum est: in saccis coriaceis transferri.

Cap. LXXXVII. Valde obscura est galbani antiquorum origo aut historia naturalis. Dioscorides ferulaceae plantae syriacae esse succum perhibet. Huic addendum Theophrasti testimonium de graveolente indole et medicato odore plantae: e panace Syriae effluere.<sup>18</sup> Plinius consentit, e Syria venire et ferulam illud largiri: sed addit, in Amano monte crescere plantam, qui Ciliciam a Syria disternat.<sup>19</sup>

Post renatas literas Lobelius primus galbaniferam e seminibus coluit, inter gummiresinam eam inventis.<sup>20</sup> Est autem *Ferula Ferulago* L., quae in Africa boreali, Creta et Asia minore occurrit. Evulgarunt quidem P. Her-

15) Descr. Afric. 9. p. 500. Scaliger in Cardan. exerc. 181. p. 586.

16) Hort. amsteld. 2. t. 11.

17) Ib. t. 12. Casp. Commelin. praelud. bot. p. 9. 17.

18) Hist. pl. 9, 7. ἐπεὶ καὶ αὕτη γίνεται περὶ Συρίαν ἐκ τοῦ πανάκου (cod. Urb. loco πάκου vulg.) καλουμένου.

19) Lib. 12, 56.

20) Obs. 451.

mannus<sup>21</sup> et Commelinus<sup>22</sup> plantas diversas, nomine eodem *Ferulae galbaniferae*: sed neutra huc trahi potest, cum in promontorio bonae spei crescant. Sunt autem: illud *Selinum Galbanum* mihi, hoc *Selinum gummiferum*: utrumque Linnaeus Bubonis generi citra rationem adscripserat. Itaque acquiescendum in ea planta, quam Lobelius divulgavit, quanquam in Europae variis regionibus, ubi obvia est, liquorem eum neutiquam largiatur.

Memorabile vero est, a Mose ad suffitus praeter alia et מְלִיחָה requiri<sup>23</sup>, quod a מֶלֶח, pinguedine, derivatum, a vetustis interpretibus galbanum redditur. Additum id suffimentis putant ob vim incensi galbani reptilia omnia abigendi<sup>24</sup> et culices fugandi.<sup>25</sup>

Cap. LXXXVIII. Ammoniacum diserte dicitur ferulae succus, quae circa Ammonis fanum in Africa proveniat. Neque uberiores notitiam post tot saecula adepti sumus. Namque et Shavius<sup>26</sup> et Jacksonius<sup>27</sup> plantam, quam ipsi observarunt, cum ferula comparant, citra ulteriorem descriptionem.

Cap. LXXXIX. Sarcocollae, quam عنزروت seu أنزروت Arabes appellant, ulterior nusquam notitia, nisi in Mesue, qui arbusculam spinosam esse, ramis nodosis, tradit.<sup>28</sup> In ea editione, qua utor, effigiem arboris, a mercatore Persa acceptam, Andr. Marinus apposuit, quae, sive ficta, sive ad naturam facta, folia arboris exhibet ovato-oblonga, serrata aut dentata. Fueritne sarcocolla in Perside generata, an per emporia persica solummodo ex India advecta, aut ex Aethiopia, expediri nequit. Hodiernam ex arbusculis aethiopicis, quae ad *Penaeae* genus pertinent, manare, constans fama est, a nemine etiamnum confirmata, quam vero falsissimam esse reor. Equidem nostrarum officinarum sarcocollam turi tenui similem, subfulvam, odoratam, gustuque amariusculam inve-

21) Paradis. p. 163.

22) Hort. amsteld. 2. t. 53.

23) Exod. 30, 34.

24) Nicandri ther. v. 555. Virgil. georg. 3, 415.

25) Plin. 19, 58.

26) Travels, sp. pl. n. 237.

27) Account on Marocco, p. 75.

28) Mesue f. 79<sup>b</sup>.



nio. Obvia fuerunt in ea semina *Smyrni*, quae ad quàm speciem pertineant, ambigo. Itaque nostra sarcocolla satis affinis et galbano et sagapeno aliisque eiusmodi substantiis esse videtur.

Cap. XC. De Glaucio paullo aliter Plinius: In Syria et Parthia nasci, humilem herbam, densis foliis, fere papaveris, minoribus tamen sordidioribusque; odoris tetri, gustus amari cum adstrictione. Granum habere crocei coloris.<sup>29</sup> Avicenna succum ماميثا (*mamitsa*) herbamque, si recte scripta est vox, بمنج (*bomnih*) vocat.<sup>30</sup> In Serapione legimus<sup>31</sup> *memithe* nomen etiam Chelidonio minori adscriptum, quae gravis est hallucinatio, cum Glaucii affinitas cum Chelidonico maiori negari quidem nequeat, sed longe alienum sit Ch. minus seu Ranunculus Ficaria.— Hic intelligitur *Glaucium corniculatum* Curt., seu *phoeniceum* Crantz., quod per Europam australiorem et in Syria circa Halepum (Russelio teste) provenit. Succum herbae expressum croceum (ut in Chelidonio) in oculorum morbis adhibitum fuisse, nemo mirabitur, qui Chelidonii usum in eiusmodi affectibus consideraverit.<sup>32</sup>

Cap. XCI. E coriis bubulis praestantissimum glutinum in Rhodo insula conficiebatur. Sed Galenus aliam etiam collae speciem ad librorum volumina compingenda memorat, e similagine et polline farinaceo (γύρεως l. γάρου legendum) conficiendam.<sup>33</sup>

Cap. XCII. Piscis cetacei dicitur venter ichthyocola, quae vesica natatoria est *Acipenseris Husonis*, gigantei utique piscis, cuius longitudo ab octo ad viginti pedes variat. Incola Volgae et caspii maris, provenit tamen et in Danubio et ponto euxino. Optimam nonnulli habent, quae ex interna vesicae natatoriae membrana petitur: haec aqua elota et siccata serpentino modo torquetur: vilior est libri modo plicata: ultima pretio sine cura siccata venit. Coquant etiam ad Volgam et in vicinia

29) Lib. 27, 59.

30) Ed. arab. p. 210.

31) Cap. 306. fol. 170 c.

32) Fabric. Hildan. opp. p. 1003.

33) De fac. simpl. 7. p. 33.

maris caspii vesicas Sturionum Silurorumque, donec gelatina spissescat, quae, in laminas scissa, pellucida est et flavida.<sup>34</sup>

Cap. XCIII. Ἰξός Dioscoridis est ἰξία Theophrasti<sup>35</sup>, quae in quercubus et terebinthis provenit. Est *Loranthus europaeus*, qui, Belonio<sup>36</sup> et Sibthorpio<sup>37</sup> testibus, recentioribus Graecis ὀξός dicitur. Ὑφέαρ aut ὕφιαρ, ut Hesychius scribit, cum in pinuum arboribus proveniat<sup>38</sup>, est *Viscum album*. Στελὶς Theophrasti eadem planta cum ἰξία videtur, cum Euboeae incolae posteriore nomine στελίδα insignierint.<sup>39</sup>

Iam vero exploratum habemus, viscum commerciorum et artilecum haud e fructibus *Visci albi*, sed e fructibus *Loranthi europaei* in Italia et Graecia parari, lignum etiam illius in officinis italicis, *Visco quercino* dictum, vendi.<sup>40</sup>

Cap. XCIV. Ἀπαρίνη ita describitur, ut *Galium Aparinen* L. facillime coniectemus. Eadem intelligitur, si eius cauliculi longi molles et tenues a Theophrasto memorantur<sup>41</sup>, si inter lenticulam crescere dicitur.<sup>42</sup> Φιλάνθρωπος vocabatur, quia vestibis hominum tenaciter adhaeret: id nomen, ut ἀπαρίνης et κολλητζίδας recentiorum Graecorum, ad alias plantas facile adhaerentes transit. Ξάνθιον enim quoque ἀπαρίνην vocatum fuisse e libr. 4. c. 136. patet; de eo etiam valet, quod Theophrastus de flore aparines tradit in aspero capite nascente, nec prodeunte nec manifesto, sed intra se ipsum maturescente semenque pariente, sicut id in Raiis (ἐπὶ τῶν γαλιῶν καὶ ὀινῶν cod. Urb. loco κυνῶν) contingat.<sup>43</sup>

Cap. XCV. Ἄλυσσον dictum fuit ἀπὸ τοῦ τὴν λύσ-

34) Pallas Reise in versch. Prov. des russ. Reichs, 2. p. 264. 265.

35) Hist. pl. 3, 16. 36) Obs. 1. p. 59.

37) Apud Walpole, p. 283.

38) Theophr. causs. pl. 2, 17. Walpole l. c.

39) Hesych. v. στελὶς.. 40) Pollini flor. veron. 3. p. 176.

41) Hist. pl. 7, 8. 42) Ib. 8, 8.

43) Ib. 7, 14. Cf. (Paulet de Fontainebleau): Examen d'un ouvrage, qui a pour titre: Stackhouse illustrat. Theophr. p. 26. Melun: 1816. 8.

σαν κυνὸς ἰᾶσθαι. Perplexitas nascitur e comparata descriptione plantae, quam Dioscorides hic exhibet, cum ea, quam Galenus ex Antonino quodam Coo mutuam accepit.<sup>44</sup> Ἄλυσσος, inquit, ἐστὶ βοτάνη τῷ πρασίῳ παρεμ-  
φέρουσα, τραχυτέρα δὲ καὶ μᾶλλον ἀκανθώδης περὶ τὰ  
σφαιρία, ἄνθος δὲ φέρει κυανῖζον. Inde colligitur insignis  
utriusque ἀλύσσου diversitas. Accedit Plinii alysson, quod  
cum neutro congruit, comparat enim cum erythrodano  
aut rubia<sup>45</sup>, unde nonnulli id ad *Asperulam arvensem*  
reducerunt, de quo tamen Dodonaeus dubitat.<sup>46</sup> Prio-  
res autem duas Alyssos egregie distinxit idem Dodonaeus,  
Dioscoridis plantam referens ad *Farsetiam clypeatam* R.  
Br., egregie delineatam<sup>47</sup>, Galeni vero ad *Marrubium*  
*Alysson* L.<sup>48</sup>, quod Car. Clusius iam eodem nomine di-  
vulgarat.<sup>49</sup>

Neque tamen praetereunda Fab. Columnae coniectura,  
qui in ἀλύσσῳ Dioscoridis *Veronicam arvensem* L. dispi-  
cit:<sup>50</sup> in ἀλύσσῳ Galeni vero *Stachyn annuam*<sup>51</sup>, nullo  
modo congruam. Et Veronica quidem arvensis melius re-  
spondet descriptioni, cum ἀσπιδίσκια διάδιπλα optimo iure  
de valvis fructus intelligenda sint. Sed σπέρμα ὑπόπλα-  
τυ deest in Veronica, adest in Farsetia, cuius semina  
compressa sunt, orbiculata, alata. Postea *Veronicam mon-  
tanam* L. aptiorem introduxit hoc nomine Columna.<sup>52</sup>  
Crescit autem Farsetia in Sicilia et Asia minore, praeser-  
tim in Sipylo, Olympo Bithynico, et Libano montibus.  
In definiendo Galeni ἀλύσσῳ nititur Columna maxime  
Aëtii<sup>53</sup> Paullique<sup>54</sup> testimoniis, qui sideritidem Heracleam  
dici et alysson perhibent. Neque aliud quid inde effici,  
meo arbitrio, potest, quam ἀλύσσου cognomen ad alias et  
valde differentes plantas transiisse.

Cap. XCVI. Ἀσκληπιάδα Dioscoridis Fuchsius pri-

44) De antidot. 2. p. 168.

45) Plin. 24. 57.

46) L. c. p. 356.

47) L. c. p. 39.

48) L. c. p. 88.

49) Hist. 2. p. 35.

50) Phytobas. p. 21. t. 3.

51) Ib. p. 25. t. 9.

52) Ecphras. 1. p. 288.

53) Lib. 1. p. 8. Lib. 6. c. 40.

54) Lib. 5. p. 162. ἢ σιδηρεΐδος Ἡρακλείας, ἣν καὶ ἀλυσσον (loco  
διᾶλυσον) καλοῦσι.

mus<sup>55</sup> pro *Cynancho Vincetoxico* R. Br. habuit, refutatus a Matthiolo<sup>56</sup>, quod odoratae non sint Vincetoxici radices, neque fructus cum securibus aut securidacae fructibus comparari possint. Sed bene defenditur a Dodonaeo, qui radices utique odoratas esse statuit.<sup>57</sup> Acerbius etiam invehitur in Matthiolum Lobelius.<sup>58</sup> Cum Dalechampio<sup>59</sup> denique et C. Bauhinus<sup>60</sup> et Sibthorpius<sup>61</sup> a Fuchsii partibus stant.

Cap. XCVII. *Ἀτρακτυλῖς* nomen sortita est, quia *ἄτρακτοι* s. colus ea antiquitus conficiebantur. Theophrastus plantam albidiorē habet cnico et acarna, graveolentem insuper ac velut cruorem recentem spirantem, cuius folium decerptum et carnosa sui parte admotum sanguineum laticem stillet, unde et *φόρος* a quibusdam vocetur.<sup>62</sup> Quodsi haec indicia cum iis componuntur, quae Dioscorides addit, mirum est, quantopere a vero aberraverint rei herbariae patres. Fuchsius enim atractylida mitiorem *Carlinam vulgarem*, hirsutiorē *Centauream benedictam* declarat<sup>63</sup>, adstipulantibus C. Gesnero<sup>64</sup> et Dalechampio.<sup>65</sup> Matthiolus vero primus *Centauream lanatam* Cand. seu *Carthamum lanatam* L. in scenam produxit<sup>66</sup>, quem plerique sequuti sunt, uberrime plantam illustrante Fab. Columna.<sup>67</sup> Eodem tamen iure, et quia planta glaberrima inferne magis nuda est, et hodie Graecis *ἀτράκτυλι* audit, a Sibthorpio<sup>68</sup> *Onobroma leucocaulon* mihi (*Carthamus ipsi*) huc trahitur. Huius flores pallidi sunt: quae vero florem *πορφυροῦν* habet, (si modo genuina est lectio,) ab Anguillara *Atractylidis cypriae* nomine ita describitur<sup>69</sup>, ut ad *Onobroma glaucum* mihi (*Carthamum glaucum* M. B.) reduci posset, si modo sciremus, Tauriae plantas Dioscoridi innotuisse. Sed et

55) L. c. p. 129. 130. 56) L. c. p. 592.

57) L. c. p. 407. 58) Advers. p. 278.

59) L. c. p. 1144. 60) Pin. p. 303.

61) Flor. graec. 1. p. 166. 62) Hist. pl. 6, 4. 9, 1.

63) L. c. p. 121. 122. 64) De hort. Germ. f. 249<sup>b</sup>.

65) L. c. p. 1450. 66) L. c. p. 593.

67) Ephr. 1. p. 19. 68) Flor. graec. 2. p. 160.

69) L. c. p. 149.



*Carlina lanata* L., in Italia, Gallia Narbonensi et Africa boreali inventa, floribus roseis, non aliena est. Haec saltem videtur Anguillarae planta esse, quam variis Italiae locis reperisse testatur.

Cap. XCVIII. Πολύκνημον iam Nicandro dictum<sup>70</sup>, habetur a Lobelio pro *Mentha arvensi*.<sup>71</sup> Nemo id iterum ad nostra usque tempora tetigit, plerisque nihil se de ea planta asserere posse fatentibus. Lobelii coniectio- ni itaque assentiendum, ni forte approbanda Caesalpini sententia, qui *Prunellam vulgarem* intelligi perhibet.<sup>72</sup>

Cap. XCIX. Clinopodium Plinius pariter tractat, sed, cum noster τὰ ἀνθη κλίνης ποσὶν ὅμοια dicit, ille orbiculato foliorum ambitu speciem lecti pedum praebere scribit.<sup>73</sup> Eam plantam Valerius Cordus, C. Gesnerus, Matthiolus alique pro *Clinopodio vulgari* habuerunt, cum verticilli densi, bracteis setaceis circumvallati, similitudinem quamdam cum pedibus lectorum habere videantur. Lobelius vero *Thymum Acinon* clinopodium veterum esse existimavit.<sup>74</sup> Clusius haesitans utramque plantam proposuit, addito tertio clinopodio, *Thymo* nimirum *alpino*.<sup>75</sup> Caesalpinus *Satureiam Julianam* in medium protulit, cuius verticilli pedunculati cum pedibus lectorum aptius comparantur.<sup>76</sup> Denique P. Alpinus in *Satureiae graecae* foliis et pedunculis paucifloris, ut plurimum trifidis, Dioscoridis κλινopόδιον agnoscere sibi visus est.<sup>77</sup>

Cap. C. De Leontopetalo nulla exstitit controversia, postquam Matthiolus plantam in Italia, Graecia et Asia minore non raram descriptione et icone adumbravit.<sup>78</sup> Aliam Dodonaeus exhibuit, in qua taxanda fructuum forma, quae siliquas aequant, cum tamen capsulae sint subrotundae, inflatae.<sup>79</sup> Verumtamen plura sunt, quae

70) Alex. v. 57. theriac. v. 559.

71) Adv. p. 217. Obs. p. 270. Dalechamp. p. 932.

72) Lib. II. c. 37. 73) Lib. 24, 87.

74) Adv. p. 217. Obs. p. 270. Anguillar. p. 218.

75) Hist. I. p. 353. 354. 76) Lib. II. c. 39.

77) De plant. exot. p. 260. 78) L. c. p. 596.

79) L. c. p. 69. Multo meliorem effigiem exhibet C. Gesnerus in opp. ed. Schmid. tab. aeri incis. g. f. 75.

certitudinem, *Leonticen Leontopatalum* esse Dioscoridis plantam, adimunt. Et primum quidem *λοβοί*, seu siliquae, cicerum similes, dein puniceus floris color, qui flavus est in *Leontopetalo* Matthioli, post etiam folia haudquaquam papaveris modo incisa, sed biternata, foliolis obovatis obtusis, denique semina minuta dici nequeunt, cum pisorum moles sit. Attulit igitur *Corydalin bulbosam* Pers. Caesalpinus<sup>80</sup>, quae utique floribus purpureis gaudet et siliquas gerit. Neque tamen unquam in arvis et inter segetes nascitur, sed in sylvis umbrosis.

Cap. CI. Comparato Plinii loco de Teucrio, mira apparet confusio.<sup>81</sup> Teucrium enim duplex habet, alterum, hemionion aut splenion quibusdam dictum, quod lienibus medeatur, nunquam florere neque semen gignere. Est id *ἄσπληγρον* nostri (c. 141.). Teucrium autem id vocatum fuisse, patet ex Apuleio (c. 57.), qui tamen et lonchitidem (c. 151.) cum Aspleno et Hemionitide perperam coniungit. Alterum Plinii teucrium ramis hyssopi surculosam vocat plantam, folioque fabae, quam e Cilicia Pisidiaque maxime laudari. Haec nostra quidem videtur, sed notis alienatis.

In Teucrio interpretando patres rei herbariae magnopere dissident. Siquidem Tragus *Veronicam officinalem*<sup>82</sup>, Fuchsius *Teucrium*, ut videtur, *flavum*<sup>83</sup>, Matthioli et hoc et *Veronicam Teucrium*<sup>84</sup>, posterius solum Lobelius<sup>85</sup>, Clusius practer *Teucrium flavum* ac *fruticans* L. etiam tres *Veronicae* species in scenam produxit<sup>86</sup>. Dodonaeus cum *Chamaedry* coniungens, *Teucrium* etiam *flavum* profert<sup>87</sup>, nec dissentit Anguillara.<sup>88</sup>

Cap. CII. *Chamaedrys*, ob foliorum formam ad quercinorum formam accedentem dicta, vocatur et teucrium, Romanis tripsago aut trixago; fruticulus floribus purpurascentibus, aspera loca amans et rupestria. Hinc

80) Lib. 6. c. 75.

81) Lib. 25, 20.

82) L. c. f. 79<sup>b</sup>.

83) L. c. p. 829.

84) L. c. p. 596. 597.

85) Obs. p. 259.

86) Hist. 1. p. 348. 349.

87) L. c. p. 43.

88) L. c. p. 219.

facilis erat argumentatio instauratorum, si a Trago inde *Teucrium Chamaedryn* ita vocarent<sup>89</sup>, adiungerent autem *Veronicam Chamaedryn*, praeunte Brunfelsio<sup>90</sup>; quam tamen C. Gesnerus<sup>91</sup> falsam et Bauhinus<sup>92</sup> spuriam dixerunt chamaedryn. Itaque, accedente et Sibthorpio<sup>93</sup>, subsistamus in Teucrio Chamaedry, in Graecia, ut per totam fere Europam, satis vulgari.

Cap. CIII. In hoc capite duae species Leucadis tractatae fuerunt, sed solum de montana fragmentum superest. Neque restitui in integrum potest, cum nec ipse Plinius incolume hoc caput legerit. Ita enim is, de leuce herba loquens: „Fortassis eadem sit, quae leucas appellatur, contra omnia marina venena efficax. Speciem eius auctores non tradunt, nec aliud, quam sylvestrem latioribus foliis esse efficaciorē, hanc semine acriorem.“<sup>94</sup> Hinc efficitur, e vano fere hausta esse, quae patres rei herbariae, ut et hanc plantam definirent, coniecturis consequi studuerunt. Lobelius<sup>95</sup> *Potentillam subacaulem*, Caesalpinus<sup>96</sup> *Galeobdolon luteum* Smith. huc trahunt, sine ulla probabili ratione. Paullo maiore digna sunt attentione Dodonaei ratiocinia.<sup>97</sup> Cum leucas et polium ex eadem canitie partium nomen obtinuisse videantur, cum Caelius Aurelianus testetur, leucen etiam polium nominari<sup>98</sup>, colligi potest, Polii affines plantas, *Teucrium* scilicet *aureum* vel *capitatum*, vel etiam supinum, ita appellata fuisse. Sed quis sibi claram in tam obscura re interpretationem arrogaverit?

Addam, quod vero mihi proximum videtur. Si leucas eadem est, quae leuce; haec omnino divinari potest. Mercuriali enim similis, nomen ex causa accepit, per medium folium candida transcurrente linea, quare mesoleucon quosdam vocare, Plinius testatur. Iam cum idem de lamio tradat, „album habere in medio folio“<sup>99</sup>, nil

89) L. c. fol. 78<sup>a</sup>. Fuchs. p. 869. Lobel. adv. p. 209. Dodon. p. 43. Matthiol. p. 596.

90) Herb. 1. p. 125.

91) De hort. Germ. f. 253<sup>a</sup>.

92) Pin. p. 249.

93) Flor. graec. 1. p. 393.

94) Plin. 27, 77.

95) Adv. p. 209.

96) Lib. 11. c. 51.

97) L. c. p. 284.

98) Morb. chron. 2, 4.

99) Lib. 22, 16.

obstat, quin *Lamium maculatum* hic subesse arbitremur, quod Fab. Columna iam bene illustravit.<sup>100</sup>

Cap. CIV. *Lychnidis coronariae* ac *sylvestris* nomina aegyptiaca *σμεῖον* et *σμεοῦρα* Rossius e coptica lingua exponit, illud significare *herbam luminis*, hoc *herbam solis*.<sup>1</sup> *Lychnis* vero *coronaria* nomen suum ad hunc usque diem servavit, licet ad *Agrostemmatidis* genus Linnaeus vocaverit.

Cap. CV. *Lychnis sylvestris* iam vocatur *L. Githago* Scop., seu *Agrostemma Githago* L., inter segetes per omnem Europam vulgatissima. Non defuerunt tamen, qui vel hanc vel priorem ad *Lychnidem Florem Iovis* Desrouss. traducerent<sup>2</sup>, vel *Lychnidem dioecam* L. in *λυχνίδι ἀγρία* invenirent.<sup>3</sup>

Cap. CVI. *Lilii* nomen aegyptium *συμναφού* scribendum et *αἶμα τοῦ Ἀρεως* esse interpretandum, Iablonskius docet.<sup>4</sup> Syrorum nomen corruptum e *ܠܝܠܐ*: punicum esse ebraicum *לֵבֶן אָבִיב* (*spica alba*) iam Bochartus monet.<sup>5</sup> Species ipsa plantae manifesto est *Lilium candidum* L. *Lilium* purpureo flore, quod hic indicatur, fueritne *L. Martagon* vel *chalcedonicum*, merito ambigimus.

Cap. CVII. *Βαλλωτή* Dioscoridis, a Fuchsio primo recognita, eadem dicitur cum *Ballota nigra* L.<sup>6</sup> Neque quisquam huic sententiae contradicere ausus est, cum pleraque indicia congruant: nisi aliquis Sibthorpii *Lamium striatum* praeferre voluerit.<sup>7</sup>

Cap. CVIII. De melissa iam Nicander:

τὴν ἥτοι μελίφυλλον ἐπικλείουσι βοτῆρες,  
οἱ δὲ μελίτταιναν· τῆς γὰρ περὶ φύλλα μέλισσαι  
ὁδμῇ θελγόμεναι μέλιτος ῥοιζήδον ἔνται.<sup>8</sup>

Et alio loco vocatur *μελισσόβοτος δασεία*.<sup>9</sup> Est Theocriti *εὐώδης μελίτεια* (Id. 4, 25.) ubi schol. τὸ κοινῶς λεγόμενον

100) Ecphras. I. p. 192.

1) Etym. aeg. p. 189.

2) C. Gesn. de hort. Germ. f. 266<sup>a</sup>.

3) Dodon. p. 171.

4) Opusc. I. p. 332.

5) Can. p. 755.

6) Fuchs. p. 154.

7) Flor. graec. I. p. 405.

8) Ther. v. 554.

9) Ib. v. 677.



μελισσοβότανον. A Virgilio dicitur melisphyllum<sup>10</sup>, à Var-  
rone<sup>11</sup> ceterisque Romanis<sup>12</sup> apiastrum. In eo, ut solet,  
Plinius vehementer hallucinatur, dum in confessa damna-  
tione esse venenatum Sardiniae perhibet, herba sardoa  
cum hac innocentissima planta confusa. Arabibus dicitur  
بادرنجبويه aut بادرنجبويه, *citrum redolens*.

Cap. CIX. Marrubii nomen punicum Bøchartus in-  
tactum liquit: equidem auguror, esse ebraicum הַצִּיר בְּרִכָּה,  
*herbam benedictam*, quia saluberrima est, maxime sterili-  
tati adversa.<sup>13</sup>

Herbam ipsam duplicem iam profert Theophrastus<sup>14</sup>:  
alteram foliis herbaceis, magis viridibus, profundius in-  
cisis, qua et pharmacopolae utantur, alteram foliis ro-  
tundioribus et squalidioribus, minusque incisis. Illa vi-  
detur *Marrubium catarifolium* Desrouss., per Asiam mi-  
norem frequens, hoc vero *M. vulgare* L. Illud a Nic-  
andro πρασίωιο χλοανθέος nomine insignitur<sup>15</sup>, ubi per-  
peram scholiastes cum μελισσοφύλλω commutat.

Cap. CX. Stachys Dioscoridis ob folia parva, albida,  
rigida et odorata a Sibthorpio habetur pro *Stachy palae-  
stina*, quae in montosis asperisque totius Graeciae pro-  
veniat.<sup>16</sup> Dubium tamen movent folia lanceolata, quae  
ὑποστρόγγυλα indicat Dioscorides. Patres rei herbariae  
plerique *St. germanicam* huc traxerunt. Magis aberrat  
Anguillara, si plantam agnoscit, ab Italis *spico gentile*  
dictam, quae *Lavandula Spica* Willd. est. Plinius in-  
considerata properatione scripsit<sup>17</sup>: „Ea quoque, quae  
stachys vocatur, porri similitudinem habet“ (legit enim  
aut audiit legentem amanuensem πράσω loco πρασίω), „lon-  
gioribus foliis“ (loco longior aliquanto, scilicet ramis)  
„pluribusque et odoris iucundi, colorisque in luteum in-  
clinati.“ Operam igitur perdiderunt, qui stachyn Plinii  
tanquam sui generis exponere conarentur.

10) Georg. 4, 64. 11) De re rust. 3, 16. 10.

12) Plin. 20, 45. 13) Hippocr. de steril. p. 19.

14) Hist. pl. 6, 2. 15) Ther. v. 550.

16) Flor. graec. 1. p. 409. 17) Lib. 24, 86.

Cap. CXI. *Φυλλῆτις* sine omni dubio est *Scolopendrium officinarum* Sm., filix, cuius frons cordato-lanceolata ab aversa parte soros capsularum lineares geminatos gerit, qui hic vermiculi tenues distantes dicuntur. *Σκολοπενδρίου* nomine occurrit apud Theophrastum<sup>18</sup> et Nicandrum<sup>19</sup>: forte etiam *πεταλῆτις* eadem est.<sup>20</sup> Matthiolus primus<sup>21</sup> hoc nomine plantae effigiem exhibuit, posteriorum consensu.

Cap. CXII. *Φαλάγγιον*, *φαλαγγίτης* Galeno dictum<sup>22</sup>, quod morsis a phalangiis auxiliatur. Plinius sic<sup>23</sup>: „Phalangites a quibusdam phalangion vocatur, ab aliis leucanthemon, vel (ut in quibusdam exemplaribus invenio) leucacantha. Ramuli ei sunt nunquam pauciores duobus, in diversa tendentes: flos candidus, lilio rubro (unde hoc expiscatus est?) similis: semine nigro, lato, ad lenticulae dimidia figuram, multo tenuiore: radice tenui, herbacei coloris.“

Eam plantam Matthiolus<sup>24</sup> habet *Czackiam Liliastrum* Andr. (Hemerocallis L.), quae tamen non ramosa est, nec radículas parvas, tenues habet, sed fasciculatas: crescit etiam in Alpibus helveticis et noricis: neque ἐν γεωλόφοις. Valer. Cordus *Anthericum Liliaginem* huc traxit, quanquam et hoc non ramosum sit, nec fibrosas habeat rudices, sed fasciculatas. Dodonaeus legitimum *φαλάγγιον* in *Antherico ramoso* L. dispexit.<sup>25</sup> Praepostere vero iudicavit Sibthorpius, dum hanc plantam ad *Anthericum graecum* L. reduceret<sup>26</sup>, quod bulbum habet loco radices, scapumque simplicem, nunquam ramosum.

Cap. CXIII. *Τρίφυλλον* hic tam eximie describitur, ut nemo non statim *Psoraleam bituminosam* L. intelligat, quae per Galliam australem, Italiam Graeciamque haud raro invenitur. Eadem iam a Nicandro describitur.<sup>27</sup> Agnorunt eam plerique rei herbariae instau-

17) Hist. pl. 9, 18. 19) Ther. v. 684.

20) Ib. v. 864. 21) L. c. p. 606.

22) De fac. simpl. 8. p. 150. 23) Lib. 27, 98.

24) L. c. p. 607. 25) L. c. p. 106.

26) Flor. graec. 1. p. 234. 27) Ther. v. 520.

ratores: e. g. Matthiolus, qui trifolii asphaltitis<sup>28</sup> et Dodonaeus, qui trifolii bituminosi nomine<sup>29</sup> adumbrarunt.

Cap. CXIV. *Teucrium Polium* πολίου nomine intelligi, in confesso est, Matthiolo, ni fallor, id primo probante.<sup>30</sup> Altera vero species, magis fruticulosa minusque graveolens, controversa est. Plinius<sup>31</sup>, postquam quae Dioscorides (4, 133.) de τριπολίου colore quotidie ter mutato retulerat, ad polium nostrum traducit, duo eius genera tradit: campestre maius, sylvestre minus. Et Gale-nus<sup>32</sup> πόλιον μικρόν δριμύτερον καὶ πικρότερον ab alio distinguit. Itaque et patres rei herbariae alterum divinare gloriati sunt: Matthiolus autem longissime aberravit, dum *Teucrium montanum*, nec magis fruticulosum, nec debiliore, sed gravissimo odore insigne, huc traheret. Neque tamen recedit C. Gesnerus ab hac erronea opinione.<sup>33</sup> Equidem, si quid veri videatur simile, enunciaturus, *Teucrium* potius *creticum* L., s. *rosmarinifolium* Lam., esse intelligendum, existimo.

Cap. CXV. De *Teucrio Scordio* nulla unquam fuit controversia.

Cap. CXVI. *Bήχιον* nomen a βηχί, adversus quam praesidium est, sicut Avicenna dicit سعالی a سعال, tussi: ex ultima voce et Rossius aegyptium nomen σααρθά derivare conatur.<sup>34</sup> *Tussilaginem* autem *Farfaram* intelligendam esse, quis non videt? Chamaeleucen tradit Plinius apud Romanos farfarum vocari, sive farfugium<sup>35</sup>: illud forte a Farfaro amne in Sabinorum regione.<sup>36</sup>

Bessi, quorum cognomen ἄσᾶ hic citatur, Thraciae partem incolebant, ubi Philippopolis sita.<sup>37</sup>

Cap. CXVII. Artemisiae nomen Plinius ab Artemisia, uxore Mausoli, repetendum esse tradit, cum antea Parthenis vocata fuerit. Esse tamen, qui ab Artemide Ili-thyia cognominatam putent, quoniam privatim medeatur

28) L. c. p. 608. 29) L. c. p. 566.

30) L. c. p. 612. 31) Lib. 21, 21.

32) De fac. simpl. 8. p. 106. 107.

33) De hort. German. f. 273 b. 34) Etym. aeg. p. 130.

35) Lib. 24, 85. 36) Ovid. metam. 14, 330.

37) Plin. 4, 18.

feminarum malis.<sup>38</sup> Illam etymologiam reiicit Harduinus, quod herba in Hippocraticis libris commendetur, Hippocrates autem multo Artemisia posterior sit. Mausolus autem obiit, Plinio teste<sup>39</sup>, olympiade centesima sexta, itaque viginti fere annos post Hippocratem, Heraclidis filium. Iam vero, cum libri Hippocratici de natura muliebri<sup>40</sup> et de morbis mulierum<sup>41</sup> diu post Hippocratis obitum, et probabiliter Ptolemaeorum temporibus consarcinati sint, salva esse potest ea etymologia.

Quodsi vero Dioscoridis Artemisiae ad nostras reducendae sunt species; prima ramosa fruticosa, quae maritima loca amat, et foliis gaudet maioribus, quam absinthium, nitidioribusque, haud haereo in nominanda cum Sibthorpio *Artemisia arborescente*, quae in Archipelagi maritimis atque in insula Zacyntho indicatur.<sup>42</sup> Miror tamen, neminem e patribus rei herbariae in hanc plantam incidisse. Artemisiam tenuiorem omnes fere maiores nostri cum Sibthorpio habent *Artemisiam campestram*, in omni Graecia admodum vulgarem. Artemisia denique *μονόκλωνος* sine dubio esse *Art. spicata* Jacqu. videtur, obvia et, Sibthorpio teste, in Graeciae montibus.

Cap. CXVIII. Spurium esse hoc caput, in confesso est: neque alia planta describitur, quam, quae iam supra aderat, *Art. campestris*.

Cap. CXIX. *Ambrosiam* esse *maritimam* L., quae hic profertur, Lobelius<sup>43</sup> et Dodonaeus<sup>44</sup> iam persuasum habuerunt. Turpiter autem lapsus est Matthiolus, dum alienissimas plantas vulgatissimasque, alteram *Coronopum Ruellii* Dod., alteram *Artemisiam campestram*, titulo Ambrosiae primae ac secundae produceret.<sup>45</sup> Neque Retzio assentiendum, qui Artemisiae speciem odoratam intelligi vult.<sup>46</sup>

Cap. CXX. A Tragi inde aetate, qui primus *βότρυν* Dioscoridis recognovit<sup>47</sup>, *Chenopodium Botrys*, in Europa

38) Plin. 25, 36.

39) Lib. 36. s. 4, 9.

40) Hipp. opp. 2. p. 556. 595. ed. Lips.

41) Ib. p. 672.

42) Flor. graec. 2. p. 168.

43) Obs. p. 442.

44) L. c. p. 35.

45) L. c. p. 619.

46) Flor. Virgil. p. 15. 16.

47) L. c. f. 335<sup>a</sup>.



australi spontanea, vulgaris est notitiae. Herba tota flava Dioscoridi dicitur, quod flosculi paniculati flavidi totam fere plantam obtegunt.

Cap. CXXI. *Geranium*, a gruini capitis imagine dictum, Afris dicebatur *κράν*, collo *longus*, radice arabica *عنق*: hinc lectio *ἑγκ* probabilior quam *ἑσκ*.

*Geranium* autem primum folio anemones et radice tuberosa, iam a Matthiolo<sup>48</sup>, Anguillara<sup>49</sup>, Dodonaeo,<sup>50</sup> Lobelio<sup>51</sup> ceterisque instauratoribus recognitum, per Italiam Dalmatiamque, in Peloponneso ac Cypro provenit. Est *Geranium tuberosum* L.

Quod *Geranium* alterum attinet, Fuchsius id in *Geranio rotundifolio* L. dispicere sibi visus est.<sup>52</sup> Bona id effigie etiam Dodonaeus illustravit.<sup>53</sup> Nec alieni ab ea sententia sunt, qui postea plantas veterum investigarunt. Sibthorpius<sup>54</sup> vero aptius putavit *Erodium malachoides* Willd., quod *Geranii* nomine sibi a Calceolario Veronensi missum Matthiolus primus delineatum exhibuit, huc referre<sup>55</sup>, quia gruum capita cum rostris melius repraesentat, folia etiam quodammodo ad malvae folia accedunt.

Cap. CXXII. *Γναφαλίου* etymon ipse D. indicat, quod folia alba molliaque tomenti loco inserviant. Plinius, qui gnaphalion ab aliis chamaezelon vocari tradit,<sup>56</sup> centunculum, synonymon gnaphalii apud nostrum, alio loco tanquam proprii generis et longe alieni profert.<sup>57</sup> Hunc centunculum cum Anguillara<sup>58</sup> credimus esse *Polygonum Convolverum*.

Nostrum vero *Gnaphalium* iam a Matthiolo<sup>59</sup>, Dodonaeo<sup>60</sup>, Lobelio<sup>61</sup> et Clusio<sup>62</sup> ita adumbratum invenimus, ut *Otanthum maritimum* Link. (*Santolinam maritimam* Huds., *Diotin candidissimam* Desf., *Athanasiam maritimam* L.) promptissime cognoscamus. Candida lana ac

48) L. c. p. 621.

51) Obs. p. 377.

53) L. c. p. 61.

55) L. c. p. 624.

57) Lib. 24, 83.

59) L. c. p. 625.

61) Adv. p. 201.

49) L. c. p. 227.

52) L. c. p. 205.

54) Flor. graec. 2. p. 57.

56) Lib. 27, 61.

58) L. c. p. 173.

60) L. c. p. 65.

62) Hist. p. 329.

50) L. c. p. 61.

lensissima, quae et folia et caules obducit, princeps est indicium, cui accedit aromaticus odor, e quo medicatas vires auguramur. Crescit autem planta ad litora maris mediterranei, ut et in Suffolcia Angliae.

Cap. CXXIII. De *τύφη*, quae nomen retinuit, a Theophrasto iam commemorata<sup>63</sup>, ambigi nequit. Tragus fere primus *Typham*, ut videtur, *latifoliam* nostratum in medium duxit<sup>64</sup>, plerisque sequentibus, praeter Anguillaram<sup>65</sup>, cui gramen placet circa muros Arimini inventum, quod *Saccharum* forte *Ravennae* Murr. est, C. Bauhinus vero pro *Eriophoro polystachyo* habet, gravi errore a Trag. Gnaphalium Dioscoridis dicto.<sup>66</sup>

Cap. CXXIV. De *κισθαία* difficillimam quaestionem promte expedire haud ausim. Arridet quidem Anguillarae sententia, *Cynanchum nigrum* RBr., ut mihi videtur, in Samnio inventum, proponentis.<sup>67</sup> Congruunt fere omnia; sed miraberis, comam seminum taceri. Lobelius, qui initio crediderat, *Solanum Dulcamaram* huc pertinere,<sup>68</sup> dein confugit ad herbam, quam et nos *Circaeam lutetianam* cum Linnaeo vocamus<sup>69</sup>, in quo quidem sequaces habuit plurimos, praesertim Fab. Columnam, qui et alteram speciem, *alpinam*, addidit.<sup>70</sup> Ea quidem planta, licet raro per Graeciam Asiamque minorem proveniat, flores habet tamen minime nigros, neque fructus cum corniculis comparari possunt: neque in locis apricis, sed umbrosis et humidis crescit. Caesalpinus, etiamsi alio loco Lobelii *Circaeam* veram existimet<sup>71</sup>, alio tamen loco *Capsicum annuum*, Indiae orientalis et Americae tropicae incolam, huc trahit.<sup>72</sup> Irridenda denique opinio Tragi, qui *Celosiam margaritaceam* congruam putat.<sup>73</sup>

Cap. CXXV. Plerique maiores nostri a Matthiolo inde *Oenanthes*, umbelliferarum genus, intelligunt sub *οἰνάνθη* Dioscoridis, sive sit *pimpinellifolia*, sive *peuce-*

63) Hist. pl. 1, 5.

65) L. c. p. 229.

67) L. c. p. 229.

69) Obs. p. 137.

71) Lib. 8. c. 33.

73) L. c. f. 219<sup>b</sup>.

64) L. c. f. 260<sup>a</sup>.

66) Trag. f. 261<sup>a</sup>.

68) Adv. p. 102.

70) Ecphras. 2. p. 80.

72) Lib. 5. c. 22.

*danifolia* sive *prolifera*. Haerebit tamen, qui loca natalia Oenantharum reputaverit: crescunt enim omnes in pratis humidis: Dioscoridis οἰνάνθη petras habitat. Neque altitudo congruit: pleraeque enim Oenanthae nostrates cubitales sunt: Dioscoridis est dodrantalis. Neque fructus cum Atriplicis fructu plano bivalvi conferendus est. Multo minus placet Fuchsii Oenanthe<sup>74</sup>, quae *Spiraea* est *Filipendula*; praeter altitudinem enim maiorem fructus nullo modo cum atriplicis fructibus comparari possunt. Superest *Pedicularis tuberosa* L., ad quam primus confugit Lobelius<sup>75</sup>, quam et Oenanthes alius Myconi Dalechampius<sup>76</sup>, et Oenanthes alpinae nomine Pona<sup>77</sup> citant. Haec omnino in petris et inter saxa alpina provenit, radicibus tuberosis teretibus, foliisque bipinnatifidis dentatis hirsutiusculis, Dauci folia omnino quadrantenus referentibus, caule etiam dodrantali, simplici, crassiusculo, floribus ochroleucis, maxime vero fructu compresso, biloculari, bivalvi, atriplicis fructui non dissimili, proxime ad Dioscoridis plantam accedere videtur. Medicas virtutes affinium specierum, praesertim ad urinam pellendam et Floyerus<sup>78</sup> et Hallerus<sup>79</sup> confirmant.

Ceterum οἰνάνθη Theophrasti ἀνθώδης, quae una cum *Viola odorata* floreat, flore gaudeat albo ac racemoso,<sup>80</sup> alia ac nostra esse videtur. Odore carebat. Tertiam autem citat<sup>81</sup> montanam plantam fragrantem, in Cypri nascentem, e cuius foliis unguentum paratur. Quarta οἰνάνθη est ipse vitis flos.<sup>82</sup>

Cap. CXXVI. Κόνυζα, sic forte dicta, quia κώνωπας abigat, quod noster tradit, triplex hic est, duplex apud Theophrastum et Nicandrum. Quam enim Dioscorides maiorem nominat, eam ἄρρηνα Theophrastus appellat, ramosiorem dicens et pinguiorem, florem etiam λαμπρότερον.<sup>83</sup> Hippocraticus scriptor, qui folium cum σελίνω

74) L. c. p. 562. 563.

75) Adv. p. 326. ic. 750.

76) L. c. p. 786.

77) Mons bald. p. 80. 99.

78) Pharmacobas. p. 163.

79) Stirp. helv. 1. p. 140.

80) Hist. 6, 6. 8.

81) De odor. p. 74κ. Hesych. h. v. Athen. 15, 39.

82) Theophr. causs. pl. 3, 13. Geopon. 5, 51.

83) Hist. pl. 6, 2.

οὐλῶ comparat, non coram habuisse plantam videtur, sicut ego eam iam ante oculos habeo. Namque folia sunt amplexicaulia lanceolata, serrata, villosa, viscosa, unde et male cum oleae foliis conferuntur. Odorem vocat idem Hippocraticus auctor δύσοιστον, toleratu difficilem, quum omnino gravem ingratumque percipio. Est enim planta in Europa australi non rara, *Inula viscosa* Ait., quam Conyzae maioris nomine Clusius, ni fallor, primus illustravit.<sup>84</sup> Minus placet Rauwolfii sententia<sup>85</sup>, qui Conyzam circa Tripolim Syriae inventam pro maiore Dioscoridis habet, licet odor non gravis, nec viscosa sit indoles. Hanc Linnaeus *Baccharidem Dioscoridis* nominavit. Est autem conyza maior Dioscoridis vi refrigerante celebris, qua cupidinem veneream restringere credebatur, substrata ideo in Thesmophoriis.<sup>86</sup> De eadem refert Sibthorpius, latice viscoso irretiri ac captari muscas aliaque animalcula insecta.<sup>87</sup> Ceterum non defuerunt, qui, Trago et Matthiolo praeceuntibus, et *Conyzam* nostram *squarrosam* huc traherent, quamvis nec pinguis superficies, nec gravis odor in hac adsint.

Conyza minor, foliis angustioribus, caulibus pedali-bus, a Theophrasto dicitur acriore odore praedita esse. De hac Nicander:

ἡ καὶ λεπτοθρόιο πολύθρονα φύλλα κονύζης.<sup>88</sup>

Primus eam speciem Lobelius<sup>89</sup> ita adumbravit, ut *Eri-gerontem graveolentem* agnoscas. Hanc plerique dein receperunt, etiamsi non negandum sit, *Inulam saxatilem* Lam., quam a Mycono acceptam Dalechampius Conyzae montanae nomine effigie expressit<sup>90</sup>, ob glutinosam indolem, hircinum odorem, caules duntaxat dodrantaes et folia angusta pari iure Conyzam minorem nuncupari posse.

Tertium Conyzae genus, in locis aquosis nascens, foliis mediae magnitudinis, haud pingue, sed odore gra-

84) Rar. stirp. hispan. hist. p. 377.

85) Iter, n. 54. Dalechamp. app. p. 20.

86) Schol. Nicandr. ther. v. 70. Schol. Theocr. id. 7. v. 68.

87) Walpole l. c. p. 245.

88) Ther. v. 875.

89) Advers. p. 146.

90) L. c. p. 1201.



viore, fere omnes habent *Inulam britannicam*, dissentiente tamen Clusio, qui, cum in nostro textu Aldinae lectionem ἀνύδροις loco ἐφύδροις praeferret, *Inulam Oculum Christi* hic intelligi existimavit.<sup>91</sup>

Cap. CXXVII. Ἡμεροκαλλίς alia videtur esse planta ac Theophrasti ἡμεροκαλλές: hoc enim lignosam habet radicem<sup>92</sup>, cum Dioscorides suae plantae bulbum praegrandem tribuat. Ἡμεροκαλλές Theophrasti simul cum oriente sole efflorescit, noctu vero marcet.<sup>93</sup> In coronamentis autem qnaerebatur.<sup>94</sup> Fueritne *Hemerocallis fulva* L., cuius radix omnino lignosa est, ambigitur, cum in Graecia haud indicetur. Nihilominus in Pannonia<sup>95</sup> et Transsylvania<sup>96</sup> occurrit, unde credibile est, etiam in Graecia provenire.

Redeo ad Dioscoridis ἡμεροκαλλίδα. Hanc Matthiolus primus declaravit esse *Lilium bulbiferum*<sup>97</sup>, Dodonaeus L. *Martagon*<sup>98</sup>, quamvis hoc plerumque rubro gaudeat flore.

Cap. CXXVIII. Sub λευκοῖω militant *Matthiolae incanae* R. Br. varietates multicolores, et *Cheiranthus Cheiri* L., quem lutei flores et praecipuus in medicina usus produnt. De hoc cecinerat Nicander<sup>99</sup>:

— — Τένη γε μὲν ἰάσι δισσά,  
ὠχρόν τε, χρυσοῦ τε φυὴν εἰς ὧπα προσειδές·  
ἄσσα τ' Ἰωνιάδες νύμφαι στέφος ἄγνόν Ἴωνι  
πισαίοις ποθέσασαι ἐνὶ κλήροισιν ὄρεξαν.

Id etiam Theophrastus intellexisse videtur, dum post τὸ λευκὸν ἶον, καὶ ἔτι μᾶλλον τὸ φλόγιον (cod. Urb. φλόγιον vulg.) ponit.<sup>100</sup> Color enim flammeus s. potius fulvus, helvolus et croceus frequens est in Cheirantho Cheiri. De utroque autem genere, et Matthiola et Cheirantho, intel-

91) Hist. 2. p. 20. 21. 92) Hist. pl. 6, 6.

93) Athen. 15, 28. Hesych. h. v.

94) Athen. 15, 32. 95) Clus. pannon. p. 143.

96) Baumgarten flor. transsylv. I. p. 303.

97) L. c. p. 631. 98) L. c. p. 201.

99) Athen. 15, 31.

100) Hist. pl. 6, 8. Nomen *Cheiri*, خیری, persicae esse originis, lexicographi statuunt.

ligendum, si Hicesius πολὺ δ' ἀρίστην εὐωδίαν καὶ δυναμένην τέρευν, ἀλλὰ πρὸς ὀλίγιστον praedicaverat<sup>1</sup>: et si Philonides coronas ε λευκοῖω et ἀμαράκω caput gravare et soporem inducere observaverat.<sup>2</sup> Ex utroque etiam unguenta confecta fuisse videntur.<sup>3</sup>

Longe aliud est λευκοῖον, quod βολβῶδες καὶ στρογγύλον τῇ ῥίζᾳ Theophrastus vocat.<sup>4</sup> Id Dodonaeus tum in *Galantho nivali*, tum in *Leucoio verno* recognovit.<sup>5</sup>

Cap. CXXIX. Κραταιόγονον dictum, quod κρατεῖ τοῦ γόνου, geniturae dominatur et cogit ad coitum fecundum. In Theophrasto iam legitur τῆς κραταίου καρπὸς ὠφέλιμος πρὸς τὸ γόνιμον: loco κραταίου autem κραταίου habet cod. Urb. Φύεσθαι δὲ τοῦτο ὡς περ λίνον πύρινον, ὃ δὲ καρπὸς, οἶον κέγχρος.<sup>6</sup> Si λίνου πυρίνου vice μελάμπυρον ponimus, nostra etiam planta eadem esse videtur. Plinius: „Crataeogonon, spicae tritici simile, multis calamis ex una radice emicantibus, multorumque geniculorum. Nascitur in opacis, semine milii, aspero vehementer gustu.“<sup>7</sup> Galenus idem esse κραταιόγονον, quod Hippocratici dixerint πολύκαρπον, adversus uteri ulcera commendatum.<sup>8</sup>

Cum Ruellio et Lacuna sentio, *Polygonum Persicariam* L. esse intelligendum, tum propter acrimoniam, tum ob seminis cum milio affinitatem, tum etiam, quod folia cum Melampyri foliis conferri possunt. Alii alia statuerunt: Lobelius *Melampyrum pratense*<sup>9</sup>, Dalechampio<sup>10</sup> et Gerardo<sup>11</sup> adstipulantibus. Quin Dodonaeus *Stellariam gramineam* arripit<sup>12</sup>, et Gerardus addit *Bartsiam Odoniten* Huds. nomine Crataeogoni Euphrosynes.

Proxime accedit ad nostram sententiam Anguillara,<sup>13</sup>

1) Athen. 15, 28.

2) lb. c. 17. Theophr. id. 7. v. 64.

3) Theophr. de odor. p. 741. 4) Hist. pl. 7, 13.

5) L. c. p. 230.

6) Hist. pl. 9, 13. Galen. de fac. simpl. 6. p. 44.

7) Plin. 27, 40.

8) Hipp. de morb. mul. 1. p. 692. Galen. expos. voc. Hipp. p. 548.

9) Adv. p. 11. 10) L. c. p. 420.

11) Gerard. emac. p. 91. 12) L. c. p. 563. 13) L. c.

dum *Polygonum Hydropiper* subesse arbitratur, μελάμπυρον autem cognomen habet μνάγρου. (lib. 4. c. 115.)

Cap. CXXX. De φύλλῳ tum ἀρρνεογόνῳ tum θηλυγόνῳ Theophrastus<sup>14</sup>: "Ὁμοία δ' ἄμφω, καὶ μορφὴν ἔχοντα ὠκίμου· ὁ δὲ καρπὸς τοῦ μὲν θηλυγόνου καθάπερ ἐλαίας βρύον, ὡχρότερος δέ· τοῦ ἀρρνεογόνου δὲ, οἷονπερ ἐλαία, ὅταν ἄρτι φύηται ἐκ τοῦ βρύου· δίκρουν δὲ, ὥςπερ ὄρχεις ἀνθρώπων.

Comparata hac descriptione cum iis, quae Dioscorides (lib. 4. c. 188.) de λινωζώστει s. Mercuriali tradit, eandem plantam, nempe *Mercurialem annuam*, duobus diversis locis tractare videtur, id quod Valer. Cordus primus perspexit.<sup>15</sup> Ἀρρνεογόνον Theophrasti et Dioscoridis omnino cum feminea planta Mercurialis annuae congruunt: θηλυγόνον illius est mascula planta: sed de θηλυγόνῳ Dioscoridis dubitari posset, cum florem album habeat, et fructum maiorem, velut papaveris (semen.) In Mercuriali annua vero spicae masculae nihil gerunt, quod huic comparationi ansam praeberere potuisset. Quodsi autem *Mercurialem ellipticam* Lam., quam etiam e Sardinia habeo, aut Merc. *tomentosam*, Europae australi familiarem, contemplatus fueris, capitula potius pedunculata obversantur, quae flores masculos gerunt: haec utique pro fructibus haberi potuerunt. Utra vero sit, dubium esse nequit, cum χλωρότερον ἐλαίας τὸ φύλλον dicatur. Proinde fallitur Matthiolus<sup>16</sup>, qui Merc. *tomentosam*, totam candidam et sericeo-tomentosam, huc trahit, annuentibus plerisque patribus rei herbariae. Dalechampius sueta levitate et Mercuriales duas, *tomentosam annuamque*, et Saxifragam *Cotyledonem*<sup>17</sup> et Drabam aizoidem<sup>18</sup> huc traxit.

Quod reliquum est, Caesalpini coniectura<sup>19</sup>, ὁμοίόν τι τῷ ἄρτι ἐξηνηκνίας ἐλαίας βρυώδει loco βοτρυνῶδες le-

<sup>14</sup>) Hist. pl. 9, 18.

<sup>15</sup>) Comm. in Diosc. f. 59<sup>a</sup>. 76<sup>b</sup>. <sup>16</sup>) L. c. p. 634.

<sup>17</sup>) L. c. p. 1195. <sup>18</sup>) L. c. p. 1196.

<sup>19</sup>) Lib. 8. c. 30.

gendum esse, iam magnopere placet. Congruit enim tum cum Theophrasto, tum cum natura ipsa.

Cap. CXXXI. Orchis est, quae in locis saxosis et sabuletis per Graeciam et Europam australem invenitur, tuberibus indivisis, ut plurimum geminis, horum altero, altero annotino, quae vel supra se invicem, vel iuxta se collocata sunt, foliis radicalibus humi procumbentibus, oblongis, glabris, scapo spithamaeo, floribus purpureis. His indiciis rite perpensis, *Orchis papilionacea* L. in mentem venit, in quam omnia quadrant, quaeque σαλέπι nomine ab hodiernis Graecis distinguitur.<sup>20</sup>

Patres rei herbariae, licet in Orcheos genere consentientes, patriis tamen plantis, ut Germani erant, inhaerentes, satis egerunt, ut modo hanc, modo illam earum intelligi probarent. Fuchsius primus complexus est quaternas species, *Orchin militarem*, *pyramidalem*, *masculam* et *Morionem*, κυνοσόρχειος nomine.<sup>21</sup> In Orchi tamen mascula et Morione plerique substituerunt, quanquam duae hae species in pratis magis siccis quam in sabulosis locis et saxosis proveniant.

Cap. CXXXII. Orchis altera, quam σεραπιάδα appellaverat Andreas, τρίορχις Paulo Aeginetae dicta<sup>22</sup>, difficulter extricanda est. Fuchsius primus et *Orchin Morionem* iuxta ac *Ophryn apiferam* Huds.<sup>23</sup> in scenam produxit. Dodonaeus et *Platantheram bifoliam* Rich.<sup>24</sup> et *Ophryn apiferam*, *araniferam* Huds. et *myoden*: Lobelius *Orchin latifoliam*, *maculatam*, *Gymnadeniam conopseam* et *viridem* Rich. nomine Serapiados illustravit.<sup>25</sup> Hos sequuti sunt alii, augentes quidem Orchidearum species, sed neutiquam revocantes ad Dioscoridis appellationes: unde patet, desperasse eos de hac saltem, inextricabili, profecto specie.

Cap. CXXXIII. Σατύριον verterunt Arabes خصى الثعلب, *testiculum vulpis*, sicut κυνοσόρχιν خصى الكلب, *testicu-*

20) Flor. graec. 2. p. 213. 214.

21) L. c. p. 554—557.

22) Lib. 7. p. 249.

23) L. c. p. 559. 560.

24) L. c. p. 237.

25) Obs. p. 90 — 92.



*lum canis*: illa appellatio transiit ad instauratores usque rei herbariae. Brunfelsius primus hoc nomine dispares conguessit plantas, *Orchin masculam*, *Spiranthen autumnalem* Rich. et *Gymnadeniam conopseam*.<sup>26</sup> Tragus et *Orchin variegatam*<sup>27</sup> et *Spiranthen autumnalem* et *Neottiam Nidum avis*<sup>28</sup> huc trahit: Fuchsius *Platantheram bifoliam* Rich.<sup>29</sup> Alii vel aperte fassi sunt, plantam hanc ignotam esse, ut Anguillara, vel plane neglexerunt, Matthioli, Dodonaei, Lobelii Clusiique exemplis. Priores autem, qui vi quadam Orchideis adnumerandam esse iusserant, non legisse videntur Dioscoridis verba: *ἄνθος κρινοειδές*, quod nentiquam de Orchideae ullius flore dici potest. Caesalpinus quidem aliam incessit semitam<sup>30</sup>, *Iride tuberosa* hoc nomine descripta; quae tamen longissime abest foliis quadrangulis, nullo modo cum rumicis liliive foliis comparandis.

Equidem persuasum habeo, *Tulipae* speciem subesse, forte *Clusianam* Redout., quam immortalis Atrebas brevi ante obitum descripsit.<sup>31</sup> Neque me opposuerim, si quis maluerit *T. Gesnerianam* nostram, Thraciae Asiaeque minoris incolam, intelligi, quippe quae caule aphylo, flore quoque, dum sponte provenit, saepissime candido, dignior etiam hoc loco videri possit.

Cap. CXXXIV. Satyrium erythronium a Lobelio, ni fallor, primo propositum<sup>32</sup>, est *Erythronium Dens canis*, in Europa australi obvium. Neque tamen haec coniectura quidquam habet certitudinis, neque facile Sibthorpio assentiendum, qui *Serapiada cordigeram* huc trahit.<sup>33</sup> *Erythronium* vero nostrum esse *Mithridatium*, quam Cratevam Mithridati regi vovisse Plinius tradit,<sup>34</sup> Anguillara<sup>35</sup> pariter ac Caesalpinus<sup>36</sup> probare studuerunt. Huic esse, scribit Plinius, folia duo a radice acantho

26) L. c. 1. p. 104 — 106.

27) L. c. f. 296<sup>b</sup>. 28) L. c. f. 298<sup>a</sup>.

29) L. c. f. 710. 30) Lib. 10. c. 45.

31) Clus. cur. post. p. 18.

32) Obs. p. 97. C. Gesner. tab. aeri inc. 2. f. 17.

33) Flor. graec. 2. p. 218. 34) Lib. 25, 26.

35) L. c. p. 174. 36) Lib. 10. c. 18.

similia, roseum florem inter utrumque folium caule sustineri.

Cap. CXXXV. Ὀρμινον, ἀπὸ τοῦ ὀρμᾶν ἢ παρορμᾶν εἰς συνουσίαν dictum, Theophrasto ὀρμηνον, Galeno etiam φόρβιον<sup>37</sup>, Paullo Aeginetae φόρμιον vocatum<sup>38</sup>, mutavit medio aevo appellationes in ζεντογάλην<sup>39</sup>, nostra denique aetate in σαρκοθρόφι.<sup>40</sup> Serebatur autem antiquitus cum sesamo<sup>41</sup>, tanquam alexipharmacum<sup>42</sup> iuxta ac administratum in perficiendis τελεταῖς seu initiationibus mysteriorum.<sup>43</sup>

Est *Salvia Horminum* L., cuius affinis *S. viridis* L. sylvestre forte ὀρμινον est, quod fuscis rotundisque seminibus differt, ceterum priori proximum. Agnoverunt id cum Matthiolo<sup>44</sup> plerique patres rei herbariae, praesertim Dodonaeus<sup>45</sup> et P. Alpinus.<sup>46</sup>

Cap. CXXXVI. Ἡδύσαρον, τὸ ὑπὸ τῶν μυρεψῶν καλούμενον πελεκῖνος, φυόμενον ἐν κριθαῖς καὶ πυροῖς vocatur Theophrasto ὁ πελεκῖνος, ὁμοῖος τῇ ὄψει τῷ πελέκει.<sup>47</sup> Eum inter ἀγάκας crescere, pro quo cod. Urb. ἐν τοῖς φακοῖς habet, sicut Plinius: Lentem herba securidaca enecat, quam Graeci a similitudine pelecitonon vocant.<sup>48</sup> Matthiolus duas genereque diversas plantas hic collocavit: *Coronillam Securidacam* L. et *Astragalum hamosum*, illam maiorem, minorem hanc securidacam appellans.<sup>49</sup> In eo sequaces habuit plerosque, additis tamen a Clusio *Coronilla varia* et *Biserrula Pelecino* L.<sup>50</sup>, quanquam neutram legitimam habeat. Securidaca autem per Europam australem, et privatim per Graeciam, inter segetes vulgaris est.<sup>51</sup>

Cap. CXXXVII. In onosmate definiendo eo magis fluctuarunt patres rei herbariae, cum falsam lectionem,

37) De fac. simpl. 3. p. 152.

38) Lib. 7. p. 249.

39) Nic. Myreps. sect. 3. c. 62.

40) Flor. graec. 1. p. 14. 41) Theophr. hist. pl. 8, 7.

42) Orph. argon. 1. v. 917. Nicand. ther. v. 893.

43) Athen. 11, 76. 44) L. c. p. 640.

45) L. c. p. 294. 46) De plant. exot. p. 112. 113.

47) Hist. pl. 8, 8. 48) Plin. 18, 44. Geopon. 2, 43.

49) L. c. p. 641. 50) Hist. 2. p. 347. 348.

51) Flor. graec. 2. p. 78.

nec caule, nec flore, nec fructu gaudere, sequerentur. Iconem quidem exhibuit Matthiolus foliorum plantae circa Goritium inventae, sed nemo ausus est eam plantam exponere. Neque nos tam arduam expedire quaestionem nobis arrogamus, nisi respiciamus ad similitudinem cum ἀρχούση; quae si *Lithospermum* est tinctorium Cand., suspicio nascitur, nostram plantam esse vel *Anchusam undulatam* vel *Lithospermum purpureo-coeruleum*. De Onosmate Linnaeano sermo nequaquam esse potest, cum pleraeque species, graecae saltem, et hirsutioribus, non mollibus, foliis, et floris forma longe a Lithospermi recedente, colore etiam vel flavido vel albidō alienae sint.

Cap. CXXXVIII. Νυμφαία Dioscoridis est σίδη Theophrasti<sup>52</sup>, non quod punicae malo similis sit, sicut Athenaeus nugatur<sup>53</sup>, sed quia fructus grana numerosa, initio rubra continet, quae cum punicae granis conferebantur. In lacu Orchomenio copiosam indicat Theophrastus: Nicander commendat<sup>54</sup>:

— σίδας Ψαμαθηίδας, ἃς τε Τρόφεια  
Κῶπαί τε λιμναῖον ὑπεθρέψαντο παρ' ὕδωρ,  
ἥπερ Σχοινῆος τε ῥόος Κνώποιό τε βάλλει.

Scholiastes et Psamathon et Trophiam et Copas Boeotiae oppida, Cnopus et Schoeneum rivulos aut torrentes eisdem habet regionis, lacui Copaidi vel Orchomenio atque Hylico vicinae. Radicem asperam clavatam et clavam Herculis, gallice autem Baditin fuisse nuncupatam, Marcellus Burdigalensis testatur.<sup>55</sup>

Cap. CXXXIX. Altera nymphaea νοῦφαρ dicitur: vox, ut videtur, aegyptia, composita a νοῦ, appellatione Nili<sup>56</sup>, et φάρ, φάρμακον<sup>57</sup>, ut sit Nili pharmacum. Inde Arabes dicunt plantam نیلوفر, نيلوفر et نوفر. Transiit haec vox in genericam appellationem, ut *Nuphar luteum* cum Smithio dicamus, quae Linnæo Nymphaea audire-

52) Hist. pl. 4, 10.

53) Lib. 14. c. 64.

54) Ther. v. 887 — 889.

55) Ed. Steph. col. 396.

56) Horapoll. hieroglyph. I, 21. Iablonsky op. I. p. 178. Rossi p. 136.

57) Rossi p. 233.

bat. Hanc, pariter *νυμφαίαν* dictam, Theophrastus in Orchomenia regione, circa Marathonem<sup>58</sup> et in Creta indicat: Boeotos *μαδωνίαν* dicere, fructumque comedere. Esse vero plantam astringentem, et contra intestinorum difficultatem, folia vero ad coërcendum sanguinem inservire.<sup>59</sup> Quae quidem nuperis observationibus confirmantur: plebs enim Russiae et Finniae comedit et radicem et caules seu petiolos.<sup>60</sup> Lac quoque reprimere folia mammis imposita, exploratum habemus.<sup>61</sup> *Μαδωνίαν* Plinius madon vocat<sup>62</sup>, et *ἐμποριστῶν* auctor *μάδον* coriarium commendat<sup>63</sup>, sicut et radices nostris temporibus ad densanda coria suadentur.<sup>64</sup>

Cap. CXL. *Ἀνδρόσακες*, quale primus à Luca Ghinio acceptum exhibuit Matthiolus<sup>65</sup>, post eum ad litora Galloprovinciae inventum Lobelius<sup>66</sup>, est zoophyton elegantissimum, conchis ut plurimum innascens. Stipite gaudet simplicissimo, filiformi, subdigitali, albo, basi parum dilatato, et in apice eius umbraculum seu peltam orbicularem, viridem, planissimam, plicato-radiatam, medio umbilicatam, cuius diametrus tres ad sex lineas habet. Id zoophyton agnovit quoque Caesalpinus<sup>67</sup>, haerens tamen in defectu seminum, quae distinguere nequivit. At vero adsunt semina in umbone operculato, quod Vitalianus Donati bene<sup>68</sup> et melius etiam Phil. Cavolini<sup>69</sup> observarunt. Sunt ovalia, viridia similiterque glutinosa, ac polyporum ovula. Quae Donati stamina putavit<sup>70</sup>, parasiticas potius esse confervas, Cavolinus et Bertolomius suadent.<sup>71</sup>

Quanam parte collocanda sit haec stirps, in contentionem venit. Linnaeus initio<sup>72</sup> Sertulariam, post Ma-

58) Pausan. 1, 32. Erat ibi lacus paludosus in mare effluens.

59) Hist. pl. 9, 13. 60) Linder de venen. p. 651.

61) Wredow flor. megapol. 2. p. 528.

62) Lib. 25, 37. 63) Lib. 1. c. 179.

64) Gleditsch verm. Abh. 1. p. 100.

65) L. c. p. 645. 66) Adv. p. 165.

67) Lib. 16. c. 48.

68) Storia natur. marina dell' Adriatico, p. 52. t. 2. f. H.

69) Pflanzenthierie des Mittelmeers, a me edit. p. 118. tab. 9. f. 14.

70) L. c. tab. 2. f. E.

71) Amoenit. ital. p. 279. 72) Hort. Cliffort. p. 480.



dreporam<sup>73</sup>, denique Tubulariam<sup>74</sup> dixit. Pallasius Corallinis maiori iure annumeravit.<sup>75</sup> Acetabulariam dixit Lamourouxius<sup>76</sup>, Oliviam Bertolonius.<sup>77</sup> In hac ultima denominatione subsistamus, cum vegetabilem naturam stirpis negare non audeam.

Cap. CXLI. Quae hic clare de ἀσπλήνω, corrupte et perverse Plinius tradit: „Asplenium sunt qui hemionion vocant, foliis trientalibus multis, radice limosa, cavernosa (!), sicut flicis, candida, hirsuta: nec caulem, nec florem, nec semen habet. Nascitur in petris parietibusque opacis, humidis: laudatissima in Creta.“ Filix autem, quae hic intelligitur, est *Gymnogramma Ceterach* mihi (*Asplenium Ceterach* L.), quod iam Tragus<sup>78</sup> bene perspexit. Originem vocis Ceterach, quae iam in Matthaeo Sylvatico occurrit, enucleare nequeo.

Cap. CXLII. Ἡμιονίτις est *Scolopendrium Hemionitis* Sw., quod Dodonaeus iam<sup>79</sup> et Clusius<sup>80</sup> iconibus illustrarunt. Matthiolus<sup>81</sup> varietatem Scolopendrii officinarum ita vocat.

Cap. CXLIII. Quantopere hallucinati sint in exponenda Anthyllide priore instauratores rei herbariae, mirum esse nequit, si mancam descriptionem et incognitam fere earum regionum, quae Dioscoridi notissimae erant, consideramus. Tragum, dum Tanacetum vulgare et Achilleam Ptarmicam adducit<sup>82</sup>, pariter taxamus ac Caesalpinum, qui ad Inulam crithmifoliam<sup>83</sup>, et Dodonaem,<sup>84</sup> qui ad Anthyllida Vulnerariam consilium transferunt. Paullo propius ad veritatem accesserunt Lobelius<sup>85</sup> et Clusius<sup>86</sup>, qui Frankeniam pulverulentam subesse rati sunt. Rem vero acu tetigit P. Alpinus, dum *Cressam creticam* aperiret, quae egregie huc quadrat.<sup>87</sup>

73) Syst. 10. spec. 17.

74) Syst. 12. p. 1303.

75) Elench. zooph. p. 430. Cav. ic. 2. t. 191.

76) Hist. des polypes, p. 244.

77) Amoen. ital. p. 277.

78) L. c. f. 209<sup>a</sup>.

79) L. c. p. 467.

80) Hist. 2. p. 214.

81) L. c. p. 646.

82) L. c. f. 61<sup>a</sup>.

83) Lib. 12. c. 38.

84) L. c. p. 552.

85) Advers. p. 196.

86) Hist. 2. p. 186.

87) De plant. exot. p. 156. 157.

Altera Anthyllis, quae Chamaepityn refert, a Clusio primo ad *Aiugam Ivam* Schreb. est revocata, cum qua ad amussim congruit.<sup>88</sup>

Cap. CXLIV. Anthemidos tres species comprehenduntur, prima radio albo, altera luteo, tertia purpureo. Has quidem Sibthorpius ita designat, ut primam habeat *Anthemida chiam*, alteram *tinctoriam* L., tertiam *roseam* Sibth., in Cypro insula vulgarem.<sup>89</sup> At vero plures intelligi species, quis negabit? Sic iam Lobelius *Matricariam Chamomillam* et *Anthemida nobilem* ii Anthemidi adscripsit, quae albo radio; *Anacyclum* vero *aureum* ii, quae flore luteo unicolore gaudeat.<sup>90</sup> Et ipsae appellationes ἄνθεμις s. ἀνθεμὶς, χαμαίμηλον et λευκάνθεμον repetitae sub παρθενίῳ, probant levitatem, qua plantarum nomina mutata fuerunt.

Theophrastus ἀνθέμον vocat, quae Dioscoridi ἀνθέμιδος nomine venit, cuius plures sint species. Duas ille potissimum distinguit, φυλλῶδες, quod radio albo gaudeat, et ἀφύλλανθος, quod radio destitutum esse videtur.<sup>91</sup> Hoc igitur fuerit *Anacyclus aureus*, illud forte *Matricaria Chamomilla*, quam Hippocratici εὐανθέμου χλωροῦ nomine in suppresso menstrui sanguinis et lochiorum cursu praedicant.<sup>92</sup>

Chamaemelum purpureum semel duntaxat in seriore aetate redit.<sup>93</sup>

Punicum nomen corruptum esse ex ebraeo חֲצִיר הַבֵּית, *herba pomi*, propter mali odorem Bochartus docet.<sup>94</sup> Hinc et *ovalidiam*, Gallicum chamaemeli cognomen,<sup>95</sup> exponendum esse a gallico *oval*, quod cum germanico *Apfel* et Anglico *apple* consentit, ipsi Bocharto videtur.

Et Arabibus dicitur تفوح الارض χαμαίμηλον, idem ac بابونج.

Cap. CXLV. Παρθένιον dictum fuisse traditur παρ-

88) L. c. 89) Flor. graec. 2. p. 189. 191. 192.

90) Obs. p. 455. 456. 91) Hist. pl. 7, 8. 14.

92) Hipp. de nat. muliebr. p. 552. de morb. mul. I. p. 726.

93) Nic. Myreps. sect. I. c. 44. p. 42. ed. Fuchs.

94) Can. p. 755. 95) Apulei. c. 24.

θένου, Minervae Hygeae, quae, cum verna Pericli carus, templum in arce Atheniensi aedificaturus, de fastigio cecidisset, herbam hanc somnio Pericli monstraret.<sup>96</sup> In sempiternam rei memoriam curatum est, ut iuxta arcem herba ea cresceret.<sup>97</sup> At longe aliter herbam Plinius describit, ac noster. Habere enim folia ocimo similia, sed nigriora, noster folia coriandri tenuia. Qui rem herbariam instaurarunt, in Pliniana descriptione subsistentes, a Brunfelsio inde<sup>98</sup> *Pyrethrum* nostrum *Parthenium* stabiliverunt, excepto Fuchsio, qui pessimo consilio *Anthemida Cotulam* huc traxit<sup>99</sup>, quia forte cum Dioscoridis descriptione conformem reddere appellationem studebat. Equidem non possum quin *Matricariam Chamomillam* a Dioscoride intelligi statuam, maxime dum odorem graviorem viresque celebratas contemplor.

Punicum nomen e chaldaeo מִנְחָמָה, quod amaram herbam significat, Bochartus exponit<sup>100</sup>: legitur etiam *thamnacum* in variis Plinii codicibus<sup>1</sup>, tanquam cognomen parthenii. Arabes vocant اقحوان (*okchuwân*) et بابونج (*babunadsch*.)

Cap. CXLVI. Βουφθάλμου nomina memoratu digna sunt. Βαλσαμένην esse aramaeum מִנְחָמָה, dominus coeli, s. sol, Bochartus innuit.<sup>2</sup> Punicum nomen originem habet in verbo arabico نَار, *lucere*, unde نورَة (*nawrath*), *flos lucidus*. Galenus de βουφθάλμω<sup>3</sup>: ὠνόμασται μὲν οὕτως ἀπὸ τῶν ἀνθῶν ξοικέναι δοκούντων κατὰ τὸ σχῆμα βοὸς ὀφθαλμῷ, ἐπὶ τε τὴν γε χροῖαν τοῖς τῆς ἀνθεμίδος ἐστὶν ὁμοιότατα.

Errarunt, qui cum Trago<sup>4</sup> *Anthemida* tinctoriam subesse crediderunt: obstant enim folia, quae foeniculi similia esse debent. Proximus autem est a veritate Clusius, qui *Anthemida valentinam*, Bupthalmi narbonensis

96) Plutarch. vit. Pericl. c. 13. Plin. 22, 20.

97) Plutarch. vit. Syll. c. 13. Dodwell's tour through Graece, 1. p. 359.

98) Herb. 3. p. 63. 64.

99) L. c. p. 583.

100) Can. p. 755.

1) Lib. 21, 104.

2) L. c. p. 756.

3) De fac. simpl. 6. p. 852.

4) L. c. f. 58<sup>a</sup>.

nomine huc trahit.<sup>5</sup> Folia eius triplicato-pinnata, foliolis linearis-subulatis, comparari melius possunt cum foeniculi foliis, licet multo sint breviora. Flos aureus est, radio subtus purpurascente. Ex hac ultima indole audeo Avicennam exponere, qui de nostrā planta, بهار (bihār) dicta, sic agit<sup>6</sup>: هو الدى يسمى كاوجشم اى عين البقر ورده اصفر الورق (القرى legendum احمر الوسط اسم من (الورق) deletur البابونج.

Iam eum corruptum locum ita verto: „Haec est illa, quae vocatur (persice) *khaudschaschm*, i. e. oculus bovis: flos eius est luteus, dorso (s. subtus) ruber, et centrum (discus) obesior, quam parthenii.“ Tali audacia saepissime opus est, si Avicennam interpretaturi sumus.

Cap. CXLVII. Paeonia, ut Plinii verbis utar, vetustissima inventu, praestigiis magorum antiquitus inseruiit.<sup>7</sup> Dactylorum Idaeorum nomen, qui famuli magnae matris, quini numero, radicum Idae montis primi dicuntur cultores et φαρυμακῆς, quorumque posterī habentur Curetes et Corybantes<sup>8</sup>, ἀγαθοδαίμονες ipsi nuncupati<sup>9</sup>, hac potissimum herba et medelas perfecerunt et lustrationes, ad ipsam plantam transiit, quae alioquin a Παιῶνι aut Παιῶνι, deorum medico, qui et Παιάν dictus mutatusque ab Orphicis in Apollinem ipsum<sup>10</sup>, παιωνία dicebatur. Sic iam iisdem Orphicis hoc nomine grata fuit, et culta in Hecates horto fabuloso.<sup>11</sup> Πεντοβόριον melius et Galeno et Plinio dicitur, quam πεντοβόριον, quod semina globosa quina in singulis folliculis haerent. Γλυκυσίδην a nonnullis appellari, Theophrastus testatur.<sup>12</sup>

Duas Dioscorides enumerat species, marem iuglandis, et feminam smyrnii foliis. Illam habeo *Paeoniam* nostram *officinalem*, vel *arietinam* Anders. et *peregrinam*

5) Hist. I. p. 332.

6) Ed. arab. p. 145.

7) Plin. 25, 10.

8) Strabo 10. p. 212. s.

9) Plutarch. de facie in orbe lunae, p. 324.

10) Orph. hymn. in Apoll. p. 295. ed. Hermann.

11) Orph. argon. I, 916. 917.

12) Hist. pl. 9, 8.



Mill., foliis subtus pubescentibus a priore distinctam: feminam vero *P. corallinam* Retz. Qui contrarium proferrunt, haud sedulo comparasse foliorum formas videntur. Folia enim Smyrnii multo magis ad *P. corallinae* formam accedunt. Plures autem species et in Creta et in reliqua Graecia proveniunt.

Grana nigra suffocationes ab incubis tollere in tota antiquitate creditum est, sive id e fuga daemonis, sive e refrigerante vi et attenuante paeoniae exponerent. Namque ἐφιάλτην, quem Themiso πνιγᾶλίωνα cognominarat, maxime a crapula malaque digestionem nasci, eaque propter et sanguinis missiones et evacuationes prodesse et refrigerantia, quibus paeoniae semina accensebantur, idem praeceperat.<sup>13</sup>

Cap. CXLVIII. Memorabilis est Plinii de lithospermo locus, quem transcribam<sup>14</sup>: „Inter omnes herbas lithospermo nihil est mirabilius. Aliqui aegonychon vocant, alii diospyron, alii heracleos. Herba, quincuncialis fere, foliis duplo maioribus, quam rutae, ramulis surculosis, crassitudine iunci, gerit iuxta folia singulas veluti barbulas, et earum in cacuminibus lappillos, candore et rotunditate margaritarum, magnitudine ciceris, duritia vero lapidea. Ipsi, qua pediculis adhaereant, cavernulas habent, et intus semen. Nascitur et in Italia, sed laudatissimum in Creta. Nec quidquam inter herbas maiore quidem miraculo adspexi. Tantus est decor, velut aurificum arte alternis inter folia candicantibus margaritis: tam exquisita difficultas lapidis ex herba nascentis. Iacere atque humi serpere auctores tradunt. Ego vulsam, non haerentem vidi.“ Acclamaverim Plinio cum Aristotele: Ἀρχομεν μὲν ἀπὸ τοῦ θαυμάζειν πάντες· ἀλλ’ ὁ ὑπερβαλὼν θαυμασμοῦς ὁμορεῖ τῇ ἀπαιδευσίᾳ. Etiam si ipsum observasse plantam pateat, in ducentis saltem et sua aetate cognitis plantis Plinius plura habebat miratu digniora, quam in lithospermo. Quanquam in Plinii descriptione plura sint a Dioscoridis adumbratione aliena, ut barbulae iuxta sin-

<sup>13</sup>) Paull. lib. 3. p. 66.

<sup>14</sup>) Plin. 27, 74.

gula folia, quas in Lithospermo apulo facilius conspicimus, haud tamen arbitror aliam intelligi speciem, quam *Lithospermum officinale*. Hoc enim gerit lucidissimos, glaberrimos fructus, qui tamen basi neutiquam forati sunt, more aliorum, Anchusae, Myosotidis et Lycopsis fructuum. Itaque minime cavernulas dispicio in ipsis fructibus, quae pedunculis adhaerent. Neque bifurcam caulis divisionem, qualem Dioscorides indicat, tam manifestam habet *L. officinale*, quam *L. apulum*, quod tamen foliis multo angustioribus recedit.

Cap. CXLIX. Si Plinii locum de Phalaride conferimus, paullo plura inveniuntur, quam in nostro, indicia. Quippe: thyrsus, inquit, habet longum, tenuem, ceu calamum, in summo florem inclinatum, semen simile sesamae.<sup>15</sup> Alia esse species nequit, quam *Phalaris canariensis*, utique in Graeciae arvis frequens.<sup>16</sup> Namque aliae species gaudent radicibus tuberosis aut bulbosis, sed huius Dioscorides λεπτός tradit.

Cap. CL. De *Rubia tinctorum* nullum exstitit unquam dubium. Nomen aegyptium, affine arabico روبة, quod pariter rubiam significat, praefixo só, quod herbam notat<sup>17</sup>, et Philo Alexandrinus, qui aegyptiacum idioma callebat, ρουὰ ἐρυθρόν vertit.<sup>18</sup>

Tò ἐρεθόδανον Theophrasti<sup>19</sup> alia videtur ac nostra planta. Folia habebat hederacea, sed rotundiora; humi reptabat, ut ἄγρωστις; umbrosa loca amans. Fueritne Rubia lucida, Galium cruciatum Sm., an Asperula odorata, ambigo. Hippocratici ἐρεθόδανον contra sterilitatem,<sup>20</sup> ad uteri gravidi dolores pertinaces<sup>21</sup> et intestinorum difficultatem<sup>22</sup> hortantur. In utero usum rubiae confirmat Fr. Hoffmannus<sup>23</sup>, in menstruo fluxu restituendo Fr. Homius,<sup>24</sup>

15) Plin. 27, 102.

16) Flor. graec. I. p. 57.

17) Rossi p. 214.

18) Quis sit rerum divin. heres, p. 491. ed. Mangey.

19) Hist. pl. 9, 13. 20) Hipp. de steril. p. 20.

21) De morb. mul. I. p. 752. 22) De victu acut. p. 99.

23) Med. syst. 3. p. 542.

24) Clinical facts and experim. p. 421.

in lochiis promovendis Herzius<sup>25</sup>, in urina pellenda Marxius.<sup>26</sup>

Cap. CLI. Lonchitidem primam vel intactam miserunt rei herbariae instauratores, vel mirum in modum hallucinati sunt, quanquam Itali cognoscendae verae plantae nanciscerentur occasionem. Sic alii Iridem tuberosam<sup>27</sup>, alii Cypripedium Calceolum<sup>28</sup>, nonnulli etiam Tulipam sylvestrem<sup>29</sup> perperam pro lonchitide habuerunt. Est vero *Serapias Lingua*, planta per Italiae Graeciaeque aspera montosa non adeo rara. Eius rudem iconem, Testiculi quinti nomine, primus exhibuit Matthiolus<sup>30</sup>, multo meliorem Fab. Columna, Orcheos macrophyllae titulo.<sup>31</sup> Folia sunt porracea: flores luteovirides, striis purpureis: sepalia connivent: propendet vero labellum ochroleucum, inferiora spectans. Fructus triquetri, bractea elongata, lanceolata, acuminata tecti. Radix tuberosa, sed super tubere prodeunt radicae fibrosae, cum quibus, intacto tubere, saepe evellitur planta.

Cap. CLII. Lonchitis altera, aspera dicta, est manifesto filix, nec dubitari potest de specie. Matthiolus iam *Aspidium Lonchitidem* Sw., et iure quidem, hoc nomine adumbravit<sup>32</sup>, neque quemquam invenit sententiae adversarium.

Cap. CLIII. Si, quod plerique faciunt, *Althaea officinalis* eadem putatur ac *ἄλθαία* Dioscoridis, nihil obstat, praeter foliorum formam, quae haud orbiculata, ut Cyclaminis, dici possunt. Malvam autem sylvestrem facit et Theophrastus cognomen *ἄλθαίας*<sup>33</sup>, quanquam flores luteos ii tribuat.<sup>34</sup> Hoc vero indicio fretis optio datur, utri annumeranda sit Theophrasti planta, *Lavaterae flavae* Desf., an *Althaeae pallidae* Kit. Equidem illam praeferrem, Siciliae et probabiliter quoque Pe-

25) Briefe an Aerzte, 2. p. 156.

26) Verm. Beobacht. 5. p. 66.

27) Dalech. p. 1220.

28) Ib. p. 1186.

29) Caesalp. 10, 21.

30) L. c. p. 636.

31) Ecphras. 1. p. 322.

32) L. c. p. 666.

33) Hist. pl. 9, 15.

34) Ib. c. 18.

Ioponnesi incolae. *Sidam Abutilon* huc traxerunt nonnulli.<sup>35</sup>

Cap. CLIV. *Ἀλκέα* Dioscoridis Brunfelsius iam herbae Simeonis nomine illustravit.<sup>36</sup> Est *Malva Alcea* L. Hanc etiam, tanquam legitimam, plerique agnoverunt, exceptis fere Anguillara<sup>37</sup>, qui Althaeam cannabinam, et Sibthorpio<sup>38</sup>, qui Hibiscum Trionum subesse existimant. Sed radices cubitales postremae sententiae repugnant.

Cap. CLV. Cannabis sativa vulgaris est notitiae. Patriam docet Herodotus esse Scythiam<sup>39</sup>, quemadmodum et in Tauria et in caucasica regione frequentem invenit Marschallius de Bieberstein.<sup>40</sup> Cannabinas insuper vestes Thracum, lineis quam simillimas, memorat Herodotus et suffimenta e cannabis seminibus apud Scythas loco lavacri usitatas, quibus et nostrae aetatis plures Asiae populi semet inebriare consuescunt.

Plantam *σχοινόστροφον* dici et perutilem esse ad texendos funes validissimos. Eos videtur primus Syracusarum rex Hiero adhibuisse. Cum enim singulari studio in navium fabricationem incumberet, ad funes spartum ex Hispania, cannabim vero et picem a fluvio Rhodano comportari iussit.<sup>41</sup> Massilienses autem, quorum in potestate Rhodani ostia erant, florentissimo commercio per orbem terrarum celeberrimi, videntur etiam e Tauria utilissimam hanc plantam advexisse.

Cap. CLVI. *Κάνναβις ἀγρία* est procul dubio *Althaea cannabina*, quod iam C. Bauhinus agnovit.<sup>42</sup> Qui eum praecesserant, vel penitus omiserunt eam (Fuchsii Matthiolique exemplis), vel eandem rati sunt cum *ἀλκέα*.<sup>43</sup>

Cap. CLVII. *Ἀνάγυρις* est *Anagyris foetida*, frutex per Europam australem, maxime Graeciam obviuus, cuius flores colore aureo quidem, sed minime forma, brassicae flores aemulantur, cuius legumina semina continent re-

35) Dalech. p. 592.

36) Herb. 1. f. 197<sup>b</sup>. 2. f. 72<sup>b</sup>.

37) L. c. p. 223.

38) Flor. graec. 2. p. 48.

39) Lib. 4. c. 74.

40) Flor. taur. caucas. 2. p. 419.

41) Athen. 5, 40.

42) Pin. p. 316.

43) Dodon. 1. c. p. 656.



niformia, protinus alba, ut maturescunt, purpurea, demum atro-coerulea, satis dura. Foetor totius plantae adeo notus erat, ut proverbium inde natum sit: ἀνάγυρον κινεῖν<sup>44</sup>, de renovata fastidiosa re aut quaestione.

Ἐμπρίοντα vocat Nicander<sup>45</sup> ὀνόγυρον; ubi inepte scholiastes: τὸν ἀκανθώδη καὶ τραχύν· προιονώδη γὰρ ἔχει φύλλα. Neque spinosi neque asperi aliquid in toto est frutice: neque serrata sunt folia. Sed alio loco iterum<sup>46</sup> ἔμπρίοντα σίνηπυν, ubi aptius scholia: τὸ τραχὺ ὄν τῇ γεύσει. Ἐμπρίειν est poëtice incidere acrimonia quadam, qua et semina huius fruticis vomitum cient.

Cap. CLVIII. In κηπαία Dioscoridis exponenda omnes maiores nostri consentiunt, si recesseris a Clusio admodum circumspecto, qui dubitanter plantam proponit.<sup>47</sup> Habetur vero pro *Sedo Cepaea*.<sup>48</sup> De asparago μυακάνθω iam supra lib. 2. c. 151. sermo fuit.

Cap. CLIX. Primus ἄλισμα Dioscoridis quadam certitudine statuere sibi visus est Valer. Cordus<sup>49</sup>, qui *Alisma Plantaginem* habuit. Alii longius abfuerunt: Matthiolo Arnicam montanam<sup>50</sup>, Caesalpino Digitalem luteam<sup>51</sup>, Fabio Columna etiam Primulam Palinuri Petagnae eo nomine insignientibus.<sup>52</sup> Equidem Valerio Cordo assentior, tametsi florum colorem haud plane congruere sentiam, namque rubelli sunt. Verum tamen facile ita pallescunt, ut fundus corollae flavus maneat: itaque dicere potuit D. ἄνθη λευκά, ὑπωχρα.

Cap. CLX. Ὀνοβρυχίς est *Onobrychis sativa* Lam. In eo plerique consentiunt, excepto Dalechampio, qui et Campanulam, ni fallor, patulam, et Polygalae varias species, ipsam monspeliacam *Onobrychidum* appellatione dignatur.<sup>53</sup>

Cap. CLXI. Nullam invenio *Hyperici* speciem, quae

44) Zenob. proverb. cent. 2. n. 22.

45) Ther. v. 71.

46) Alexiph. v. 553.

47) Hist. pl. 2. p. 68.

48) Matthiol. p. 666.

49) In Diosc. f. 60<sup>b</sup>. Sed alio loco (hist. 2. f. 150<sup>b</sup>.) nomine Alismatis quorundam *Epipactin* latifoliam Sw. introduxit.

50) L. c.

51) Lib. 8. c. 47.

52) Phytobas. p. 14. t. 5.

53) L. c. p. 490. 491.

ad amussim respondeat *ὑπερικῶν* Dioscoridis, nisi *Hypericum barbatum* Iacqu., quod mihi, probe id cognoscenti, propter resinam graveolentem, e capsulis exsudentem, memorabile est. Crescere id in monte saltem Atho, Sibthorpius testatur.<sup>54</sup> Quod idem huc refert, H. crispum, minus huc pertinere videtur.

Cap. CLXII. *Ἀσχυρον* sive sit *Hypericum perforatum*, quod iam Val. Cordus cum Dodonaeo, nuper etiam Sibthorpius<sup>55</sup> perhibet, sive *Hypericum montanum*, quod eo nomine Fuchsius et Matthiolus designant, facile expediri potest. Namque folia tenuia, saepe subrubentia, duntaxat de H. perforato praedicari posse patet.

Cap. CLXIII. *Ἀνδρόσαιμον* Sibthorpius ad *Hypericum ciliatum* Lam. reducit.<sup>56</sup> Quod cum coram habeam, video quidem reliqua omnia congruere, ramos esse teretes, rubescentes, folia amplexicanlia, cordato-oblonga, flores paniculato-corymbosos, sed laud exiguos dixerim: reliquorum enim Hypericorum flores magnitudine aequant. Capsulae seu fructus sunt *κατάγραφοι*, i. e. stigmatibus et striis obliquis insignes. Vox enim *κατάγραφος* apud Lucianum<sup>57</sup> non puncta sola, sed vibices etiam et strias a flagris ortas notat.

Alii aliter iudicarunt. Dodonaeus, cum *Hypericum Androsaemum* introduceret, *τὴν κατάγραφον ἐπιφανείαν* fructus non huc pertinere, sed ad aliam speciem, temere magis quam vere contendit.<sup>58</sup> Fab. Columna, cautissimus alioquin veterum plantarum indagator, *Hypericum montanum* huc traxit, *τὸν κατάγραφον καρπὸν* exposuit e glandulis nigris calycis margines obsidentibus.<sup>59</sup> Exhibuit tamen etiam *Androsaemum alterum* apulum<sup>60</sup>, quod, si omnia rite reputo, cum H. ciliato Lam. bene convenire videtur. *Μασχάλας* etiam *τεταρσσωμένας* scienter exponit, ut ramulos paniculae corymbosae pinnatos: neque

54) Flor. graec. 2. p. 117. 55) L. c. p. 116.

56) L. c. 57) Lucian. tyrann. p. 211.

58) L. c. p. 78. 59) Ecphras. 1. p. 75.

60) Ib. p. 78.

ullum superest dubium, eximium virum hic tandem rem acu tetigisse.

Cap. CLXIV. *Κόριν* esse *Hypericum Carin*, fugere neminem potuit, qui hanc in Europa australi non raram plantam observasset. Itaque praeter Matthiolum, qui rudem effigiem proposuerat<sup>61</sup>, praecipue Io. Pona plantam ab Honor. Bello acceptam egregia icone adumbravit.<sup>62</sup>

CLXV. CLXVI. De synonymis *χαμαιπίτυος* Apollodorus apud Athenaeum<sup>63</sup>: οἱ δὲ ὀλόκυρον, οἱ δ' Ἀθήνησιν ἰωνίαν, οἱ δὲ κατ' Εὐβοίαν σιδηρεῖται: et scholiastes Nicandri<sup>64</sup>: *χαμαιπίτυς*, ἥ καὶ ὀνόκυρος καὶ σιδηρεῖται λέγεται καὶ ἰωνιὰ ἄγρια. Nicander etiam *χαμηλὴν* appellat *πίτυν*.<sup>65</sup>

Non sine controversia apud patres rei herbariae sunt plantae, quae *χαμαιπίτυος* nomine veniunt. Brunfelsius hoc nomine videtur *Veronicam* spicatum<sup>66</sup> proferre: *Tragus* primus *Aiugam Chamaepityn*<sup>67</sup>, quem alii sequuti sunt. Fuchsius vero *Cressam* creticam<sup>68</sup>, aliorum pertinentem.

Cum tres *χαμαιπίτυος* species in eo congruant, ut resinam vel pinum redoleant, albos dein aut flavidos flores axillares gerant, affines sibi esse debent. Prima humi serpit, de altera et tertia id non constat: rami prioris et alterius incurvi sunt: folia hirsuta primae et tertiae. Primae vero folia debent esse subteretia aut filiformia, assimilantur enim foliis *ἀειζώου μικροῦ*, quod Sedium altissimum Poir. esse videtur. Proinde primam habeo *Aiugam Chamaepityn*, alteram *Teuerium* vel *supinum* vel *montanum*, tertiam *Aiugam Ivam* Schreb. *Passerina* hirsuta, quam dubitanter Sibthorpius huc trahit<sup>69</sup>, quanquam foliis crassiusculis aliquantum ad Sedi folia accedat, aliena tamen est foliis planis ovatis, supra glabris, nec pinum redolet aut resinam.

61) L. c. p. 669.

62) Mons bald. p. 40.

64) Alexiph. v. 56.

66) Herb. 3. p. 36.

68) L. c. p. 885.

63) Lib. 15. c. 28.

65) Ther. v. 841.

67) L. c. f. 30<sup>a</sup>.

69) Flor. graec. 1. p. 262.

## LIB. IV.

Cap. I. Brunfelsius iam duas satis distinctas hoc nomine introduxit species: *Betonicam* nimirum *strictam* Ait.<sup>1</sup>, et alteram, ab Hieron. Trago acceptam, quam B. albam dicit, quaeque, si res ad verum exigitur, B. *officinalis* est varietas flore albo.<sup>2</sup> Eandem repetit et Tragus, qualem inter Argentoratum Spiramque invenerit.<sup>3</sup> Commemorat eam quoque Valer. Cordus<sup>4</sup> et Clusius, qui discrimen B. *officinalis* *strictae*que probe cognoscit, illius varietatem flore albo bene delineat<sup>5</sup>, quam effigiem et alii mutuarunt, et Hier. Bauhinus suo Matthiolo, iuxta B. *strictam* collocatam, inseruit.<sup>6</sup>

Tum vero Dalechampius novam protulit speciem, *Alopecurum* dictam<sup>7</sup>, quae non solum floribus albis seu ochroleucis, sed labio etiam superiore bifido, verticillis spicatis magis approximatis, quam in B. *officinali*, calycibus bracteisque admodum villosis, foliis vero cordato-ovatis, longe petiolatis, profunde crenatis et praesertim odore florum sambucino distinguitur. Haec, B. *Alopecuri* nomine a Iacquino tandem<sup>8</sup> et Scopolio (licet *Sideritidis* nomine)<sup>9</sup> uberius illustrata, optime cum Dioscoridis *Betonica* congruit.

Superest autem ad finem capitis secundi altera, et longe diversa quidem *Betonica*, quam serior quidam librarius inseruit. Quisquis is fuerit, Antonii Musae sibi etiam nomen arrogans, Marco Agrippae, Augusti genero, commentariolum peculiare de *vettonica* inscripsit; sed nugae fabulosae caliginem superstitiosam senioris aetatis sa-

---

1) Herb. 1. f. 89.

2) Herb. 3. f. 130.

3) L. c. f. 75<sup>b</sup>.

4) Hist. f. 165<sup>b</sup>.

5) Hist. 2. p. 38. 39.

6) L. c. p. 672. Cf. Dodon. p. 40. Lobel. ic. 532.

7) L. c. p. 1358. Cf. Io. Bauhin. hist. 3. p. 303.

8) Enumer. stirp. vindob. p. 251. Fl. austr. 1. t. 78.

9) Flor. carniol. n. 711, t. 23.



piant.<sup>10</sup> Quod plantam ipsam attinet, describitur sic, ut ad summam cum Pulegio similitudinem conclusio valeat. Accedit, et Paullum bene distinguere hanc betonicam, λεπτόκλωνον, quae ramusculos pulegio similes habeat, sed tenuiores, nulloque peculiari sapore insignis sit. Nasci eam in rupestribus locis.<sup>11</sup> Eadem forte est, quam κέστρον τὸ παρὰ τοῖς Κέλτοις γεννώμενον, quam σαξίφραγον dicant, Galenus vocat.<sup>12</sup> Pro Mentha cervina L. eam plantam libenter habuerim, ni plura repugnarent: et primum quidem, quod haec planta in agro potissimum monepeliensi, locis uliginosis, non petrosis, proveniat, dein quod et sapore et odore multo fortioribus gaudeat, quam Mentha Pulegium<sup>13</sup>, cum tamen ἀποίαν τῷ γευσάμενῳ dicat Paullus. Multo minus placent, quae maiores de hac planta coniecerunt: Fuchsius enim Dianthus carthusianorum et superbum<sup>14</sup>, Dodonaeus Veronicam officinalem<sup>15</sup>, Turnerus Veron. serpyllifoliam<sup>16</sup>, Evang. Quatrami etiam Scutellariam Columnae huc traxit.<sup>17</sup> Itaque mittamus hanc plantam, donec forte in σαξίφράγῳ nostri aliquid luminis affulserit.

Cap. II. Cum et hanc satis diversam plantam βοεταννικήν et βεττονικήν appellari tradat Dioscorides, mirum est, quanta inde apud Plinium et posteros, nimiam ipsi fidem tribuentes, orta sit confusio. Dum enim de vettonica loquitur, nomen hoc Gallos plantae imposuisse perhibet a Vettonibus, Hispaniae populo, quem Darius amnis ab Asturia distermine.<sup>18</sup> Eos illam invenisse, ante cunctas laudatissimam: in Italia autem dici serratulam. Exire anguloso caule, cubitorum duum, a radice spargere folia fere lapathi, serrata, semine purpureo.<sup>19</sup> Hacc manifesto ex utroque Dioscoridis capite conflata sunt. De

10) Casp. Barth. animadvers. 38, 1. Ackermann progr. de Ant. Musa. Altorf. 1786.

11) Paull. Aegin. 7. p. 235. 12) De sanit. tuend. 5. p. 559.

13) Cf. Lobel. adv. 214. Delechamp. p. 392. C. Gesner. tab. acri incis. 10. f. 89.

14) L. c. p. 352. 353. 15) L. c. p. 40.

16) Apud C. Gesner. hort. Germ. f. 250<sup>a</sup>.

17) Degli ingredienti della teriaca. Ferrara. 1597. 4.

18) Plin. 4, 34. 19) Plin. 25, 46.

britannica vero herba locuturus, narrat, Romanum militem, postquam Germanicus Caesar trans Rhenum castra promovisset, morbo afflicto fuisse, quem medici stomachicam vocaverint et scelotyrben. Repertam auxilio esse herbam, non nervis modo et oris malis salutarem, sed contra anginas quoque et contra serpentes. Folia habere oblonga nigraque ac radicem nigram. Florem *vibones* vocari, qui collectus prius quam tonitrua audiantur et devoratus securos in totum reddat. Frisios, qua castra fuerint, Romanis illam herbam demonstrasse. Mirari se etiam nominis causam, nisi forte collines oceano Britanniae, velut propinquae, dicaverint. Non enim inde appellatam eam, quoniam ibi plurima nasceretur, persuasum habet, etiam tum Britannia libera.<sup>20</sup>

Plinius, qui ipse in Germania sub Corbulone stipendia meruerat, de regione loquitur ipsi probe cognita, quae vastas paludes, Amisiae vicinas, limosam et gravi coeno tenacem planitiem, aut rivis incertam; uligines denique contremiscentes complectitur, a Frisiis et Chaucis habitatas. Ibi igitur, ut Inst. Lipsius vult, in ditone Osnabrugensi, inter Lingam et Coevordam sunt Britanniae uligines<sup>21</sup>, quas Rumices varii incolunt, in quibus vel *Hydrolapathum*, vel *aquaticus* L. huc pertinent. Cum et Plinius et Galenus de nigrioribus<sup>22</sup> foliis loquantur, omnino et *μελάστερα* Aldinae loco *μείσζονα* ponendum est.

De hac herba Abr. Munting, prof. Groninganus, librum singularem conscripsit, doctum quidem, sed haud magnae utilitatis.<sup>23</sup> Ad eum notas observationesque addidit Henr. Cannegieter, rector scholae Arnhemensis, quas tamen nunquam legi.<sup>24</sup> Id saltem compertum habeo, nullam plantam tam controversam esse apud patres rei herbariae, quam britannicam. Etenim Matthiolus tum Polygonum Bistortam et viviparum, tum Potentillam ne-

20) Plin. 25, 6. 21) Lips. ad Tacit. ann. 1, 63.

22) De fac. simpl. med. 6. p. 854.

23) Diss. de vera herba britannica. Amst. 1698. 4.

24) Diss. de Brittenburgo, matribus Brittis, Britannica herba etc. Hag. Com. 1754. 4.

moralem Nestl., non suo, sed aliorum, quos non nominat, iudicio, sub hoc titulo exhibet<sup>25</sup>: Dodonaeus Cochleariam anglicam<sup>26</sup>, quae, etiamsi contra scorbutum egregium est praesidium, nec cum rumicibus comparari potest, nec ad Amisiam crescit. Dalechampio placuit magis Inula britannica<sup>27</sup>, quam et cum aliis Lobelius exhibet<sup>28</sup>: Anguillariae Armeria vulgaris vel plantaginea Willd.<sup>29</sup> Haud opus est addere, quam Linnaeus dixerit Rumicem Britannicam, esse plantam Americae borealis.

Cap. III. Lysimachion nomen sortitum est a Lysimacho, Agathoclis filio, Macedone, Alexandri M. satellite ac comite, post obitum magni viri rege Thraciae, dein Macedoniae totiusque Asiae minoris, victo denique a Seleuco, Syriae rege.<sup>30</sup> In honorem huius tyranni plantam dixisse traditur Erasistratus.<sup>31</sup> Est autem non levis inter Dioscoridis herbam et *δμωνύμην* Plinii differentia. Illa enim fulvo florum seu aureo colore, nullo peculiari odore insignis, ab omnibus post Tragum<sup>32</sup> habetur pro *Lysimachia vulgari*. Plinii vero Lysimachia, flore purpureo et odore acri, a Matthiolo<sup>33</sup>, Clusio<sup>34</sup> aliisque declaratur *Lythrum Salicaria*, quo nihil potest esse certius.

Cap. IV. Polygoni masculi nomen aegyptium *θελόν* Rossius *unguem muris* interpretatur.<sup>35</sup> Punici nominis expositio, quam Bochartus periclitatus est, nihil valet, cum תולת, ut ille vult, articulorum significatum haud habeat.<sup>36</sup> Posset aliquis pro *χουλούμ* — *χαίλιμ*, חליל, legere, quod *vires*, *virtutes* medicas significat. Sed eiusmodi coniecturas nolo digniores iusto putari.

Polygonum Sanguinariam Romanis dici, Plinius docet<sup>37</sup>: posterius nomen etiam in Columella occurrit.<sup>38</sup> Nec sibi satis constat Plinius in appellationibus. Modo

25) L. c. p. 674.

26) L. c. p. 594.

27) L. c. p. 1082.

28) Adv. p. 121.

29) L. c. p. 247.

30) Paus. 1, 10.

31) Plin. 25, 35.

32) L. c. f. 69<sup>b</sup>.

33) L. c. p. 675.

34) Hist. 2. p. 51.

35) L. c. p. 64.

36) Can. p. 756.

37) Lib. 27, 91.

38) Lib. 6. c. 12. lib. 7. c. 5.

enim hoc ipsum polygonon mas appellari vult, atque a multitudine seminis fruticisque densitate dici calligonon. Modo inveniri ait, qui hoc feminam vocent, masque maius minusque nigrum et geniculis densius semine sub (*super* potius) omnibus foliis turgescere. Esse autem hanc plantam *Polygonum aviculare*, in confesso est.

Cap. V. *Polygonum femina* posset *P. maritimum* L. esse. Suffrutex enim est parum ramosus ascendens, ochreis amplis tubaeformibus, ita fissis, ut ἐξοχαί πίντος φυλλαρίοις δοικῦναι facile conspici possint. Satis vulgaris est in Europa australi. Matthiolus<sup>39</sup> et Dodonaeus<sup>40</sup> faciunt *Hippurin vulgarem*, cui coniecturae patrocinator fruticulus arundini similis, sed genicula nihil habent tubaeformis. Neque compertum habeo, an in Graecia Asiaque minore proveniat. A calidioribus enim regionibus aliena est.

Cum infirmiore Dioscorides declaret feminam, Paulus id ita exprimit: Ἐστὶ δὲ τὸ ἄρσεν τοῦ θήλειος ἰσχυρότερον.<sup>41</sup> Contrarium Marcellus legit: τὸ δὲ θήλυ τοῦ ἄρρενος ἰσχυρότερον. Vitium librarii.

Cap. VI. *Πολυγόνατον* cum Matthiolo<sup>42</sup> plerique habent *Convallariam multifloram*, quae etiamnum in Laconia antiquo eo nomine appellatur.<sup>43</sup> Non defuerunt tamen, qui, Clusio praecedente<sup>44</sup>, et *Conv. Polygonatum* L. huc traherent, tametsi florum numerus minor dubia excitet.

Cap. VII. *Κληματίς*, a κλήμασι dicta, aegyptia a Plinio cognominatur.<sup>45</sup> Quam cum longam tenuemque dicat, legisse etiam κλήματα μακρά (l. μικρά) videtur, ut diserte Paullus<sup>46</sup>. Est autem, in quo omnes censiunt, *Vinca minor vel maior*.

Clematis altera a Paulo eodem modo describitur, sed κληματίτις appellatur, sicut et prior. Eodem nomine repetitur c. 179, unde exploratum habemus, a libra-

39) L. c. p. 676.

40) L. c. p. 115.

41) Lib. 7. p. 251.

42) L. c. p. 678.

43) Flor. graec. 1. p. 257.

44) Pannon. p. 264.

45) Lib. 24, 90.

46) Lib. 7. p. 241.



rio huc perperam transposita esse. Aptius ergo ibi exponetur.

Cap. VIII. Polemoniam Plinius, aliis philetaeriam dictam, a certamine regum inventionis appellari tradit.<sup>47</sup> Ad eum locum Harduinus: Certasse inter se duos reges, Polemona Cappadociae ac Philetaerum Ponti, uter prior chiliodynamam herbam invenerit. Eam captat occasionem Marcellus, ut temporum gentiumque illarum felicitatem collaudet, quibus pro salute omnium, cunctis postea seculis, bella fierent. Equidem vero ineptias existimo, tanti facere certamen, quod nondum bellum fuit. Insaniam autem fuisse arbitror barbaris regibus dignam, si vanitati gloriolaeque vitas subiectorum immolare voluissent.

In descriptione Polemonii uncinis inclusa sunt, quae aberant a bonis codicibus. Sed addita esse videntur ex Apsyrti mulomedici Bithyni libris, qui cum sub Constantino in scythico bello meruerit, prior etiam Oribasio fuit, unde et additamentum potuit ab hoc legi. Est autem Apsyrti *πολεμώνιον* calaminthae latiori simile, sed magis canescens et odoratum, quod in paludosis nascatur.<sup>48</sup> Alia vero comparatio cum *στρουθίω* decepisse auctores videtur, ut *πολεμώνιον* crediderint *Silenen* esse *inflatam* Sm.<sup>49</sup> Alii habuerunt *Iasminum fruticans*<sup>50</sup>, Columna etiam *Resedam Phyteuma*.<sup>51</sup> Primus autem ad *Polemonium coeruleum* illud antiquum nomen reduxit Tournefortius.<sup>52</sup> Antea illud Valerianae coeruleae aut graecae nomine venerat<sup>53</sup>, quod probare videtur, in Graecia eam spontaneam esse, quanquam a Sibthorpio non indicetur. Provenit tamen in Transsylvania, Caucasica regione, in Gallia occidentali Helvetiaque.

Cap. IX. Symphytum petraeum iam Matthiolus exhi-

47) Lib. 25, 28.

48) Hippiatr. p. 108. ed. Basil. 1557. Ἡ πολεμωνία ἐστὶν ὁμοία καλαμίνθῃ τῇ πλατείᾳ, πολιωτέρα δὲ μᾶλλον καὶ πικροτέρα, ὁσμὴν ἔχουσα βαρεῖαν· γίνεται δὲ ἐν τοῖς ὑγροῖς λειμῶσιν.

49) Dodon. p. 172. C. Gesner. de hort. Germ. f. 273.

50) C. Gesner. l. c. f. 278. Lobel. adv. p. 389. 390.

51) Ecphr. I. p. 270. 52) Instit. p. 146.

53) Dodon. p. 352.

buit<sup>54</sup>; meliore icone vero Clusius<sup>55</sup> et Camerarius<sup>56</sup>, ille inscriptum: *Coris quorundam*. Id nomen mansit, namque *Coris monspeliensis*, oras maritimas mediterranei maris inhabitans, sine dubio est Dioscoridis planta. Quam mirabilis sit efficacia in vulneribus recentibus glutinandis, si pulvis siccatae herbae inspergatur, uberius narrat Cavanillesius<sup>57</sup>, praesertim testimonio Monachi Andreae Marti, Valentini.

Alii hallucinati sunt rei herbariae instauratores in ea planta definienda, dum Lobelii exemplo Prunellam vulgarem albamque Pall.<sup>58</sup> et Caesalpini, Hyssopum officinalem<sup>59</sup> huc pertinere opinarentur.

Plinii nugae de hac planta postremo adiungo. Primum scilicet: „Malus, quam Galli sic vocant, Veneti cottoncam, similis est cunilae bubulae, cacuminibus thymo, dulcis et sitim sedans, radicis alibi albae, alibi nigrae.“<sup>60</sup> Tum iterum: „Alum nos vocamus, Graeci symphyton petraeum, simile cunilae bubulae, foliis parvis, ramis tribus aut quatuor a radice, cacuminibus thymi, surculosum, odoratum, gustu dulce, salivam ciens, radice longa rutila. . . . Vulneribus sanandis tanta praestantia est, ut carnes quoque, dum coquuntur, conglutinet addita, unde et Graeci nomen imposuere.“<sup>61</sup>

Cap. X. Symphytum aliud, solidago Romanis, consolidida Apuleio et posterioribus dictum<sup>62</sup>, a Brunfelsio iam probe indicatum<sup>63</sup>, ab omnibus, qui sequuti sunt, nomine *Symphyti officinalis* assumptum est. Neque in descriptione quicquam est, quod repugnet. Vis radicis praesertim mucilaginosae ad glutinanda vulnera ossaque conferruminaanda ab antiquitate barbaraque aetate magis depraedicata, quam nuperorum observatione confirmata est. Sed obtinuit vernacula nomina *Beinwelle*, *Beinheil* Germano-

54) L. c. p. 682.

55) Hist. 2. p. 174.

56) Epit. p. 699.

57) Observ. sobre la hist. nat. de Valencia, t. p. 209. Anales de cienc. nat. 2. p. 274.

58) Obs. p. 251.

59) Lib. 11. c. 50.

60) Lib. 26, 26.

61) Lib. 27, 24.

62) Apul. c. 60.

63) Herb. t. p. 75. 76.

rum, Gallorum *Consoude*, Anglorum *Boneset*, licet vulgo *Comfrey*, Suecorum *Vallört*.

Cap. XI. *Holosteum*, inquit Plinius<sup>64</sup>, sine duritia est herba; ex adverso appellata a Graecis, sicut fel dulce.<sup>65</sup> Quaeenam sit planta, non liquet. Dodonaeus primus *Plantaginem albicantem* L. protulit<sup>66</sup>, Lobelius praeter hanc etiam *Asplenium septentrionale* Sw.<sup>67</sup> In ea *Plantagine*, cui adiunxit Pl. *Bellardi* All., substitit etiam Clusius.<sup>68</sup> Sed Matthiolus insuper exhibuit *Iuncum bufonium*, *Lonicerus Myosurum minimum*, *Ruellius Stellarium Holosteum*, vel *Cerastium arvense*. Tandem *Tabernaemontanus* his omnibus addidit *Holosteum umbellatum*<sup>69</sup>, cuius nomen et *Linnaeus* servavit.

Cap. XII. *Στοιβή* a Theophrasto *σφυγανικοῖς σαρκώδεσι φύλλοις* adnumeratur.<sup>70</sup> Eadem alio loco<sup>71</sup> ὁ φλειῶς (φείως) appellata, sicut tribulus et ononis, *παρὰ τὴν ἄκανθαν ἕτερον ἔχει φύλλον*. Iterum ὁ φλειῶς *πολυσχιδές* habere καὶ *σαρκῶδες* folium, neque annuum, sed *χρονιώτερον*.<sup>72</sup> A Plutarcho etiam *στοιβή καὶ ἀσφάραγος* in *ἀκανθώδεσι* enumerantur fruticibus, qui dumeta constituent *Perigunen*, *Thesei amatam abscondentia*, unde posterii *Ionidae*, *Cariam* habitantes, legem sanxisse dicuntur, neque *aspharagum* cremari neve *stoeben*, sed *coli ac magni haberi*.<sup>73</sup> Sitne eadem planta, quam in Asia minore aliqui *στοιβήν*, vulgo autem *κολυμβάδα* appellant<sup>74</sup>, ad vini conservationem aptissima, fruticosa, calida, acris et odorata, valde dubito. Nostram vero ac Theophrasti plantam a nostrae aetatis Graecis *στοιβήδα*, *ἀστοίβη* et *στοιβή* nominari, compertum habemus.<sup>75</sup> Esse *Poterium spinosum* L., astring-

64) Lib. 27, 65.

65) Cael. Aurellan. chron. 3, 1. Praecedit tamen perverse etymologia orthopnoeae.

66) L. c. p. 111.

67) Adv. p. 17. 18.

68) Hist. 1. p. 110. 111. Caesalp. 8, 20.

69) Herb. p. 543. ed. Hier. Bauhin.

70) Hist. pl. 1, 10.

71) Lib. 6. c. 1. 4.

72) Ib. c. 5.

73) Plutarch. Thes. c. 3.

74) Galen. de antid. 1. p. 18.

75) Honor. Bell. apud. Olus. 2. p. 303. Walpole mem. p. 284. Flor. graec. 2. p. 238.

gente vi etiamnum clarum, Honor. Bellus primus uberius docuit.

Igitur graviter lapsi sunt, qui Matthaei Sylvatici auctoritate<sup>76</sup>, quae apud nos nulla est, freti, Scabiosam eandem cum Stoebe Dioscoridis haberent, quos et Matthiolus et Dodonaeus primi refutare conati sunt, hoc et imaginem Stoebes e codice caesareo vindobonensi afferente, quae fictitia est.<sup>77</sup> Adiunxit etiam Clusius Stoebes nomine Centauream salmanticam, erucaefoliam et splendentem.<sup>78</sup> Eum errorem foverunt, qui *ποτήριον* Dioscoridis (3, 15.) idem haberent cum *στοιβήδα* recentiorum Graecorum.<sup>79</sup>

Cap. XIII. *Κλύμενον*, ob mire corruptum textum, obscurissimis plantis annumerandum est. Equidem textum ita restitui, ut intelligi et in certam quamdam plantam applicari posset. Verumtamen audentior iusto *θυσάνια* loco *θυλακίων*, quae et codices et interpretes prisci habent, posui. Plinius, primus interpres, parum lucis affert: „Clymenus, inquit, a rege<sup>80</sup> herba appellata est, ederae foliis, ramosa, caule inani, articulis praecincta, odore gravi et semine ederae, sylvestribus et montuosis nascens.“ Et mox: „Graeci plantagini similem esse dixerunt, caule quadrato, folliculis cum semine inter se implexis, velut in polyporum cirris.“ Utramque igitur Plinius lectionem tuetur; et cod. C., qui *τὰ φύλλα κισσοειδῆ*, et Ald., qui *τὰ φύλλα πρὸς τὰ τοῦ ἀρογλώσσου* habet.

In tantis tenebris, quae ignibus nonnisi fatuis illucescunt, Anguillarae assentiendum, qui, plane se nescire, quatenam sit planta, ingenue fatetur.<sup>81</sup> Alio tamen loco, Plinii clymenum se habere pro ea, quam Patavini *Ciciliana* vocent, asserit.<sup>82</sup> Sic autem Itali appellant *Hypericum Androsaemum*, in quo nihil video, quod ad Dioscoridis plantam accedat, sive *θυσάνια* legas, sive *θυλάκια*.

76) Pandect. c. 614. f. 174<sup>c</sup>. 77) Dodon. p. 123.

78) Hist. 2. p. 9. 10. 79) Lobel. obs. p. 491.

80) Arcadiae. Hygin. fab. 206. 81) L. c. p. 251.

82) L. c. p. 92.



Multo minus comprobanda C. Gesneri sententia, qui Scrofulariam nodosam<sup>83</sup>, aut Ruellii, qui Saponariam officinalem huc trahit. Matthiolus, licet haesitans, Lathyrum latifolium, quadantenus congruum, dum *θυσάνια* legimus, huic capiti appingi curavit.<sup>84</sup> Fabius Columna, initio Calendulam arvensen pro hac planta declarans, multus est in exponendis *θυλακίοις*, seu folliculatis seminibus, quae referant polyporum cirros.<sup>85</sup> Dein vero, improbens suam ipsius sententiam, *Scorpiurum vermiculatum* ita *κλυμένον* nomine illustrat, ut facile approbationem mereatur. Caulis enim plantae angulatus, folia plantagini similia, fructus *θυσανοειδείς* cum *πλεκτάναις πολύποδος* utique comparari possunt.<sup>86</sup> In hoc igitur acquiescendum, neque Sibthorpio assentiendum, qui Convolvulum sepium huc affert.<sup>87</sup>

Cap. XIV. Minus negotii *περικλύμενον* facessit: neque dissensus auctorum animadvertitur: multi enim approbant Tragi<sup>88</sup> Fuchsiique<sup>89</sup> sententiam, esse *Loniceram Periclymenum* L.; plerique vero alteram speciem, *Loniceram Caprifolium* L., cum Matthiolo<sup>90</sup> praeferunt, quia folia huius connato-perfoliata, ideoque amplexicaulia dici possint, illius vero nequiquam. Utraque species per Graeciam non rara: neque opus est ad Convolvulum arvensen cum Sibthorpio confugere, cum utraque Lonicera se circa dumeta etiam convolvere soleat. Hederae fructus quidem similis est, sed durus dici nequit, cum bacca sit, nisi semina ipsa intelligantur, quae etiam separatu difficilia sunt.

Satis suarum rerum agit Bochartus, ut punicum nomen *λανάθ* exponat<sup>91</sup>: quod haudquaquam bene ipsi cecisse credo. Neque meliorem audeo exhibere interpretationem.

Cap. XV. Duo tribuli genera, terrestris et aquatici,

83) De hort. Germ. f. 254<sup>b</sup>.

84) L. c. p. 690. 85) Phytobas. p. 42. t. 13.

86) Ecphras. i. p. 156. 87) Flor. graec. i. p. 125.

88) L. c. f. 311<sup>b</sup>. 89) L. c. p. 646.

90) L. c. p. 691. 91) Can. p. 756.

optime distinguuntur. At cum *Tribulum terrestrem* iterum bipartito distribuat, inquirendum est, utri Dioscoridis planta conveniat. Alterum Theophrastus tradit esse *περικαρπιάκανθον*, folia gerere ciceri similia, semina sesamoidea, praecocius florere, loca inundata ac novata amare.<sup>92</sup> Quae omnia in *Tribulum vulgare* terrestrem quadrant. Hunc esse et Dioscoridis *τρίβολον*, non dubito, licet comparatio foliorum cum portulacae foliis haud sit idonea. Alter vero Theophrasti tribulus terrestris folia ipsa habet spinescentia, serius floret circa domuum areas, et semina rotunda, nigricantia gerit in folliculis seu capsulis. Hic esse videtur *Fagonia cretica*, ab Hon. Bello et C. Bauhino<sup>93</sup> Trifolii spinosi cretici nomine illustrata.

Quo pertineat *τρίβολος παραθαλάσσιος* Hippocraticorum<sup>94</sup>, non liquet. Dalechampius *Echinophoram spinosum* eo nomine adumbravit<sup>95</sup>, quod nec improbare nec vero comprobare possum.

De tribulo aquatico, qui *Trapa natans* est, nulla exstitit controversia. Ueberior est apud Theophrastum<sup>96</sup> descriptio. *Βουκέφαλος* et *ταυρόκερος* bene dicebatur ob formam fructus, qui nucem duram cornutam sistit, spinis quatuor validissimis arcuatis armatam, sub aqua conditam. Petioli longi sunt, superne incrassati. Capillamentata spicaeformia sunt radicales innumerae ex omni inferiore planta progerminantes. Thraces fructum alendo idoneum panis loco adhibuisse, haud sine fide est, cum et apud nos castanearum more comedatur. „Ob id et Gallia Padana castaneas ferrarienses vocat.“<sup>97</sup>

Capitulum de Saxifrago, quanquam ipsi Dioscoridi non adscribendum aliqui putent, tantae tamen est vetustatis, ut in optimo quoque codice legatur, sed nusquam fere incolume. Sic in cod. C. deest comparatio cum epi-

92) Hist. pl. 6, 1. 5. 93) Prodr. p. 142.

94) De nat. muliebr. p. 552. De morb. mul. 1. p. 722.

95) L. c. p. 1367. 96) Hist. pl. 4, 9.

97) Hermol. Barbar. coroll. ad Diosc. 624. *Castagne d'acqua* Veronensibus audit.

thymo, in codd., quos Matthiolus citat, *θύμω* legebatur loco *ἐπιθύμω*.

Iam originem huius capituli indagaturis protinus obuius est Plinii locus de empetro.<sup>98</sup> Eum et a Romanis *calcifragam* dici et calculos frangere tradit. Quod cum alienum a Dioscoridis textu (c. 178.) sit, hic autem *ἐμπετρον* habeatur cognomen *σαξιφράγου*, necesse est, affuerit iam Plinii aetate vel integrum hoc capitulum, vel aliquid simile in textu. Sed transiit dein saxifragae appellatio ad alias, et diversas quidem, plantas. Etenim iam praecepimus ad cap. 1. de Galeni *κέστρω*, *τῷ παρὰ τοῖς Κελτοῖς σαξιφράγω*, ut et de Paulli *βειτονικῇ*, *λεπτοκλώνω*, quorum rami pulegio similes sint. Idem etiam *σαρξιφαγές*<sup>99</sup>, ut et Trallianus<sup>100</sup> vocat. Cum et Hippiatrici de *σαρκοφάγω* loquantur in enumerandis herbis lithonthrypticis<sup>1</sup>, Graecorum morem, exterarum voces ad linguae indolem mutandi, saeculorum lapsu invaluisse patet. Quando et hic *σκολοπένδριον* nominatur *σαξιφράγου* cognomen, Marcellus etiam Burdigalensis dicit: *Scolopendros*, quam nos *saxifragam* appellamus.<sup>2</sup>

Medio aevo *saxifraga* cum *pimpinella* componebatur. Id e Simeonis de Cordo fragmento elucet<sup>3</sup>, qui etiam cum *Cachry maritima* (Cretano) comparat. Et Matthaeus Sylvaticus: „*Pimpinella* est herba multum similis *saxifragae*: unde versus: *Pimpinella pilos*, *saxifragia* non habet ullos.“<sup>4</sup>

Post renatas igitur literas non potuit non *saxifraga* in contentionem venire, cum ipse iam Hermolaus Barbarus admodum diversas enumeret sententias, querens simul, combustos esse et arrosos hac parte codices, ut nullo possit modo cognosci, quamnam habeat folium *saxifragae* similitudinem.<sup>5</sup> Brunfelsius et *Pimpinellam Saxifragam*<sup>6</sup>, quam etiam Tragus<sup>7</sup>, Dodonaeus<sup>8</sup> et Caesalpinus

98) Lib. 27, 51.

99) Paull. lib. 7. p. 252.

100) Lib. 9. p. 534.

1) Hippiatr. p. 278. 281.

2) Ed. Stephan. col. 355.

3) Apud Brunfels., 1. p. 188.

4) Pandect. c. 573. f. 162 d.

5) Coroll. in Diosc. 625.

6) Brunf. 1. p. 188.

7) L. c. f. 177.

8) L. c. p. 515.

9) Lib. 7. c. 57.

hoc nomine insigniunt, et Saxifragam granulata<sup>10</sup>, iisdem Trago<sup>11</sup> et Dodonaeo<sup>12</sup> annuentibus, profert. Ruelius coniecit, *Salviam* sic dictam *vitam*, quam Rutam murrariam esse Lobelius docet.<sup>13</sup> Hic ipse Gypsophilam Saxifragam iuxta ac Scleranthum annuum Saxifragae nomine adducit.<sup>14</sup> Valer. Cordus et Matthiolus consentiunt, Paulli *βεττονικήν*, quae eiusdem *σαρξιφαγής* sit, ad Saxifragam reducendam esse: Matthiolus igitur Satureiam et Iulianam et montanam hoc loco appingi curavit.<sup>15</sup> Nec desunt aliae coniecturae: Caesalpino etiam Asperulam cynanchicam<sup>16</sup>, Clusio Seseli Hippomarathron hoc nomine designantibus.<sup>17</sup> Neque dirimi eae lites ullo modo possunt, omnibus indiciis deficientibus.

Cap. XVI. *Λειμώνιον* a *λειμωνία* Theophrasti differt.<sup>18</sup> Haec enim, ad Plinii interpretationem<sup>19</sup> et Scalligeri textum, synonyma scolymi est. Dioscoridis planta betae sylvestris nomine a Plinio appellatur.<sup>20</sup> Aëtius scribit, etiam cynoglossum vocari. Syrorum cognomen forte ex hebraeo *קִסְמָה*, *vis*, formatum, ut efficaciam singularem denotet.

Plerique rei herbariae instauratores in eo congruunt, ut, Matthiolo duce<sup>21</sup>, *Staticen Limonium* intelligi arbitrentur. Crescit saltem in paludosis maritimis per omnem Graeciam<sup>22</sup>: neque descriptio Dioscoridis contradicit. Conr. Gesnerus fere solus discrepat, dum *Polygonum Bistortam* vocat Limonium.<sup>23</sup>

Cap. XVII. *Λαγώπους* idemne sit ac *λαγώπυρος* Hippocratis, quaeritur. De hoc ita: *Ἔστι δὲ πιτύροισιν ὁμοίη, ὅταν αὐαίνηται, μικρὸν τὸ φύλλον, ὥσπερ καὶ τὸ τῆς ἐλαίης καὶ μακρότερον.*<sup>24</sup> Cum Galeni expositio<sup>25</sup>, ἡ λαγονάτη καλουμένη βοτάνη, nihil luminis afferat, in ipsa

10) L. c. p. 185.

11) L. c. f. 199 b.

12) L. c. p. 316.

13) Adv. p. 362.

14) Ib. p. 183.

15) L. c. p. 693.

16) Lib. 6. c. 46.

17) Pannon. p. 698.

18) Hist. pl. 6, 4.

19) Lib. 22, 43.

20) Lib. 20, 28.

21) L. c. p. 696.

22) Flor. graec. 1. p. 211.

23) De hortis Germ. f. 265 a.

24) Hipp. de ulcer. p. 319.

25) Expos. voc. Hipp. p. 512.



descriptione subsistamus, quae omnino ad *Trifolium arvense* conducit. Neque alienae sunt de lagopode Dioscoridis coniecturae. Nasci enim in segetibus Plinius addit.<sup>26</sup> Hinc iam Valer. Cordus cum Fuchsio<sup>27</sup> *Trifolium* idem arvense habuit, quod tamen Matthiolus affirmare non audet.<sup>28</sup> *Tragus* etiam ad *Crepida* tectorum refugit.<sup>29</sup> Omnes vero reliqui consentiunt.

Cap. XVIII. Synonyma Medii huc non pertinere, sed ex *Medicaginis* aut *Meliloti* historia transposita esse videntur. In iis est aegyptium ab *Epapho* ortum, qui idem cum *Api* Aegyptiorum existimatur.<sup>30</sup>

Planta ipsa a priscis rei herbariae magistris habita est pro *Campanulae* specie, quam et nos *Medium* vocamus. At cum nulla sit foliorum cum *σέριδος* foliis similitudo, *Rauwolfius* aliam invenit in Syriae locis rupestribus umbrosisque plantam proceram, strigosam, foliis radicalibus pinnatifido-laciniatis, flore amplo, albido-purpurascens, quae omnino cum *Medio* Dioscoridis convenire videtur.<sup>31</sup> Est ea *Michauxia campanuloides* Herit. Obiici posset, plantam hanc in Graecia non nasci, unde et Sibthorpius suasit, ad *Campanulam laciniatam* consilium transferre.<sup>32</sup> Simillima ea priori est, caesio tamen floris colore differt et partium numero. Neque *Cilix* Dioscorides Asiae minoris vel Syriae plantas neglexit, Graeciae incolas solas enumerans. Haeremus quidem in semine cnico simili. Quodsi vero rem ad verum exigimus, et *Michauxiae* et *Carthami* tinctorii (qui *νίλος* Dioscoridis) semina sunt oblonga, angulata, licet minuta illa, haec grandiuscula.

Cap. XIX. *Epimedium* Anguillara primus id, quod et posteris eo nomine notum est, *alpinum* L. dictum, observavit, ideoque huc pertinere credidit, quod flores cito pereant, fructus fere nunquam in conspectum veniant,

26) Lib. 26, 34.

27) L. c. p. 494.

28) L. c. p. 698.

29) L. c. f. 101<sup>b</sup>.

30) Herod. 3, 27. Aelian. hist. anim. 11, 10.

31) Iter germ. II. 284. App. ad Dalechamp. p. 33. Gesner. tab. lign. 4. f. 36.

32) Flor. graec. 1. p. 141.

unde et Dioscoridi ignoscendum, si flore fructuque carere perhibuerit.<sup>33</sup> Sequuti Anguillaram sunt Lobelius<sup>34</sup>, Matthiolus<sup>35</sup> alique, licet nec in aquosis locis nostrum Epimedium crescat, nec folia hederæ similia sint. His motus argumentis Fab. Columna *Botrychium Lunarium* Epimedii nomine produxit.<sup>36</sup> Neque tamen et id aquosa loca amat, sed rupestria, arida.

Cap. XX. *Ξιφίον*, iam Theophrasto dictum, esse Gladiolum communem, omnes fassi sunt. Neque aliquid contrarii in descriptione invenio, præter flores *στιχιδὸν ἀλλήλων διεστῶτας*, quod nec de nostro communi, nec de orientali imbricato valet: floribus scilicet secundis ii gaudent. Sed Parkinsonius iam *Gladiolum byzantinum*<sup>37</sup> distinxit floribus puniceis, speciosis, distichis, distantibus insignem, qui omnino cum *ξιφίω* convenit. *Φάσγανον* idem fuisse, et ex hoc loco patet, quod in tumultis virginum plantabatur.<sup>38</sup> Nec *ὑάκινθος* Graecorum *πολύθηρος* ἢ *φιλόθηρος* admodum diversus, sic dictus, quia e sanguine Hyacinthi Amyclæi, ab Apolline cum eo ludente disco occisi multumque complorati, progerminaverit.<sup>39</sup> Cum inversum V constituat A, ingeniosi poetæ et in Aiace Telamonium applicarunt, quod de Hyacintho dictum fuerat. Salaminii etiam fabulabantur, ab obitu Aiæcis natum esse florem album rubrumque, lilio minorem, cui inscriptæ sint literæ, quales et hyacintho.<sup>40</sup> Romani tamen, in Hyacintho acquiescentes, Phœbum suos gemitus suaque lamenta floribus inscripsisse cecinerunt, ut *αἰ' αἰ'* in flore legendum sit.<sup>41</sup> Haec *γράμματα τῷ νεκρῷ ἐπαϊάζοντα* Luciani<sup>42</sup> sunt nectarostigmata albida in purpureo Gladioli flore.

Cap. XXI. *Sparganii*, cuius nulla fere fit mentio apud veteres auctores, nisi quæ e nostro mutuata sit, notitiam acceptam referimus ad Tragum, Valer. Cordum et Matthiolum, quorum posterior *Sparganii ramosi* iconem

33) L. c. p. 253.

34) Adv. p. 138.

35) L. c. p. 700.

36) Phytobas. p. 65. t. 18.

37) Paradis. p. 189.

38) Athen. 15, 31.

39) Schol. Nicandr. ther. v. 902.

40) Pausan. 1, 35.

41) Ovid. metam. 10, 211.

42) Dial. deor. 14. p. 43.

exhibuit<sup>43</sup>, quamvis e foliorum descriptione colligi possit, *Sp. potius simplex subesse.*

Cap. XXII. *Ξυρίς*, a Matthiolo primo illustrata, *Iris foetidissima* omnino esse videtur. Germina, quae hic *λοβοί* dicuntur, utique trigona, et super his flos lurido-purpurascens, cuius interiores partes laetiori colore gaudent. Semina, quae hic rubra dicuntur, crocea aut fulva mihi apparuerunt; sed minoris haec sunt momenti, quam silentium de ingrato plerisque odore foliorum tritorum vel contusorum.

Cap. XXIII. *Anchusae* nomen punicum *βουινεσάθ* Bochartus corruptum arbitratur et arabico *أبو جاسا* (*abudschilasa*).<sup>44</sup> Quae vero vox cum ipsa e Graeco *άνδρυσ* (*andschusa*) depravata ortum duxerit, originitio ea approbari nequit. Priorem enim vocem capiti illo in Avicenna inscriptam, tanquam peregrinam, legimus<sup>45</sup>, in textu obviae sunt plures arabicae appellationes.

Planta ipsa dignosci debet e radicis colore subsanguineo, foliis frequentibus humi stratis, hirsutis asperisque, quae *θριδάκι δξυφύλλω* assimilantur. Id epitheton quamquam non obvium sit, quadrat tamen in Lactucam Scariolam. Duae autem sunt plantae maxime affines, in quibus ea indicia animadvertimus: *Anchusa tinctoria* L. et *Lithospermum tinctorium* L. Utra vero sit praeferenda, ambigo, tametsi prior Graeciae familiaris sit, de posteriore vero dubito. Eadem iam a Theophrasto nominatur<sup>46</sup>: radix adhibebatur ad tingenda rubro colore unguenta.<sup>47</sup> Nomine *άγχούσης θριδακηίδος* Nicander eam signat<sup>48</sup>, Galenus *όνοκλείας* appellatione distinguit.<sup>49</sup>

Hanc secundam faciunt Matthiolus<sup>50</sup> atque Lobelius<sup>51</sup>: sed repugnat color secundae purpureus, qui in *Anchusa* et *Lithospermo tinctoriis* coeruleus est.

43) L. c. p. 702.

44) Can. p. 757.

45) Ed. arab. p. 135.

46) Hist. pl. 7, 8. 9.

47) Id. de odor. 31. p. 743.

48) Ther. v. 338.

49) De fac. simpl. 5. p. 811. 812.

50) L. c. p. 703.

51) Adv. p. 248.

Cap. XXIV. Altera anchusa Dioscoridis est ea, de qua Nicander:

Ἐσθλὴν δ' Ἀλκιβίου ἔχιος περιγράφει ὄνταν,  
τῆς καὶ ἀκανθορόλος μὲν αἰεὶ περιτέτορε χαίτη,  
λείρια δ' ὥς ἴα τοῖα περιστέγει· ἥ δὲ βαθεῖα  
καὶ ῥαδινὴ ὑπένεσθαι ἀέξεται οὐδεὶ ῥίπα.<sup>52</sup>

Scholia tradunt, ab Alcibio quodam, qui a vipera morsus hac herba consanuerit, nomen accepisse. Compositis autem, quae Nicander et Dioscorides de hac planta praecipiant, *Echium* videtur esse *diffusum* Sibth., in Creta Asiaque minore spontaneum. Radix enim grandis, crassa, lignosa, fusco-sanguinea: folia angusta, linearia, setoso-hispida, floresque punicei hoc probant. Superest tamen alia species, quam et e Sardinia obtinui, *Echium elegans* Sibth. Id pariter angustis, parvis foliis gaudet, floribus etiam bellis puniceis. Omnis planta pilis rigidis duplicibus obsessa est, quorum nonnulli tuberculis sen callis fuscis insident. Radix est aequae fusca et longissime descendens. *Echium creticum*, pro quo Sibthorpius habuit, esse non potest, quoniam folia nimis longa sunt ac lata, radix etiam gracilis, totaque planta multo maior, neque adeo hirsuta ac *Anchusa tinctoria*.

Cap. XXV. *Anchusa* tertia, prioribus similis, sed rubro semine gaudens, videtur *Lithospermum* esse *fruticosum*, cuius semina matura utique fusco-rubra sunt. Est fruticulus spithameus aut dodrantalis, foliis linearibus strigoso-hispidis, floribus violaceis, qui per Europam australem non rarus, ab Alpino *Anchusae* arboreae nomine delineatus est.<sup>53</sup> Neque tamen arbitratur Alpinus ad Dioscoridis anchusas pertinere: neque ego, si quis mihi aptiorem monstraverit plantam, in mea sententia perseveravero.

Cap. XXVI. Ἀύκοψιν Nicander λύκαψον ὀρμενόντα vocat<sup>54</sup>, quod epitheton scholiastes ita exponit: οἶονεὶ βεβηκότα καὶ κατὰ γῆς ἐξορίζωμενον, ἢ τὸν ὀρμητικὸν πρὸς

52) Ther. v. 541. s.

53) De plant. exot. p. 68.

54) Ther. v. 840.



ὑψος· εὐανξής γάρ ἐστι, καὶ καυλὸν ἔχει μακρόν. H. Stephanus cum spiritu leni ὀρμενόμεντα scribendum ac ab ὄρω, ὄρμενος derivandum esse vult, ut omnino elatum caulem designet. Est autem in affinis fere procerissimum *Echium italicum* L., quod, in omni Graecia vulgare, huc quoque Sibthorpius traxit.<sup>55</sup> Echii altissimi nomine Iacquinus olim illustravit, quum non raro tres aut quatuor pedes altum sit. Folia sunt lanceolata, rigida, strigoso-hispida. Flores dilute violacei, in capitulis aggregati, racemum longissimum spicaeformem constituunt, pilis rigidis flavescentibus densissime obsessum.

Eam plantam video iam Io. Bauhinum<sup>56</sup> et fratrem Casparum<sup>57</sup> et Parkinsonium<sup>58</sup> Lycopsis nomine protulisse, nomenque derivasse a similitudine racemorum spicaeformium hirsutissimorum cum pedibus lupi. Crescit et in Insula Caesaréa ad oram Armoricae.<sup>59</sup>

Cap. XXVII. Ἐχίον dici Dioscorides monet, διὰ τὸν καρπὸν κεφαλῇ ἔχιος ὅμοιον. Melius Plinius, plantae ipsi capitula viperarum similia esse.<sup>60</sup> Alii perhibent, ab usu adversus viperarum morsus plantam fuisse appellatam.<sup>61</sup> Nicander ἐχίειον scribit, cuius duo distinguit genera, alterum id, quod noster ὠκμοειδές appellat, alterum autem ita adumbrat:

Ἡ δ' ἑτέρη πετάλοισι καὶ ἐν καλύκῃσι θάλεια,  
ὑψηλή· ὀλίγω δὲ πέριξ καλχαίνεται ἄνθει·  
βλάστη δ' ὡς ἔχιος σφεδανὸν καθύπερθε κάρηνον.

Plerique in definienda planta in Echio vulgari acquieverunt; sed flores coerulei huius contrarii sunt, cum πορφυροειδῇ ἄνθῃ diserte ἐχίω suo tribuat Dioscorides: nec καλχαίνειν aliud quid, quam πορφύρειν, ut κάλχη πορφύραν significat.<sup>62</sup> Hinc *Echium rubrum* Iacqu. praefero, cuius caulis simplicissimus gracilis, bipedalis; folia lineari-lanceolata, hispidula; flores secundi, rubri, glomerato-spi-

55) Flor. graec. 1. p. 124.

56) Hist. pl. 3. p. 584.

57) Pin. p. 255.

58) Theatr. p. 519.

59) Rai. synops. p. 227. Engl. bot. 2031.

60) Lib. 25, 58.

61) Schol. Nicandr. ther. v. 637.

62) Schol. Nicandr. 1. c. Hesych.

cati, bracteis fere pectinatis instructi (φυλλάρια λεπτά, τασσούμενα, μέλανα) exacte descriptioni respondent. Bene id iam Clusius delineavit.<sup>63</sup>

Cap. XXVIII. Ὠκισμοειδές, Romanorum ocimastrum, cum Matthiolo<sup>64</sup> non pauci habuerunt pro *Lychnide dioeca*: Fuchsius etiam huc *Thymum Acinon*<sup>65</sup> pertinere existimavit. Sed, ne illud accipiamus, dissuadet proceritas plantae, cum ocimastri rami sint spithamaei: ab hoc dehortatur fructus fabrica, hyoscyamo similis, semine nigro pleni. Itaque facile largior Lobelio<sup>66</sup> et Dalechampio,<sup>67</sup> qui *Saponariam Ocimoiden* intelligunt; plantam ramosam, dodrantalem, ramis hirsutis, foliis ad ocimum quodammodo accedentibus, capsulis etiam intra calyces tubulosos, hirsutos, semina multa nigra continentibus. Provenit in Gallia australi, Helvetia et Italia.

Cap. XXIX. Τὴν ἔρινον Diocles Carystius iam dixerat ocimum referre, crescere autem ad fluvios fontesque, καὶ πρὸς ὑπορείας, quas Nicander ἀρπύζας, οἶονεὶ ὀροπέζας, vocavit.<sup>68</sup> Ἐχίνον Galeni<sup>69</sup> huc pertinere, nonnulli credunt, quia vires convenient. Itaque negligentia librarii sic scripta est. Quenam vero sit planta, diu latuit, quando et Matthiolus fictitiam iconem, a pluribus repetitam<sup>70</sup>, huc posuit, et Dalechampius aliam addidit obscuram plantam, quam in rivulis prope Lugdunum invenerit: Cunilam dixerim thymoidem, ni quatuor manifesta adessent stamina.<sup>71</sup>

Denique Fab. Columna, ad succum proprium caulis foliorumque respiciens, *Campanulam Rapunculum*<sup>72</sup>, dein vero *Campanulam Erinum* huc pertinere probavit.<sup>73</sup>

Cap. XXX. Ἀγρώστειος cognomen aegyptium Rossius ἀσνοῦφι legit, quod *sanguinalem* significet<sup>74</sup>: punicum

63) Pannon. p. 631. Hist. 2. p. 164. Echium rubro flore.

64) L. c. p. 706. 65) L. c. p. 896.

66) Adv. p. 144. 67) L. c. p. 1429.

68) Schol. Nicandr. ther. v. 647.

69) De facult. simpl. 6. p. 880.

70) L. c. p. 707. 71) L. c. p. 1086.

72) Ecphras. 1. p. 225. 73) Phytobas. p. 122. t. 37.

74) Etym. aeg. p. 12.

nomen congruere cum ebraico *יבול*, *terrae proventus*, Bochartus iam sensit.<sup>75</sup> Esse autem *ἄργρωστον* *Triticum nostrum repens*, nemo dubitavit.

Cap. XXXI. *Καλαμάργρωστον*, a qua plerique maiores nostri abstinuerunt, egregie illustravit Lobelius.<sup>76</sup> Est *Calamagrostis epigeios* Roth., in collibus aridis abundans. Rigidum illud et exsuccum gramen intactum iumenta et pecora relinquunt. Quodsi vero fame coacta iumenta id forte mandunt ac vorant, labra faucesque sauciari, quin inflammatione intestinorum enecatū iri, non rarum est. Quodsi idem ad Babylonem provenit, propter penuriam pabuli melioris, saepius letalem ibi effectum observari credibile est. Neque possum, quin huc etiam referam gramen id, quod in Cilicia *κίνναν* appellant, a cuius esu boves inflammentur, quamvis et Iuncus bufonius et Molina varia Schrank. pariter nocere observentur.<sup>77</sup>

Cap. XXXII. In gramine Parnassi, quod gramen haudquaquam esse, nemo non videt, graviter lapsi sunt, quotquot in exponendis Dioscoridis plantis desudarunt. Matthiolus male pictam *Maianthemum bifolium* Cand. effigiem apposuit<sup>78</sup>, Dodonaeus in *Parnassia palustri* pedem fixit.<sup>79</sup> Equidem Campanulae hederaceae affinem, C. forte *Cymbalaria* Sibth. proponerem, si modo scirem, flores esse odoratos, albos, ac radices albas, dulces, digitum crassas, succi denique proprii plenas.

Cap. XXXIII. In Sideritidis cognominibus deest latinum *peritaria*, cuius meminerunt Hippiatrici.<sup>80</sup> Cognominum autem aegyptiorum ac afrorum etymologiam, a Bocharto et Jablonskio exhibitam, cum approbare nequeam, fusius refutare supervacuum duco. Pluris interest, quamnam intellexerit plantam sub Sideritide prima. Matthiolus profecto hallucinatus est, dum *Lycopus europaeum* proponeret<sup>81</sup>: is enim, etiamsi omnino cum descriptione con-

75) Can. p. 757.

76) Adv. p. 3. ic. t. 6.

77) Thaers Landwirthschaft, 3. p. 264. Wredows ökon. Flor. Mecklenb. 1. p. 169.

78) L. c. p. 709.

79) L. c. p. 564.

80) p. 76.

81) L. c. p. 711.

gruat, nunquam saxosa habitavit loca. Magis placet Fuchsii sententia, qui *Stachyos rectae* effigiem huc collocat:<sup>82</sup> neque habeo, quid regeram, nisi quod nulla fiat ingrati odoris mentio, quem planta, quasi a cimicibus obsideatur, spargit. *Stachyn Heracleam* All. Fab. Columna<sup>83</sup>, *Sideritidem scordioidem* Clusius<sup>84</sup> hoc nomine prodixerunt.

Cap. XXXIV. Sideritidem alteram, quam quivis rei herbariae gnarus pro *Poterio Sanguisorba* vel pro *Sanguisorba officinali* habuerit, ita Anguillara designat<sup>85</sup>, ut utra intelligatur, haudquaquam clarescat; siquidem utraque italico nomine *Pimpinella* venit. Sed priorem potissimum plantam hoc nomine illustrat Fab. Columna.<sup>86</sup>

Cap. XXXV. Sideritis tertia Dodonaeo videbatur *Geranium Robertianum*<sup>87</sup>, in quo et Anguillara congruit.<sup>88</sup> Fab. Columna *Saniculan europaeam*<sup>89</sup> pluribus, sed non satis firmis, argumentis stabilire studuit. Postremo Sibthorpius *Scrofulariam lucidam* subesse assumsit<sup>90</sup>, in quam sententiam multa me probabiliter argumentari posse confido.

Cap. XXXVI. De nomine *Ἀχιλλείου* Plinius: „Invenit et Achilles, discipulus Chironis, qua vulneribus mederetur, quae ob id Achilleos vocatur. Hac sanasse Telephum dicitur.“<sup>91</sup> Hinc et punicum nomen scribendum *χαῖτο χιλλός*, חֶצִיר חָלוֹם, herba Achillis, ut iam Bochartus monuit.<sup>92</sup> Sunt autem hic comprehensae tres species *Achilleae*: floribus albis, quae forte magna; floribus rubris, quae Ach. *tanacetifolia* All.; et aureis, quae vel Ach. *abrotanifolia* vel *tomentosa*.

Cap. XXXVII. *Rubus*, cum uberius non designetur, *fruticosus* esse videtur. *Κυνόβατος* vero *καταχορηστικῶς* cognominabatur; de ea enim Rosa iam (1, 123.) sermo fuit.

82) L. c. p. 769.

83) Ecphras. I. p. 128. 151.

84) Hispan. p. 390.

85) L. c. p. 257.

86) Ecphras. I. p. 124.

87) L. c. p. 62.

88) L. c. p. 257.

89) Phytobas. p. 59. t. 16.

90) Flor. graec. I. p. 436.

91) Lib. 25, 19.

92) Can. p. 757.



Cap. XXXVIII. *Rubum idaeum* hortensem omnes exuere aculeos, non novum est.<sup>93</sup> Rei herbariae patres tamen sub *R. idaeo* non spinoso interdum aliam intellexerunt speciem: e. g. *Tragus*<sup>94</sup> *Rubum*, ut videtur, *saxatilem*, etiamsi asserat, eum, in hortum transplantatum, mutatum fuisse in *Rubum idaeum*. Non defuerunt tamen, qui, Ruellio praecunte, *Fragariam* intelligi hoc *Rubum idaeo* inermi statucrent.<sup>95</sup> *Fraga* autem, a nullo Graecorum veterum scriptore memorata, Ovidio primo,<sup>96</sup> dein Plinio<sup>97</sup>, postremo Nicol. Myrepsico *φραγοῦλι* dicuntur.<sup>98</sup>

Cap. XXXIX. *Ἐλξίνη* haec prior, magnopere diversa a posteriore (c. 86.), bene iam a Val. Cordo *Convolvulo arvensi* assignatur, consentientibus Fuchsio<sup>99</sup>, Matthiolo<sup>100</sup> et Dodonaeo<sup>1</sup>, qui, ut a posteriore *δμωνύμη* distinguere, *μισσάμπελον* addiderunt.

Cap. XL. *Ἐλατίνη* plerique cum Matthiolo<sup>1</sup> faciunt *Linariam Elatinen* Desf., ob folia hastata magis cum *C. arvensi* comparandam, quam *Linaria spuria* Willd., pro qua et Lobelius<sup>3</sup> et Sibthorpius<sup>4</sup> habent. Haec enim folia subrotundo-ovata mucronata gerit, a *Conv. arvensis* foliis recedentia. Utraque autem in segetibus et cultis locis per Europam mediam ac australem non rara.

Cap. XLI. Nemo in *ἐνπατωρίω* ad systemata nostra denominando haerebit, qui Dioscoridis descriptionem vel obiter legerit. Est *Agrimonia Eupatorium* L. Regiam auctoritatem cum nomine sortita est, ut Plinii verbis utar<sup>5</sup>, a Mithridate Eupatore dicta. Cum Arabes accusentur, confusionem in huius herbae denominatione protulisse, in Serapione et Avicenna nihil invenio, quod ii vituperio ansam praebere potuerit. In Avicennae cor-

93) C. Gesner. de hort. Germ. f. 277.

94) L. c. f. 367<sup>a</sup>. Dalech. p. 124.

95) Val. Cord. in h. l. f. 64. Bauh. pin. p. 326.

96) Metam. 1, 104.

97) Lib. 25, 62.

98) Sect. 3. c. 46.

99) L. c. p. 258.

100) L. c. p. 715.

1) L. c. p. 396.

2) L. c. p. 716.

3) Adv. p. 197.

4) L. c. p. 430.

5) Lib. 25, 29.

rupto quidem textu sequentia lego: <sup>6</sup> غافث (*Gāfet*) „Haec est ex herbis asperis, et folium ei cannabis, seu folium pentaphylli, (et floris color) sicut nilufar.“ At Mesue describere plantam videtur diversam <sup>7</sup>, foliis centaurii parvi asperis incisisque; floribus subluteis, quae et herba publicum ob lentorem dicatur. Cum nonnisi versionem Mesuae latinobarbaram inspicere possim, quacnam vox Arabica centaurium minus reddita fuerit, plane ignoro. Cetera tamen haud plane dissentiunt, neque lentor quidam abest ab Agrimoniae nostrae summis partibus.

Confusio illa igitur non ab Arabibus ipsis Dioscoridis interpretibus profecta est, sed a Latinobarbaris, in quibus Matthaeus Sylvaticus *Argemoniam* s. *Agrimoniam* dicit Eupatorium, *Agrimonium* etiam Lappam inversam, quod de fructibus utique herbae nostrae dici potest. <sup>8</sup> In tractatu ipso de Eupatorio miratur Matthaeus, qui possint nonnulli Salviam agrestem pro Eupatorio vendere. <sup>9</sup> Is abusus valuit tamen ad Brunfelsium usque, qui Salviam, ut mihi videtur, Verbenacam hoc nomine delineavit. <sup>10</sup> Hinc Nic. Leonicensus iam invexit in eos, qui confusione hanc creaverint. „Quod medicus ille precabatur, qui medicinam sorti commiserat, Dii sua cuique remedia, quibus illa extraherentur, secundarent, itidem a nobis orandum, ut bona fortuna in verum incidamus auctorem.“ <sup>11</sup> Sed cur oras ac precaris, bone Leonicene, quando ponderis erat magni, invenire, quam Mesues voluerit plantam comparare? Equidem persuasum habeo post tot saecula, sicut in meo Avicenna loco القضا فيلون lego الغنطافيلون, ita et latinobarbarum interpretem legisse القنطاريون, et inde natas esse tot rixas et tam indignum Arabum contemptum.

„Alter rixatur de lana saepe caprina, et  
„propugnat nugis armatus.“

6) Ed. arab. p. 279. Cf. Anguillara, p. 258.

7) Opp. f. 58<sup>d</sup>. 8) Pandect. f. 9<sup>a</sup>.

9) Ib. f. 92<sup>c</sup>. 10) Herb. 2. p. 26.

11) De Plinii erroribus, lib. 1. c. 16. fol. 4<sup>b</sup>. (Opusc. Basil. 1532. fol.

Andr. vero Marinus suae editioni Mesuae inseruit Achilleae Agerati rudem iconem.<sup>12</sup> Brunfelsius iam latinobarbarum nomen Agrimoniam recepit ad Eupatorium designandum.<sup>13</sup>

Cap. XLII. Totidem fere verbis πεντάφυλλον describit Democritus ille ψευδώνυμος.<sup>14</sup> Neque alia est Theophrasti planta, de qua praecipit<sup>15</sup>: Ἡ δὲ τοῦ πενταφύλλου ἢ πενταπετοῦς<sup>16</sup> (καλοῦσι γὰρ ἀμφοτέρως) ῥίζα ὀρυζομένη μὲν ξυθρά, ξηραίνουμένη δὲ μέλαινα γίνεται καὶ τετραγώνος. Ἔχει δὲ τὸ μὲν φύλλον ὥσπερ οἶναρον<sup>17</sup>, μικρὸν δὲ, καὶ τὴν χοιρὰν ὁμοιον· καὶ αὐξάνεται καὶ φθίνει ἅμα τῇ ἀμπέλῳ· πάντα δὲ πέντε τὰ φύλλα. διὸ καὶ ἡ προσηγορία. Καυλοὺς δὲ ἐπὶ γῆς ἴησι λεπτοὺς, καὶ κνήμας ἔχει πυκνάς. *Potentillam* esse *reptantem*, Matthiolus iam bene perspexit.

Cap. XLIII. Φοῖνιξ est *Lolium perenne*, vulgare per Europam Asiamque mediam gramen. Dictum fuisse videtur διὰ τὸ φοινικοῦν χρῶμα τοῦ σπέρματος, sicut et Schreberus pingi semen curavit.<sup>18</sup>

Cap. XLIV. Idaeam radicem plerique rei herbariae instauratores vel silentio transierunt, vel, quid sit, nescire se fassi sunt: excepto uno fere Anguillara, qui, frequentem esse in saltibus Italiae, docet. Folia esse rusco similia, capreolos iuxta folia emitti, qui baccas rubicundas gerant. De flore silet.<sup>19</sup> Est sine dubio *Streptopus distortus* Mx., seu *Uvularia amplexifolia* L., cuius pedunculi medio geniculato-refracti sunt ἑλικες μικραὶ, ἐξ ὧν τὸ ἄνθος. Primus eam herbam Matthiolus laurus alexandrinae nomine evulgavit.<sup>20</sup> Quam Fab. Columna initio huc retulerat plantam<sup>21</sup>, dein meliora edoctus, Laurum dixit alexandrinam, Ruscum Hypophyllum.<sup>22</sup>

Cap. XLV. Rhodiam radicem, licet hospitem, ut ar-

12) L. c. f. 59<sup>a</sup>.

13) Herb. 3. p. 68.

14) Geopon. 2, 6.

15) Hist. 9, 13.

16) Nicand. ther. v. 839. τὸ πενταπέτηλον.

17) Hesych. Οἶναρα τὰ τῆς ἀμπέλου φύλλα.

18) Gram. germ. 1. t. 37. f. 5.

19) L. c. p. 259.

20) L. c. p. 841.

21) Phytobas. p. 51. t. 15.

22) Ecphr. 1. p. 164.

bitratur; in Germania, primus aperuit Tragus.<sup>23</sup> Est *Sedum Rhodiola* Cand. seu *Rhodiola rosea* L. Provenit tamen omnino in Silesiae alpestribus, in Austria, Helvetia; Britannia, maxime vero in Italiae montibus.

Cap. XLVI. „Equisetum, Plinius loquitur<sup>24</sup>, hippuris a Graecis dicta, et in pratis vituperata nobis: est autem pilus terrae, equinae setae similis.“ Et disertius iste Democritus, quem ad c. 42. allegavi: *Ἡ ἵππουρις ἐκ τοῦ ἐτύμου τὸ ὄνομα ἔσπασεν· ἔστι γὰρ ὁμοία τῇ τοῦ ἵππου οὐρᾷ, ἔχουσα τὰ φύλλα ταῖς θριξίν ὅμοια, καὶ αὐτὸν τὸν καυλὸν ἀγόμενον ἀπὸ τῆς ῥίζης ὡς ἐπὶ τὸ ἄκρον λεπτότερον· αὐτὸς δὲ ὁ καυλὸς ἐστὶ κενὸς, ὡς ὁ κάλαμος, ἔχων τὰ ἄρθρα διηρημένα, ἐξ ὧν ἄρθρων αἱ τριχῶδεις φυλλάδες πέφυκαν· ἐκ τοῦ δὲ εἶναι, αὐτὸ σαλπίγγιον προσαγορεύεται.*<sup>25</sup> Quae licet descriptio egregia est, dictio tamen alexandrina prodit nobis aetatem istius Democriti.<sup>26</sup>

Est autem nostrum *Equisetum fluviale*, quod Tragus primus adumbravit.<sup>27</sup>

Cap. XLVII. Altera hippuris est *Equisetum limosum*, pariter a Trago eodem loco delineatum.

Cap. XLVIII. *Quercus coccifera*, Sardiniae Siciliaeque indigena, vulgatissima vero in omni Graecia, Asia minore ac Syria, hospites recipit Cocca (Chermes), vermiculos, qui proprio succo tubercula seu bacculas pisi-formes producunt, pretiosi coloris fontem. Eum colorem cum prisca mortalium gens iam a vermibus illis derivaret, a persica voce كرم, *vermis*, nata sunt vocabula חֲמִצְתַּיִם seniorum Ebraeorum<sup>28</sup> et قَرْمَز (kermes)<sup>29</sup> Arabum. Antiqui Ebraei a עֲרֵמָה, *verme*, colorem eum vel simpliciter sic, vel apposito עֲרֵמָה, a سناء Arabum, *splendere*, itaque עֲרֵמָה עֲרֵמָה vocarunt.<sup>29</sup> Theophrastus τὸν φοινικεῖον κόκ-

23) L. c. f. 544<sup>b</sup>. 24) Lib. 26, 83.

25) Geopon. 2, 6. 26) Τὸ ὄνομα ἔσπασεν . . . αἱ φυλλάδες πέφυκαν, formae sunt alexandrinae. Sext. Empir. adv. grammat. 1, 10, 213.

27) L. c. f. 264<sup>a</sup>. 28) 2 Chron. 2, 6, 15.

29) Exod. 25, 4. Pari modo lo *vermeu* vocatur in Gallia provinciali, gallice *vermeillon*.



νον in πρίνω inveniri statuit: discrimina scilicet Qu. Ilicis et cocciferae eiusmodi sunt, ut facile negligantur: tomentum in inferiore foliorum facie, squamaeque cupulae arcte imbricatae in Ilice, cum squamae patulae sint in Qu. coccifera, folia autem subtus glabra. Πρίνον dictam fuisse arbusculam patet et e Simonidis verbis a Plutarcho servatis.<sup>30</sup> Ab Ionibus vocatam fuisse κόκκον, a Galatis ultra Phrygiam degentibus ὕς<sup>31</sup>: esse fruticem magnitudine rhamni, Pausanias asserit<sup>32</sup>, qualem frequentem vidit circa Ambryssum Phocidos. Comparat folia cum σχοίνω, pro quo πρίνω legendum. Fructum nominat, qui a nostro dicitur κόκκος ὡς γαρός, cuius molem ervo comparat. Garidelius esse coccum pisi fere magnitudinis in Galloprovincia tradit.<sup>33</sup> In eo fructu nidulari animalculum, Pausanias refert, cuius sanguis colorem largiatur: perfectum id animalculum κώνωπι simile esse. Eius animalis historiam Emericus, medicus Aquensis, bene aperuit.<sup>34</sup> In Cilicia noster coccum esse exilis cochleae similem: *cusculium* vocat Plinius<sup>35</sup>, sicut Hesychius κοσκυλμάτια, τὰ τῶν βυσσῶν περικομμάτια.<sup>36</sup> Στόνυξιν colligere mulieres in Cilicia coccum, intelligitur ex Hesychio: Στόνυχες, τὰ εἰς ὃν λήγοντα, καὶ τὰ ἄκρα τῶν ὀνύχων.<sup>37</sup> Itaque unguium ope acutorum decerpserunt coccum, quemadmodum id etiamnum in Gallia fit provinciali.<sup>38</sup> Tychsenii igitur emendatio aliis omnibus praeferenda.

Cap. XLIX. Honorius Bellus primus τράγιον, ob

30) Vit. Thes. c. 17. φοινίκεον ἰστίον ὑγρῶν πεφυρμένον πρίνον ἄν-  
θει ἐριθάλλου.

31) *Anau* est nomen arbusculae galloprovinciale. *Houx* appellatur Ilex Aquifolium.

32) Lib. 10. c. 36.

33) Hist. plant. Aqu. sext. p. 246. 249. Eodem modo Belonius obs. 1, 17. p. 24. ed. Clus.

34) Garidel. l. c. tab. ad p. 254. fig. 8. 9. animalculi perfecti icon.

35) Lib. 16, 12.

36) Schol. Aristoph. equit. v. 49.

37) Schol. Apollon. Rhod. 4. v. 1679.

38) Garidel. l. c. p. 254. Il y a des femmes, qui en ramassent jusqu'à deux livres par jour. Leur habileté consiste à avoir épié par avance les endroits, où il y en a beaucoup, et sur tout à avoir les ongles longs, et à les cueillir le matin avant la rosée.

odorem hircinum sic appellatum, ad *Hypericum hircinum* L. reducit<sup>39</sup>, quod, quanquam in Creta proveniat, haud tamen in ea sola observatur, sed et in Sicilia et Italia inferiore non rarum est. Resinosum inde liquorem stillare, Bellus quoque animadvertit. Et Belonius congruit, Tragium verum in Creta secundum rivulos crescere, luteo flore, fructu *Cecilianae* (Hyperici Androsaemi.)<sup>40</sup>

Cap. L. Alterius Tragii cognomen punicum esse ἄχαισιμ, βοτάνην τῶν Ἀχαιῶν, Bochartus autumat.<sup>41</sup> Sed cur Phoenicibus Graeci Ἀχαιοί dicti? Nonne פְּנִי יָוֹנִים, יְרֵנִים erat appellatio Graecorum sueta apud Ebraeos? An ideo temeritatis arguar, si coniecero, eam vocem ex transpositione et corruptione מֶנְחִים (ἀναχίμ) natam esse, ut foetidum odorem (זוּחַ, foetere) exprimat?

Tragium alterum a Columna egregie illustratum, est a me dictum *Tragium Columnae*.<sup>42</sup> Aliorum hallucinationes mittamus: e. g. Dalechampii<sup>43</sup>, qui Botrychium Lunarium huc trahit.

Cap. LI. Tragium fruticem, bene descriptum, iam Ruellius agnovit, dein Dalechampius<sup>44</sup> et Camerarius<sup>45</sup> uberius illustrarunt. Est *Ephedra distachya* L., ad oras maritimas Europae australis frequens. Calyces baccati, rufi, apice acuti, numerosi, bene expressi sunt a Dioscoride. Itaque Matthiolus non audiendus, qui *Salsolam Tragum*, spinosam plantam herbaceam, nec foliis destitutam, nec fructus uvarum forma gerentem, huc traxit.<sup>46</sup>

Cap. LII. Nomen σχοίνου punicum Bochartus ingeniose exponit ex ebraeo שְׁחִינִי, שְׁחִינִי מֶלֶךְ.<sup>47</sup> Ipsae autem σχοίνου species sequentes esse videntur: ὀξύσχοινος, ἄποξυς ἐπ' ἄκρου, *Iuncus acutus*<sup>48</sup>, in litoribus Graeciae copiosus: ὀξύσχοινος ἄκαρπος, *Scirpus palustris*, quia semina saepe non perficiuntur: ὀξύσχοινος, cuius fructus

39) App. ad Clus. hist. 2. p. 305. Pona mons bald. p. 81.

40) Obs. 1, 17. p. 23. ed. Clus. 41) Can. p. 757.

42) Phytobas. p. 61. t. 17. 43) L. c. p. 1315.

44) L. c. p. 1338. 45) Hort. p. 171. t. 46.

46) L. c. p. 731. 47) Can. p. 757.

48) Anguill. p. 264. Flor. graec. 1. p. 240.

niger, rotundus, cuiusque culmi crassiores et carnosiores sunt, forte *Scirpus lacustris*, semina vero haud nigra sunt, sed pallida, aut *Sc. maritimus*. Tertia multo carnosior, ὀλόσχοις, quae et in summitate fructum gerit, ob hanc ipsam causam *Sc. Holoschoenus* esse nequit. *Cladium* potius *germanicum* Schrad., seu *Schoenus Mariscus* L., ut iam Val. Cordus voluit, esse videtur: crescit id et in paludibus Peloponnesi.<sup>49</sup> Ὀλόσχοις Theophrasti, quanquam obscure, ita tamen describitur, ut ad hanc ipsam speciem valeat conclusio<sup>50</sup>: spicatum enim affixos habet pedunculos et semen ipsum cuspidatum (ἀκιδώδες), quale in nucula Cladii contemplamur. Hunc esse ad vitilia commodiorem. Sed et e μελαγκρανίδι s. μελαγκρανίξ Balearium insularum incolae σφενδόνας circa caput gerendas texebant.<sup>51</sup> Et nostra aetate in Graecia Iuncum acutum adhiberi ad corbes aliaque opera viminea, testatur Sibthorpius.<sup>52</sup>

Cap. LIII. De lichene in roscidis petris nascente aliter Plinius<sup>53</sup>: „Nascitur in saxosis, folio uno ad radicem lato, caule uno parvo, longis foliis dependentibus.“ „Et aliud genus lichenis, petris totum inhaerens, ut muscus.“ Posterius igitur genus idem esse videtur, ac Dioscoridis. Hoc arbitrabatur Fab. Columna esse *Parmeliam parietinam*: illud *Marchantiam conicam*.<sup>54</sup> Neutra tamen in roscidis petris, sed illa magis in arborum cortice, haec ad rivulos umbrosos nascitur. Nihilominus Plinii lichenem primum ad Marchantiae genus pertinere, in confesso est: folia quippe longa dependentia non ad literam sumenda sunt: videntur elateres esse subtilissimi, quibus semina adhaerent. Forte etiam intelliguntur radii receptaculi fructiferi, qui saepe inclinant. Namque *Marchantia polymorpha* subesse omnino videtur. Lichen autem Dioscoridis ad *Peltigeram caninam* vel *aphthosam* Hoffm. referendus est, neque ad *Stictam pulmonaceam* Achar., cum

49) Flor. graec. 1. p. 28.

50) Hist. plant. 4, 12.

51) Strabo lib. 3. p. 449.

52) Walpole, p. 243.

53) Lib. 26, 10.

54) Ecphr. 1. p. 330.

qua iungunt post Matthiolum<sup>55</sup>, qui vires magis praedicatas medicas, quam loca natalia respiciunt. Etenim posterior querebus annosis, nec rupibus, innasci consuescit.

Cap. LIV. *Ἡρώωνυχίαν* Anguillara recognovit<sup>56</sup> tanquam *Polycarpon tetraphyllum*, quod in locis petrosis Italiae proveniens utique congruit. Matthiolus id etiam Paronychia<sup>57</sup> alterius nomine bene expressit. Sed adiunxit etiam Rutam murariam. Lobelius *Drabam vernam*<sup>58</sup> Clusius tandem *Paronychiam hispanicam* Cand.<sup>59</sup> illustravit, licet ipse fateretur, a veterum planta diversam esse.

Cap. LV. *Χρυσόχομη* nomen puniceum *δουβά* facillime e syriaco *ܕܘܒܐ*, *aurum*, eruitur. Alterum nomen *βουόχουμά* cohaeret cum arabico *برعم*, *calyx floris*. Ipsa planta tandem adumbrata est a Fab. Columna,<sup>60</sup> postquam Matthiolus scripserat, se in tota Italia invenisse neminem, qui sibi eam ostenderet plantam.<sup>61</sup> Est vero *Chrysocoma Linosyris* L.

Cap. LVI. *Χρυσόγορον* est planta admodum rara, quam ante Rauwolfium nemo, et post eum pauci cognoverunt. Is in Syria inventam descripsit et icone illustravit.<sup>62</sup> Aliam quidem, sed satis mediocre, a Corvino, equite romano, acceptam, exhibuit Barrelierus.<sup>63</sup> Tandem et prope Abydum Hellesponti se plantam invenisse memorat Sibthorpius.<sup>64</sup> Est *Leontice Chrysogonum* L.

Cap. LVII. *Ἐλίχρυσον ἐλαόχρυσον* a Theophrasto scribitur. Caulem tenuem durumque, foliis albidis, ferre florem aureum, quo coronatus gloriam consequuturus esse credatur.<sup>65</sup> *Ἐλίχρυσος* dicitur Theocrito<sup>66</sup> et Athenaeo.<sup>67</sup> Eademne sit Theophrasti planta ac Dioscoridis, ambigendum est, cum folia albidia a nostro non dicantur, sed abrotani folia aemulantia. Quod indicium sequuntur ob-

55) L. c. p. 733.

57) L. c. p. 734.

59) Hist. 2. p. 183.

61) L. c. p. 735.

62) Iter n. 119. Dalechamp. app. p. 28.

63) Icon. t. 1113.

65) Hist. pl. 9. 19.

67) Lib. 15. c. 27.

56) L. c. p. 264.

58) Adv. p. 196. Obs. p. 249.

60) Ecphras. 1. p. 81. 82.

64) Flor. graec. 1. p. 234.

66) Id. 1, 55. 2, 79.



vium venit *Tanacetum annuum*, Europae australis incolae. Id etiam plerique rei herbariae patres statuerunt, praeter Matthiolum, Clusio herbam bene delineante.<sup>68</sup> At miror, veteres odoris singulariter fragrantis non meminisse, quem compositum credideris e pomorum cavilleorum et cydoniorum odore. Gnaphalium Stoechas, a Valer. Cordo<sup>69</sup> et Sibthorpio<sup>70</sup>, iuxta ac Gnaphalium orientale ab Hon. Bello<sup>71</sup> huc relata, aliena foliis sunt.

Cap. LVIII. *Χρυσανθέμου* nomen punicum est arabicum: قرصا enim et قرصة (*korrasath*), est chamaemeolum, ab orbiculari florum forma dictum. Planta ipsa *Chrysanthemum* est coronarium, quod omnes agnoscunt.

Cap. LIX. *Ἀγήρατον* a Matthiolo<sup>72</sup> et plerisque sequentibus *Achillea Ageratum* habetur. Quod etiamsi plane negare haud audeam, addubitandi tamen locum praebet tum parva aut nulla cum origano affinitas, tum quod flos haud tamdiu coloris speciem servet.

Cap. LX. In verbenae cognominibus aegyptiis multus est Rossius. *Πεψευπτέ* interpretatur herbam virtutis divinae<sup>73</sup>, et quod est apud Apuleium *diosatum*, *Dei caudam*.<sup>74</sup> Punicum nomen alterum, ab Apuleio servatum,<sup>75</sup> Bochartus bene exposuit. *Azirgozol* est *הציר בוזל*, herba columbae. Alterum *zimicum* mihi potius cognatum cum arabico *عجم*, *beneficus*, esse videtur. *Περισσέωνος* autem nomen Cratevas deduxit ex ita incisis foliis, ut cum columbae pedibus comparari possint.<sup>76</sup> *Verbena officinalis* erat, qua Romani imprimis ad magicas artes utebantur.<sup>77</sup> Utramque verbenam Plinius in unum caput contrahit<sup>78</sup>: „Nulla romanae nobilitatis plus habet, quam hierabotane. Aliqui peristeriona, nostri verbenacam vocant. Hac Iovis mensa verritur, domus purgantur lustranturque, Generis eius duo sunt: foliosa, quam feminam

68) Clus. hist. 1. p. 326.

69) Comm. in Diosc. f. 65 h.

70) Flor. graec. 2. p. 169.

71) Ad Clus. p. 300.

72) L. c. p. 740.

73) Etym. aeg. p. 158.

74) Ib. p. 66.

75) Cap. 65.

76) Schol. Nicandr. ther. v. 860.

77) Virg. ecl. 8, 65. Horat. od. 1, 19, 4, 11.

78) Lib. 25, 59.

putant, mas rarioribus foliis. Ramuli utriusque plures, tenues, cubitales, angulosi. Folia minora, quam quercus, angustioraque, divisuris maioribus: flos glaucus: radix longa, tenuis. Nascitur ubique in planis aquosis. Quidam non distinguunt, sed unum omnino genus faciunt, quoniam eosdem effectus habeat. Utraque sortiuntur Galli et praecinunt responsa. Sed Magi utique circa hanc insaniunt.<sup>79</sup> Et alio loco<sup>79</sup>: „Non aliunde sagmina in remediis publicis fuere et in sacris legationibusque verbenae. Certe utroque nomine idem significatur, hoc est, gramen ex arce cum sua terra evulsum: ac semper e legatis, cum ad hostes clarigatumque mitterentur, id est, res raptas clare repetitum, unus utique Verbenarius vocabatur.“ Itaque transiit nomen a privata hac herba ad alias verbenas, herbenas quasi, quaecunque adoleri possent.

Cap. LXI. Altera igitur est *Verbena supina*. In distinguenda autem utraque specie maiores nostri passim graviter lapsi sunt. Brunfelsius priorem recte *Verbenam officinalem*, hanc *Senecionem vulgarem* habet.<sup>80</sup> In priore sola acquiescit Tragus<sup>81</sup>, alteram haud satis se nosse fassus. Fuchsius pro *Verbena mare*, *Turritidem Loeselii* R. Br. et pro *Verb. supina officinalem* ponit.<sup>82</sup> Optime vero utramque iuxta se collocatam primus distinguit Dodonaeus.<sup>83</sup>

Cap. LXII. *Ἀστράγαλος* a Fab. Columna ad *Orobum vernum* reducitur.<sup>84</sup> Eius vero radix cum lignosa sit et ramosa, nec rotunda dici aut cum raphano comparari potest. Praeferendus potius videtur *Orobis tuberosus*, cuius radix tuberibus rotundis, appendiculatis ac inter se implicitis obsessa est. Utraque in sylvis ventosis montosisque Graeciae totiusque Europae provenit. Tuber posterioris in Norvegia comeduntur, ut etiam mercaturam constituent.<sup>85</sup> Nescio an eadem planta sit, quam

79) Lib. 22, 3.

80) L. c. tom. 1, p. 119. 120.

81) L. c. f. 80.

82) L. c. p. 593. 594.

83) L. c. p. 150.

84) Phytob. p. 48. t. 14.

85) Horneman's dansk oeconom. Plantelaere, p. 762.

Anguillara in Graecia suo tempore sic appellatam describit.<sup>86</sup>

Quam primus Lobelius<sup>87</sup> introduxit *Astragali syriaci* nomine, planta est valde obscura, a me dubitanter ad *A. aduncum* Willd. relata. Effigies tamen loco Lobelii citato bene respondet ἀστράγαλλω Dioscoridis. Matthioli icon<sup>88</sup>, licet ab aliis repetita, fictitia esse videtur. *Phacam baeticam*, a Clusio hoc nomine propositam<sup>89</sup>, alienam puto, ob flores ochroleucos, radicem praegrandem, fusiformem tamen et habitum erectum. Crescit utique, praeter Hispaniam ac Lusitaniam, et in Poloponnese.<sup>90</sup>

Cap. LXIII. Hyacinthus hic, ab aliis (c. 20.) distinguendus, *Hyacinthus* est *orientalis*, a Matthiolo primo, ni fallor, illustratus.

Cap. LXIV. Papaver Rhoeas Dioscoridis ob capsulam oblongam semenque rufum nostra sic dicta planta esse nequit, sed videtur *Papaver dubium*, cuius flores, licet vulgo punicei, interdum tamen et albi obveniunt.<sup>91</sup>

Cap. LXV. Sub *Papavere sativo* nominatur sylvestre quoddam genus demissa capsula ac oblonga et semine nigro, quod et ροιὰς et πιθίτις nominetur. Hoc est *P. Rhoeas* L. Tertia vero species φαρμακωδεστέρα καὶ μακροτέρα, quae et κωδίαν (capsulam) oblongam habeat, nisi fuerit *P. Argemone* (lib. 2. c. 208.), nescio, quaenam intelligatur.

Quantum noster experientiae tribuerit, ex iis praecipuis elucet, quae contra Diagoram et Andream profert, usum opii in collyriis damnantes. At vero et Galenus adversus Apollonium monet, collyria ex opio multis detrimento esse, cum debilem visum et ἀμβλυωπίαν, quin et auditus difficultatem adducant.<sup>92</sup> Et alio loco vituperat medicorum vulgus, qui medicamenti ex opio, man-

86) L. c. p. 267.

87) Obs. p. 525.

88) L. c. p. 743.

89) Hist. pl. 2. p. 234.

90) Flor. graec. 2. p. 84.

91) Iacq. fl. austr. 1. t. 24. Marsch. Bieberst. fl. taur. cauc. 2. p. 5.

92) De compos. med. sec. loc. 2. p. 533.

dragora et hyoscyamo compositis oculorum summam perniciem producant.<sup>93</sup>

Cap. LXVI. Papaveris cornuti nomen punicum Bochartus e syriaco [𐤒𐤍𐤏] 𐤒𐤍𐤏𐤍 (*semsem ukhomo*) derivat, quod igitur *sesamum nigrum* denotat.<sup>94</sup> Esse autem *Glaucium luteum* Scop., bene iam Tragus probavit.<sup>95</sup>

Cap. LXVII. *Μήκων ἀφρώδης* vel *Ἡράκλεια* magnopere torsit Dioscoridis interpretes. Radicem facit Theophrastus albidam, superficalem, album etiam fructum et folia struthio similia. Vomitiones producere idem testatur.<sup>96</sup> Fueritne igitur *Gratiola officinalis*, quod iam Anguillara anguratus est?<sup>97</sup> Silenem inflatam Sm. praefert Lobelius<sup>98</sup>; sed huius vis emetica cognita non est. Multo minorem assensum meretur Fab. Columna, si Gentauream Cyanum huc trahit.<sup>99</sup> Spuma, qua obsidetur planta, sunt excrementa cicadae, quam Cercopin spumariam appellant. Occupat ea varias plantas, vernacule *Kukuks-speichel* vocata.

Cap. LXVIII. *Hypocoum procumbens* primus hoc nomine Dodonaeus stabilivit.<sup>100</sup>

Cap. LXIX. Nomen hyoscyami aegyptiacum *σαφθῶ* Rossium *caput tentans, infestans* interpretatur.<sup>1</sup> In Apuleio (c. 5.) nomen punicum, *gingan*, occurrit, quod Bochartus<sup>2</sup> idem cum arabico *بندج* (*bandsch*) putat.

Tres autem species Hyoscyami enumerantur: prima floribus subpurpureis est *H. reticulatus*, in Creta et Syria obuius, quem Io. Camerarius<sup>3</sup> adumbravit: alter floribus luteis est *H. aureus*, in Graecia vulgaris: tertius floribus albis, ceterum pinguis et lanuginosus, est *H. albus*, in Europa australi vulgaris.

93) Meth. med. 3. p. 171. 94) Can. p. 759.

95) L. c. f. 46<sup>b</sup>. 96) Hist. pl. 9, 12.

97) L. c. p. 268. 98) Adv. p. 143.

99) Phytobas. p. 74. t. 21. 100) L. c. p. 449.

1) L. c. p. 184. 2) L. c. p. 762.

3) Hort. med. p. 77. t. 22. Sed antea iam Clusius (pannon. p. 502.) *H. peregrini* nomine, e Syria missi, tetigerat.



Cap. LXX. *Psyllii* cognomen *punicum* est corruptum arabicum *برغوثي* (*bargutsi*), quod bene iam Bochartus docuit.<sup>4</sup> Planta ipsa nihil habet difficultatis: est *Plantago Psyllium*.

Cap. LXXI. *Strychni hortensis* nomen aegyptium ab herpetibus sublatis ortum duxisse, Rossius testatur.<sup>5</sup> Nomen *punicum* est *הַצִּיר הַשְּׂמֹנִי*, *herba Esmuni*, i. e. *Aesculapii*.<sup>6</sup>

Dicitur autem *hortensis strychnos*, non quia colitur in hortis, sed quia ibi et in locis cultis frequens et spontaneus est. Habuerunt omnes pro *Solano nigro*, aut, dum fulvae sunt baccae maturae, *Sol. miniato* Bernh.

Cap. LXXII. *Strychnos halicacabus* est *Physalis Alkekengi*, cuius nomen graecum *ἀλικάναβος* a *κάναβος*, *sartago*, *olla*, ortum ducit, quoniam calyces fructiferi eam formam praebent. Ea vox male scripta transiit in arabicum *الكاكنج* (*alkakendsch*), quod in nomine triviali superest.

Cap. LXXIII. *Strychnon somniferum* Clusius<sup>7</sup> et cum eo plerique habuerunt pro *Physalide somnifera*. Respondent utique omnia, si recesseris a flore: hic enim non grandis est et ruber, sed parvus et pallidus. Itaque et *Hyoscyamum Scopoli*am, in agro Goritiensi inventam, Matthiolus Solani somniferi alterius nomine delineari curavit.<sup>8</sup> Obstat tamen et hic fructus color, qui non croceus, sed nigro-purpurascens est. Itaque in *Physalide somnifera* subsistendum, et floris color ex errore auctoris sive e sphalmate librariorum exponendus. Est eadem *στρύγνος ἐδωδιμος* Theophrasti<sup>9</sup>: baccae enim comeduntur, et *ὕπνωτικός*<sup>10</sup>, cuius descriptio cum Dioscoridis quidem congruit. Sed de flore nihil praedicat Theophrastus, fructum autem tradit esse *ἐρυθρότερον κόκκινον*.

Cap. LXXIV. *Στρώγγιον μανικόν* proxime accedit ad

4) Can. p. 759.

5) L. c. p. 4.

6) Damasc. apud Phot. cod. 242. p. 352.

7) Clus. hist. 2. p. 85.

8) L. c. p. 753.

9) Hist. pl. 7, 7. 15.

10) Ib. 9, 11.

*Solanum sodomaeum*, quod et in Sicilia et in Lusitania sponte provenit. Huius enim folia profunde laciniata et aculea' a ad erucae, magis etiam ad acanthi folia accedunt: caulis est fruticosus et apud nos cubitum altus: flores pallide caerulescentes, baccae sunt nigrae. Earum pulpam Hermannus virulentam observavit, inducentem καρηβαρίαν, torporem, furorem ipsamque necem.<sup>11</sup>

*Solanum esculentum* Dunal. (S. insanum et Melongena L.), quod etiam huc traxerunt, alienum est fructu magno, oblongo, esculento, plerumque violaceo, neque nocivum quid in aliis plantae partibus observatum est.

Fab. Columna in hoc capite duas distinguit plantas, textu temere mutato. Alteram, flore nigro et fructu molli, Atropam esse Belladonnā, alteram, ad quam caput olivae forma, sed hirsutius, ut platani globuli, reducit, esse Daturam Stramonium perhibet.<sup>12</sup> Nescius forte fuit, hanc plantam medio tandem aevo ex interioribus Asiae mediae in Occidentem migrasse. Bodaenus talem audentiam imitaturus, e Plinio varia etiam addit, ut textum restituat.<sup>13</sup>

Θρύον tanquam magica Colchorum planta, iam Orphicis notum fuit.<sup>14</sup> Ηέροσιον cum περσέα commutatum fuisse, iam supra monui.<sup>15</sup> Quale autem fuerit λυκοπέρισιον Galeni, quod aliqui ad *Solanum esculentum* retulerunt, Anguillara etiam ad *Lycopersicon esculentum* Dunal., americanam plantam<sup>16</sup>, non liquet. Centurio quidam herbam eam ex barbarica circa Aegyptum regione comportatam Galeno ostenderat.<sup>17</sup> Tam gravi et inamoenus erat odore, ut ne gustare quidem Galenus auderet, sed letalem esse coniiceret. Cicutam odore quidem aemulabatur, sed adiuncta quadam εὐωδία ἀρωματίζούση. Nihil addit, nisi colore subflavo fuisse herbam.

*Solanum esculentum* huc non pertinere, etiam inde patet, quod Arabes illud seorsim semper nomine persico

11) Hort. lugdunobat. p. 574.

12) Phytobas. p. 37. t. 12.

13) Comm. in Theophr. p. 586.

14) Orph. Argon. 1, 916.

15) Lib. 1. c. 187.

16) L. c. p. 217.

17) De fac. simpl. 4. p. 681.

بازنجان (*badendschân*), unde forte *Melanzân* et *melon-gena* orta sunt, tractant. De solanis autem peculiari capite, inscripto nomine جنب الثعلب, agunt.

Cap. LXXV. Rondeletius et Lobelius *Dorycnium monspeliense* Willd. iam hoc nomine insignierunt<sup>18</sup>: neque regeri aliquid potest, si formam, colorem et locum natalem respexeris. De viribus enim nihil innotescit, neque ipse Dioscorides eas expertus est, quod verba δοκεῖ — quasi δὲ τινες indicant.

Maiori tamen iure et Imperatus<sup>19</sup> et Caesalpinus<sup>20</sup> et Clusius<sup>21</sup> *Convolvulum Cneorum* introduxerunt, fruticulus in Sicilia et Archipelagi insulis proveniente, foliis lanceolatis, argenteo-sericeo-tomentosis, quae cum oleae foliis comparari possunt. Caesalpinus loco στενότερα στενότερα legi suadet. Flores sunt candidi, umbellati: nec in capsulis plura quam quina aut sena semina latent. Affinem *Convolvulum* Linnaeus *Dorycnium* nominavit, in Creta et Peloponneso obvium. Longissime autem a veritate abest Valer. Cordus, dum *Cardiospermum Halicacabum*, indicam plantam, et quae foliis quam maxime recedit, huc trahit.<sup>22</sup>

Sed confusio nata est e commutatis ἀλικακάβου, στρύχνου *μανικοῦ* et *δορυχνίου* appellationibus, quod tum e nostro, tum ex aliis scriptoribus patet. Sic auctor alexipharmacorum<sup>23</sup> στρύχνον *μανικὸν δορυχνίου* nomine tractat. Et Plinius<sup>24</sup>: Hoc esse venenum, quod innocentissimi auctores simpliciter dorycnion appellaverint, ab eo quod cuspides in proeliis tingerentur illo passim nascente. Qui parcius insectarentur, manicon cognominasse. Galenus etiam: στρύχνου, οἱ δὲ *δορυχνίου*.<sup>25</sup>

Cap. LXXVI. Tria hic mandragorae genera distinguuntur. Duo priora bene, ut ab αὐτόπτη, descripta: tertium e traditione. Mandragora femina, nigra, foliis

18) Adv. p. 589. 19) Hist. nat. p. 753.

20) Lib. 9. c. 27. 21) Hist. 2. p. 254.

22) In Diosc. f. 67<sup>a</sup>. Hist. f. 89<sup>a</sup>.

23) Vide supra p. 14, 21. 24) Lib. 21, 195.

25) De compos. med. sec. loca, 10. p. 356.

angustioribus, fructibusque vel sorbi forma vel pyri, est *Mandragora autumnalis* Bertolon., foliis oblongo-lanceolatis, acutis, undulatis, floribus autumnalibus, baccisque oblongis. Mas autem Dioscoridi et albida dicta, foliis magnis, betae similibus, fructibus maioribus, croceis, odoratis, est *Mandragora vernalis* Bertolon., quae foliis ampis, ovatis, obtusis bullatis gaudet, fructus autem fert globosos, postquam vere floruerit. Utraque species et in Italia et in Graccia, speciatim circa Athenas occurrit.<sup>26</sup> Tertia mandragora, quam et *μώριον* vocari tradit, vel eadem est cum mare, vel, quod Valer. Cordus innuit, *μανδραγόρας* Theophrasti<sup>27</sup>, qui cum caulescat, fructusque ferat nigros, succo vinoso scatentes, suspicionem attulit Anguillarae, esse Belladonnam<sup>28</sup>, annuente quoque Dodonaco.<sup>29</sup>

Duplicem autem radicis formam humanam esse, alteram femineam, masculam alteram, fabula est, cuius originem apud Arabas investigamus. Avicenna enim, *ابروح* nomine plantam insigniens, eam ipsam vocem, tanquam peregrinam ex imagine formae humanae exponit.<sup>30</sup> Iam cum Abulfadli testetur, esse syriacam vocem<sup>31</sup>, eo libentius e syriaco *ܡܪܝܢܐ*, *spiritus*, et *ܡܪܝܢܐ*, *concupiscere*, natam esse arabicam vocem contendimus. Cupidines igitur a spiritibus seu daemonibus productas significat.<sup>32</sup> Itaque videmus ab Arabibus fabulas illas praeprimis foveri, quod et alia confirmant testimonia.<sup>33</sup> Per omne autem medium aevum ad seriora usque tempora vignerunt eae fabulae, nec defuerunt agyrtae, qui foeda fraude credulum vulgus circumvenirent, dum e bryoniae radice arte sculpta formarent virilem femineamque effigiem, quam

26) Wheleri iter gall. p. 528. 529.

27) Hist. pl. 6, 2. 28) L. c. p. 90.

29) L. c. p. 456. 30) Ed. arab. p. 187.

31) Apud Gels. hierob. 1. p. 6.

32) Bochartus igitur fallitur, dum ex arab. *ܡܪܝܢܐ*, *miraculum*, exponit.

33) Herbelot biblioth. orient. pag. 17. Casiri bibl. escur. 2. p. 554.



utramque pluribus aureis etiam nummis vendiderunt.<sup>34</sup> Quaestum eo maiorem facere potuerunt praestigiatōres illi, quo magis inveteraverat opinatio de fecundante mandragorae vi. Nata haec opinio videtur ex celebrata antiquitas in rebus amatoriiis efficacia mandragorae. Hinc et LXX. et Iosephus<sup>35</sup> Dudaim Leae<sup>36</sup> *μῆλα μανδραγορῶν* vertunt: et Venus ipsa *μάνδραγορίτις* vocatur.<sup>37</sup> Sed non defuerunt, qui medio iam aevo fabulas illas monachorum irriderent, Io. Platearii exemplo<sup>38</sup>, quem et herbarius saeculi decimi quinti citat.<sup>39</sup>

Usus mandragorae ad sopiendas vires in antiquitate celebratissima est, ut et in proverbium abierit: *ὑπὸ μανδραγόρου καθεύδειν*.<sup>40</sup> De inertia ea ac tali torpore dicebatur, ut expergesceri fere nequeant.

Cap. LXXVI. LXXVII. Primum de *ἀκόνιτου* appellatione et loco natali. Nomen autem ipse Theophrastus derivat ab Aconis, vico Mariandynorum. Mariandyni scilicet, Heracleotarum vicini, oram Ponti euxini a Sangario fluvio ad Lycum usque habitabant.<sup>41</sup> Portum Aconen nominat Plinius, veneno Aconito dirum, et Acherusiam specum. Et Nicander<sup>42</sup>:

*Ἄλλ' ἤτοι χολόεν μὲν ἰδὲ στομίοισι δυσάλθες  
πνυθείης ἀκόνιτον, ὃ δὴ ῥ' Ἀχερωίδες ὄχθαι  
φύουσιν, τόθι χάσμα δυσέκδρομον Εὐβουλῆος,  
ἄστυρά τε Πριόλαο καταστρεφθέντα δέδουπε.*

Ubi scholiastes fluvium Acheronta ponticum et Priolai oppidum exponit. Theopompus Chius easdem *Ἀκόνας*, Heracleae vicinas, Aconito nomen dedisse tradit.<sup>43</sup> Strabo in Heracleotide aconitum nasci testatur.<sup>44</sup> Igitur in confesso est, Ponti euxini oras australes esse patriam Aco-

34) Trag. 1. c. f. 220. Amat. Lusit. in Diosc. p. 432.

35) Antiqu. iud. 1; 51. 36) Genes. 30, 14.

37) Hesych. h. v.

38) De simpl. med. f. 241 b. (ed. Lugd. 1525. 4.)

39) Herbarius Schönsberger, c. 257. 258. Aug. Vindel. 1488. 4.

40) Lucian. Timon, p. 72. Demosthen. encom. p. 164.

41) Pausan. 5, 26. Plin. 6, 1. 42) Alexiph. v. 15.

43) Athen. 3, 29. Dionys. Perieg. v. 737.

44) Lib. 12. p. 58. 59.

niti. Magnam etiam habuit partem in praestigiis et magicis artibus Colchorum, cum Hecate invenisse et hoc γάρμακον et alia dicatur.<sup>45</sup> Fabulabantur quoque, ex iis, quae Cerberus vomitu reiecerit, natam fuisse herbam.<sup>46</sup>

Haec omnia valent de priscorum Graecorum aconito, quod etiam cognomen παρδαλιαγγές habet,

— — ἐπεὶ θήρεσσι πελώροις  
πότμον βουπιλάται τε καὶ αἰγονομήες ἔθεντο  
Ἰδης ἐν κνημοῖσι, Φαλακραίης ἐν βήσσαις,<sup>47</sup>

quia videlicet pastores eo pardales enecent. Adiungit scholiastes fabulam de stercore humano, huius veneni antidoto, et θηλυφόνου cognominis etymologiam: ὅτι, ἐὰν ἄψηται μορίου θήλειος, διαφθείρει τὸ ζῶον. Κάμμορον fuisse appellatum idem addit, ὅτι κακῶ μόρῳ ἀναιρεῖται.

De Aconito autem Pardalianche Dioscoridis exponendo valde dissenserunt rei herbariae patres. Longissime profecto aberravit Fuchsius<sup>48</sup>, qui Parida quadrifoliam hoc nomine ornaret. Nec Conr. Gesnero assentiendum, qui Ranunculum Thoram, seu Phthoram Valdensium veram esse hanc plantam statuit.<sup>49</sup> Namque nec radix Ranunculi scorpii caudam prae se fert, nec folia sunt subaspera. Matthiolus igitur et *Arnica scorpioides* et *Doronicum scorpioides* Willd. primus hoc nomine introduxit.<sup>50</sup> Illud et *Doronicum Pardalianches* et Dodonaeus nomine eodem delineavit.<sup>51</sup> Idem esse Dioscoridis primum aconitum ac σκορπίον Theophrasti, qui et θηλυφόνον vocatur<sup>52</sup>, facillime erui potest: probavit id praepriis Fab. Columna, *Doronicum scorpioides* W. huc trahens.<sup>53</sup> Cumque Lobelius<sup>54</sup> et Clusius<sup>55</sup> diluere suspicionem venenatae indolis radicis scorpioidis conarentur, adductis de aromatica potius vi testimoniis, litem inde natam ita componere studet Columna, ut, quae animalibus brutis

45) Diod. Sic. 4, 45. Schol. Apollon. Rhod. v. 311.

46) Schol. Nicand. alex. v. 13. 47) Nicand. alex. v. 38.

48) L. c. p. 87. 49) De hortis Germ. f. 244<sup>b</sup>.

50) L. c. p. 762. 51) L. c. p. 437.

52) Hist. pl. 9, 18. 53) Ecphras. 2. p. 37.

54) Advers. p. 291. 55) Hist. 2. p. 17. 19.

noxia, imo pernicioſa ſint, ſaepe inſontia, quin ſalutaria eſſe humano generi, exemplis probet. Contr. Geſnerus ipſe periculum fecerat, duas radicis Doronici drachmas ſumens, ſine noxa.<sup>56</sup> Contraria vero teſtimonia enecatorum hac radice ſaltem canum luporumque, Amatus Luſitanus<sup>57</sup> et Bern. Deſſenius<sup>58</sup> attulerunt. Noſtra demum aetate et Sibthorpius Doronicum Parcalianches, in Bithynia, Parnäſſo et Laconia deprehenſum, hoc aconitum putat.<sup>59</sup>

Aconitum ſecundum Dioſcoridis parum negotii facieſſit, ſi ſolum genus conſideramus, quod Aconitum Linnaeanum eſſe, exploratum habemus. Species e loco natali et foliorum forma divinari poſteſt. Eſt *Aconitum Napellus*, qui et in Italiae montibus et in Laconia provenit. Magnopere autem differt Theophrasti ἀκόνιτον a noſtro: cuius adeo perplexa eſt deſcriptio, ut ſatis mirari nequeamus, id nihilominus ubique provenire.<sup>60</sup> „Radix tuberoſa, nuci ſimilis, quae ſola ſit letifera. Nihil notabile in brevi herba, quae frumento ſimilis ſit, et tamen folium habeat cichoraceum, ſemen ſpicatis diſſimile.“ Oedipo, mehercle, coniectore opus eſt, qui tale ſolvat aenigma, praecertim cum et Aëtius<sup>61</sup> et ſcholiaſtes Nicaandri<sup>62</sup> hoc ἀκόνιτον ἀγρώστιδι ſimile declarent, ille etiam nonnullis ἰριδα ἀγρίαν dici teſtetur. Ranunculus certe Thora praeter radicem tuberoſo-grumosaſ, quae tamen cum nuce iuglandis comparari nequit, nihil commune cum Theophrasti planta habet. Neque quidquam iuvat, ſi cum Geſnero κυκλαμινῶδες loco κικωριῶδες legimus.

Cap. LXXIX. De *Conio maculato*, ut vulgaris notitiae, velut in tranſcurſu agendum. Copioſiſſimum invenit Sibthorpius inter Athenas ac Megaram, nec infrequens in Peloponneſo.<sup>63</sup> Optimum noſter praedicat atticum, megarenſe, creticum, chium et cilicium. Theophrastus περὶ

56) Epist. f. 17<sup>b</sup>. 74<sup>b</sup>.

57) Enumer. p. 432.

58) De compos. medic. p. 524.

59) Flor. graec. 2. p. 133.

60) Hist. pl. 9, 16.

61) Lib. 6, 64.

62) Alexiph. v. 13.

63) Flor. graec. 1. p. 187.

Σοῦσα καὶ ἐν τοῖς ψυχροτάτοις τόποις.<sup>64</sup> Loco Σοῦσα esse Λοῦσσα vel Λούσου legendum, iam Schneiderus hortatus est.<sup>65</sup> Etiam si enim Plinius quoque Susas vertit,<sup>66</sup> non potest Persidis regia intelligi, quippe cuius regio ἔμπυρος ab ipso Theophrasto vocetur.<sup>67</sup> Neque credi potest, Thrasyam Mantineensem venenum a Perside usque petiisse. Sed Lusi, oppidum Arcadiae, in elatis clitoriis montibus, stadia vix ducenta a Mantinea versus Caeciam situm erat.<sup>68</sup> In hac frigida regione conium optimum provenisse, probabile est.

Nomen conii aegyptium Rossius ita exponit, ut ad capitis turbas, quas excitet, respiciat.<sup>69</sup> Sic etiam graecam vocem κώνειον ἀπὸ τοῦ κωνῆσαι, τούτέστι κύκλω περιεγεκῆν Etymologus derivat, διὰ τὸν εἰλιγμὸν καὶ σκότον, τοῖς πίνουσι γινόμενον.

Cap. LXXX. Taxus, ἡ μῖλος Theophrasto, σμίλος Nicandro dicta, quasi solummodo in Italia et Gallia narbonensi crescat, tractatur. Est tamen et graeca arbor, montes Cretae, Peloponnesi ac Macedoniae habitans.

De noxia aut insonti arboris fructuumque indole varia sunt testimonia. Theophrastus iam τὰ λόφουρα (equos asinosque) foliis taxi voratis interimī, nihil vero pati ruminantia. Fructum esse dulcem ac innoxium, ut a nonnullis hominibus comedatur.<sup>70</sup> Nicander τὴν σμίλον οἰτείην ἐλατήριδα, θανάτοιο πολυκλαύστοιο δότευραν vocat.<sup>71</sup> Quod et mortem obeant, qui in eius umbra obdormiverint, Andreas testabatur<sup>72</sup>, quod et Sextius<sup>73</sup> et Plutarchus<sup>74</sup> repetunt. Sic Virgilius taxos nocentes, quae aquilonem et frigora ament, cecinit.<sup>75</sup> Cativolcum etiam, regem dimidiae partis Eburonum, aetate iam confectum, taxo se exanimasse, Iul. Caesar refert.<sup>76</sup> Et senioribus

64) Hist. pl. 9, 15.

65) Annot. ad h. l. p. 302.

66) Lib. 25, 95.

67) De vent. p. 767.

68) Paus. 8, 18.

69) L. c. p. 14.

70) Hist. pl. 3, 10.

71) Alex. v. 624.

72) Apud schol. Nicandr. l. c.

73) Apud Plin. 16, 20.

74) Sympos. 3. p. 634. ed. Wyttenb.

75) Georg. 2, 113. 275.

76) De bello gall. 6, 31.



temporibus noxia, imo perniciosa, eius arboris efficacia in equis saltem et bubus confirmata legitur.<sup>77</sup>

Neque tamen desunt testimonia innoxiae indolis. Dodonaeus, in Belgio minus perniciosam esse umbramque periculo carere.<sup>78</sup> Lobelius, in Anglia nec tantillum incommodi vel ex umbra vel ex esu fructuum, quibus porci pascantur, quibus pueruli vescantur, observari.<sup>79</sup> Sic et Martynius<sup>80</sup> et Hallerus<sup>81</sup>, Lamarckius<sup>82</sup> etiam et C. C. Gmelinus<sup>83</sup> insontem fructuum esum confirmant.

Cap. LXXXI. Cum ἀποκύνου cognomen romanum hic dicitur *brassica rustica*, Apuleius cum *brassica sylvestri* (2,147.) confudisse videtur. Nominibus enim aliquot ex hoc capite sumtis, vires plantae medicatas eas tradit, quae brassicae sylvestri tribuuntur.<sup>84</sup> In iis nominibus est etiam punicum *butzutzim*, quod forte e בנב, καταπατεῖν, *perniciēs*, et בִּהְיָ, *bestiae*, formatum est.

De hac herba Galenus<sup>85</sup>: Ἀπόκυνον ἢ κυνοκράμβη. καλοῦσι δ' ἔνιοι καὶ κυνόμορον, ἐπειδὴ τάχιστα τοὺς κύνας ἀναιρεῖ, καθάπερ τὸ λυκοκτόνον τοὺς λύκους· ἔστι δὲ ἀνθρώπων δηλητήριον, ἱκανῶς δυσώδης πόα.

Plantam ipsam cum Matthiolo<sup>86</sup> plerique pro *Cynancha erecto* L. (*Marsdenia* R. Br.), non solius Syriac, sed totius etiam Graeciae incola, habent.<sup>87</sup> Flexiles quidem virgae sunt, sed non volubiles: in folliculis gerit semina comosa. Cum hac ipsa specie experimenta instituta in canibus 1580 memorat Clusius<sup>88</sup>: interemtos fuisse omnes, quibus id propinatum fuerit, praeter eos, quibus exhibita fuerit terra sigillata silesiaca.

Cap. LXXXII. Nerium nihil prorsus habet difficultatis. Bona enim descriptio *Nerium Oleandrum* nostrarum scholarum ilico prodit. Increbruit autem rumor de

77) Hon. Bouche obs. sur l'hist. nat. de Provence, 1. p. 49. Birch hist. of the roy. soc. 1. p. 454. Floyer pharmacobas. p. 189.

78) L. c. p. 859.

79) Adv. p. 450.

80) Virgil. georg. p. 195.

81) Stirp. helvet. n. 1663.

82) Encycl. bot. 3. p. 228.

83) Flor. bad. 3. p. 771.

84) Apul. c. 127.

85) De fac. simpl. 6. p. 335.

86) L. c. p. 774.

87) Flor. graec. 1. p. 166.

88) Hist. 1. p. 126.

noxa, quam asini, muli equique e foliorum esu percipiant, adeo, ut et Lucianus eius meminerit.<sup>89</sup> Fueritne et haec arbor lauro similis in Ariana aut Gedrosia, quam iumenta in Alexandri exercitu postquam gustassent, comitiali morbo correpta ac spumantia emortua sint<sup>90</sup>, dubitandum.

Cap. LXXXIII. De fungorum noxiorum vel edulium discrimine admodum manca profert D. Praecipue vero in noxiis adesse *ἐπίπαγον γλοιώδη*, glutinosum coagulum in pilei superficie: quod omnino in Agarici muscarii var. regali, in Ag. pantherino Cand., in Boletio lurido Fr. et in nonnullis aliis observatur. Sed et edules fungi nonnunquam glutinosam habent pilei superficiem, maxime pluvio coelo, exemplis Agarici Prunuli Pers., eburnei Bull., Boleti edulis et Fistulinae hepaticae Fr. Noxios fieri etiam fungos tradit, dum proxime ab arboribus cre-scant, quae iis pravitatem quamdam impertiant. Eam sententiam iam promserat Nicander<sup>91</sup>, eos privatim fungos salutare declarans, quae prope a ficibus creverint. Neque tamen eam opinionem defendendam esse putamus, quamvis in universum fungi in umbrosissimis sylvarum locis obvii suspecti sint, ni noxii.

Vilem habuere veteres cibum, qui e fungis paratur.<sup>92</sup> Et quanquam Diphilus Siphnius scripserat, fungos ori gratos (*εὐστόμους* l. *εὐστομάχους*) valide nutrire, alvum tamen summovere, aegre concoqui et flatus gignere docuit. Naturae humanae convenire teneros et friabiles: nigros et lividos ac qui cocti indurescant, non convenire.<sup>93</sup> Galenus *βωλίτας* et *ἀμανίτας* distinguit, illos, nisi condiantur et apparentur, insipidos esse, ut frigidum quoque et pituitosum praebeant alimentum.<sup>94</sup> Suadet etiam fere eadem contra noxios fungorum effectus, quae in nostro legimus. Optimum tamen putamus praesidium

89) Lucius s. Asinus c. 17. p. 159. *Τάδ' ἦν ἐκ τῆς ἀγρίας δάφνης φερόμενα ῥόδα ἐκεῖνα, δάφνην αὐτὴν καλοῦσιν ἄνθρωποι, κακὸν ἀριστον ὄντω τοῦτο παντὶ καὶ ἱππῳ. φασὶ γὰρ τὸν φαγόντα ἀποθνήσκειν αὐτίκα.*

90) Strabo lib. 15, p. 172.

91) Athen. 2, 57.

92) Athen. 2, 56.

93) Athen. 2, 59.

94) De fac. alim. 2. p. 655.

ex emeticis peti, aut, si temporis plus ab esu elapsum fuerit, e purgantibus. Oxymeli et acetum ipsum saluti esse possunt, postquam fungus voratus eiectus fuerit: alioqui solet acetum acrimoniam fungorum extrahere magisque noxiam reddere.<sup>95</sup>

Cap. LXXXIV. Colchicum nomen a Colchide regione obtinuit, venenorum feracissima, unde Horatius „venena colchica et quicquid usquam concipitur nefas“<sup>96</sup> et „herbas canit, quas lolcos atque Iberia mittat venenorum ferax.“<sup>97</sup> Videtur autem, quod *κολχικοῦ* nomine Dioscoridis aetate veniebat, prius *ἐφήμερον* dictum fuisse, quia *ἐφήμερον* occidat.<sup>98</sup> Theophrastus saltem auditu comperit habuit, esse radicem, foliis vel ellebori vel lili. Nicander ephemeris sui, quod *τὸ Μηδείης Κολχηίδος ἐχθόμενον πῦρ* appellat, effectus et noxas ita delineat, ut omnino ad Colchicum nostrum conclusio valeat.<sup>99</sup> Scholiastes diversos tradit *ἐφήμερον* significatus: esse enim tum venenum arte paratum, quod et barbari naphtham vocent, tum plantam, flore cito marcescente, quae ad Hypanim crescat.

*Colchicum nostrum autumnale* intelligi patet, quamquam florum color albidus dicatur. Nostrum quidem vulgo roseo colore insigne est, sed albo etiam subinde occurrit. Saporem radicis, seu potius bulbi, dulcem praedicari a Dioscoride, mirabitur, qui acrimoniam valde noxiam eius perpenderit. At vero non desunt, qui autumnno radicem, ni dulcem, insipidam tamen declarent, etiamsi verno tempore eruta amarissima sit.<sup>100</sup> Quin et amyli copiam, quod in gelatinam blandam abit, e bulbo obtineri, in confesso est.<sup>1</sup>

Cap. LXXXV. Iam ad alterum *ἐφήμερον* veniendum est, quod et *ἴριον ἀργίον* Galenus cum nostro vocat. Cau-

95) Persoon sur les champignons comestibles, p. 108.

96) Carm. 2, 13. et epod. 17. 97) Epod. 5.

98) Theophr. hist. pl. 9, 16. 99) Alexiph. v. 250.

100) Maranta meth. cogn. simpl. p. 33. Haller. stirp. helv. n. 1266. Krapf. apud Störck contin. experim. circa Colchic. p. 233.

1) Berg. mater. med. p. 291.

lis et folia lilii, sed tenuiora, flores albi minuti, fructus mollis (bacca), radix denique longa, odorata, digiti fere crassitudine; omnia haec nos fere cogunt, *Convallariam verticillatam* cum Caesalpino<sup>2</sup> hic intelligi statuamus. Neque dissuademur Plinio, qui flores caerulcos huic plantae tribuit<sup>3</sup>, cum, quam parum fidendum Plinio, ad satietatem usque probatum sit. Provenit autem per omnem Italiam in pratis alpestribus et per sylvas montuosas. Primam, ni fallor, iconem Tragus exhibuit<sup>4</sup>; licet pro χαμαιδάκνη Dioscoridis habeat. Reliqui rei herbariae instauratores omnia pertentarent, ut congruam invenirent plantam. Matthiolus ignotam promisit liliaceam, forte fictitiam<sup>5</sup>, Dodonaeus Lysimachiam Ephemerum<sup>6</sup>, Lobelius obscuram liliaceam,<sup>7</sup> quam nec Clusius nec Bauhinus rite intelligere potuerunt, nec ego nomine systematico insignire ausim. Fab. denique Columna Digitalem ambiguam huc traxit.<sup>8</sup>

Graves autem irrepserunt errores, cum ἐρμοδακτύλους senioris aetatis Arabes et qui eos sequerentur cum ephemero utroque confunderent. Paullus, ni fallor, primus ἐρμοδακτύλου, quod probe ab ἐφημέρω distinguit, radicem ut purgans remedium appellavit.<sup>9</sup> Apud Alexandrum Trallianum multa antipodagrica purgantia celebrantur, δι' ἐρμοδακτύλου dicta, quae cum ea radice aromatica iuncta habent, zingiberis, piperis, anisi et cumini exemplis, quia per se sumpta ea radice stomachus offendatur.<sup>10</sup> Repetit eadem pluribus locis Nic. Myrepsicus.

Arabes vel ad literam versum ἐρμοδάκτυλον هورمس أصابع (*hermas assabá*) vel سورجیان (*surandschân*) dixerunt. Distinctis autem rubro surandschân ab albo, ad illud applicarunt, quod Dioscorides de πολικῶ, ad hoc, quod seniores Graeci de ἐρμοδακτύλω praedicarant.<sup>11</sup> Avicenna speciatim, flores albos esse et flavos, crescere plantam ad

2) Lib. 5. c. 33.

3) Lib. 25, 107.

4) L. c. f. 150 b.

5) L. c. p. 780.

6) L. c. p. 203.

7) Obs. p. 73.

8) Ecphras. I. p. 158.

9) Lib. 7. p. 236.

10) Lib. 11. p. 645 — 646. 10. Actuar. meth. med. 5. col. 264. ed. Steph.

11) Serap. c. 194. f. 150 r. Mesue, f. 70. 71.



pedes montium.<sup>12</sup> Hinc Latinobarbari, et in iis maxime Matthaeus Sylvaticus<sup>13</sup>, eodem colchici (*colici* aut *colitici* dicti) titulo comprehenderunt et ephemerum et hermodactylum. Cum neutrum posteriorum cognosceretur, Colchicum autem notissimum esset, angebantur, qui ad veterum praecepta materiam medicam vel methodum medendi conformaturi erant, si hermodactyli radicem monstrare deberent.<sup>14a</sup> Spe frustrati, e vano etiam hauerunt, qui Behen album rubrumque Arabum (بهن), ab his tamen probe seiunctum, cum hermodactylis iungerent. Nec feliciores Brunfelsius, qui Narcissum Pseudonarcissum et Leucoium vernum<sup>14b</sup>; C. Gesnerus, qui Erythronium Dentem canis<sup>15</sup>, et alio loco<sup>16</sup> Hypoxin fascicularem L. (Colchicum fasciculare R. Br.<sup>17</sup>), a Rauwolfio in Syria inventam, huc trahit. Haud procul a veritate abfuisse videtur Matthiolus, dum *Iridem tuberosam*, in Graecia et Asia minore obviam, Hermodactyli veri nomine promeret.<sup>18</sup> Radicum enim tuberosarum fasciculi fere digitorum formam praebent. Purgante autem efficacia radicem pollere, probabile est, cum de Iride germanica id iam exploratum habeamus.<sup>19</sup>

Cap. LXXXVI. *Ἐλξίνην* hanc posteriorem esse *Parietariam officinalem*, persuasum habemus.

Cap. LXXXVII. Nec in lenticula stagnina moror, quae *Lemna* est *minor*, vulgaris notitiae.

Cap. LXXXVIII. *Ἀεζώων τὸ μέγα* esse *Sempervivum arboreum*, in muris et locis montosis insularum ionicarum, aegaei maris et ipsa Cypro proveniens, Anguillara primus docuit<sup>20</sup>: assentiente et Sibthorpio.<sup>21</sup> Apellari in Chio *ἀμάραντον*, in Corcyra autem *ἀναστασίαν*, idem Anguillara est auctor. Nomen aegyptium Iablonskius<sup>22</sup> et Rossius<sup>23</sup> habent versionem *ἀεζώων*.

12) Ed. arab. p. 220.

13) Pandect. c. 172. f. 68<sup>b</sup>.

14<sup>a</sup>) Cf. Trag. f. 290.

14<sup>b</sup>) L. c. tom. 1. p. 129.

15) De hortis Germ. f. 261.

16) Ic. lign. tab. 11. f. 95.

17) Ad Denham, iter p. 243.

18) L. c. p. 778. Dodon. p. 249.

19) Murray appar. medic. 5. p. 271.

20) L. c. p. 276. 277.

21) Flor. graec. 1. p. 334.

22) Opusc. 1. p. 194.

23) Etym. aeg. p. 154.

Cap. LXXXIX. *Αἰζών το μικρόν* ob folia teretia, acuta, parva, floresque *χλωρούς* in umbella seu cyma dispositos, vel *Sedum rupestre* vel *reflexum* est, in rupibus et montosis Graeciae utrumque vulgare.

Sempervivum tertium Columna primus aperuit.<sup>24</sup> Est *Sedum stellatum*, in Italia, Gallia et Europa australi obvium.

Cap. XC. Cotyledon prima est *Cotyledon* nostra *Umbilicus*, in Graeciae rupibus et muris obvia,

Cap. XCI. Cotyledon altera ob folia lingulata posset *Cot. serrata* L. dici, sed obstant radix fibrosa, flores purpurascentes, cum Hyperici floribus non comparandi, neque folia cum alterna sint, eam speciem faciunt, quae hic describitur. Itaque ad *Cotyledonem luteam* Huds. consilium esse transferendum videtur. Radix enim longa, tuberoso-carnosa et repens est; folia inferiora peltata, crenata, superiora cum bracteis ovata, dentata, flores aurei. Haec pariter in rupibus Graeciae occurrit.<sup>25</sup> Qui primi plantas veterum scienter examinerunt, Matthiolo duce<sup>26</sup> *Saxifragam Cotyledonem* intellexerunt, cuius tamen, licet folia rosacco-congesta, flores albi absunt a similitudine Hyperici, neque dixerim radicem esse maiusculam.

Cap. XCII. *Urticam urentem* et *dioecam* iam Brunfelsius<sup>27</sup> et Tragus<sup>28</sup> in duabus *ἀκαλύφης* speciebus, *τραχύτέρα καὶ ἄριωτέρα* et altera *οὐχ ὁμοίως τραχεία*, agnoverunt. Nec quicquam mutandum esse aut regerendum videtur. Virtutes medicas paucas duntaxat nostra aetas confirmat, ad cohibendos nimirum sanguinis cursus, maxime c pulmonibus et fistula spiritali.<sup>29</sup> Nomen aegyptium Rossius a *mordendo* vel *urendo* derivat:<sup>30</sup> quemadmodum Arabibus dicitur قريص a radice قرص, *pungere*: sed et بنت النار, *filia ignis*.

24) Phytobas. p. 52. t. 11.

25) Flor. graec. t. p. 308.

26) L. c. p. 787. 788.

27) L. c. tom. 1. p. 151. 154.

28) L. c. f. 1. 2.

29) Berg. mat. med. p. 734.

30) L. c. p. 188.

Cap. XCIII. *Galiopsin* Dioscoridis Anguillara iam in Illyrico, Bosnia et Graecia recognovit, ac ita descripsit, ut *Scrofulariam peregrinam* a Camerario primo<sup>31</sup> delineatam facile agnoscas. Cum folia praeter glabritiem omnino cum Urticae urentis foliis forma congruant; cum odor gravis perspicuus sit; cum flores purpurei, ratione ceterarum partium, exigui sint; cum denique et usus contra scrofulas ab Anguillara confirmetur, et Sibthorpius ad hanc accedit sententiam, qui plantam ubique in Graecia ad semitas, sepes et circa domuum areas invenit.<sup>32</sup> *Lamium purpureum*, quod cum Brunfelsio<sup>33</sup> et Trago<sup>34</sup> plerique substituunt, congruit quidem, sed flores sunt grandes potius quam exigui.

Cap. XCIV. *Γάλιον* Dioscoridis est *Galium verum* L. A vi lac coagulandi et gallicum nomen *Caille-lait* et danicum *Melklöbe* obtinuit. Ea vis adeo nota est, ut olim ad caseos parandos in Anglia adhiberetur.<sup>35</sup> Ab acido pendet succo, qui et plantarum succos coeruleos in rubrum colorem vertit. Flores melleum odorem spirant. Tantum tamen abest, ut in palustribus locis abundet, ut potius loca edita amet et sicciora.

Cap. XCV. Cum continuo floreat, (*ἡ ἀνθεῖς πᾶσας καταλαμβάνει τὰς ὥρας*<sup>36</sup>), cum per hyemem apud nos, magis etiam in Graecia, florere consuescat, flores verno tempore in pappos soluti, his deciduis, calva relinquunt receptacula, unde *ἡριγέρων*, *senecio*, quasi *vernus senex*, dicta est planta, per omnem Europam, Asiam mediam, Africamque borealem frequens, *Senecio vulgaris*.

Cap. XCVI. *Thalictrum* in campestribus obvium, foliis coriandri, est *Thalictrum minus* L., quod in Peloponneso saltem et per Italiam provenit.

Cap. XCVII. *Βρύον θαλάσσιον* duplici modo intelligi potest. Si enim nobiscum *θριδακώδες* legitur, erit idem, quod Theophrastus<sup>37</sup> denotat, ut *οὐκ ἀνόμοιον ταῖς θριδακίαις, πλὴν ῥυτιδωδέστερον καὶ ὥσπερ συνεσπασμένον*. *Ul-*

31) Hort. med. p. 157. t. 43.

32) Flor. graec. 1. p. 435.

33) Tom. 1. p. 153.

34) L. c. f. 2.

35) Smith engl. flora, 1. p. 298.

36) Theophr. hist. 7, 10.

37) Hist. 4, 6.

va quippe *Lactuca*, ad oras maris in saxis testisque proveniens, fronde viridissima, tenera, membranacea, palmata, cuius sapor amarus salsusque in Anglia commendatur, tum ad acetaria cum succo limoniorum apparanda, tum ad scrofulas curandas.<sup>38</sup> Quodsi vero cum Aldina *τῆς γῶδης* legeris, posset *Sporochnus* esse aculeatus Agardhii, si modo hic esset incola maris mediterranei: sed *Sphaerococcus* etiam confervoides et musciformis Ag., ad oras maris mediterranei occurrentes, huc trahi possent. Corallinam officinalem L. declararunt cum Matthiolo<sup>39</sup> plerique maiores nostri.

Cap. XCVIII. E fucis marinis tria genera enumerantur: latum quoddam, alterum oblongum et puniceum, tertium candidum, quod ad Cretae oras nascatur, pulcre floridum nec corruptioni obnoxium. Primum quidem nescio an sit *Zonaria Pavonia* vel *squamaria* Ag., cum nulum aliud indicium addatur. Secundum genus forte *Wormskioldia ocellata* (*Fucus granateus* Lamour. et Turn.) *Ulvae punctatae* Stackh. valde affinis, colore roseo-puniceo insignis est, quae ad oras maris mediterranei non raro invenitur. W. enim sanguinea in maribus septentrionalibus potius occurrit. Tertium genus videtur *Chondria obtusa* Ag. esse, cuius color pallidus, substantia cartilaginea et apices tuberculiferi congruunt. Est incola maris mediterranei et rubri. *Sphaerococcus plicatus* Ag., licet color magis respondeat, oceano tamen atlantico marique septentrionali proprius est. Id etiam valet de *Sphaer. cartilagineo*, pro quo olim habui: color etiam huius fuscus est. Sed alia in promptu est expositio, e Theophrasto petita. Is enim elegantissimum fuci genus, ad Cretae litora obvium, profert, quo taeniae, lana et vestes tingantur: recentis et eius, quod borea vento perflatur, colorem speciosiore esse ipsa purpura.<sup>40</sup> Hoc genus esse *Wormskioldiam Plocamium* (*Fucus coccineus* Huds.) persuasum habeo. Si hic intelligitur, τὸ λευκόν vel expungen-

38) Engl. bot. 1551.

39) L. c. p. 795.

40) Hist. 4, 6.



dum, vel ita accipiendum, ut mutationem coloris ad lucem solarem a puniceo in albidum notet. Eam vero mutationem accidere, tum ipse expertus sum, tum Turneri testimonio tueri possum.<sup>41</sup> Eo formosissimo fuce usas fuisse mulierculas ad coloris venustatem conciliandam, persuasum habemus, cum dein hoc vocabulum usurpatum fuerit ad quemcunque colorem arte paratum denotandum.<sup>42</sup>

Ῥιζιον illud, quo pariter utebantur mulieres ad fucandam faciem, est Anchusa, de qua (c. 23.) iam egimus, et de qua etiam Hesychius ἄγκουσα, ῥίζα, ἣ φουκῶνται τὰ γύναια.

Cap. XCIX. *Potamogeton* nomen servavit; in prima specie post Fuchsiū<sup>43</sup> fere omnes *Potamogetona natantem* agnoscunt. Haereo tamen, cum δασὺ τὸ φύλλον esse lego, neque alium significatum eius epitheti novi, quam *hirsutum*. Cum Plinius etiam ita intellexerit<sup>44</sup>, neque ulla *Potamogetonis* species nota sit foliis hirsutis, vel errorem auctoris subesse assumamus, vel scripsisse παχύ suspicemur, quod eo magis probabile fit, cum subcoriacea substantia foliorum *Pot. natantis* pariter ac *heterophylli* Schreb. differentiam constituat meliorem.

Alteram speciem habuerim *P. rufescentem* Schrad., propter spicam rubentem, sed magis quadrat *P. zosteræ-folius* Schumach. Nomen punicum ἀστιακόν lego חֶבֶר כֹּחַ, *herba efficax*.

Cap. C. Στρατιώτης est planta aegyptia, cuius aegyptium nomen etiam *militem* notat.<sup>45</sup> Est *Pistia Stratiotes* L., Arabibus dicta حى علم (hay álem elmá), sempervivum aquaticum<sup>46</sup>, quia folia rosaceo-congesta aliquam habent similitudinem cum sempervivo. Optime

41) Synops. of the british fuci, p. 293.

42) Lucian. piscat. p. 129. Ὑπεφαίνεται δέ τι καὶ ψιμίθιον καὶ φύκος. Ei. epigr. omissa, 4. p. 53. Liber sapient. 13, 14. Καταχρύσας μίλιω, καὶ φύκει ξουθήνας χροῖαν αὐτοῦ. Horat. carm. 3, 6. Neque amissos colores lana refert medicata fuce.

43) L. c. p. 651.

44) Lib. 25, 35.

45) Iablonsky l. c. p. 545. Rossi l. c. p. 246.

46) Delil. fl. aeg. p. 20.

eam plantam adumbravit P. Alpinus<sup>47</sup>, confirmato quoque usu, quem Dioscorides commemorat.

Priusquam haec planta innotesceret, docti rei herbariae instauratores in tenebris versabantur. Ingeniosa est Caesalpini coniectura, *Salviniam natantem* subintelligi,<sup>48</sup> quae omnino quadantenus respondet. Magnopere vero fallitur Dodonaeus, dum Stratioten aloidem huc trahit,<sup>49</sup> quanquam eum plerique sequantur.

Cap. CI. Στρατιώτης χιλιόφυλλος est *Achillea Millefolium*, quod post Brunfelsium<sup>50</sup> omnes fatentur. Herba astringens, aromatica, laudes etiam seriori aetate adepta est ob virtutem antispasticam ac haemostaticam.<sup>51</sup>

Cap. CII. Φλόμος, ἔνιοι δὲ διὰ τοῦ π γράφουσί τε καὶ λέγουσιν.<sup>52</sup> Πλόμω autem enecari pisces fluviatiles atque eo captari, Aristoteles tradit.<sup>53</sup> Id de Verbascosinuato et nupera testimonia confirmant.<sup>54</sup> Discrimen ἄρρενος καὶ θηλείας iam a Crateva<sup>55</sup> et Nicandro stabilitum, ab illo vero male ita constitutum legimus, ut maris folia foeniculo, licet longiora sint et tenuiora, compararet, feminae vero coriandro.

Noster summa genera facit album et nigrum: illius duas habet species; feminam foliis latioribus, hirsutis, albis, floribus albidis aut ex luteo pallescentibus: marem foliis angustioribus, pariter albis. Illam esse *Verbascum plicatum* sibi, aut *undulatum* Lam., nuperrimus interpretas autumat.<sup>56</sup> Dum vero marem perhibet esse *V. Thapsus*, egregie profecto probat, se Dioscoridem non legisse. Posterioris enim folia tantum abest, ut angustiora sint, ut potius plerisque latiora prodeant. Si quid recte video, *V. Thapsus*, quod etiam flore albo occurrit, est φλόμος θηλεία λευκή, ut iam Fuchsius<sup>57</sup> et Dalecham-

47) De plant. aeg. p. 106—109.

48) Lib. 16. c. 36. 49) L. c. p. 583. 589.

50) Tom. 3. p. 171. 51) Fr. Hoffmann opusc. med. p. 341.

52) Galen. de fac. simpl. 8. p. 150.

53) Hist. anim. 8, 20.

54) Walpole, p. 276. 277.

55) Schol. Nicandr. ther. v. 856.

56) Sibthorp. fl. graec. 1. p. 150.

57) L. c. p. 847.

pius<sup>58</sup> eam speciem designarunt. *V. undulatum* vero Larmarckii, seu *plicatum* Sibthorpii, in Graecia obvium, ob folia angustiora, sinuata, undulata, semper candido-tomentosa, caulemque graciliorem pro *φλόμω λευκῇ ἀρόενι* habeo. *Verbascum nigrum* nomen servavit, a Dodonaeo eo nomine bene exhibitum.<sup>59</sup>

*Verbascum sylvestre* est *Phlomis fruticosa*, quam et Matthiolus<sup>60</sup> et Dodonaeus<sup>61</sup> iam eo nomine produxerunt.

*Phlomides* duae, hirsutae, terrae adnatae, foliis subrotundis, nescio an sint *Phl. samia* L., quae et in Euboea, et *Phl. lunarifolia* Sibth., quae in Peloponneso occurrit.

*Phlomida Lychnitis* primus hoc nomine, quod etiamnum retinet, illustravit Clusius.<sup>62</sup> Hispanis meminit dici eandem herbam *Candilera*, quod eius folia non modo sicca sed etiam recentia ellychnii modo, oleo affuso, uri possint.

Cap. CIII. *Salvia Aethiopis*, quam Matthiolus<sup>63</sup> cum plerisque senioribus huc trahit, multa habet, quae *αἰθιώπιδι* Dioscoridis respondent. Neque me moratur, bina tantum semina in singulis calycibus indicari, cum, quae quaterna esse deberent, saepissime et in aliis *Salviae* speciebus abortiant, ut binae duntaxat supersint. *Salvia Aethiopis* in Attica et Asia minore inventa est.<sup>64</sup>

Cap. CIV. De *ἀρχαίω* dissentiant interpretes rei herbariae gnari. Quam e codice vindobonensi mutuata exhibuit Dodonaeus<sup>65</sup>, effigies miserrima est et contemtu digna. Honor. Bellus arcturum creticum a se dictum primus promisit, licet legitimum non haberet.<sup>66</sup> Eum dein effigie illustrarunt Pona<sup>67</sup>, Columna<sup>68</sup> et P. Alpinus,<sup>69</sup> uterque posterior *Verbasci* nomine. Interea recepta est

58) L. c. p. 1300.

59) L. c. p. 144.

61) L. c. p. 146.

63) L. c. p. 804.

65) L. c. p. 149.

67) Mons bald. p. 44.

69) Exot. p. 122, 123.

60) L. c. p. 800.

62) Stirp. hispan. p. 378.

64) Flor. graec. I. p. 13.

66) Ad Clus. p. 299.

68) Ecphr. 2. p. 82.

ca planta *Celsiae Arcturi* nomine. Sibthorpius, licet interrogatione, *Conyzam candidam* in medium ducit<sup>70</sup>, cuius nec folia nec semina papposa Dioscoridis plantae respondent. Nonne *Verbascum ferrugineum* Ait. melius quadrat?

Cap. CV. *Ἀρκεύιον* s. *Personata* vulgaris est notitiac. Est *Arctium Lappa* nobis. Radix, quae tenera, sapida est et esculenta, nec nostra memoria suis laudibus in arthritide destituta est.<sup>71</sup>

Cap. CVI. *Petasites*, a folio *πετασάδει* nomen accepit, vulgatissima planta, quae *Tussilago Petasites* iam audit.

Cap. CVII. Quis e manca ea descriptione plantam divinaverit? *Cephalanthera rubra* vel *ensifolia* Rich., quam Elleborines quintae nomine Clusius primus in lucem produxit<sup>72</sup>, pari iure nuncupari possunt, ac *Spiranthes aestivalis* et *autumnalis* Rich. In Europa enim australi, Graecia praecipuis, ac Asia minore occurrunt. Magnifice Anguillara de virtutibus herbae cuiusdam microphyllae contra viperarum morsus et hepatis affectus loquitur, quae, per Graeciam, Macedoniam, Illyricum et Italiam vulgaris, Millegrana et a Graecis *ἀσπεδίλα* vocetur, quamque esse Dioscoridis *ἐπιπακτίδα*, asseverat.<sup>73</sup> Hanc esse *Herniariam glabram*, exploratum habeo.

Cap. CVIII. *Fumaria* tritissima est, cuius officinalem speciem post Brunfelsium<sup>74</sup> omnes agnoscunt. Sibthorpius tamen *Fumariam parvifloram* Lam. praefert,<sup>75</sup> propter maiorem, ut videtur, teneritatem. Eam Clusius iam Capni tenuifoliae nomine bene adumbravit.<sup>76</sup> Omnino candidior et multo tenerior est vulgari; flores etiam in Graecia saturiori et sanguineo colore insignes dicuntur, cum carnei magis in Gallia sint ac Britannia.

Cap. CIX. Lotum sativam Dioscoridis Matthiolus

70) Flor. graec. 2. p. 175.

71) Berg. mat. med. p. 655.

72) Stirp. pannon. p. 276.

73) L. c. p. 282.

74) Tom. I. p. 99.

75) Flor. graec. 2. p. 50.

76) Stirp. hispan. p. 375.



habet *Melilotum officinale* Lam.<sup>77</sup>, Dodonaeus *Mel. coeruleam* Desv.<sup>78</sup> Huic accedunt plerique; Anguillara fere solo excepto, qui *Medicaginem*, ni fallor, *maculatam*, *τριφυλλοματὴν* Graecis dictam, in medium produxit.<sup>79</sup> *Mel.* tandem *messanensem* accipit Sibthorpius.<sup>80</sup>

Cap. CX. In Loto sylvestri semet plerumque frustra exercuerunt rei herbariae patres, dum patriam Libyam negligerent. Conr. Gesnerus *Trigonellam corniculatam* L.<sup>81</sup>, Matthiolus et Anguillara *Melilotum coeruleam* Desv. capropter accipiunt, quod in Belgio et Hispania balsamum dicatur, oleo inde parato, quo naevi faciei tollantur. Neque tamen fructus est proximus foeno graeco, qualem describit Dioscorides. Ideoque ignotam esse plantam Dodonaeus statuit, rudi addita icone e codice vindobonensi<sup>82</sup>, in qua tamen legumina racemosa stricta et folia ternata manifesta sunt. Plantam eam melius delineavit Lobelius<sup>83</sup>, Meliloti syriacae odoraе nomine. Est vero *Trigonella elatior* Sibth., quam in Asia minore et Cypro invenit: planta procera, stricta, foliis rhombeo-oblongis, serrulatis, stipulis lanceolatis dentatis, racemis longe pedunculatis axillaribus, leguminibus pendulis subfalcatis.<sup>84</sup> Haec profecto melius ceteris respondet. Itaque non audiendus Pona, qui *Lotum glaucum* Ait., e Liguria acceptum, huc trahit. Eam speciem Allionius demum *Loti Dioscoridis* nomine adumbravit.<sup>85</sup>

Cap. CXI. Cum de Cytiso olim iam uberrime praeceperim<sup>86</sup>, verborum multitudine supersedendum est. Id tamen patet, verum cytisum veterum a Barthol. Marantia<sup>87</sup> et Honor. Bello<sup>88</sup> apertum fuisse. Est *Medicago arborea* L.

Cap. CXII. Lotus aegyptia est *Nymphaea Lotus* L., planta Nilo peculiaris, post P. Alpinum<sup>89</sup> egregie a De-

77) L. c. p. 809.

78) L. c. p. 571.

79) L. c. p. 285.

80) Flor. graec. 2. p. 93.

81) De hort. Germ. f. 265b.

82) L. c. p. 572.

83) Ic. 2. t. 42.

84) Flor. graec. 2. p. 108.

85) Flor. pedem. n. 1131.

86) Antiqu. bot. p. 35—46.

87) Meth. cognosc. simpl. p. 50.

88) Ad Clus. p. 309.

89) De plant. exot. p. 213—229.

lilio illustrata.<sup>90</sup> Similem esse *κνάμω*, Nelumbio nimirum specioso, iam patet ex effigie utriusque, quam filius, praematura eheu! morte nobis ereptus, historiae rei herbariae, vernacule scriptae, adiunxit. Radix vero tuberosa, quam iam mali mole tradit Herodotus<sup>91</sup>, edulis, a Theophrasto *κόρσιον* nominatur.<sup>92</sup> *Κόρση* scilicet et *κόρσης*, *κόρσειος*<sup>93</sup>, caput significat. Longe alio vero sensu *κόρσιον* apud Strabonem occurrit<sup>94</sup>: esse nimirum *τράγῆμα τῷ πεπέρει ὅμοιον, μικρῷ αὐτοῦ μεῖζον*. De foliis peltatis, argute serrulatis, supra venoso-reticulatis, subtus pubescentibus nihil antiqui auctores memoriae tradiderunt: florem vero candidum, liliis aut rosis similem: fructum capiti papaveris similem, pariter ac radix, edulem memorant.

Postremo Alexandrini, qui toties coronamentis adhibere lotum consuerant, non potuerunt non colorum modos tum in hac, tum in affini specie animadvertere. Sic Callixenus Rhodius duplicem in loti flore colorem observavit, alterum rosae similem, e quo nexa corona proprie Antinoëa vocetur: alteram coronam loteam appellari, coeruleo colore.<sup>95</sup> Quae lectio, quanquam nonnulli correxerint *κνανέαν χοιράν* in *χιονέαν*, legitima tamen esse videtur, quoniam in remotissimae antiquitatis picturis et monumentis Aegypti superioris coeruleus loti color frequenter conspicitur.<sup>96</sup> Hinc *Nymphaeam coeruleam* Savign. ante hominum memoriam in Aegypto iam notissimam fuisse patet. Nostra aetate haec vocatur *بشنين عربى* (*baschnin arabi*), N. Lotus vero *بشنين الحنزير* (*baschnin alchanzir*).

Cap. CXIII. Cum variis plantarum aquatilium generibus folia sint pinnata aut bipinnata, foliolis pectinatis, setaceis, Hottoniae palustris exemplo, Phellandrii etiam aquatici, Ranunculi aquatilis, Myriophyllorum denique et Ceratophyllorum, quorum caules etiam fistulosi

90) Flor. aeg. p. 159. t. 60. 91) Lib. 2. c. 92.

92) Hist. 4, 8. 93) Nicandr. alex. v. 414.

94) Lib. 17. p. 629. 95) Athen. 15, 21.

96) Delile flor. aeg. p. 163. 164.

esse consuescunt, optio nobis datur eligendi eam, quae magis huic μυριοφύλλῳ conveniat. Quoniam autem nulum floris indicium additur, difficillimus est delectus. Quapropter et Matthiolus Phellandrium aquaticum ac Hottoniam palustrem una cum Myriophyllo spicato et Cera-  
tophyllo demerso hic pingi curavit.<sup>97</sup> His etiam Lobe-  
lius addidit Utriculariam vulgarem.<sup>98</sup> At, cum florem silentio transeat Dioscorides, Sibthorpio assentiendum, qui in Myriophyllo spicato subsistit. Foliorum e caule stel-  
latim aut verticillatim prodeuntium forma ea est, quasi studio perforatum opus, pectinato-reticulatum, sistant.

Cap. CXIV. *Myrrhis odorata* Scop. apprime cum μυρρίδι Dioscoridis congruit, quod Dodonaeus docuit.<sup>99</sup> Chaerophyllum sylvestre, quod Fuchsius<sup>100</sup> hoc nomine insignivit, minus aptum esse videtur. Invenisse se arbi-  
tratur Anguillara veram Myrrhida in Graecia et Sclavonia, Cicutae similem, foliis cauleque hirsuto, umbellis Anetho conformibus luteis, seminibus cumini, radice napiformi, odorata, tenera sapidaque.<sup>1</sup> Eam plantam, a C. Bauhino neglectam, nec ego coniectura assequi possum.

Cap. CXV. Sub μνάργῳ intelligi *Camelinam sativam* Crantz., veri est simillimum, etiamsi comparatio foliorum cum rubiae foliis non apta sit: nec fructus, nec semina cum foeni graeci seminibus componi possint. Nihilominus et his comparationibus patrocinator Anguillara.<sup>2</sup>

Cap. LXVI. Ὀναργα nil esse potest nisi *Epilobium angustifolium*, quod in montosis sylvaticis Graeciae pariter ac totius Europae provenit. Radicis, tradit noster, infusum, a feris animantibus potum, ea mansueta reddere: quod Theophrastus de οἰνοθήρᾳ suo (namque ὁ οἰνοθήρας scribit) hactenus docet, ut radicem in vino datam πρῶτον ποιεῖν καὶ ἱλαρώτερον τὸ ἥθος praecipiat.<sup>3</sup> Hinc cum Marcello Vergilio et οἶναργα, sicut οἰνοθήρας, potius scribendum. De infusi illius usu superest vestigium

97) L. c. p. 812. 813.

98) Ic. 1. t. 791.

99) L. c. p. 701.

100) L. c. p. 524.

1) L. c. p. 284.

2) L. c. p. 285.

3) Hist. 9, 19.

(quis crediderit?) apud Sibiriae orientalis et Camtschatcae incolas. Qui, spirituoso potui e petiolis Heraclei Sphondylii parato aliquid sedantis et permulcentis addituri, medullam caulium Epilobii huius, quae inter cupedias earum gentium locum non infimum obtinet, illi potui admiscunt.<sup>4</sup> Comedi et in Suecia turiones huius plantae, Linnaeus testatur.<sup>5</sup>

Nostrae de ὀνύχα sententiae e maioribus nostris solus accedit Caesalpinus.<sup>6</sup> Reliqui fere silentio eam transeunt.

Cap. CXVII. Κίρσιον videtur esse *Carduus tenuiflorus* Curt., in Archipelagi insulis frequens. Caulis e foliis decurrentibus dicitur hic triangularis: folia omnia sunt incana, subtus lanata, ambitu sinuata, spinosa; radicalia lyrata, rosaceo-congesta, flores aggregati, purpurei. *Cirsium monspessulanum* All., quod Matthiolus<sup>7</sup>, melius pictum Dodonaeus<sup>8</sup> exhibent, minus congruit, cum folia non albicantia sint, neque hirsuta.

Cap. CXVIII. Asterem atticum eundem esse cum Amello Virgilii<sup>9</sup> et Columellae<sup>10</sup>, inde efficimus, quod flos purpureus simul et luteus dicatur. Itaque *Asterem Amellum* L. esse censemus. Quodsi vero cum Oribasio πογγυροῦν omittimus, maioris momenti instar habentes βουβωνίου cognomen, facile inducimur, Inulam Bubonium cum Tabernaemontano<sup>11</sup> huc trahere. Sed salva est prior sententia, a Matthiolo iam pronunciata<sup>12</sup>, cum Aster Amellus atticus dictus sit, quia in Attica frequens est.<sup>13</sup> Tritissimus est locus Virgilii:

„Est etiam flos in pratis, cui nomen amello  
 „fecere agricolae, facilis quaerentibus herba.  
 „Namque uno ingentem tollit de caespite sylvam,  
 „aureus ipse, sed in foliis, quae plurima circum  
 „funduntur, violae subluceat purpura nigrae.“

4) Gmelin flor. sibir. 1. p. 218.

5) Flor. suec. n. 331. 6) Lib. 6. c. 70.

7) L. c. p. 817. 8) L. c. p. 737.

9) Georg. 4, 271. 10) Lib. 9, 4. 4. 11) Herb. p. 716.

12) L. c. p. 817. 818. 13) Flor. graec. 2. p. 179.



quem egregie Martynius illustravit.<sup>14</sup> Quamnam vero intelligat plantam Anguillara, quae, in Italia ac Graecia vulgaris, flores aut luteos aut purpureos stellaeformes gerat, caulem foliaque habeat pilosa, quae dicatur a rhizotomis Filius ante patrem, in Zacyntho autem δωδεκαμνῆτις, me plane fugit.<sup>15</sup>

Cap. CXIX. Ἰσόπυρον verutu difficillimum est. *Corydalis* autem *claviculata* Pers., in agro Argolico obvia<sup>16</sup>, ut per omnem Europam temperatam, plura coniungit κριτήρια, quae ad ἰσόπυρον accedunt. Folia sunt composita, pedata, glauca, foliolis ovatis, incis: petioli communes cirris divis: terminantur. Flores fructusque in spica subcapitata congesti sunt: siliquae lanceolatae semina ut plurimum terna, nigra, minuta, acriuscula continent. Haec saltem coniectura magis arridet, quam Dodonaei hallucinatio, qui Menyanthen trifoliatam<sup>17</sup>, textu ad lubitum mutato, aut Caesalpini<sup>18</sup>, qui Lathyrum Ochrum Cand., aut Columnae<sup>19</sup> etiam, qui Aquilegiam vulgarem huc trahit. Nota demum est macula, qua doctrinae splendorem aspersit Matthiolus, dum Anisi foliis appictis Nigellae flori, mendacem hanc formam ἰσοπύρου nomine insigniret.<sup>20</sup>

Cap. CXX. Ad caput de viola illustrandum nihil prorsus habeo quod addam, maxime cum alibi iam uberius de toto hoc genere egerim.<sup>21</sup>

Cap. CXXI. In capite de Cacalia Plinius alia quaedam legit, quae si genuina putaverimus, satis diversam ab iis indicant plantam, quas primi rei herbariae instauratores intellexerunt. Is enim semen „margaritis minutis simile“ tradit.<sup>22</sup> Quod si componimus cum flore βούρη ἢ ἐλαία εἰκόσι, coniecturae locus datur, *Mercurialem tomentosam* subesse. Maiori saltem iure id perhibetur, quam si cum Lobelio<sup>23</sup> *Cacalia* alpinam, aut cum Clu-

<sup>14</sup>) Georg. p. 450. 451.

<sup>15</sup>) L. c. p. 285.

<sup>16</sup>) Flor. graec. 2. p. 51.

<sup>17</sup>) L. c. p. 580.

<sup>18</sup>) Lib. 6. c. 5.

<sup>19</sup>) Phytobas. p. 1.

<sup>20</sup>) L. c. p. 820.

<sup>21</sup>) De antiqu. bot. p. 1—15.

<sup>22</sup>) Lib. 25, 85.

<sup>23</sup>) Adv. p. 255.

sio<sup>24</sup> Cac. albifrontem, aut demum cum Anguillara Conyzam candidam<sup>25</sup> substituerimus. Etenim, si etiam recesserimus a patria utriusque prioris, alpibus Germaniae australis, nihil est in floribus earum plantarum, quod cum βούω aut olivae flore comparari possit: rubri enim sunt cum anthodio ipso, ac, sicut Conyza, cito ἐκπαπ-  
ποῦνται. Nec quicquam albi est in omnibus Cacaliae alpinae partibus. Cac. albifrons habet quidem faciem inferiore foliorum incano-tomentosam, et Conyzae candidae folia sunt albo-lanata, sed florum forma nimis differt.

Cap. CXXII. Βουνίου nomen mallet a voce βουνός, collis, derivare, quam propter similitudinem cum βουνιάδι (lib. 2. c. 136.) ita appellatam fuisse. Nomen aegyptium Rossius e proceritate plantae proficisci arbitrat<sup>26</sup>. Punicum nomen ad contrarium ducit: זעיר, arab. صغير, syr. ܙܥܝܪ, exilis. Oppidorum nomina esse ζυγάρι et θαψώ, Bochartus suspicatur<sup>27</sup>, illud צוער, hoc תפסא, Thapsacum ad Euphratem, in quorum forte vicinia creverit herba; quod mihi fere e vano haustum esse videtur.

Plantam ipsam Dodonaeus<sup>28</sup> habet pro *Pimpinella dissecta* Retz. Alio loco<sup>29</sup> τὰ βολβοκάστανα Alexandri Tralliani<sup>30</sup> Dodonaeus bene illustrat. Unde nescio, quo iure dicere Conr. Gesnerus potuerit<sup>31</sup>, Bunium Dodonaei verius Bulbocastanum appellari. Utrumque enim bene distinguit. Sed Lobelius utique suspicatur, Bunii nomine Bulbocastanum Tralliani indicari.<sup>32</sup> Posterius vero, Dalechampii exemplo<sup>33</sup>, *Sium* nostrum *Bulbocastanum* Bunii Dodonaei titulo introduxerunt, quam genericam appellationem et Linnaeus retinuit. Nullo sane iure: namque nec folia inferiora cum apii, nec superiora cum coriandri

24) Stirp. pannon. p. 500.

25) L. c. p. 286. 26) L. c. p. 52.

27) Can. p. 760. 28) L. c. p. 315.

29) L. c. p. 333.

30) Lib. 7. p. 512. τὰ βολβοκάστανα Guintherus Andernacensis ad lubitum mutavit in βαλανοκάστανα.

31) De hort. Germ. f. 251<sup>a</sup>.

32) Adv. p. 71. 33) L. c. p. 774.

foliis ullam habent similitudinem. Quibus accedit, si flores anetho similes dicuntur, id pariter ac in ἐλαφοβόσκου floribus (lib. 3. c. 73.) de colore esse intelligendum; nec ullam fieri radicis tuberosae esculentaeque mentionem. Itaque totum id commentum de βολβοκαστάνων cum βουνίω coniunctione explodendum esse videtur. Fateor autem cum Anguillara, me plane nescire, ad quam plantam τὸ βούνιον referendum sit.

Cap. CXXIII. Ψευδοβούνιον Dodonaeus primus habuit pro *Barbarea vulgari* R. Br., quia folia ramulosque ferat napi similia.<sup>34</sup> Ea autem comparatio e Dioscoride saltem hausta non est: codices enim omnes ac ipsae editiones habent βουνίω, quod cum napo nihil habet communis. In Plinii hallucinationibus fontem dispicimus errorum eorum. Etenim, postquam de rapis disservisset, pergit<sup>35</sup>: „Naporum duas differentias et in medicina Graeci servant. Angulosus florum caulibus florentis, quod bunion vocant, purgationibus feminarum et vesicae et urinae utile decoctum etc.“ — „Alterum genus buniada appellant, et raphano et rapo simile.“ Hac interpretatione decepti instauratores rei herbariae bunion Dioscoridis naporum generibus adnumerarunt, ut iam Marcellus Vergilius de pseudobunio dicat: napi, quod bunion vocant, folia habet. Eum errorem, a Matthiolo etiam repetitum, primus correxit Lobelius<sup>36</sup>, Pseudobunium recte ferulaeis plantis accensens, quod alio loco<sup>37</sup> Peucedani facie plantae pusillae nomine delineat. Est vero *Pimpinella dioeca*.

Equidem sic iudico: pseudobunium est planta foliis bunii, dodrantalis, quae in Creta provenit, *Pimpinella tenuis*, a Sieberio in Creta inventa, quae et ultra dodrantem erigitur, caule ramoso, foliis inferioribus subrotundo-cuneatis, crenatis, superioribus lanceolato-linearibus integerrimis. Affinitas igitur inter hanc et dissertam negari non potest.

34) L. c. p. 712. Cf. et Anguillara, p. 287.

35) Lib. 20, II. 36) Advers. p. 70. 37) Ic. I. t. 745.

Cap. CXXIV. *Χαμαίισος* ab omnibus propemodum auctoribus, duce Brunfelsio<sup>38</sup>, pro *Glechoma hederacea* L. habetur. Cui tamen cum florum color repugnet, nescio, an *Antirrhinum Asarina* L., floribus albis leviter purpurascentibus, Galliae provincialis et narbonensis incolae, praeferendum sit. Eam plantam primus adumbravit Lobelius.<sup>39</sup>

Cap. CXXV. Cum Plinius<sup>40</sup> chamaepeuci folia tribuat laricis, neglecto flore, instauratores rei herbariae praepostere egerunt, dum Plinii perversam interpretationem ipsi Dioscoridis textui praeferrent. Inde iam Valer. Cordus<sup>41</sup> *Lycopodium clavatum*, *Anguillara Camforosmam monspeliacam*<sup>42</sup> ita nominarunt. P. Alpinus aliam introduxit Chamaepeucen, floribus quidem roseis et foliis quadantenus pinuum folia simulantibus, sed subtus ramisque lanatis, quae itaque *δλόχλωρος* nominari nequit.<sup>43</sup> Est *Staehelina* (Pteronia mihi) *Chamaepeuce* L., in Creta et Asia minore crescens.

Cap. CXXVI. Mire corruptum punicum cognomen legendum esse arbitror: *ܠܫܢ ܐܠܬܘܪ*, ut *γλώσση βοός* reddatur. Marcellus Burdigalensis *burdunculum* appellat, quae alias lingua bovis dicatur.<sup>44</sup> Ex eo gallico vocabulo nata est medio aevo *Boraginis* vox, quam, quasi in Dioscoride occurrat, Matthaeus Sylvaticus iam habet.<sup>45</sup> Translationem hanc ad Boraginem ab Avicenna inde repetendam esse, patet ex iis, quae de *لسان الثور*, buglosso suo, notat.<sup>46</sup> Esse nimirum herbam latis foliis, sicut Maru, ad tactum asperis, ramis pariter asperis, sicut pedes locustae (pansis); colorem eius ex viridi et flavo conspici. Petendam autem potissimum esse e Khorassan, foliis callosohirsutis: namque aliam vulgarem esse Maru. Ex his quidem patet, buglossum Avicennae alienum esse a Dioscoridis, Buglossum e Bactriana ortum ducere, atque ad id fuisse

38) Tom. 1. p. 167.

39) Obs. p. 329.

40) Lib. 24, 86.

41) Hist. f. 111 b.

42) L. c. p. 202.

43) De plant. exot. p. 76. 77.

44) Cap. 5. col. 260, ed. H. Steph.

45) Pandect. f. 42 c.

46) Ed. arab. p. 200.



applicatum; quod de buglosso Dioscorides et Plinius tradidere, hilaritatem afferre ac „animi voluptates augere, unde et euphrosynum vocari,“ Plinius scribit.<sup>47</sup> Unde et adagium illud medii aevi: „*Ego borago gaudia semper ago*,“ quod Gerardus ita vertit: „*I borrage bring always courage*.“<sup>48</sup> Eam commutationem senserunt Nicol. Leonicens<sup>49</sup> et Marcellus Vergilius, unde poster<sup>50</sup> tandem, Brunfelsio praeunte<sup>51</sup>, ad *Anchusae* species, italicam maxime Retz., confugerunt, in qua etiam subsistit Sibthorpius<sup>52</sup>, cum per omnem Graeciam vulgaris nuperis Graecis etiam *βουδόγλωσσον* dicatur.

Cap. CXXVII. *Cynoglossum* nostrum officinale intelligi, non dubito, tametsi caule carere dicatur. Planta enim saepe per duos annos caulem floriferum non emit, eo efficacior, quo minus floruit. Quamnam Plinius coram habuerit plantam, cynoglossos ipsi dictam, topiariis operibus gratissimam<sup>53</sup>, divinare nequeo.

Cap. CXXVIII. *Phyteuma* Narbonensium dixit Lobelius<sup>54</sup> plantam, huc omnino facientem, quippe *Reseda* est *Phyteuma*, cuius fructus aperti, quasi forati conspiciuntur. Campanula persicifolia L., quam huius loci esse Matthiolum<sup>55</sup>, Antirrhinum Orontium, quod Dodonaeus,<sup>56</sup> *Asterocephalus* Columbaria, quam Columna<sup>57</sup> huc pertinere credidit, minus quadrant.

Cap. CXXIX. *Λεοντοπόδιον* Matthiolum bene recognovit.<sup>58</sup> Est planta alpina, *Gnaphalium* *Leontopodium* L. Magis quadrat, quam *Plantago* cretica, quam eo nomine Honor. Bellus<sup>59</sup> et Clusius<sup>60</sup> produxerunt. Ea enim non caulescit. Nec *Micropum* erectum, cui Sibthorpius favet<sup>61</sup>, nomine Dioscoridis insigniverim, cum flores neutiquam nigricantes sint.

47) Lib. 25, 40. 48) Gerard. emac. p. 797.

49) De Plinii erroribus, lib. 4. f. 60.

50) Tom. 1. p. 111, 112.

51) Flor. graec. 1. p. 115.

52) Lib. 25, 41.

53) Advers. p. 320.

54) L. c. p. 316.

55) L. c. p. 185.

56) Phytobas. p. 79. t. 22.

57) L. c. p. 328.

58) Ad Clus. p. 300.

59) Hist. 2. p. 111.

60) Flor. graec. 2. p. 208.

Cap. CXXX. Ῥπόγλωσσον est *Ruscus Hypoglossum*, quod Matthiolus iam docuit.<sup>61</sup>

Cap. CXXXI. Ἀντίρρινον et Theophrasti<sup>62</sup> et Dioscoridis esse *Antirrhinum Orontium*, persuasum habebit, qui fructus formam, vituli naribus similem, comparaverit. Matthiolus iam eo nomine promulgavit.<sup>63</sup>

Cap. CXXXII. Κατανάγκης genera duo sunt, valde diversa. In primo coniungantur indicia erutu difficilia. Coronopodis folia incisa sunt: id vero arescens in terram curvatur, ut speciem unguium milvi exanimati prae se ferat, fructus esse videtur. Iam nescio, an aptior expositio dari possit, aut magis congrua planta deligi, quam *Ornithopus compressus*, cuius folia pinnata apud Dioscoridem habuisse similem videntur valorem ac folia incisa: fructus vero, seu lomenta arcuata, rugosa cum unguibus γαμψώνυχος omnino comparari possunt. Nisi foliorum forma respicienda esset, Scorpiurus forte sulcata fructibus melius exprimeret formam. Id saltem persuasum habeo, nec Lathyrum Nissoliam, a Dodonaeo<sup>64</sup> et Lobelio<sup>65</sup> huc relatum, nec Plantaginem Lagopoda, a Rauwolfio<sup>66</sup> adductam, nec Impatientem Balsaminam, quam Caesalpinus praefert<sup>67</sup>, ullo modo huc pertinere.

Altera κατανάγκη mihi saltem *Astragalus magniformis* Herit. videtur, in Syria Asiaque minore obvius.

Cap. CXXXIII. Maioribus nostris fuit certamen de rite definiendo τριπολίω: Dodonaeo Asterem Tripolium L.<sup>68</sup>, Fabio Columna vero Plumbaginem europaeam designantibus.<sup>69</sup> In illo quidem pauca congruunt, in hoc pleraque, maxime folia isati similia. Quantopere saepe lapsus sit Plinius in vertendis Graecorum exemplaribus, vel inde elucet, quod colorum mutationem, quam in floribus Dioscorides animadvertit, ad folia Polii vulgaris traduxerit.<sup>70</sup> Arabes autem et Latinobarbari, ut iam in

61) L. c. p. 329. 62) Hist. 9, 19. 63) L. c. p. 329.

64) L. c. p. 529. 65) Obs. p. 518.

66) Iter, n. 6. Dalechamp. app. p. 21.

67) Lib. 6. c. 68. 68) L. c. p. 379.

69) Ecphras. p. 161. 70) Lib. 21, 21.

nota 35. ad textum pag. 615. monstravi, Turpethum pro Tripolio ponentes, in gravissimos incidere errores, quos primus Nicol. Leonicens diluere conatus est.<sup>71</sup>

Cap. CXXXIV. Ἀδιάντου nomen a Theophrasto<sup>72</sup> disertis verbis ita explicatur, ut statuatur, in aqua nunquam madescere, nec ullum humoris vestigium in eo apparere, quoniam nusquam persistat. Nomen ergo sortitum est, ὅτι οὐ διαίνεται. Hinc et Nicander:<sup>73</sup>

ἄχραές τ' ἀδιάντον, ἔν' οὐκ ὄμβροιο ῥαγέντος  
λεπταλή πίπτουσα νοτὶς πετάλοισιν ἐφίξει.

Nomen aegyptium Apuleius (c. 97.) scribit *phepere*, quod Rossius herbam coturnicum interpretatur.<sup>74</sup> Ipsa herba autem nil aliud esse potest, quam Adiantum Capillus, stipitibus subtilibus, splendentibus, foliis obovato-cuneatis, lobatocrenatis, quod etiamnum in officinis venditur.

Cap. CXXXV. Τριχομανές, iam a Theophrasto<sup>75</sup> iisdem fere verbis descriptum ac a Dioscoride, omnium consensu est *Asplenium Trichomanes* L., stipite tenui, subnigricante, nitido, foliis pinnatis, subrotundis, crenatis. Addere aliquid, supervacuum est.

Cap. CXXXVI. Ξάνθιον esse nostrum *Xanthium strumarium*, in locis cultis, prope lacus et ambulacra, praesertim qua aqua stagnavit, nascens, nemo dubitabit. Scrofulas discutere folia, Tournefortius testis est.<sup>76a</sup>

Cap. CXXXVII. Αἰγίλωψ, vitium hordei triticique, iam a Theophrasto πολυχίτων vocatur.<sup>76b</sup> Hic vero disertius bina aut terna indicantur involucra, in aristas capillares exeuntia. Nil esse potest, nisi *Aegilops ovata*, per omnem Europam australem obvia. Id iam Dodonaeus optime probavit.<sup>77</sup>

Cap. CXXXVIII. Non magni refert, curatius examinare, quodnam gramen intelligatur, cum βρωμος iam (lib. 2. c. 116.) descriptus sit, cum hoc caput a librariis

71) De error. Plin. lib. 1. p. 57.

72) Hist. 7. 14.

73) Ther. v. 846. Cf. schol.

74) L. c. p. 235.

75) L. c.

76a) Plantes de Paris, 2. p. 124.

76b) Caus. pl. 4. 16.

77) L. c. p. 539.

terioribus assutum videatur, cum denique, si veram habuerit auctor huius capituli notitiam aegilopos, facile suadeamur, Avenam fatuam subesse.

Cap. CXXXIX. *Γλαύξ* a Clusio primo<sup>78</sup> egregie exponitur: est *Astragalus Glaux* L., non soli Hispaniae propria, sed et in Cypri campestribus inventa.<sup>79</sup> Iccirco et in Asia minore provenire vero est simile.

Cap. CXL. *Πολύγαλον* Dioscoridis esse nostram *Polygalam amaram*, Tragus iam indicavit.<sup>80</sup>

Cap. CXLI. *Ὀσύριδα*, quae a Galeno ὄσιρις scribitur<sup>81</sup>, triplici modo interpretati sunt, qui plantas veterum exponere studerent. Controversiam genuit, quod Galenus *κορήματα* ex hoc fruticulo fieri tradat, quam vocem cum plerique scopas vertant, non desunt tamen, qui purgamenta reddant, quod nullo modo sensum tolerabilem promittit. Plinius autem ad *smegmata* muliercularum adhiberi, e veteribus graecis exemplaribus suo more transtulit.<sup>82</sup> Itaque, si primum retinemus significatum, si virgas tenues, fractu contumaces, ideo flexiles et folia saturrime viridia consideramus, *Osyris alba*, frutex per Europam australem Graeciamque ipsam satis frequens, facile dignoscitur: quod C. Bauhinus iam innuit.<sup>83</sup> *Chenopodium* autem *Scopariam* intelligi, inde effecerunt et Dodonaeus<sup>84</sup> et Anguillara<sup>85</sup>, quod et hodie ea herba apud Graecos ἀξυρίς dicatur. Tertia sententia Fuchsii<sup>86</sup> et nonnullorum aliorum minoris est pretii. Linaria enim vulgaris nec adeo nigricantia habet folia, nec fractu tam difficiles ramos: flores autem grandiores sunt, quam quae negligi poterint a Dioscoride.

Cap. CXLII. *Smilax aspera* nomen ad nostrum usque tempus servavit. Est fruticulus subvolubilis aculeatus, foliis hastato-cordatis, aculeato-dentatis, nervosis, baccis racemosis, rubris, qui a Carniolia inde per omnem

78) Hist. 2. p. 240. 241. 79) Flor. graec. 2. p. 88.

80) L. c. f. 216<sup>b</sup>. 81) De fac. simpl. 8. p. 93.

82) Lib. 27, 38. 83) Pin. p. 212.

84) L. c. p. 101. 85) L. c. p. 290.

86) L. c. p. 545.



Europám australem satis vulgaris est. Egregie iam de smilace haec Theophrastus<sup>87</sup>: Τὸ φύλλον κιττώδες, μικρόν, ἀγώνιον, κατὰ τὴν μίσχου πρόσφασιν ὠτηρόν (ad petioli insertionem auriculatum). Ἴδιον δὲ, ὅτι τὴν τε διὰ μέσου ταύτην ὥσπερ ῥάχιν λεπτὴν ἔχει, καὶ τὰς στημονίουσ διαλήψεις (filamentosos s. filiformes nervos) οὐκ ἀπὸ ταύτης, (nempe non a medio nervo, ut venae sint) ἀλλὰ περὶ αὐτὴν περιφερεῖς ἡγμένας ἀπὸ τῆς προσφύσεως τοῦ μίσχου τῷ φύλλῳ. Παρὰ δὲ τοῦ καυλοῦ τὰ γόνата (sic lego loco τὸν καυλὸν τὸν ἄτονον) καὶ παρὰ τὰς διαλήψεις τὰς φυλλικὰς ἐκ τῶν αὐτῶν μίσχων τοῖς φύλλοις παραπέφυκεν ἴουλος λεπτὸς καὶ ἐλικτός (amentum tenue et tortum). Ἄνθος δὲ λευκόν, καὶ εὐωδες, λείρινον (?) — Ὁ δὲ καρπὸς ἐρυθρὸς, ἔχων πυρῆνας, τὸ μὲν ἐπίπαν δύο, ἐν τοῖς μείζοσι δὲ τρεῖς, ἐν δὲ τοῖς μικροῖς ἓνα. E patribus rei herbariae Fuchsius primus hanc stirpem adumbravit.<sup>88</sup>

Cap. CXLIII. Smilax laevis proxime ad Smilacem hortensem (lib. 2. c. 175.) accedit: verum tamen diversam esse stirpem, statim elucet. Ideoque cum Fuchsio<sup>89</sup> sentimus, esse *Convolvulum sepium*, qui μαλακόκισσος Pseudo-Democrito<sup>90</sup> vocatur.

Cap. CXLIV. Myrtum sylvestrem seu ὀξυμυρσίνην esse *Ruscum aculeatum*, Anguillara bene notavit.<sup>91</sup> Fructum dixerunt Arabes, praeunte Serapione<sup>92</sup>, كبابه (*khabâbath*), unde *cubebae* Latinobarbarorum. Eum errorem primus Leoniceus oppugnavit.<sup>93</sup>

Cap. CXLV. Laurus alexandrina, iam a Theophrasto<sup>94</sup> enumerata, est *Ruscus Hypophyllum*, egregie adumbratus a Fab. Columna (Ecphras. 1, 165.)

Cap. CXLVI. Daphnoidem habeo *Daphnen alpinam*, in montibus Europae australis et Asiae mediae provenientem. Folia sunt laurinis similia, sed molliora et angustiora. Flores albi in medio gerunt germen conicum. Tota planta, maxime cortex et folia, principio scatent acri,

87) Hist. 3, 18.

88) L. c. p. 718.

89) L. c. p. 719.

90) Geopon. 2, 26. Cf. Anguill. p. 92.

91) L. c. p. 291.

92) L. c. c. 288. f. 166<sup>a</sup>.

93) L. c. f. 10.

94) Hist. 1, 10. 3, 17.

cuius ope cortex *Daphnis Mezerei* notissimum sistit epispasticum. *Daphne Laureola*, quam cum Dodonaeo<sup>95</sup> Lobelius<sup>96</sup>, Anguillara<sup>97</sup> et Caesalpinus<sup>97</sup> huc trahunt, recedit foliis latitudine laurina aequantibus, flore etiam flavo.

Cap. CXLVII. *Χαμαιδάφνη* *Ruscus racemosus* esse videtur, quamquam *R. Hypophyllum* Fab. Columna habeat<sup>99</sup>, Brunfelsius Vincam minorem, Lobelius insuper *Daphnen Mezereum*.<sup>100</sup>

Cap. CXLVIII. Ellebori albi nomen aegyptium Iablonskius<sup>1</sup> et Rossius genituram seu progeniem Herculis interpretantur.<sup>2</sup> Aliud nomen idioticon Apsyrthus habet, *καρπίον*.<sup>3</sup> Est autem Dioscoridis bona descriptio, quae in *Veratrum album* quadrat, excepta caulis altitudine, quae neutiquam palmaris est, sed cubitalis et bicubitalis.

Cap. CXLIX. Ellebori nigri nomen aegyptium Rossius nigrum purgans vertit.<sup>4</sup> Est vero *Helleborus officinalis* Salisb., (*orientalis* Lam.), distinctus floribus purpurascentibus, foliis serratis, subtus pubescentibus. Crescit in Graecia, Macedonia, Thracia et Asia minore.

Cap. CL. *Σησαμοειδές* antiquitus dicebatur fructus ellebori albi, propter similitudinem cum sesami fructibus.<sup>5</sup> Quanquam eius loquendi usus etiam noster mentionem facit, hic tamen alienam profert herbam. Hanc Dalechampius credidit in *Daphne Tartonraira* recognoscere.<sup>6</sup> Caesalpinus vero *Resedae* species huc referens, laud disertis verbis Dioscoridis plantam notavit<sup>7</sup>, quae mihi *Reseda mediterranea*, in Graecia utique proveniens, esse videtur.

Cap. CLI. Sesamoides parvum credo in *Reseda canescente* agnoscere, quae in Aegypto et Asia minore inven-

95) L. c. p. 363.

96) Adv. p. 156. Obs. p. 200.

97) L. c. p. 291.

98) Lib. 4. c. 6.

99) Ecphras. 1. p. 165.

100) Adv. p. 155.

1) L. c. p. 323.

2) L. c. p. 203.

3) Hippiatr. p. 43.

4) L. c. p. 85.

5) Erotian, expos. voc. Hipp. p. 346. Galen. de fac. simpl. 8. p. 120.

6) L. c. p. 1669.

7) Lib. 9. c. 34.

ta est. Folia lineari-lanceolata, pilosa, flores albidii quidem, sed antherae fulvo-purpurascens id patefaciunt. Multo minus descriptioni respondent Catananche coerulea L., quam Matthiolus<sup>8</sup>, Passerina hirsuta aut polygalaeifolia Lapeyr., quam Dalechampius<sup>9</sup> et Bauhinus<sup>10</sup> huc trahunt.

Cap. CLII. *Σίκυς ἄγριος* (*σίκυς ἄγριος* Theophr.<sup>11</sup>, *σίκυς ἀγρότερος* Nicandri<sup>12</sup>) familiae quidem Cucurbitacearum habitum ostendit, sed nec Cucumeri sativo, nec Meloni similis est. Namque caulis erectiusculus est et fructus elliptici muricato-echinati cum cucumeris fructibus remotissimam gerunt affinitatem. Est vero *Momordica Elaterium*, in Graecia satis vulgaris planta, cuius succus amarissimus et hodie purgante vi insignis celebratur. De vino autem, quod ad temperandam radicem suadet, sic iudico: *λίβυκόν*, quod editiones habent, esse nequit, quoniam id, e fructibus Zizyphi Loti paratum, nonnisi apud plebem Alexandriae usitatum<sup>13</sup>, ultra decimum diem non durabat, proinde, ut usus poscebat, parabatur.<sup>14</sup> *Λιγυστικὸν οἶνον* vero, quem boni codices habent, cum nec Galenus nec noster uspiam memorent, expositu difficilem habeo, ni consilium transtuleris ad *λιγυστικοῦ* herbae aromaticae (lib.3. c.51.) parationem vinosam, quae etiamnum in alpibus helveticis et Apennino monte domesticum praebet remedium.

Afrum vel punicum nomen scribo *פִּנְיֹן מִזְרִי*, verendum *cucumis comprimendus*. Quodsi enim fructum maturum manu comprehenderis, impetu singulari ita dissilit, ut succus cum seminibus procul eiciatur. Arabibus dicitur planta *قنأ الحمار* (*kitsa alhemâr*), unde cucumis asininus officinarum.

Elaterium, quod e fructibus paratur, probatissimum esse noster asserit, quod facile ad lucernam accendatur.

8) L. c. p. 847.

9) L. c. p. 1070.

10) L. c. 1. p. 695.

11) Hist. 7, 6, 3, 9.

12) Ther. v. 867.

13) Strabo lib. 17. p. 525.

14) Polyb. apud. Athen. 14, 65.

Id verum esse, exploratum habemus. Contrarium statuit Theophrastus<sup>15</sup>, qui, ob humiditatem inhaerentem etiam post quinquaginta annos flammam extinguere perhibet. Plinius addit<sup>16</sup>: hoc veri experimentum esse, si admotum, prius quam exstinguat, scintillare sursum ac deorsum cogat. Etiam si enim pinguedo elaterio inhaerens flammam nutriet, adiunctus tamen est humor, qui scintillare flammam, et, ubi praevaluerit, exstingui iubet.

Cap. CLIII. *Delphinium Staphis agria*.

Cap. CLIV. *Thapsia Asclepium*. Punicum nomen, quod Bochartus male exponit, nescio an a  $\text{𐤓𐤓}$ , loco deserto, derivandum sit.

Cap. CLV. *Spartium iunceum*.

Cap. CLVI.  $\Sigma\lambda\upsilon\beta\omicron\nu$  esse *Silybum marianum* Gaertn., iam Lobelius ratus est.<sup>17</sup>

Cap. CLVII. Multo melior est arboris huius descriptio apud Theophrastum<sup>18</sup>, qui folia recte cum foliis myrti comparat, arborem dicit proceram, sed ramis divaricatis ( $\pi\alpha\rho\epsilon\sigma\tau\rho\alpha\mu\acute{\epsilon}\nu\omicron\nu$ ). Est *Hyperanthera Moringa* Vahl., in Aegypto, Arabia et India orientali proveniens. Belonius primus arborem, prope montem Sinai inventam, descripsit.<sup>19</sup> Oleum, e cotyledonibus expressum, in omni oriente usitatum, eapropter praedicatur, quod non facile rancorem contrahat. Fructum iam Galeni aetate  $\mu\nu\rho\omicron\beta\alpha\lambda\acute{\alpha}\nu\omicron\nu$  nomine insignitum fuisse, patet e locis citatis.<sup>20</sup>

Sed ingens nata est apud seriores Graecos confusio, postquam Arabes fructus indicos longe diversos introduxerunt, quos praeter Zosimum Panopolitam<sup>21</sup> et Io. Actuarius<sup>22</sup> et Nic. Myrepsicus<sup>23</sup>  $\mu\nu\rho\omicron\beta\alpha\lambda\acute{\alpha}\nu\omicron\nu$  nomine praedicarunt. Arabes ipsi huius erroris non accusandi sunt. Appellant enim nostram  $\beta\acute{\alpha}\lambda\alpha\nu\omicron\nu$   $\text{𐤁𐤏𐤍}$  (*bân*), indicos vero

15) Hist. 9, 14. 16) Lib. 20, 3.

17) Adv. p. 366. 18) Hist. 4, 2.

19) Obs. 2, 61.

20) De compos. med. sec. loc. lib. 9. p. 239. Meth. med. 13. p. 911. Cf. Geopon. 20, 28.

21) du Cange glossar. inf. graec. 1. p. 375.

22) Meth. med. 5, 8. col. 274. ed. Steph.

23) De antid. 1, 24. col. 363. ed. Steph.



illos fructus *هليلج* (*heliledsch*), *املج* (*emledsch*) et *بليلج* (*beliledsch*.) Nullam hi similitudinem cum *βαλάνω* nostra, nec quoad efficaciam, habent. Astringunt enim et purgant.<sup>24</sup> Neque tamen eo minus gravem eum errorem per omne fere medium aevum animadvertimus<sup>25</sup>, adeo pertinacem, ut et Linnaeus nomen genericum *Myrobalani* pro indicis arboribus istis retinuerit.<sup>26</sup> Tandem Koenigii, Retzii, Gaertneri et Roxburghii studiis debemus veriorum indicarum myrobalanorum notitiam. *Emledsch* Arabicum est *Emblica officinalis* Gaertn.<sup>27</sup>, *Beliledsch* *Terminalia Bellirica* Roxb.<sup>28</sup>, *Heliledsch* *Term. Chebula* Retz.<sup>29</sup>

Cap. CLVIII. *Narcissus poëticus* manifestus est et vulgaris notitiae.

Cap. CLIX. *Ἰπποφάεξ* esse *Euphorbiam spinosam*, fruticulus iam in Carniolia obvium, in Gallo-provincia et Graecia vulgarem, Honorius Bellus<sup>30</sup> probavit. *Galestividae* alterius nomine citat: P. Alpinus vero *Tithymali spinosi cretici* appellatione breviter adumbratam stirpem delineavit.<sup>31</sup>

Cap. CLX. *Ἰππόφαιστον* primus Fab. Columna<sup>32</sup> bene illustravit: est *Cirsium stellatum* Allion., planta, nisi floret, humilis, spinis axillaribus basi ramosis. Saepe per annum integrum non floret: tum vero radix succo scatet. *Κεφάλια χαῦνα* dicit anthodia spinosa, quorum flores abortiunt, quod in tenui solo non raro contingit.

Cap. CLXI. *Κίκι* esse vocem aegyptiam, certissimum est. Herodotus enim<sup>33</sup>, Galenus<sup>34</sup>, multique antiqui cum Hesychio id testantur. Et ebraica vox *קיקיון*<sup>35</sup> ex aegyptia formata esse videtur. Arabes *خروء* (*cherva*) vocant.<sup>36</sup>

24) Serap. c. 95. 107.

25) Matth. Sylv. f. 151. 152.

26) Mat. med. n. 662. ed. Schreb.

27) De fruct. 2. p. 222.

28) Plant. lorom. 2. t. 198.

29) Roxb. 1. c. t. 197.

30) Ad Clus. 2. p. 508.

31) Exot. p. 502.

32) Phytobas. p. 85. t. 24.

33) Lib. 2. c. 94.

34) Expos. voc. Hipp. p. 508.

35) Ion. 4. 6.

36) Cf. Bochart. hieroz. 2. p. 295. Ol. Cels. hierob. 2. p. 275. Iablonsky opusc. 1. p. 110—112.

Cap. CLXII. *Tithymalorum* species indicantur sequentes :

α. *Euphorbia Characias*, in Europa australi vulgaris.

β. *Euph. Myrsinites*, foliis spathulatis, mucronatis, coriaceis, pariter in Europa australi obvia.

γ. *Euph. Paralias*, ad litora maris mediterranei proveniens.

δ. *Euph. helioscopia*, per omnem Europam satis vulgaris.

ε. *Euph. Cyparissias*, qua vulgatio nulla.

ς. *Euph. dendroides*, in Italia, Sicilia et Creta inventa.

ζ. *Euph. platyphylla* nullam habet cum *Verbascum* similitudinem, nisi quod folia sint subtus pubescentia.

Cap. CLXIII. η. *Euph. Pityusa* in Hispania, Italia et Gallia crescit. Folia sunt lineari-lanceolata, glauca, infima retrorsum imbricata: flores fusco-purpurei. Crescit in Italia superiore, Carniolia et Graecia.

Cap. CLXIV. θ. *Euph. Lathyris*.

cap. CLXV. ι. *Euph. Peplus*, in hortis vineisque umbrosis per Europam temperatam obvia.

Cap. CLXVI. κ. *Euph. Peplis* bene expressa est. Procumbit enim, ramosissima, foliis carnosis, semicordatis, obtusis, rubentibus, cum *Portulaca* comparanda.<sup>37</sup>

Cap. CLXVII. λ. *Euph. Chamaesyce*.

Cap. CLXVIII. Duas distinguit recte Dioscorides *σκαμμόνιας* species, mysiacam alteram, praestantiorem, alteram syriacam. Illam Rufus Ephesius<sup>38</sup> testatur ad Olympon asiaticum et circa Colophonem optime crescere, et in Peloponneso invenit Sibthorpius.<sup>39</sup> Est *Convolvulus farinosus*, caulibus farinosis, foliis cordatis, pubescentibus. *Conv. Scammonaea* vero, foliis sagittatis acuminatis, postice truncatis, non solum in Syria, sed etiam in Asia minore et in ipsa Tauria inventa est. Eam, a Busbequo acceptam, Matthiolus primus promulgavit.<sup>40</sup>

37) Cf. engl. bot. t. 2002.

39) Flor. graec. i. p. 133.

38) Fragm. p. 21. ed. Matth.

40) L. c. p. 870.

Cap. CLXIX. *Χαμελαίας* cognomen *ανέωρον* et apud Galenum occurrit<sup>41</sup>, et a Linnaeo adhibitum est ad plantam designandam, quam, in Gallia et Italia vulgarem, *Chamelaeam tricoccon* cum Matthiolo<sup>42</sup> fere omnes seriores nominarunt. Est *Cneorum tricoccon* L. Hoc tamē minus placet, quam *Daphne oleoides* Schreb.<sup>43</sup>, quam etiam ad *χαμελαίαν* Dioscoridis Sibthorpius trahit.<sup>44</sup> Est fruticulus ramosus, spithamaeus, foliis crebris lanceolatis, unguicularibus, glabris, non solum in Creta obuius, sed et in Corsica et in Sardinia.

Cap. CLXX. *Θυμέλαια* est *Daphne Gnidium* L., frutex, foliis lineari-lanceolatis, cuspidatis, floribus racemosis, candidis. In Gallia provinciali, Sardinia, Neapoli et Asia minore lecta exemplaria vidi. Plerique patres rei herbariae, Matthiolo et Clusio<sup>45</sup> praeceuntibus, eandem agnoscunt.

Cap. CLXXI. CLXXII. De *Sambuco nigra* et *Ebullo* nulla existere potest dubitatio.

Cap. CLXXIII. In *πυκνοκόμῳ* interpretando magno-pere distant Anguillara<sup>46</sup> et Columna.<sup>47</sup> Ille plantam sub eo nomine describit, quam libenter *Leonurum Marrubiastrum* L. dixerim. Hic *Succisam pratensem* Mönch. delineat. Illi radix, huic omnia obstant.

Cap. CLXXIV. *Ἄπιος* est *Euphorbia Apios* L., quam egregie Clusius delineavit.<sup>48</sup> Punicum nomen aliter ac Bochartus expono: scilicet *טַרְפַּת שָׂדֵה* est *herba sempervirens campestris*: *טַרְף* scilicet et *טַרְף* chald. *folium* et *frons*.

Cap. CLXXV. *Cucumis Colocynthis*, fructibus globosis, glabris, in Nubia et Aegypto<sup>49</sup>, tum etiam in Arabia, ubi *حَنْضَل* (*handal*) vocatur<sup>50</sup>, sponte crescere, exploratum habemus. Ergo et veteribus nota fuit.

Cap. CLXXVI. *Ἐπίθυμον* sic intelligo: esse florem

41) De compos. med. sec. loc. lib. 9. p. 263.

42) L. c. p. 871.

43) Ic. plant. minus cognit. t. 7.

44) Flor. graec. 1. p. 260.

45) Hist. 1. p. 87.

46) L. c. p. 298.

47) Phytobas. p. 28. t. 10.

48) Hist. 2. p. 190.

49) Delil. fl. aeg. p. 29.

50) Forsk. fl. arab. p. 122.

(certe peregrinum) thymi thymbraeque speciebus hospitaliter innascentem, gerere capitula levia, tenuia, longis instructa et capillaceis caudulis. Ecquis haesitaverit *Cuscutam Epithymum* agnoscere, quae in fruticibus varii generis, praesertim Thymo, hospitatur?

Cap. CLXXVII. *Globularia Alypum*, a Lobelio primo<sup>51</sup> illustratum, ad oras maris mediterranei non rarum est.

Cap. CLXXVIII. Ἐμπετρον iam Pandulf. *Collenucius*, adversarius Leoniceni, interpretatus est *Cachryn* (Crithmum L.) *maritimam*.<sup>52</sup> Quod ob salsum saporem et amaricantem probabile est. Caesalpinus tamen in *Salsoe* specie substituit.<sup>53</sup> *Herniaria glabra*, quam hoc nomine Tragus adducit<sup>54</sup>, plane aliena est. Nec satis intelligo stirpem, quam Anguillara ita appellat<sup>55</sup>, quamque Passerinam polygalifoliam facit Bauhinus.<sup>56</sup>

Cap. CLXXIX. Κληματῖς, quae eadem habetur a Clusio<sup>57</sup> et C. Bauhino<sup>58</sup> ac ἀθραγένη Theophrasti<sup>59</sup>, a plerisque maioribus nostris declaratur *Clematis Vitalba*. Sed multo melius Sibthorpius *Clematida cirrosam* praefert, circa Athenas obviam.<sup>60</sup>

Cap. CLXXX. Ἀμπελος ἀγρία est *Tamus communis*.

Cap. CLXXXI. Ἀμπελος λευκή — *Bryonia dioeca*.

Cap. CLXXXII. Ἀμπελος μέλαινα — *Bryonia alba*.

Cap. CLXXXIII. Πτέρις — *Aspidium Filix mas*.

Cap. CLXXXIV. Θηλυπτέρις — *Asplenium Filix femina* Bernh. (*Polypodium* L.)

Cap. CLXXXV. Πολυπόδιον — *Polypodium vulgare*.

Cap. CLXXXVI. Δρυοπτέρις — *Polypodium Dryopteris*.

Cap. CLXXXVII. Κνίκος — *Carthamus tinctorius*.

Cap. CLXXXVIII. Αινόζωστις — *Mercurialis annua*.

Cf. lib. 3. c. 130. Nomen punicum legendum ψηψη, *minister* (Deorum) *Mercurius*.

51) Adv. p. 158.

52) Apud Brunfels 1. p. 187. 53) Lib. 4. c. 40.

54) L. c. f. 200. 55) L. c. p. 301.

56) Pin. p. 463. 57) Hist. 1. p. 122.

58) Pin. p. 300. 59) Hist. 5, 10.

60) Flor. graec. 1. p. 366.



Cap. CLXXXIX. *Κυνοκράμβην* primus Honorius Belius illustravit<sup>61</sup>, post eum C. Bauhinus.<sup>62</sup> Est *Thelygonum Cynocrambe*. Nomen punicum est *לְבָן שְׂמִינִי*, *Mercurialis alba*.

Cap. CXC. *Ἡλιοτρόπιον μέγα* est *Heliotropium europaeum*.

Cap. CXCI. *Ἡλιοτρόπιον μικρόν* — *Croton tinctorius*. Id bene iam agnoverunt Lobelius<sup>63</sup> et C. Gesnerus.<sup>64</sup>

Cap. CXCH. *Σκορπιοειδές* esse *Scorpiurum sulcatum*, Dodonaeus iam docuit.<sup>65</sup>

## LIB. V.

### I. De Vitis.

Cap. III. V. *Vitis sylvestris*, quae et *labrusca* a labris agrorum, quos coronat, dicitur, non est *V. labrusca* L., quae folia habet subtus incano-tomentosa, Americae borealis incola, sed *V. viniferae* var. *sylvestris*, foliis subtus pubescentibus, quae in Italia, Graecia, Asia minore et Syria sponte provenit, quamque et *Tragus*<sup>66</sup> et C. Gesnerus<sup>67</sup> iam agnoverunt. Huius flores, *oenanthes* nomine, ad condienda odorandaque vina etiam nunc adhibentur.<sup>68</sup>

Cap. VI. *Omphacium*, Italicae nostrae aetatis *agresto* dictum, domesticum est remedium, in uvulae tonsillarumque vitiis iuxta ac in scrofulis et scorbuto laudatum.<sup>69</sup>

Cap. X. *Vinorum differentiae*, e locis natalibus petitae eadem generatim a Galeno statuuntur, ac a nostro. Sunt enim vel *italica*, vel *graeca*, vel *asiatica*.<sup>70</sup> *Italicorum princeps* est *falernum*, proxima *albanum*, caecu-

61) Pon. mons bald. p. 47. 48.

62) Prodr. p. 59.

63) Obs. p. 133.

64) Ic. lign. t. 4. f. 30.

65) L. c. p. 71.

66) L. c. f. 399.

67) De hort. Germ. f. 286.

68) Marcell. Vergil. ad h. l.

69) Pollini flor. veron. x. p. 292.

70) Galen. de sanit. tuenda, 5. p. 334. s.

bum, surrentinum, dein adrianum, mamertinum, in Sicilia generatum, post praetutianum et isticum. Quibus et Galenus signinum adiungit, sabinum etiam et gabianum, tiburtinum et omnia aminaea, quae circa Neapolin colebantur et in Thuscorum regione. Sabinum denique ad compositiones utilissimum iudicat.

E Graecis vinis a nostro chium maxime praedicatur, a Galeno etiam lesbium et ariusium. Pramnium quoque vinum, ab Homero iam celebratum<sup>71</sup>, nigricans et austerum<sup>72</sup>, in insulae Icarì rupe pramnia nasci referunt Eparchides et Semus.<sup>73</sup> Cum alii et lesbium pramnium vocent<sup>74</sup>, videtur omnino generosum et vetustum vinum (ἀπὸ τοῦ παραμένειν) sic appellatum fuisse. Dein praedicantur et thasium et milesium, euboicum etiam et naxium et sciathium, denique et oenuntias et carystium e Laconia, quae Alcman ἄπυρα καὶ ἄνθος ὄσδοντα dixit.<sup>75</sup>

De asiaticis vinis indicium diversum est. Noster videtur ephesium, quod φυγελίτης dicatur, praeferre, taxat tmolites (μεσσωγίτης) et clazomenium. Galenus vero mysium e Mysia Hellesponti praefert, tmolites etiam bonitate cum falerno comparat: austeris et adstringentibus adnumerat sybates in Cilicia et aegeates et peperinium.

Cap. XIII. Vinum secundarium, ab Atticis δευτερίας dictum, ab Asiae incolis στεμφυλίτην appellari, Galenus testatur.<sup>76</sup> Namque στέμφυλα et βρύτια et τρύγα promiscue dici solidas crassasque partes, quae post mustum expressum in uvis supersint.

Cap. XIV—LXXXIII. nulla egent illustratione.

## II. De Metallicis omnibus.

Cap. LXXXIV. Cadmiae factitiae varia genera, eaque plerumque impura, recensentur. In his primum locum obtinet βοτρυίτις, quam nostrates tutiam seu nihil gryseum vocant. Fornacum, in quibus aurichalcum li-

71) Il. 11, 630.

72) Galen. expos. voc. Hipp. p. 548.

73) Athen. 1, 55.

74) Ib. c. 51.

75) Ib. c. 57.

76) De fac. simpl. 2. p. 580.

quatur, parietibus adhaeret, maximam partem e zinco, sed et e cupri particulis constans. Superficies est caesio-cinerea, interna vero compages flavido-cinerea. Secunda *ὀνυχίτις* invenitur in iis fornacibus, in quibus iam diu metalla non sunt excocta.<sup>77</sup> Extus ea pariter coerulescit, sed intus vicissim candidas habet et cinereas venas. Huic *ζωνίτις* proxima et simillima. *Ὀστρακίτις* vero in iisdem fornacum humilioribus locis e terrenis crassisque partibus conflata nascitur. Recte etiam monet auctor, in fornacibus, in quibus pyrites aerosus coquatur, cadmiae varias species reperiri. Cadmiae cetero nomen a Cadmo Phoenice derivatur, qui aeris tractationem usumque Graecos docuerit.<sup>78</sup>

Cap. LXXXV. Pompholyx est favilla zinci, sed impura. Namque vel lapidem calaminarem, vel orichalcum urunt, ut bullarum forma zincum evolet, ad parietes fornacum superiores adhaerens, unde fuligine aliisque peregrinis contaminatae favillae apparent.

Cap. LXXXVIII. Flos aeris ex minutis aeris particulis, milium referentibus, componitur. Fit autem duplici modo: uno, cum aes ex lapidis seu minerae panibus in fornace excoctum de foco per canales defluerit in catinum; altero, cum in singularis foci catino aes, a quo plumbum argentumque fuerint separata, colliquatum fuerit. Utroque enim modo, recrementis iam detractis, candentis aeris massae subinde affunditur aqua, ut in panes dividi possit: quae quia repente densatur et concrevit, florem illum quasi expuit. Hic de panibus, postquam forcipe in lacum aut labrum, ut prorsus restinguatur eorum calor, fuerint proiecti, decidit: ubi tandem, aqua emissa aut effusa, colligitur. Optimus autem facile teri potest, tritusque in pulverem rufum abit modice splendentem.

Cap. XCIX. *Στίμμεως* quemquam ante Dioscoridem mentionem fecisse, vix crediderim. Est vero vox ae-

77) Agricola de nat. foss. 9. p. 351.

78) Hygin. fab. 274.

gyptia, quae Iulio Polluci ἡ στίμμις dicitur.<sup>79</sup> Plinius stibium lapidem candidae spumae nitentisque vocat.<sup>80</sup> Arabibus plura sunt vocabula, metallum id notantia: أتمد (atmad) vulgo et Serapioni, لَمَال (lamála) etiam et لَمَاك (lamákha), لَصِيف (lassíf), postremo vero كَحَال (kachál), collyrium fucum faciens. Namque antiquitus, ut et hodie apud orientales feminas, ad circumscribendum oculis circinum (ὀφθαλμογράφον) et ad denigranda supercilia adhibebatur.<sup>81</sup> Unde et πλατυόφθαλμον et γυναικίον dicebatur. Distinguit vero Plinius marem a femina, illam mineram horridiorem scabrioremque, arenosiore, minus ponderosam aegriusque radiantem. Haec videtur minera stibii vel nigricans vel rigida. Femina vero est Stibium nativum, rarius. Id bene a Dioscoride describitur. Nec ineptum videtur, cum et id moleculas internae compagis tetraëdras, et minera stibii alba assulas seu tabellas tetraëdras ostendat, inde derivare τετραγώνου nomen, quo Hippocratici auctores id insigniisse Galeno dicuntur.<sup>82</sup>

Cap. C. Μολύβδαινα Galena Plinio dicitur, quae iuxta argenti venas plerumque invenitur.<sup>83</sup> Sed eligitur cilicia, quae flava sit ac splendeat, admodum rara species, quae praeter plumbum metallicum oxydatumque continet etiam acidum molybdaenicum, silicem et calcem carbonicam. In Austria provenit.<sup>84</sup>

Cap. CIV. Chrysocolla iam a Theophrasto commemoratur in auri et cupri fodinis inveniri, arenosamque habere compagem.<sup>85</sup> Est vero haec nativa cupri minera, malachites nostratibus dicta: neque ad boracem cum Matthiolo<sup>1</sup> et Agricola<sup>2</sup> confugiendum, quando huius et color et patria (Asiae mediae lacus coenosi montibus altissimis cincti) repugnant. Sed aliam etiam massam, qua

79) Onomast. 5, 101.

80) Lib. 33, 33. 81) Iul. Poll. 1. c.

82) Hipp. de intern. aff. p. 509. Galen. expos. voc. Hippocr. p. 578.

83) Lib. 33, 31. 84) Iacquin. misc. austr. 2. p. 159.

85) De lapid. c. 26. p. 693. c. 40. p. 696.

1) L. c. p. 931. 2) L. c. p. 215.



aurifabri utantur ad ferruminandum aurum, supra iam (c. 92.) e cupro et urina parabant, quam santerniam Plinius vocat.<sup>3</sup>

Cap. CV. Armenium est cuprum carbonicum terreum, lapidi Lazuli simile. Id in australibus petris arenosis, has ipsas penetrans, mineram aeris arenosam format. Eā vocatur *κνανός* (cap. 106.)

Cap. CVII. Indicum pigmentum ex Indigofera tinctoria hic notari, exploratum habemus, etiamsi manca sit descriptio. Ecquis vero id mirabitur, cui notum fuerit, saeculo adeo decimo septimo a variis auctoribus id pigmentum metallicaе originis habitum fuisse.<sup>4</sup> Indicarum arundinum esse *ἐκβρασμα*, noster docet: paratur autem indicum ita, ut in magnis cisternis vel foveis aqua plenis planta continuo agitata fermentationi committatur. Itaque videntur arundines illae ad Bambusam arundinaceam pertinere, e qua baculi ad summovendam massam pigmenti adhibentur.

Alterum autem indicum, flos purpureus, aereis innatus cortinis, quem derasum artifices siccent, nescio an cupri sit praeparatum. Rubra forte cupri minera est, cuius varietates coccineo aut purpureo colore nitent.

Cap. CIX. Duo sunt genera cinnabaris, mineralis altera, altera vegetabilis. Illa cum *ἀμνίω* comparatur, pro quo Goupyli codex habet *μινίω*. Est autem Minius amnis Hispaniae et Lusitaniae<sup>5</sup>, a quo forte nomen minium accepit. Prophetæ Ieremias<sup>6</sup> et Ezechiel<sup>7</sup> *שִׁשִּׁי* pigmentum rubrum habent, quod LXX. priori loco *μίλτον*, posteriori *χρᾶφιδα*, Chaldaeus paraphrastes vero *רִנָּה* vertit.

Vulgatissima est cinnabaris nostrae, hydrargyri minerae, cum minio apud veteres commutatio, si ab uno fere recesseris Theophrasto. Is enim tum nativam esse, tum industria paratam docet:<sup>8</sup> illam ex Hispania pariter ac e Colchide exportari. Illic saltem in provincia la

3) Lib. 33, 29.

4) Beckmann Gesch. der Erfind. 4. p. 475.

5) Plin. 4, 34.

6) Cap. 22, 14.

7) Cap. 23, 14.

8) De lapid. c. 58. p. 701.

Mancha novae Castiliae, ad urbem Almadon, etiam hodie cinnabaris venae notae sunt. Factitiam cinnabarin a Callia Atheniensi ex arena quadam prope Ephesum reperta primum paratam fuisse. Sed Plinius id ipsum minium vocat, servato cinnabaris nomine ad signandum arboris succum, quem sanguinem draconis appellat.<sup>9</sup> Arbor ea est Dracaena Draco: quam, dum literae renascerentur, illustris navarcha Aloysius Cadamostus, Venetus, in insula portus sancti, quae a borea Maderae vicina est, invenit,<sup>10</sup> illustravit scienter pariter ac prolixè Domin. Vandelii.<sup>11</sup> Recte vero Dioscorides indicat, βαρύχρουν esse aut βαθύχρουν, et vi pollere adstringente hunc draconis sanguinem.

Nova est nata confusio, nomine σάνδυκος introducto, quo alii ad notandum ruborem pulcrum generatim utuntur<sup>12</sup>: alii, ut Gratius<sup>13</sup>, Vopiscus et Hesychius fruticem coccineo flore aut fructu: alii denique minium ustum cum sinopide mixtum aut sandycem aut syricum appellant.<sup>14</sup>

Sed Arabes, quibus, dum Mauritania potirentur, melius notae erant insulae fortunatae, in quibus Dracaena provenit, probe ea pigmenta distinxerunt. *عندم* (*andam*) dixerunt arborem, *قاطر* et *مظ* (*kater et mazz*) succum, sed et *دم الاخوين* draconis sanguinem: sandycem vero seu tostam plumbi mineram *زرقون* et *سليقون*, cinnabarin denique veram *سنجرف* et *زنجر*.

Cap. CXIV. *Χάλκανθον* non est nostratium flos aëris, qui ad mineram cupri rubram pertinet, crystallis capillaribus insignem, in Rhymmicis Ptolemaei montibus, qui iam Ural dicuntur, obviam. E diverso videtur cuprum sulfuricum in aqua naturaliter solutum, quod nostra aetas *aquam caementariam* appellat. In Cypro, Si-

9) Lib. 33, 33.

10) Ramusio navigaz. e viaggi, I. f. 106<sup>a</sup>.

11) Römer script. hisp. et lusitan. p. 37. s.

12) Virgil. ecl. 4, 43. „Sponte sua sandyx pascentes vestiet agnos.“

13) Cyneget. 86.

14) Plin. 35, 40. 36, 25. 24.

cilia, insulaque Ilva praecipue provenit. In Hispania quoque inveniri, Plinius est auctor, qui atramenti sutorii nomine praedicat ad tingenda coria.<sup>15</sup>

Cap. CXV. De chalcitide addit Plinius, esse lapidem, e quo et ipsum aes coquatur. Distare a cadmia, quod illa super terram ex subdialibus petris caedatur, haec ex obrutis: item, quod chalcitis se friet statim, mollis naturae, ut videatur lanugo concreta. Habere autem aeris venas oblongas: probari eam, quae mellei sit coloris.<sup>16</sup> Ex hac descriptione difficillime minera eruitur. Sunt tamen in cupro arsenicato capillari plura, quae huc faciunt. Color stramineus, cereus vel melleus, compages capillari-radiata, quam et lanatam dixeris.<sup>17</sup>

Videtur autem Plinii chalcitis, cui et misy et sori subiungit, a Dioscoridis minera differre. Namque in capite sequenti dicitur chalcitis usta sanguineum aut rubricae contrahere colorem. Unde patet, esse potius ferrum sulfuricum, quod lapidem atramentarium vocant. Occurrit quidem plerumque viridi colore, sed rubrum etiam obvium est.

Cap. CXVI. *Μίσυ* nomen esse aegyptium, bene probavit Rossius<sup>18</sup>: a scintillis enim seu stellulis micantibus, quas edat, dictum fuisse in Aegypto *μισσοῦ*, unde manifesto graeca vox enata est. Galenus, qui in Cypro praegrandem acquisiverat misyos bolum, vidit *ἐπάνθισμα* esse chalcitidis, sola igitur mutata forma.<sup>19</sup>

Cap. CXVII. In *μελαντηρία* considerata eadem se offert difficultas aut ambiguitas, quae in chalcitide animadvertitur. Noster causticam dicit, Galenus solummodo adstringentem.<sup>20</sup> Nonne igitur diversa est utraque minera? Galeni videtur ad lapidem atramentarium pertinere, Dioscoridis ad cuprum illud arsenicatum. Sed nolo insistere coniecturae.

Cap. CXVIII. *Σῶρι*, non *σῶρυ*, esse scribendum,

15) Lib. 34, 32.

16) Lib. 34, 29.

17) Steffens Handb. der Oryktognosie, 4, p. 281.

18) L. c. p. 120.

19) De fac. simpl. 9. p. 227. 228.

20) L. c. p. 226.

Salmasius iam monuit.<sup>21</sup> Rossius autem aegyptiam vocem habet, a σόρε derivandam, quod *urere* vertit, ut caustica vis intelligatur ipsa appellatione.<sup>22</sup> Galenus habet chalcitidis mutatam formam, crassissimam scilicet, quae simul adurat et adstringat.<sup>23</sup> Lapidosius dicit sory suum Plinius, quam chalcitidem.<sup>24</sup>

Cap. CXIX. *Λιγυροῦς* ortus e cremata cupri minera, praesertim friabili, quam nostrates *Kupfermulm* appellant, ferro quoque praegnantem, palam est.

Cap. CXX. Arsenicum Dioscoridis et veterum reliquorum non esse nativum, elucet e descriptione. Est potius arsenici minera sulfurata citrea, quae *gelbes Rauschgelb* vernacule appellatur, cuius varietas forte est alterum βαλανοειδές καὶ ὠχροειδές. Neque tamen adversatus fuero ii, qui hoc posterius ad rubram potius mineram pertinere perhibuerit. Descripsit tamen Hausmannus<sup>25</sup> scoriam minerae arsenici luteae, quae, ni eadem, similis saltem videtur varietas. Auripigmentum citreum glebis squamatim sibi incumbentibus distinguitur.

Cap. CXXI. Sandaracha Dioscoridis est Arsenicum sulfuratum rubrum seu Realgar nuperioribus dictum. Arabes ex arsenico زرنیخ formarunt, sed vocant id etiam شکوک (*schokhukh*.)

Cap. CXXII. *Στυπτηρίας* s. aluminis, praesertim aegyptii, laus ab antiquis scriptoribus abunde praedicatur. Sic Amasis, Aegyptiorum rex, cum delphicum templum incendio destructum esset, liberalitate sua Graecorum inopiam sublevavit dono mille talentum aluminis.<sup>26</sup> Invenitur alumen, quod sal est e terra argillacea, acido sulfurico abundante et kali sulfurico compositus, in saxis secundariis, quae schistum ardesiamque continent pyritemque. Ita autem formatur, ut acidum sulfuricum abundans accedat ad ardesiae argillam, cui ferrum oxydulatum saepe est admistum. Eum discessum promovet terra

21) Plin. exerc. p. 814.

22) L. c. p. 204.

23) L. c. p. 228.

24) Lib. 34, 30.

25) Handb. der Mineralogie p. 210.

26) Herod. 2, 130.



bituminosa, ad quam fatiscens alumen capillare, halotrichum Scopoli<sup>27</sup>, sericeo splendore invenitur. Id in insula Melo obvium Tournefortius scienter descripsit.<sup>28</sup>

Altera forma, sed deterior, qua alumen provenit, est stalactitum, *στρογγύλη* Dioscoridis. Haec tuberosa est, compage molliuscula, fractu facili, pinguiuscula superficiei, quae adipis fere nitorem habet. Dicitur ea *butyrum montanum*, in Bohemia insulaque Bornholmia obvium.<sup>29</sup>

Humidum alumen nascitur sine dubio, stagnantibus aquis subdialibus, qua alumen generatur, eo igitur ab aquis recepto. Quibus positis intelligitur, impuras peregrinisque partibus contaminatas esse formas aluminis, quas veteres cognoverunt. Neque aliud quid proluxa argumentatione Beckmannus evicit.<sup>30</sup> Fabricas aluminis, quibus coctura sal ille depuratur, ab orientalibus populis inventas esse, vero est simile<sup>31</sup>, tametsi medici Arabum scriptores de *شَب* (*schabo*), suo nihil praedicent, praeter ea, quae a Dioscoride acceperant.

Cap. CXXIV. Pumicem nasci generatim ex ustione variorum saxorum, unde et in vulcanis et in terrae incendiis inveniri, bene iam Theophrastus monuit.<sup>32</sup> Varia omnino est pumicis compositio. Siquidem praeter abundantem terram siliceam et argillaceam et magnesiam et natrum et manganum oxydatum et aquam adhaerentem invenerunt, qui nuper eum lapidem examini subicerent.<sup>33</sup> Inde et mechanica eius vis abstergensque et caustica exponi potest. Arabes eum vel *نشفة* (*naschfath*) vel *حَفَة* (*rachfath*) appellant.

Cap. CXXVI. Spuma seu lantugo salis plerumque generatur, qua sal vel communis vel marinus abundat, solis et aëris vi fatiscens, atque ad scopulos vicinos haerens.

27) Princip. mineral, p. 81.

28) Iter gall. 1. p. 63.

29) Steffens l. c. p. 318.

30) Gesch. der Erfind. 2. p. 92—108. 31) lb. p. 110.

32) De lapid. c. 21. p. 691. Καὶ πλείους τρόποι τῆς γενέσεως.

33) Klaproths Beytr. zur Kenntn. der Mineral. 5. p. 265. Brandes in Buchners Repertor. für Pharm. 5. p. 155.

Cap. CXXVIII. Flos salis vero longe diversus est. Natrum enim carbonicum nativum, naturaliter ochroleucum, ubi aquis stagnorum et humo inquinatur, croceum adipiscitur colorem; hinc et Reussius praeter natrum carbonicum, magnesiā, calcem et principium humi extractivum, a quo color ille pendet, in fatiscente eo natro prope a Bilino Bohemiae invenit.<sup>34</sup> De ingentibus Aegypti lacubus, quibus natrum id abundanter gignitur, Andreossi exstant eximiae observationes.<sup>35</sup>

Nonnunquam acido carbonico privatur, ut causticum evadat, superstitibus tamen peregrinis partibus, quibus color debetur ruber. Tunc spuma natri, ἀφρός νίτρου, a veteribus vocabatur. (c. 130.)<sup>36</sup>

Cap. CXXXI. Τρούξ seu faex vini caustica evadit ustione. Sistit enim kali causticum impurum, admixta maxime parte extractiva. Cinis sarmentorum (c. 134.) eiusdem est naturae.

Cap. CXXXV. Alcedo Ispida, quam ἀλκυόνα Graeci vocabant, piscibus, quos amat, integris voratis, spinas aculeosque globis compactos evomit. Hos a mari forte reiectos pro nidis earum avium veteres habuere.<sup>37</sup> Ponunt vero aves eae ova, sine ullo nido, in foveis litoris, sub arborum radicibus.

Cum illis autem purgamentis eiectis compararunt veteres zoophyta varia, quae similem viderentur habere et formam et fabricam. Protinus *Alcyonium Ficum* Pall. propter subglobosam formam illius esse originis commentitiae rati sunt. Id esse alcyonii quintam speciem, a Dioscoride memoratam, iam Imperatus probe animadvertit.<sup>38</sup> Mihi vero multo magis congruere videtur *Alcyonium Aurantium* Pall., cuius globosa figura, cuius spinae osseae e vertebra sphaerica radiatim diffusae, cuius odor haud tam ingratus, quam aliarum specierum a Vitaliano Do-

34) Lehrb. der Mineral. 2. 3. p. 4.

35) Descr. d'Egypte, 1. p. 281.

36) Galen. de fac. simpl. 9. p. 212.

37) Arist. hist. anim. 9, 15. Plin. 10, 47.

38) Hist. nat. p. 839.

nati<sup>39</sup> bene exponuntur. Aristoteles colorem nidorum alcyonis subrufum praedicat: formam comparat cum ficubus, longa cervice praeditis. Imperatus porro *Alcyonium cotoneum* Pall. esse primam speciem monet. Eam et Vitalianus Donati egregio internae fabricae examine illustravit, quippe ex acubus tricuspidatis et globuloso strato superficiali componitur.<sup>40</sup> Odorem gravem, imo hircinum, huius notat Pallasius.<sup>41</sup>

Secundam speciem certitudine quadam explicare haud ausim. Op crustaceam tamen formam malle *Alcyonium papillosum* Pall.<sup>42</sup> huc trahere.

Tertiam milesiam, vermiculari forma et colore purpurascente, ad *Alcyonium palmatum* Pall. trahere, non temerarium arbitror.

Quartam denique, quasi e lana succida conflata, conicio esse *Spongiam stuposam* Ellis.<sup>44</sup>, quanquam *Spongia panicea* Pall.<sup>45</sup>, medullae panis similis, etiam congrua sit.

Ea zoophyta praeter gelatinam animale, qua sca-  
tent, abundant etiam calce muriatica, cum qua alii sales marini iuncti sunt. Inde explicandus est usus in calculis urinariis, adversus quos milesium etiam auctor euporistorum commendat.<sup>46</sup> Cremata vero caustica sunt, aut saltem abstergentia.

Cap. CXXXVI. Ἀδάρκης, quam et περιλαμῖτιν et λίμνηστορον Galenus appellat<sup>47</sup>, videtur spuma esse seu ἐπάνθισμα salium, quibus lacus quidam abundant et stagna. Continere autem calcem muriaticam cum aliis salibus, efficitur e comparatione cum alcyoniis, e similibus patet quoque effectibus.

Cap. CXXXVII. Spongas duras, densas, tenuiterque foratas iam Aristoteles<sup>48</sup> τράγους appellat; validissimam vero, densissimam et tenuiter foratam (sine duritie et

39) Storia dell' Adriatico, p. 64. t. 9. 40) ibid. p. 58. t. 8.

41) Charakteristik der Thierpflanzen, übers. von Wilkens, p. 196.

42) Ib. p. 172. 43) Ib. p. 170.

44) Natur. hist. of zoophytes, p. 186.

45) L. c. p. 224. 46) Lib. 2. p. 309.

47) De compos. sec. loc. 1. p. 424. 48) Hist. anim. 5, 14.

asperitate) Achilleam, quia subdatur et galeis et ocreis seu tibiarum tegumentis ad arcenda vulnera. Dura ca spongia est *S. fasciculata* Pall.<sup>49</sup> Altera, mollis, est *Sp. officinalis*.

Cap. CXXXVIII. Corallium veterum est *Isis nobilis* Pall.<sup>50</sup> Quam percrebruerit in antiquitate opinio de molli indole corallii, dum sub aqua degat, et ex Ovidio patet.<sup>51</sup> Sed falsam esse famam, docuit inprimis Vital. Donati, licet fateatur, ramulos iuniores extremosque molli cortice praeditos esse. Ipsi trunci ramique maiores et in altissimo pelago adeo duri sunt, ut cum lapidibus comparentur.<sup>52</sup>

Cap. CXXXIX. *Antipathes foeniculaceum* Pall.<sup>53</sup> est idem zoophyton, cuius Dioscorides meminit. Forma ramosissima, color niger ac loca natalia in mari mediterraneo satis consentiunt.

Cap. CXL. Phrygius lapis, cuius naturam, compositionem ac affinitatem silentio Diosc. transit, a Plinio dicitur gleba pumicosa.<sup>54</sup> Cui si fides habenda, videtur pumicibus adnumerari posse, cui nec color, nec usus ad tingendas vestes repugnat. Quandoquidem diversa pumicum compositio notissima est. Neque desunt, qui terra argillacea aut magnesica abundant, illa cum acido sulfurico alumen sistente.<sup>55</sup> Ochroleucum quoque colorem non rarum in pumicibus animadvertimus.<sup>56</sup> Arbitror autem, pumicem aluminosum tum in Cappadociae campis, igne subterraneo conspicuis<sup>57</sup>, maxime vero in regione illa Phrygiae, Lydiae et Mysiae communi, *κατακεκαυμένη* dicta, cuius centrum fere erat Philadelphia, provenisse. Terrae motibus assiduus obnoxia ea regio cuniculos habere dicitur igne aut aqua plenos, nihilque frugum ferre, praeter vitem, unde *κατακεκαυμένης οἶνος* praedica-

49) L. c. 2. p. 218.

50) L. c. 1. p. 285.

51) Metam. 15, 416.

52) Donati, p. 46.

53) L. c. 1. p. 269.

54) Lib. 36, 36.

55) Achard Samml. phys. und chem. Abhandl. 1. p. 53. Bergman opusc. 3. p. 197.

56) Dolomieu voy. aux îles de Lipari. Paris. 1783. 8.

57) Strabo lib. 12. p. 31.



tur.<sup>58</sup> In his igitur phlegraeis campis pumices varii generis occurrere, probatione non eget. Neque latet vis aluminis in illis pumicibus abundantis, pigmenta, quae carbonico scatent, e. g. Rhamni infectorii, Lawsoniae albae, reddere durabilia. Unde et adstringens vis et crustas inducens declarari potest.

Cap. CXLI. Assius lapis, circa Assum Troadis proveniens, haud diversae esse naturae videtur. Florem eius cum ἀφρονίτρω Galenus comparat.<sup>59</sup> Lapidum enim ii, per se non valde duro, imo friabili, inhaerere quiddam, farinae tenuissimae simillimum, qualis in molarum parietibus conspiciatur: id salsedinem quamdam in gustu habere admistam.<sup>60</sup> Theophrastus iam huius lapidis meminit, e quo σορούς conficiant, quique ubicunque terrarum proveniat, corpora plane consumat et in cineres redigat.<sup>61</sup> Et Plinius, sarcophagum lapidem in Asso Troadis fissili vena scindi, corporaque defunctorum, in eo condita, absumere intra quadragesimum diem, eiusque generis saxa esse et in Lycia et in Oriente, quae, viventibus quoque adalligata, erodant corpora, tradit.<sup>62</sup>

In natura huius lapidis explananda nuperi valde discrepant. Valmontius enim Bomariensis petram seu mineram aluminosam<sup>63</sup>, Wallerius saxum calcareum<sup>64</sup> declarat. Quibus addere aliquid, eo minus in mea est potestate, cum nec doctus Launaeus in amplo commentario nequiverit naturam lapidis illustrare.<sup>65</sup> Si quid tamen recte video, petra illa causticam indolem coloremque flavescens natro puro seu caustico, adstringentem vero indolem alumini debebat. Inde etiam exponendus est usus in podagricis affectibus, siquidem lixivio caustico e kali parato tumores arthriticos rebelles discutere possumus et nervorum resolutiones debellare. Natrum autem hoc effectum non alienum est.

58) Ib. p. 239. 241. lib. 13. p. 478. 479.

59) De fac. simpl. 4. p. 696.

60) Ib. lib. 9. p. 202.

61) De igne, c. 46. p. 721.

62) Lib. 36, 27.

63) Minéralog. 1. p. 530. 532.

64) Mineralriktet, p. 33.

65) Mém. de l'ac. de Bruxelles, 4. p. 331 — 355.

Cap. CXLII. Pyrites nostratibus *Kupferkies* appellatur, minera satis vulgaris, ad chalybis aciem scintillas edens, variisque lutei coloris modis conspicua. Quodsi crematur, cuprum sistit cum sulfure oxydatum, ideoque irritans atque abstergens.

Cap. CXLIII. Haematites est minera ferri, quae ferrum oxydatum continet.<sup>66</sup> Adstringere igitur simul ac roborare valet. Ad sanguinis autem reiectionem copiosam nihil utilius Alexander Trallianus invenit haematite, si modo in subtilissimum pulverem redactus fuerit.<sup>67</sup> Scripulos circiter quatuor cum succo mali punici exhibuit. Nuperis vero temporibus extrinsecus potius ad cohibendum sanguinis e naribus cursum commendari memini.<sup>68</sup>

Cap. CXLIV. Schistus lapis nil nisi varietas haematitis fibrosa videtur, quae ochraceo colore insignitur. Hanc iisdem obvenire locis, quibus et haematites ipse, iam Agricola docuit.<sup>69</sup> Infirmior est priori, quod minus oxydatum continet ferrum, unde etiam ignis vi adipisci quodammodo illius naturam potest. An etiamnum in Hispania et Lusitania (ἐν τῇ κατὰ ἐσπέραν Ἰβηρίᾳ) occurrat, nescio: sed in Bohemia vulgaris est.<sup>70</sup>

Cap. CXLV. De gagate lapide insignis exstat locus apud Galenum.<sup>71</sup> Is, licet parva navicula totius Lyciae litora legerit, haud tamen meminit fluvium Gagam invenire se posse. Sed lapidem istum in Coelesyria, ad mortuum mare, copiosum conspexit. At multo magis diffusum per plures Europae regiones nostra aetas eum invenit. Est bitumen fossile, solidum, quod eandem cum lithanthrace e protogaea habet originem. Praeter carbonem scatet oleo aethereo graveolente. Id autem, dum accenditur, nervosi systematis tumultus coercere et resolutionibus auxilio esse, nuperae confirmarunt observationes.

66) Reuss. l. c. 2. 4. p. 82. Steffens l. c. 4. p. 57—61.

67) Lib. 7. p. 300. Λειοῦσθαι δὲ αὐτὸν πάννυ δεῖ, ὥστε γνωῶδη γίνεσθαι καὶ ἀερώδη, καὶ πνεύματι πλήσιον εἶναι.

68) R. A. Vogel hist. mat. med. p. 406.

69) De nat. fossil. p. 252.

70) Reuss et Steffens l. c.

71) De fac. simpl. 9. p. 203.

Cap. CXLVI. De thracio lapide apponere libet Nicandri versus:<sup>72</sup>

Ἡὲ σύ γε Θρηῖσσαν ἐνὶ φλέξας πυρὶ λάαν,  
ἥ θ' ὕδατι βρεχθεῖσα σελάσσεται· ἔσβεσε δ' αὐτήν,  
τυτθὸν ὅτ' ὁδμήσεται ἐπιὸ ῥανθέντος ἐλαίου.  
Τὴν ἀπὸ Θρηῖνίου νομέες ποταμοῖο φέρονται,  
ὃν Πόντον καλέουσι.

Eumdem autem Agricola habet thracium lapidem cum gagate ipso ac cum samothracia Plinii gemma, quae nigra ac sine pondere lignoque similis sit.<sup>73</sup> Quid quaeso vetat, lithanthracis aut gagatis formam duriores intelligere? Namque in priore saepius venas et strata lignea animadvertimus: tritissimum etiam est, lithanthraces affusa aqua flagrare melius.<sup>74</sup>

Cap. CXLVIII. Arabicum lapidem, quem et arabum Plinius vocat<sup>75</sup>, marmoribus candidis adnumerandum esse, Agricola iam perhibet.<sup>76</sup> Credibile id quidem, licet expositu difficile sit, cum veteres Graeci, quibus marmorum candidorum, parii maxime et naxii, notitia esset vulgaris, arabicum tamen diversi generis existimaverint.<sup>77</sup>

Cap. CXLIX. Galactitis lapidis non idem est apud veteres significatus. Plinius enim et galaxiam, qui et morochthus appellatur, et smaragdum, albis venis circumligatum, galactitem vocari affirmat.<sup>78</sup> Qui huius loci est, et Galeno dicitur in succum solutus lacti similem conspici.<sup>79</sup> Esse autem tophum calcareum, qui, dum ad cotem affusa aqua teritur, soluta calcarea, lacteum reddit succum. Ad Goslariam Saxoniae inferioris inveniri, *Milchstein* vernacule appellatum, Agricola iam memoriae tradidit.<sup>80</sup> Et e Misnia Saxoniae superioris sibi allatum

72) Theriac. v. 45. Galen. l. c. p. 204.

73) Plin. 37, 67. 74) Cf. Agricola de nat. fossil. p. 235.

75) Plin. 36, 41. 76) L. c. p. 310.

77) Cf. Blas. Caryophili de antiquis marmoribus opusculum. Traj. ad Rhenum, 1743. 4.

78) Lib. 37, 69. 79) De fac. simpl. 9. p. 195.

80) L. c. p. 235.

memorat Matthiolus.<sup>81</sup> Coniicerem, cretam esse, quae utique in insulis maris aegei obvia est, ni color galactitis externus cinereus esset. Usus autem et cretae et simillium lapidum calcareorum ad purganda ulcera nuperis Cleghornii observationibus firmatur.<sup>82</sup>

Cap. CL. Melitites videtur esse arte ita productus, ut galactiti aquam dulcem affunderent, in qua solutae calcareae partes humorem reddebant dulcem. Neque quicquam vel Plinius vel Galenus addunt.

Cap. CLI. Morochthi lapidis nomen aegyptium esse, veri est simillimum: Rossius e voce aegyptia μαρόχθ, *dealbare*, derivat.<sup>83</sup> Sed varia sunt nomina: *Morochitem* dicit Plinius porraceam, lacte sudantem.<sup>84</sup> A Galeno μόροξος appellatur et λευκογραφίς, quo utantur στίλπνοῦντες τὰς ὀθόνας.<sup>85</sup>

Intelligi hoc lapide *Talcum steatites* seu *cretam brigantiacam*, persuasum habeo. Nostratibus dicitur *Speckstein* et *Seifenstein*: cultro enim facile scalpitur et scinditur; prasini est coloris: ac, dum mollior est, in graphia aut stilos formatur, quibus et sartores ad lineas duendas et fullones ad emaculandas lanas utuntur. Continet praeter talcum argillamque et siliceam terram, ferri etiam et mangani tantillum.

Alii habuerunt morochthum lapidem pro lacte lunae<sup>86</sup>, quod tamen et compage mollissima et fere farinacea, colore quoque albo-pallescente, et usu alieno, ad dealbandos parietes, longe distat. Nuperi demum moroxitis nomine calcem phosphoratam, seu apatitem Wernerii (*Spargelstein* nostratium) insignierunt. Congruit quidem colore prasino, sed commodusne sit ad eosdem usus, merito ambigitur.<sup>87</sup>

Cap. CLII. Alabastritem, quanquam et Plinius asse-

81) L. c. p. 96r.

82) Medic. facts and obs. 2. n. 11.

83) L. c. p. 122.

84) Lib. 37, 63.

85) De fac. simpl. 9. p. 198.

86) I. W. Baumer in act. acad. mögunt. 2. p. 37.

87) Werner im bergmänn. Journ. 1790. 4. p. 74. Reuss l. c. 2. 2. pag. 349.



rat & nonnullis onychem vocari,<sup>88</sup> longe tamen ab hoc lapide diversum esse, sensu saltem hodierno, in confesso est. Namque onyx cum chalcedonio lapide, cui maxime affinis est, ad silices referendus, cremari nequit. Alabastrites vero, qui gypsum densum ac concretum sistit, pariter uritur ac marmora. Abusus autem nominis inde natus esse videtur, quod alabastrites saepius undulato-striatus, vittatus aut venosus occurrit, quem igitur veteres cum onyche zonato commutasse probabile est.

Cap. CLIII. *Θυίτην* lapidem a *θυία*, mortario, dici, Hermolai Barbari iam est sententia.<sup>89</sup> Neque tamen plane reiicienda opinio, a *θυείω*, materia ligni densa et granulosa, derivandum esse nomen.<sup>90</sup> Aethiopicus is lapis, subviridis, iaspidem referens, aquam affusam lacteam reddens, a Fuchsio declaratur turcica gemma, quam *turquoise* Galli appellant.<sup>91</sup> Refutare eum conatur Matthioli, quia turcicae gemmae color azureus potius sit, iaspidiumque generi omnino adnumeranda videatur ea gemma, quod dici de thyite lapide nequeat, quippe cuius particulae in aquam transeant. Equidem vero arbitror, si unum fuerit idemque genus turcicae gemmae, nimirum occidentalis, ad Matthioli partes nos trahi ac fere cogi, quoniam occidentales gemmae turcicae dentes sunt fossiles mammalium, quae in protogaea habitarunt, cupro oxydato impraegnati. Iam vero I. I. Berzelii, summi viri, acutissimae analysi debemus intelligentiam earum gemmarum, quae turcicarum nomine veniunt. Orientales nimirum argilla phosphorica, calce phosphorica et cupro oxydato carbonico componi, exploratum habemus.<sup>92</sup> Itaque defendi potest Fuchsii sententia, cum calx phosphorica abundans aquam affusam reddere lacteam possit. Sine difficultate etiam est mordens eius humoris indoles, atque

---

88) Lib. 36, 12.

89) Coroll. 989.

90) Theophr. hist. plant. 5, 20. Hesych. τ. p. 1740.

91) De medicamentorum praeparandi componendique ratione, p. 170. Lugd. 1563. 12.

92) Berzelius om blåsörörets användande p. 193.

gemmae forte ad laevorem tritae efficacia ad expurgenda, quae oculis caliginem offundunt.

Hanc eandem esse gemmam cum callaïde Plinii, A. Fischerus monuit.<sup>93</sup> E viridi pallens ea dicitur; nasci autem post aversa Indiae, apud incolas Caucasi montis, apud Sacas et Dahas; amplitudine conspicua, sed fistulosam esse sordiumque plenam; sinceriorem et multo praestantiorem obviam esse in Carmania.<sup>94</sup>

Cap. CLIV. Iudaicus lapis idem esse videtur ac ticolithos Plinii, quem cum oleae nucleo comparatum inungi suadet adversus calculos, quos frangat pellatque.<sup>95</sup> Quibus addit Galenus, proficere eum lapidem tantum in renum calculis, supervacuum esse in iis, qui vesicae inhaereant.<sup>96</sup> Aëtius, qui et iudaicum et syriacum et ticolithon appellat, eadem e Galeno repetit, addito e Nephoso, inunctum tamen pubi comminuere et vesicae calculos.<sup>97</sup>

Iam quaeritur, quinam sit ille lapis. In eo autem consentiunt plerique, esse aculeos aut palpos echinorum, calcarea terra, silicea etiam et forte magnesiae impraegnatos.<sup>98</sup> Egregie eos, ex Echino Cidari, delineatos conspicimus in Iac. Theod. Kleinii opere.<sup>99</sup> Sunt corpuscula glandiformia, subpedicellata, longitudinaliter striata, vel laevia, vel granulosa.

Cap. CLV. Amiantus nullam habet difficultatem. Est Amiantus fibrosus, flexilis, cuius fibrae sericeo splendore nitent, quique olim ad ellychnia, chartam et ipsa lintea, flamma non destruenda, adhibebatur. E talco, calcarea, silicea terra, argilla et ferri tantillo componitur.

Cap. CLVI. Σάπφειρος et hic et a Theophrasto, σάπφυρος a Galeno<sup>100</sup> dicitur. Nomen certe semiticum,

93) Auswahl aus den Schriften der mineral. Gesellsch. zu Dresden, 1819. 2. p. 88.

94) Plin. 37, 33. 95) Lib. 37, 68.

96) De fac. simpl. 9. p. 199. 97) Lib. 2. c. 19.

98) M. Lister in philos. transact. vol. 9. p. 224. G. Dan. Coschwitz diss. de lapidibus iudaicis. Hal. 1724. 4.

99) Natur. dispos. echinodermatum, tab. 32. B—G. 46. n. 3. 4.

100) De fac. simpl. 9. p. 207.

cum iam in pentateucho<sup>1</sup> ספיר occurrat, cuius radix in arabico سفير, *splendere, illucescere*, superest.

Nostram autem, quam sapphirum dicimus, gemmam longe diversam esse a priscarum gentium homonymo lapide, protinus probatur e Theophrasto,<sup>2</sup> qui σάπφειρον esse χρυσόπαστον, velut auro sparsum, asseverat. Dein etiam, cum tererent sapphirum veteres, aquaque mixtum propinarent, de nostra gemma, silicea nimirum, id intelligi nequit. Lapidem Lazuli vero, qui maculis aureis, a pyrite sulfureo insperso ortis, insignis est, Beckmannus iam recte pro sapphiro veterum habuit.<sup>3</sup> Provenit enim praeter Imaum montem etiam in Persia, unde Phoenices in Palaestinam Graeciamque importasse videntur. Continet terrae calcarcae liberae insignem portionem<sup>4</sup>, praeter eam vero argillam, magnesian, siliceam terram et ferri fere ternas e centenis partibus. Itaque et teri in pulverem, et calcinari, acidisque tractatus in gelatinam abire visus est.<sup>5</sup>

Cap. CLVII. Memphiten lapidem e forma hic descripta, magis etiam ex usu, arbitror esse asphalti speciebus adnumerandum. Ni fallor, est *Retinasphaltum* Caroli Hatchett<sup>6</sup>, colore flavo, fulvo, gilvo, bruneo, subfusco et nitore quodam pinguiusculo. Id crematum gravem spirat et bituminosum odorem. Ex odore eo divinari potest olei aetherei inesse copiam, qua, sicut gaggates, dolores sedare potest.

Cap. CLVIII. Selenitis nomen etiamnum servatur. Est vero gypsum compactum, lamellosum, pellucidum, quod nostratibus *Frauen-Eis* vocatur. Ramenta in potu exhiberi poterant, quippe calx sulfurica, quae gypsum sistit, in quingenis partibus aquae, licet difficulter, solvitur.

Cap. CLIX. Iaspidis nomen sine dubio orientale est,

1) Exod. 28, 18.

2) De lapid. c. 23. p. 692.

3) Gesch. der Erfind. 3. p. 183.

4) Marggraf's verm. chemische Schriften, I. p. 136.

5) Steffens I. c. 1. p. 415.

6) Transact. of Linn. soc. 4. p. 140. Nicholson's Journ. 2. p. 250.

cum יִשָּׁפּ iam in Exodo<sup>7</sup> legatur. Ii respondet arabica vox يشف et يشب et syriaca ܝܫܦ, cuius radix ܝܫܒ, adiecit, addidit, superest. Phoenices enim, gemmas pretiosas per omnem orientem commercantes, lapides varios, qui ob speciosum adspectum in pretio esse viderentur, cum nomine peculiari carerent, additamenta dixerunt reliquarum gemmarum, ܝܫܦ. Id enim in confesso est, iaspidis nomine veteres diversa lapidum genera insignisse. Theophrasto videtur e smaragdo oriri. In Cypro insula enim lapidem visum esse, cuius dimidium smaragdus, dimidium iaspis erat, quasi humore nondum in totum transfigurato.<sup>8</sup>

Principatum tenuit σμαραγδιζων. Hanc saepe translucere, ac ex India etiam advehi, auctor est Plinius.<sup>9</sup> Quibus positis intelligitur, *prasiam* nostrae aetati dictam gemmam (*Praser*, *Prasem*), crystallis amphiboli actinoti, seu lapidis radiati penetratam, ac pellucidam, huc pertinere.

Colore quidem similis, sed magis glaucus, non translucens, superficie pinguiuscula, ideoque τερεβινθίζων vocata, talci steatitis varietas fuisse videtur, quam nostra aetas quoque nephrolithon (*Nierenstein*) vocat.<sup>10</sup>

Quae fumo quasi infecta conspiceretur, καπνίας dicta, an fuerit topazius nostrorum fumidus (nebulosus Plinio<sup>11</sup>), non liquet.

Ἀστριοῦ dictus, lineis albis et resplendentibus distinctus, grammantias Plinio vocatur.<sup>12</sup> *Iaspis variegata*, *fasciata* Wallerii congrua videtur. Stellata vero Plinii, rutilis punctis, longe alia est gemma, heliotropium nimirum, viridescens utique, sed e chalcedonio et talco chlorite compositum, cuius puncta rutila iaspidem produnt.<sup>13</sup>

Cap. CLX. Aëtites vulgaris est notitiae. Minera est

7) C. 28, 20.

8) Theophr. de lapid. c. 27. p. 693.

9) Lib. 37, 37.

10) Marggraf's chem. Schrift. 2. p. 12.

11) Lib. 37, 32.

12) Lib. 37, 37.

13) Reuss l. c. 2. 1. p. 319.



ferri argillaceo-silicea, fusco aut lurido colore, cortice a nucleo soluto, unde agitatus sonitum edit.

Cap. CLXI. Ophiten dictum esse a maculis quasi serpentium, ceterum vel nigricantem durumque esse, vel candidum ac mollem, Plinius testatur.<sup>14</sup> Lapidem esse serpentinum, semipellucidum, inter omnes constat.<sup>15</sup>

Cap. CLXII. Lapides in spongiis reperti sunt concrementa e calcaria muriatica potissimum, quae ab ipso zoophyto generatur. Hos, spongites dictos, eosdem putat Agricola, ac tecolithos Plinii.<sup>16</sup> Ita quoque et hos Plinius appellat; memoratu dignum vero, quod addit, nativos esse lapides, nempe innatos spongiis et ab iis genitos.<sup>17</sup>

Cap. CLXIV. De ostracite, cuius similitudo cum testa vel ostrea et a Plinio agnoscitur<sup>18</sup>, ita iudico, ut ostreas dicam esse fossiles et petrefactas, quas bene illustrarunt Iac. Theod. Klein<sup>19</sup> et Ios. Monti.<sup>20</sup>

Cap. CLXV. Smyris, quam nostrates *Schmirgel*, Galli *émeril* vocant, est substantia siliceo-argillacea, admixto ferro et calcis tantillo: quam Wernerus etiam ob colorem coeruleo-nigrum prope a sapphiro collocavit. Quae in Naxo insula reperitur, satis celebratur.<sup>21</sup> Per se nec septica nec caustica esse potest, sed iis medicamentis compagem solam impertire videtur.

Cap. CLXVII. Cos ex argilla schistosa constat: si ad eam aqua irrigatam ferrum deteritur, nascitur inde latex e ferri hemioxydati, schisti et argillae particulis, cuius adstringens vis negari nequit.<sup>22</sup>

Cap. CLXVIII. Geoden lapidem appellari Plinius ex argumento tradit, quoniam terram complectatur.<sup>23</sup> Est autem minera ferri argillaceo-silicea, fusco aut lurido colore, cortice duriori, subgloboso, vel reniformi, unde Wernero ren ferri, *Eisenniere*, dicitur. Nucleus terra

14) Lib. 36, 11.

15) Reuss l. c. p. 217. 218. 16) L. c. p. 247.

17) Lib. 36, 35. 18) Lib. 36, 31. 87, 65.

19) Philos. transact. vol. 41. p. 568.

20) Comm. instit. bonon. tom. 2. pars 2. p. 339.

21) Gilberts Ann. der Phys. 12. p. 249.

22) Cf. Agricola l. c. p. 271. 23) Lib. 36, 52.

aut arena constituitur, unde nomen derivandum. Neque latet vis adstringens et siccans, dum compositionem contemplamur.

Cap. CLXX. Eretria erat Euboeae insulae oppidum, in cuius vicinia terra ea reperiēbatur.<sup>24</sup> Est argilla, sed non pura, quae candido niveoque colore nitet; figulina potius aut schistosa esse videtur, quae cinerea est. Ea utebantur Hippocratici ad detegendum vomicae pulmonum locum. Trita ea ac humectata, linteo tenui illita, thoracem obtegebant, quaque parte primum resiccatam invenirent, ea sectionem aut ustionem facere imperabant.<sup>25</sup>

Cap. CLXXI. Samia terra propter candidum colorem pura fuisse argilla videtur. Quae aster dicebatur, globosa erat et densa, qualis argilla, renum specie, et apud nos occurrit. Sed et nigram dicunt samiam terram Hippocratici<sup>26</sup>, alienam omnino.

Cap. CLXXII. Lapides in samia terra obvii videntur crystalli gypsi esse cum quarzi granulis coagmentatae, quales et in argilla nostra halensi occurrunt.<sup>27</sup>

Cap. CLXXIII — CLXXVI. Nec chiaie aut selinusiae, nec pnigitidi terrae aliena est natura. Sunt argillae, magis minusve purae. Selinusia dicta fuit a Selinunte, Siciliae oppido. Πνιγίτις terra forsā nomen sortita est a locis πνιγροῖς (aestuosis), in quibus inveniebatur.

Cimoliae tamen terrae diversa esse indoles videtur. In cretis enim collocat Plinius, eiusque loco etiam tymphaïcum adhiberi gypsum.<sup>28</sup> In Cimolo, insula e cycladibus, inter Melon et Siphnon sita, reperiēbatur.<sup>29</sup> Cum σμητιδα eandem dicant Erotianus ac Galenus<sup>30</sup>, argilla potius smectica, quam nostrates *Walkererde* dicunt, esse videtur.

Cap. CLXXIX. Terram meliam aluminosam fuisse, probatur ex ipsis Dioscoridis verbis, dein etiam ex iis, quae de aluminis proventu in ea insula monuimus.

24) Plin. 4, 21. 35, 54.

25) Hipp. de morb. 3. p. 319.

26) De nat. muliebr. p. 557.

27) Schreber im Naturforscher, 15. p. 209.

28) Lib. 35, 57.

29) Strab. lib. 10. p. 307.

30) Expos. voc. Hipp. p. 352. 364.

Cap. CLXXX. Ἀμπελίτις terra dicta fuisse a Galeno traditur, quod viti illita insecta infesta perdat.<sup>31</sup> Mihi vero videtur ea terra bituminosa esse, et lithanthraci quidem lamellosa aut foliaceo (*Blätterkohle* aut *Schieferkohle* Wernerii) tritis originem debere. In assulas enim is lithanthrax fissilis est, ater et splendens, ni lucidus, carbone puro et bitumine abundans. Per strata lithanthracum Germaniae passim provenit.<sup>32</sup>

Cap. CLXXXII. Atramentum scriptorium noster e taedarum fuligine gummisque tertia parte parari docet. Sed aliud et ex hoc, admixtis fuligine resinae, glutine taurino ac chalcantho confici monet. Posterius tectorium Plinius vocat,<sup>33</sup> quoniam parietibus illinendis incrustandisque adhibebatur.<sup>34</sup> Scripserunt tamen etiam veteres hoc μέλανι κατακόλλω, clandestinas saltem literas in vesica.<sup>35</sup> Plinius insuper atramenti meminit e faecibus vini, tum ex ebore combusto conficiendi. Apportari etiam indicum tradit ex India, inexploratae adhuc ipsi inventionis.

## ANNOTATIONES

### *ad librum de venenis deleteriis.*

Dicitur is liber vulgo quintus, inscribitur de alexipharmacis. Neutrum tamen iure fieri, neque recte Dioscoridi Anazarbeo adscribi, tum in praefatione ad vol. I. (p. XIV.) tum in notis ad eundem librum probare studei. Neque opus esse duco, singulatim ac velut minutatim in omnia capitula exspatier, obvia iam plerorumque memorabilium explicatione in iis, quibus Dioscoridis libros de materia medica illustravi, commentariis. In iis duntaxat commorabor, quae in illis libris vel tacita relinquuntur, vel negligentius tractantur.

31) De fac. simpl. 9. p. 187. Σνέπας ea insecta vocat Galenus. Pauli. lib. 7. p. 234. Ἔστι δὲ ἡ χρησιμοποιήθη ἐπὶ τῶν ἀμπέλων, διὰ τὸ τοὺς ἐν αὐταῖς φθεῖσθαι σκώληκας.

32) Reuss I. c. 2, 3. p. 128. 132.

33) Lib. 35, 25.

34) Vitruv. archit. 7, 10.

35) Aen. poliorcet. p. 1701. ed. Gronov.

Protinus vero c. XIII. p. 26. offendimur τῆς καρπάσου ὀπῶ, qui soporem inferre dicitur et repentinam strangulationem. Eam stirpem cum Paullus<sup>1</sup> καρπησίαν appellet, subito cogitatio, καρπήσιον Galeni, cuius notitiam a Quinto magistro acceperat, huc pertinere.<sup>2</sup> At longe secius se res habet. Namque hoc erat τῶ φοῦ simile, sed valentius aroma, ut optima cassia nequaquam inferius perhibeatur. Odorem gustumque per longum tempus servabat. Circa Sidem Pamphyliæ plurimum nasci, festucas similes esse cinnamomi surculis: indigenas duplicem agnoscere speciem, λαέρκινον et alteram amaram dictam, hanc vero praestantior. Carpesii huius, a Galeno celebrati, expositioni supersederunt plerique, qui veterum plantas illustrarunt, unico ferme excepto Caesalpino, qui optime comparatum id cum φοῦ Dioscoridis, idem esse censuit.<sup>3</sup> In quo assensum meretur: est igitur, ut supra (p. 348.) monui, *Valeriana Dioscoridis* Sibth.

Longe alia venenata haec κάρπασος, seu καρπησία Paulli, cuius succum primus, ni fallor, Archigenes ad crispandos capillos commendavit.<sup>4</sup> Cum nusquam, et apud seriores Graecos, adsit formae indicium, nil plane probabilis, nedum certi, de ea substantia asseri potest. Io. Actuarius opocarpasum inter meconium et satis ab hoc diversum thapsiae succum collocat.<sup>5</sup> Admodum acris videtur fuisse haec κάρπασος, namque cum Avicenna morbo colico correptus alvum sibi clui hoc toxico iussisset, excoriatis intestinis exstinctus est.<sup>6</sup> Valer. Cordo, qui Piper longum hac καρπάσω intelligit<sup>7</sup>, libenter assentirer, nisi in ὀπῶ haererem. Peculiaris enim latex, ὀπός dicendus, nullus est in Piperis longi fructibus, tametsi liquorem pinguiusculum Cordus indigitet. In medio igitur relinquendum esse autumo.

Cap. XIX. p. 29. De pharico iam Nicander:<sup>8</sup> in

1) Lib. 5. p. 171.

2) Galen. de antid. 1. p. 71.

3) De plantis, lib. 4. c. 2.

4) Galen. de compos. sec. loc. 1. p. 445.

5) Actuar. meth. med. 5, 12. col. 284.

6) Barhebr. chron. syriac. 1. p. 235.

7) Hist. pl. 4, 25. f. 195<sup>a</sup>.

8) Alexiph. v. 597.



potu datum gustu referre nardum, gravem maxillis inferre dolorem, artuum vacillationem et furorem, quin robustum hominem intra diei spatium interimere. Quem locum scholiastes ita illustrare studet, ut nomen habere venenum illud a Pharico quodam Crete, qui id inven-rit, teste Praxagora: vel a Pharide, Laconiae oppido, vel a Pheris Thessaliae. Quid autem fuerit, tacet is, tacent omnes.

Cap. XX. p. 30. Toxici effectus idem Nicander eodem modo delineat,<sup>9</sup> additis variis furoris modis, clamoribus, ululatibus, dentiumque stridoribus. Ad eum locum scholiastes coniecturam promit, a Scythis Parthisque componi id venenum ex hydrae sanguine. Neque fidei absonum videtur, serpentium laticem venenatum ad toxicum adhibitum fuisse. Etenim et nostra aetate percrebruit fama de compositis eiusmodi exitialibus venenis.

Idem Avicenna corrupta voce طونيون (*thuniun*) appellat, se id ignorare fatens: effectibus tamen e Dioscoride allatis.<sup>10</sup> Itaque vehementer fallebatur Manardus, si بیش (*bisch*) eiusdem auctoris ἀκόνιτον Graecorum idem cum τοξικῶ putaret, bene refutatus a Matthiolo.<sup>11</sup>

Cap. XXV. p. 34. Taurinum sanguinem recentem calidumque epotum inter venena esse, apud Graecos notissimum erat. Cum Nicander<sup>12</sup> id nonnisi ἀφροσύνη fieri dicat, Matthiolus inde effecit,<sup>13</sup> eum sanguinem iis duntaxat nocere, qui mente alienati aut melancholici sint. Eam tamen sententiam eo minus defenderim, cum Themistocles exul Magnesia sibi mortem eo modo conscivisse feratur, ἄριστα βουλευσάμενος ἐπιθεῖναι τῷ βίῳ τὴν τελευτὴν πρέπουσαν.<sup>14</sup> Nec reticendum, Aegirae (lesbiae?) hactenus insontem eum sanguinem fuisse, ut sacerdos terrae vaticinatura biberit, priusquam in specum descenderet.<sup>15</sup>

9) Ib. v. 208.

10) Lib. 4. fen. 6. p. 126.

11) L. c. p. 993.

12) Alexiph. v. 312.

13) L. c. p. 996.

14) Plutarch. Themist. c. 51. Alii autem tradiderunt, sumto sponte ephemero interemtum esse.

15) Plin. 28, 41.

Expedienda autem omnis haec de sanguine taurino quaestio ita videtur, ut ad coagulum cruoris in ventriculo remanens consilium transferamus. Siquidem compertum habemus, vel nuperis funestis exemplis, e cruore sanguinis farciminum perniciosum principium evolvi. Proinde crediderim, tantum abesse, ut repente occidat sanguis taurinus, ut potius, si diutius coagulum eius in ventriculo haereat, evolvi videatur venenata eius indoles. Hinc et acetum praeprimis, quod calidum ingeri praecipit Galenus,<sup>16</sup> et nitrum praesidiis esse observarunt. Iis enim vincitur azoticum illud principium exitiale.

Cap. XXVI. p. 35. De lacte intus coagulato simile ferendum est iudicium. Coagulum enim caseosam partem continet pinguemque, e qua demum principium noxium evolvi, patet e caseorum mordacium vetustorum gravissimis effectibus. Opitulari autem acidum et saponaceum liquorem, quem in *πυτία* animalium herbivororum, maxime vero leporum, invenimus<sup>17</sup>, iamdudum observatum est: solvit enim is liquor acidulus coagulum illud, et ad eiiciendum proclive reddit.

Cap. XXXIII. p. 40. De cacto, vera enim haec est lectio, Theophrastus:<sup>18</sup> Quae cactus nuncupata est, in Sicilia tantum nascitur, in Graecia nusquam. Decorticati caules cibo idonei: flores in pappos abeunt. Itaque *Cynara Cardunculus* L. (seu *C. Scolymi* varietas:) quod iam *Anguillara*<sup>19</sup> et *Dalechampius*<sup>20</sup> perhibent.

---

16) De antid. 2. p. 143.

17) Galen. de fac. simpl. 10. p. 274.

18) Hist. pl. 6, 4. 19) L. c. p. 135.

20) L. c. p. 1438.

---

## A N N O T A T I O N E S

*a d l i b r u m π ε ρ ῖ ἰ ο β ό λ ω ν,*

quem vulgo septimum Dioscoridis et *περὶ θηριακῶν*, praepostero utrumque consilio, vocant.

p. 44. s. Omnis haec argumentatio de non apta *προφυλακτικῇ* a *θεραπευτικῇ* separatione, adversus Methodicos eius aetatis instituta, argutiis plena, pneumaticae sectae addictum fuisse hunc auctorem, probat. Siquidem pneumatici, quibus omnia propemodum Stoicorum decreta placebant,<sup>21</sup> ab his et Erasistrato, quem maximi aestimare gestiebant, doctrinam de *πνεύματος* principatu,<sup>22</sup> omniumque morborum sede in eo depravato quaerenda, suam fecerant. Erat autem et Stoicis et Pneumaticis familiaris quaedam sermonis prolixitas, quam *ἀπεραντολογία* Galenus non male nuncupat,<sup>23</sup> et argutiarum dialecticarum ubertas et altercationum sophisticarum amor, quem saepius et acriter quidem Galenus vituperat. Earum vero proprietatum non pauca sunt et in hac praefatione indicia.

Protinus vero refutare conatur auctor eos, qui *προφυλακτικὴν* a *θεραπευτικῇ* distinguant. Scilicet Methodici, omnes morbos a laesa *ὄγκων* s. molecularum corpus constituentium ad *πόρους* seu spatiola ratione proficisci autumantes, laxitatem quoque et stricturam *κοινότητος* s. communitates finxerunt, quibus duas therapeuticas regulas, *τὸ χαλᾶν*, laxare, et *στέλλειν*, constringere, superstruerent. Quando vero cuivis patet, nec externas iniurias, nec vitia ab his producta, cohaerentiae potissimum, sub hanc *κοινοτήτων* dictionem cadere posse, commenti sunt Methodici chirurgicas communitates, a therapeuticis omnino alienas. Pari etiam modo morbos a veneficiis, aut

21) Galen. de different. puls. 3. p. 642.

22) Id. de dogmat. Hipp. et Plat. 2. p. 281.

23) Ib. 3. p. 315.

a morsu animalium existentes, προφυλακτικῇ curare sibi arrogarunt, quam dum penitus a θεραπευτικῇ segregarent, parum solliciti fuere de arbitrario plane modo, quo ratio-  
cina rentur.<sup>24</sup>

Iam his se opponit auctor, dum praecipue probare conatur, βοηθήματα, seu artis praesidia, omnino nomi-  
nanda esse ea, quae in commenticia illa προφυλακτικῇ ad-  
hibentur.

Quae p. 47. s. sequuntur, partim aperta sunt, par-  
tim obscura. Manifestum est, cum natura venenorum  
nos lateat, in iis mutandis corrigendisque neutiquam ope-  
ram nostram esse collocandam. Sed, quod e Diocle ad-  
iungit, exiguitate animalium noxiorum et minima veneni  
mole impediri indicationes, id mihi saltem aequè ob-  
scurum est ac refugium ad διαθέσεις, assumpto nimirum  
huius vocis eo significato, qui etiamnum valet. Quid  
enim, quaeso, iuvat dispositionis notitia, quando canis  
rabidi morsus in robusto homine ac florido easdem pro-  
duxit sequelas ac in infirmo et laxo? Sed altius est re-  
petenda διαθέσεως informatio, et quidem ex ipso summo  
philosopho. Διαθέσεις, inquit, λέγονται, ἃ ἔστιν εὐκίνητα  
καὶ ταχὺ μεταβάλλοντα, ὅσον θερμότης καὶ ψυχρότης, καὶ  
νόσος καὶ ὑγεία, καὶ ὅσα ἄλλα τοιαῦτα.<sup>25</sup> Hinc etiam  
affectio quaedam διαθέσεως nomine venit. Sic Galenus:  
ὀνομάζω δὲ νοσώδεις διαθέσεις, οὐ μόνον, ὅταν ἤδη νοσῶ-  
σιν, ἀλλὰ καὶ πρὶν ἀρχηταί τις αὐτῶν συνίστασθαι.<sup>26</sup> Ex  
hoc igitur loco efficitur, affectionem corporis ipsius, quae  
in morbis a venenato animali natis a φθοροποιῷ δυνάμει,  
i. e. a corruptrice veneni vi, producit, esse διάθεσιν.  
Hanc vero esse comprehensibilem, adeoque θεραπευτικῇ  
debellandam, contra Empiricos pariter ac contra Methodi-  
cos statuit. In quo quidem cohibere assensum nequeo,  
siquidem, ignota viri natura, ad effectus, quos in cor-  
pore producit, consilium est transferendum. Sic, qui a

24) Galen. introd. p. 572. ed. Basil. graec.

25) Aristot. categor. p. 54. ed. Pac.

26) Comment. in libr. 6. epidem. sect. 5. p. 239.



cane rabido morsus est, iam diu ante morbi ipsius initium nervorum varios patitur affectus, animi desponsionem, μυρμηκισμόν in artu vulnerato, tractionis sensum et leves musculorum convulsiones: quae magnopere augescunt, praesertim in regione pharyngis musculorumque colli, πλατύσματος μυώδους, sed maxime cucullaris et sternomastoidi, quibus nervus providet Willisii accessorius. Proinde διάθεσιν vocamus nervorum gravissimam affectionem, quam cum inflammationis signis stipatam animadvertamus, auxiliante quandoque sanguinis missione, indicatio ex ea διαθέσει rite formatur. Cetera de corruptrice vi, eaque recte caussis adiudicanda, clara sunt, bene proposita, neque ulteriore egent expositione.

p. 64. Cum Eupatoria antidotus hic a Mithridatica distinguatur, utraque autem nomen sortita sit ab eodem Mithridate, Eupatoris cognomine, quaeritur, quonam modo differat. Eam autem quaestionem expedire nequeo; Galenus enim, plurimas Mithridaticas antidotos describens, nullam eo nomine distinguit. (lib. 2. de antidotis.)

Cap. IV. p. 66. Magnopere obscura est de phalangii veterum quaestio, cum araneorum plura genera, obiter saepe indicata, hoc nomine comprehenderent. Nomen quidem a φάλαγξι, articulis seu internodiis digitorum, propter longos pedes, unde et ipsa vox φάλαγξ eo sensu occurrit apud Hesychium (ζῶον ἀράχνη παραπλήσιον.) Solipuga Plinio dicitur genus.<sup>27</sup> Cum nullam noster agnoscat differentiam, inquirere libet in ea potissimum genera, quae apud alios auctores occurrunt. In quibus primus summusque est Aristoteles. Mordacium is phalangiorum duas memorat species,<sup>28</sup> alteram araneis, qui lupi dicantur, similem, parvam, variegatam et assultim ingredientem (πηδητικόν).<sup>29</sup> Vocari autem ψύλλαν, neque texere telas. Fueritne idem insectum parvum, cantharidibus simile, colore rutilo, inter legumina degens, quod morsu pustulas excitet, delirio saepe sequente?<sup>30</sup>

27) Lib. 22, 81.

28) Hist. anim. 9, 26.

29) Cf. Plin. 11, 28.

30) Nicand. ther. v. 752.

Maior est altera Aristotelis species, nigra, cruribus anterioribus elongatis, motu pigra, neque subsultans.

Plures phalangiorum species enumerat Nicander. *Πῶς* ipsi dicitur *αἰθαλόεις*, picei coloris, dentesque diros in medio ventre gerens. Eius morsum nulla in cute signa sequi, sed rubor circa oculos, frigidus membrorum horror et priapismus sentitur.<sup>31</sup> Rhagion idem vocatur a Plinio<sup>32</sup> et Aëtio,<sup>33</sup> quod acino nigrae uvae simile sit, ore minimo sub alvo, pedibus brevissimis. *Lycosam ruricolam* vel *palustrem* coniicio.

*Agrostes* dicitur Nicandro araneus insons, textor et venator muscarum, apum, culicum et omnium animalculorum, quae in eius rete inciderint.<sup>34</sup> *Linyphia* forte *triangularis*.

Sequitur *asterion* Nicandri, quod in dorso virgas splendentes gerit: noxium id, quod frigidos horrores inferat cum capitis gravedine.<sup>35</sup> *Tetragnatha extensa* similis est, sed insons.

Coeruleum dein Nicandri hirsutum dicitur, sublimius subsultans, quod grave inferat morsu vulnus, sequentibus cordis doloribus, caligine, vomitibus araneosis, morte denique subitanea.<sup>36</sup> *Clubiona holosericea* forma accedit, sed morsus innoxius.

Tum et *μυρμήκιον*, a formicarum similitudine, quod Sostratus *μύρμηκα ἡρακλειωτικόν* vocarat.<sup>37</sup> Corpus nigrum ii tribuitur, collum rufum, in dorso lato stellarum effigies, caput fuliginosum.

Tandem *σφήκιον*, rufum, vespae simillimum, quod graves morsu noxas inferat, artuum nimirum tremorem, debilitatem et soporem. Rufae sunt Solipugae quatuor, quas Herbstius ex Asia media et India orientali acceptas delineat; sed speciem indigitare prohibemur obscura descriptione. Id tamen memoratu dignum est, mandibulas bestiarum ita esse structas, ut periculosas plagas infligere possint, etiamsi virus proboscide non

31) Ib. p. 715.

32) Lib. 29, 27.

33) Tetrab. 4. c. 1.

34) L. c. v. 734.

35) L. c. v. 725.

36) Ib. v. 729. Plin. 29, 27.

37) Ib. v. 747. et schol.

eiacularentur. (Herbsts Naturgeschichte der ungeflügelten Insecten. Berlin 1797.)

His addit Plinius Tetragnathii duo genera: prius, medium caput linea alba distinguente et transversa altera: id oris tumorem facere. Alterum cinereum, posteriore parte candicans.<sup>38</sup> Eorum multitudine infestorum morsibus acridophagos e regione, quam habitaverint, expulsos quondam refert Agatharchides.<sup>39</sup>

Postremo et Aëtius genus *σκληροκέφαλον*, prioribus haud dictum, affert, quod capite velut saxeo differat, lineamenta vero per omne corpus similia iis gerat animalculis, quae noctu lucernas circum volitent. Quid sit, plane nescio.

An vero veteribus *Solipuga araneodes* cognita fuerit, merito dubitatur, cum ad Volgam inferiorem, ad Tainaim, et in desertis mediae Asiae vulgaris sit. Quam perniciosus sit morsus, pluribus testimoniis, maxime Pallasii, patet.<sup>40</sup>

Neque *Lycosae tarentulae*, Apuliae Calabriaeque incolis infestae, apud antiquos ulla fit mentio. Haud quidem negandum, molestum esse morsum. Sed fabulantur, deliria producere saltatoria, tollenda duntaxat, si quis fidi-  
bus aut tibiis, modulamine peculiari, tarentino dicto, cecinerit. Ii fabulae etiamsi patrocinentur praeter Baglivium<sup>41</sup> Nicol.<sup>42</sup> Caputus<sup>43</sup> et Andr. Pignonatus,<sup>44</sup> fidem omnem abstulerunt Franc. Serao<sup>45</sup> et Domin. Cyrillus,<sup>45</sup> demonstratis praestigiatorum fraudibus.

38) Lib. 29, 27.

39) Phot. cod. 250. p. 453. Vix mihi temperare possum, quin Lichtensteinii Hamburgensis coniecturam de muribus Philistaeorum regionem vastantibus (1 Sam. 5.) hic apponam. עֲכָבָרִי enim, quod murem notat, cum עֲכָבָרִי, araneo, fuisse commutatum, ac proinde solipugas esse intelligendas, haud sine veritatis specie docet. (Eichhorn's Bibl. für bibl. Literatur, B. 6. p. 455.)

40) Neue nordische Beytr. p. 345. Cf. Klaprothii iter caucas. 2. P. 289.

41) Opp. p. 600.

42) De tarantulae anatome et morsu. Lycii 1741. 4.

43) Opuscoli scelti, 2. p. 306.

44) Della tarantola. Napol. 1742. 4.

45) Philos. transact. vol. 60. p. 237.

Cap. V. p. 67. De Scolopendra vid. supra p. 429.

Cap. VII. p. 68. De Pastinaca marina ib. p. 431.

Cap. VIII. p. 69. De mure araneo ib. p. 445.

Cap. IX. p. 69. De vipera ib. p. 429.

Cap. X. p. 70. Σκυτάλην ἢ ἀμφίβαιναν scribens noster utrumque anguem distinguere non videtur. Sed diserte discriminat Nicander.<sup>46</sup> Amphisbaenam parvam esse, gemino capite praeditam, oculis parvis, utrinque caput et os obtusum longo spatio disiunctum prominere: colorem, velut terrae, in cute rimosa punctis variari: lumbricum terrestrem non superare. Scytalem similem quidem, sed multo crassiorem, ut capulum aequet ligneum, tradit, quaque cauda brevis incipiat, longiorem. Aëtius eo affines sibi docet, quod, nulla cauda attenuata, aequalem habeant crassitudinem. Amphisbaenam vero ex utraque parte gradi. Utrumque enim caput modo capitis modo caudae vice inservire.<sup>47</sup>

Quodsi valde corruptum Avicennae locum<sup>48</sup> recte intelligo, is ita de amphisbaena iudicat: Commentos esse quosdam serpentem, qui in utramque partem progrediantur, sed se ipsum firmare hoc commentum non posse. Serpentem esse أقصص (radix قصص, *frangi*), ergo fragilem, quem ipse bene cognoscat, qui utraque parte aequalem habeat crassitudinem. Nonne igitur, raro exemplo, Arabs Graecorum errores, observationi plus fidens quam auctoritati, diluit? Est enim *Anguis fragilis*, cuius epitheton iam arabica voce exprimitur, *Blindschleiche* nostratum. Cauda gaudet obtusissima, quae a capite eo minus, obiter visa, discernitur, quo exiliores sunt oculi, quoque saepius in ipsa cauda stigmata occurrunt, seu puncta oculos simulantia. Solet etiam, dum capitur, caudam capiti applicare. Neque tamen unquam utroque modo progredi, neque, quod etiamnum rudes naturalium rerum homines opinantur, morsus noxius est, cum dentibus mobilibus destitutus sit.<sup>49</sup>

46) Theriac. v. 373 — 395.

47) Aelian. hist. anim. 9, 23.

48) Lib. 4. fen 6. c. 5. p. 138.

49) Linn amoen. acad. 1. p. 296.



Quid σκντάλη sit, ambigo. *Anguis Scytale* congruit quidem, sed Indiarum incola in veterum notitiam venire nequivit. Fueritne *Anguis Eryx*, sola longitudine ab angue fragili distinctus?

Cap. XI. p. 70. De δρυῖνῳ haec Galenus:<sup>50</sup> In radicibus quercuum degere, tamque malignum ad perendum credi, ut eius, qui supergrediatur, cutis a pedibus secedat, tota crura intumescant, καὶ ἐν τῷ θαυμασιωτέρον φασι, manus quoque ipsae curantium excorientur. Si quis autem interimere animal conetur, olfactum eius penitus depravari. Χέλιδρον etiam ab aliis appellari, Nicander testatur.<sup>51</sup> In lacubus habitare et paludibus, ranas locustasque venari, ab asilo vero exagitatum aufugere in montium sylvas, ubi in caudicibus quercuum latibula quaerat. Dorsum eius nigrum esse, caput planum, odorem teterimum spirare, qualem coria equina putrida exhalent. Pustulas post morsum saniosas erumpere foetidissimas, mentem alienari, et tandem soporem accedere letalem. Idem esse anguis videtur, quem χέρσυδρον Aelianus appellat.<sup>52</sup> Eum dryinum invenisse sibi visus est Belonius,<sup>53</sup> ingenti magnitudine, quem δεινδρογαίλια Graeci hodierni appellent. *Colubrum* esse *lebetinum*, valde virulentum, in Asia minore et Aegypto obvium, auguror.

Cap. XII. p. 70. Αἰμόρροος et αἰμόρρους et αἰμορροῖς vocatur:<sup>54</sup> πολόεις dicitur colore, quod adustum significat, capite horrido, fronte nivea, duobus cornibus, collum strictum, cauda valde attenuata. Incessum esse fluctuantem et strepitantem, quasi stramenta calcentur. Morsum excipere statim tumorem coeruleum, sanguinisque cursum ex ore ac naribus, sanie biliosa mixti. Pedalis cetero esse longitudinis: petrarum rimas habitare. Haec omnia repetit Aelianus.<sup>55</sup>

*Colubrum* esse *Cerasten*, nemo non videt, unde κε-

<sup>50</sup>) De theriac. ad Pis. p. 234.

<sup>51</sup>) Ther. v. 411. <sup>52</sup>) Hist. anim. 8, 7.

<sup>53</sup>) Obs. 5, 51. p. 202. 203. <sup>54</sup>) Ther. v. 282. 2.

<sup>55</sup>) Hist. anim. 15, 13.

ράστου nomine c. 16. eundem tractari patet, licet diversa symptomata producentem.

Cap. XIII. p. 71. Δυσάς, quae et καῦσος et πρηστήρ nostro, نطشمان et اظمان Avicennae dicitur. De ea et Nicander.<sup>56</sup> Est *Coluber Prester* nostrae aetatis, satis perniciosus anguis.

Cap. XIV. p. 72. Τόδος est *Coluber Natrix*.

Cap. XV. p. 72. Κέγχρος, Nicandri κεγχρίνης, Avicennae جادرسى, esse elongatum et punctis variegatis interstinctum, scholiastes Nicandri tradit.<sup>57</sup> Eundem et ἀκοντίαν Aëtius nominat, quod velut iaculum vibratum corporibus inolet. Nonne *Colubri Beri* est varietas?

Cap. XVII. p. 73. Ἀσπίς est *Coluber aegyptius*, cuius morsu blandam sibi dolorumque expertem mortem Cleopatra conscivit.<sup>58</sup>

Cap. XVIII. p. 74. Tandem aggredior de basilisco cantilenam toties repetitam: quam et Galenus fama et traditione duntaxat ita accepit, ut animal esse subflavum et tres eminentias in capite gerere dicat, adspectu solo et sibilo homines occidere.<sup>59</sup> Exiguum esse corpore, rutilum, capiteque acuto, Nicander testatur.<sup>60</sup> Gallum tamen metuere, ac eo audito convulsum perire, fabulatur Aelianus.<sup>61</sup> Avicenna nominat اصلال et الثعابين ريس, frequentem tradens in regione Turcarum et in Nubia.

Linnaeus omnem fabulam, quae medio aevo absona multa et anilia sortita est additamenta, ad Lacertae genus, capite cristato, Iguanae proximum, reduxit.

56) Ther. v. 334.

57) Ad theriac. v. 463.

58) Dio Cass. 51, 14. Aelian. hist. anim. 9, 11. Galen. de ther. ad Pis. p. 235.

59) Galen. l. c. p. 233.

60) Ther. v. 399.

61) Hist. anim. 3, 31.

## INDEX I.

### VOCUM GRAECARUM, QUARUM EXPLICATIO VIDE- BATUR NECESSARIA.

*Ἀγλιθες* comm. p. 474.

*Ἀδημονία*. Περὶ δηλητ. c. 10. p. 24. *Animi moeror, morositas*. Affines σκυθρωπότης et σκυθρωπασμός, vel etiam μσανθρωπία. Testis significatur optimus Plutarchus (Num. c. 4), qui Numam hominum societatem fugisse ac solitudinem elegisse, οὐκ ἀδημονία τινὶ ψυχῆς καὶ πλάνῃ, sed dignioris necessitudinis ac nuptiarum divinarum caussa asseverat. Simili sensu et verbum ἀδημονεῖν apud Xenophontem (Hellen. 4, 4.) occurrit. Hesychius, qui hoc verbum recte reddit ἀκηδιῶ, ἀγωνιῶ, ἀδημονίην tamen θαῦμα interpretatur.

*Ἀερόμελι* comm. p. 453.

*Ἀθήρα* comm. p. 456.

*Αἶννος*. Εὐπόρ. 1, 132. p. 161. Est synonymon Conii, forte creticum. Diosc. 4, 79.

*Αἱμάλωψ*. Diosc. 2, 88. p. 210. Primitus est sanguinis cruor effusus seu sugillatio. Sic enim Hippocraticus auctor ovulum humanum fecundum, sed abortu elisum vidit, quod extus ad membranam αἱμάλωπας gerebat. (Hipp. de nat. pueri, p. 236. Galen. adv. Lycum, p. 335. ed. Basil. gr. tom. 5.) Hoc igitur significatu et Diosc. ea voce usus est. Deinde vero suffusiones cruentas oculorum, e plagis et contusionibus ortas, speciatim sic vocatas fuisse legimus. (Galen. de compos. med. sec. loc. 4. p. 796.)

*Ἀκραϊφανής*. Diosc. 5, 88. p. 751. Contracta vox ex ἀκραϊοφανής, itaque manifesto purus, haud mixtus. Sic Hesych. καθαρὸς, ἁληθής interpretatur.

*Ἀκρέμων*, (ἀκρεμών Etym. ἀκρήμων Hesych.) Diosc. 3, 74. p. 418. *Ramus*. Ad lubitum autem noster saepissime κλωνίον, κλωνάριον, vel κλάδος, vel ῥάβδος, ῥαβδίον, vel παραφυσάς ponit, ἀκρέμων rarissime occurrit: neque eo stricto sensu, quem Theophrastus hist. 1, 1. indigitat.

Ἀκρέμονας λέγω τοὺς ἀπὸ στελέχους σχιζομένους, οὓς ἔνιοι καλοῦσιν ὄζους· κλάδον δὲ τὸ βλάστημα τὸ ἐκ τούτων ὑφ' ἐν, οἷον μάλιστα τὸ ἐπέτειον. Ergo ἀκρέμονες Theophrasto sunt rami arborum lignosi, κλάδοι vero ramusculi herbacei. Sed ipse tamen deserit hanc strictam vocum applicationem, cum (causs. plant. 5, 1.) dicat: Ἐχουσί τινες ἀρχὰς ἐν αὐτοῖς βλαστητικὰς οἱ κλῶνες, ἢ πτόρθοι, ἢ ἀκρέμονες, ἢ ὅτι χορὴ καλεῖν τὰ ἐσχατεύοντα τῶν δένδρων· οὐδὲν γὰρ ἐπὶ πᾶσι κοινόν, ἀλλ' ἐνία προσηγορίας τινὰς ἔχει ἰδίας, καθάπερ θαλία (oleae), κράδη (figus), κληῖμα (vitis)· καλοῦσι δὲ τινες καὶ κλῶνας. Sed et oleae ramusculi vocantur senioribus ἀκρέμονες (Geopon. 9, 19. 24.), et ipsius cucurbitae aut cucumeris. (lb. 12, 19.) Itaque et foeniculi rami, quanquam non lignosi, nostro ἀκρέμονες dici possunt. Παραφυάς (Diosc. 3, 73.) pariter ramus vocatur, quae propago proprie dicitur. Sic Theophr. (hist. 2, 2.) Ἀπάντων δὲ ὄσων πλείους αἱ γενέσεις, ἢ ἀπὸ παρασπάδος, καὶ ἔτι μᾶλλον ἢ ἀπὸ παραφυάδος ταχίστη καὶ εὐαυξής, ἐὰν ἀπὸ ῥίζης ἢ παραφυάς ᾗ. Sic et Leontinus (Geopon. 3, 11.) Οἱ δὲ τὰ γενναιότατα τῶν παραφυάδων μετὰ τοῦ πρέμνου (oleae) φυτεύουσιν. Et allegorice Philo Iudaeus (de mundo, p. 603. ed. Mangey.) Τὸ δὲ παμμεγεθὲς καὶ παμφορώτατον ἔργον ὁ κόσμος οὗτος, οὗ παραφυάδες οἱ εἰρημένοι βλαστοί.

Ἀκροχορδόνες, cum quibus Diosc. 4, 191. p. 684. fructus Heliotropii parvi comparantur, sunt vitia cutis, verrucis similia. De iis Celsus: (lib. 5. c. 28. n. 14.) Ἀκροχορδόνα Graeci vocant, ubi sub cute coit aliquid durius, et interdum paullo asperius, coloris eiusdem, infra tenue, ad cutem latius, idque modicum est, quia raro magnitudinem fabae excedit. Maxime in pueris nascuntur. Galenus (defn. med. p. 401. ed. Basil.) ἀκροχορδῶν ἔστιν ἔκφυσις περιφερὴς καὶ διάστενον ἔχουσα βάσιν.

Ἀλληλουχία Diosc. 5, 144. p. 812., vox raro occurrens, est *mutua cohaerentia*. Sic Dionysius Areopagita: ἢ κοινωνικὴ ἀλληλουχία. (de divin. nomin. c. 4. s. 12. p. 478. ed. Corder. Paris 1644. fol.)

Ἀμφιλαφής Diosc. 2, 156. p. 273. Hesych. πολυδαψιλῆς καὶ πολὺ πανταχόθεν πλήρης· κατάσκιος. Itaque dense foliosus, umbrosus. Cf. Marc. Vergil. ad h. l.

Ἀνακογχυλιζόμενα. Εὐπόρ. 1, 69. p. 127. Iul. Poll. 6, 25. Ὁ μέντοι ἀναγαγαρίσασθαι νῦν λέγουσιν, ἀνακογχυλιάσασθαι ἔλεγον, τὸ ἀνακλύσασθαι τὴν φάρυγγα. Tim. ed. Ruhnken. p. 34. Aret. de curat. acut. 1, 7. p. 226. ed. Lips. διακλύσματα τάδε καὶ ἀνακογχυλισμοί. Derivatio est obscura. Cum vero κόγχη sit mensura fluido-



rum, quatuor circiter drachmas continens, forte huius mensurae capacitas ad eiusmodi gargarizatus requirebatur.

Ἀναφορικός Diosc. 2, 202. p. 317. Εὐπόρ. 2, 37. p. 249. Paull. Aeg. 3. p. 86. Io. Actuar. meth. med. 1, 17. infrequens medicis vox, et diverso a grammaticis accepta sensu. Hi enim relativum dicunt: medici eos aegros, qui vitiosa multa e pectore reiiciunt. Cf. Marc. Vergil. ad Diosc. p. 307.

Ἀντλημα Diosc. 4, 64. p. 553. *Infusio*, solo hoc loco eum significatum habet: alias *haustus*.

Ἀπενθυσμένον Diosc. 1, 130. p. 123. 3, 45. p. 392. *Intestinum rectum*, alias δακτύλιος. Sed et illud obvium est in Paulo, lib. 7. p. 254.

Ἀπηλιθιόμενοι Diosc. 5, 25. p. 711., qui ἡλίθιοι, fatui reddituri sunt: ἀπαξ λεγόμενον.

Ἀπηροτημένοι Diosc. 3, 111. p. 457. Hesych. ἀπαρτῆσαι, χωρῖσαι, διαστῆσαι. Demosth. pro coron. c. 18. Καὶ με μηδεὶς ὑπολάβοι ἀπαρτῆν τὸν λόγον τῆς γραφῆς. Lucian. encom. Demosth. c. 10. p. 141. Τὸ δ' ἐγκώμιον οὐκ ἂν ἀπαρτῆν ἐνομιζόμεν. Id. de conscrib. histor. c. 46. p. 207. Καὶ μὴν καὶ συνθήκη τῶν ὀνομάτων εὐκράτω καὶ μέσῃ χρηστέον, οὔτε ἄγαν ἀφιστάντα καὶ ἀπαρτῶντα, τραχύ γάρ.

Ἀπολέγεσθαι Diosc. 1, 13. p. 26. duplicem habet et contrarium sensum. Primus enim, qui et hic adest, frequentius fere reperitur. Sic Plutarchus in Lucullo c. 42. ἀπολεγομένου τοῦ Λουκούλλου τὰ πρωτεῖα. *Repudiare, reiicere, detrectare*. Sed contrarius sensus apud Thucydidem lib. 5. c. 8. (Ὁ Βρασιδᾶς) ἀπολεξάμενος πεντήκοντα καὶ ἑκατὸν ὀπλίτας.

Ἀραιώμα. Περί ἰοβόλ. c. 12. p. 70. *Interstitia articularum*. Longin. de sublim. sect. 10. p. 47. τὰ ἀραιώματα ἐμποιοῦντα μεγέθη συνοικονομούμενα τῇ τε πρὸς ἄλληλα σχέσει. Cf. Tour. ad h. l. p. 305.

Ἀργεμα, ἄργεμον Diosc. 2, 165. p. 280. et alibi. Est ulcusculum corneae tunicae, quod maculam albam relinquit. Λεύκωμα alias dicit, ἄργον enim τὸ λευκόν. Galen. isag. p. 386. ed. Basil. Ἀργέμων δέ ἐστιν, ὅταν κατὰ τὸν τῆς ἰριδος κύκλον καὶ τὸ λευκόν, ἐνίοτε δὲ καὶ τὸ μέλαν, ἔλκος γίνεται στρογγύλον καὶ ὑπόλευκον. Erotian. p. 66. Ἀργέμων, πάθος τι περὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς λευκωματώδες· ὃ δὴ ἐκ τῆς παρεπομένης λευκότητος ὀνομάσθη.

Ἀσβόλη Diosc. 5, 181. p. 827. Sic et ἀσβόλη Galeno de loc. aff. 6. p. 378. Alio loco de fac. simpl. 9. p. 219. legitur: οἷον αἰθαλόν τινα ἢ ἄσβολον ἢ αἰθάλην γε καὶ ἀσβόλην, ὥς ἂν ἐθέλῃ τις καλεῖν. Hinc verbum ἀπασβο-

λείσθαι, quod unico loco, 5, 87. p. 749. *fuligine infici, in fuliginem verti.*

Ἀφῆδος, *menstrua purgatio*, Diosc. 2, 85. p. 206. Occurrit eo sensu et in LXX Ezech. 18, 6. Suspiciabar, et in Philone Iudaeo, scilicet Alexandrino, eandem occurrere vocem, sed spe frustratus, inveni τὰ μηνιαῖα (de special. legib. p. 305.)

Βαίς Ἐρμού Diosc. 4, 183. p. 677. dicitur prophetis aegyptiis πτέρις. Itaque aegyptia vox videtur: quod et Porphyrius apud Hieronymum (adversus Iovinian. lib. 2. c. 9.) testatur: Κοίτη δὲ αὐτοῖς ἐκ τῶν σπαθίκων τοῦ φοίνικος, ἃς καλοῦσι βαίς, ἐπέπλεκτο. Sed et Ioannes (evang. 12, 13.) ἔλαβον τὰ βαία τῶν φοινίκων: et Maccab. 1, 13. v. 51. καὶ εἰσῆλθεν μετὰ αἰνέσεως καὶ βαίων. Hesych. βაίς, ῥάβδος φοίνικος. Cf. Rossi etym. aeg. p. 30. Ergo, quae privatim ad ramos seu frondes palmae designandos adhibebatur, vox ad aliarum stirpium surculos vel ramos traducta fuit.

Βάπτεισθαι, *durari*, e Theophrasto exponitur Diosc. 5, 138. p. 806. n. 62.

Βιασμός Diosc. 3, 98. p. 446. *Violentia externa*, et affectus inde ortus. Unico hoc fere loco occurrit.

Βικίον et βίκος, *lagena*, Diosc. 2, 96. p. 220. comment. p. 447.

Βλάτιον comm. p. 427.

Βόρασσος comm. p. 411.

Βράσμα comm. p. 476.

Βρίζα comm. p. 456.

Βρούον et βρουάδη comm. p. 359. 395.

Βρώμα Diosc. 3, 48. p. 398., quamvis ubique *escam*, *cibum* notat, longo alio sensu *cavum dentium erosum* significat.

Γαβιρέα σύμνη comm. p. 372.

Γάστρα, *urna*, *urceus*, Diosc. 5, 103. p. 769. Eodem sensu in Geopon. 14, 8. Apud alios auctores fundum vasis significat. H. Steph.

Γένος Diosc. 5, 125. p. 793. *Natio*. Sic et Synes. epist. 61. et Antiphanes in fragm. com. et trag. Grotii p. 619. Σύρος τὸ γένος. Ceterum γένος, nostro sensu *genus* plantarum, minerarum et animalium, probe ab εἶδει, *specie*, distinguitur a Diosc. 5, 114. p. 779. c. 85. p. 742. c. 119. p. 784. c. 139. p. 807. Sed nec ipse sibi constat, nec Theophrastus. Hic enim τὰ εἶδη vocat τὰ μέγιστα, δένδρον, θάμνος, φρύγανον, πόα. (hist. pl. 1, 3.)

Et de oleribus: ἔστιν αὐτῶν εἶδη καὶ γένη πλείω, (Ib. 6, 1.) Alibi tamen τὰ ὅλα γένη, familias a γένεσι distinguit. (Ib. 8, 3.) Memorabilis Galeni locus (comm. in Hipp. de victu acut. p. 753.) huc pertinet: Τὸ τοῦ γένους ὄνομα τοῦ παλαιοῦς Ἑλλήνας καὶ κατὰ τῶν ὁμωνύμως λεγομένων ἐνίοτε φέροντας, τὸ μὲν ἐν ἐχόντων τὸ σημαίνομενον, ἐκ δὲ τῆς κατ' αὐτὸ τομῆς εἰς διαφορὰς πλείους ἀφικνουμένων. Optime distinxit genera a speciebus Aristoteles (part. anim. 1, 3. et categor. p. 46.) Uberrimam autem ratiocinationem iuxta Aristotelis sententiam reliquit Porphyrius in institutionibus.

Γεώδης Diosc. 2, 160. p. 277. est terra *fertilis, laeta*. Sic et in Geopon. 2, 6. Aliis scriptoribus est duntaxat *terreus*.

Γόγγρος. *Bruscum*. Plin. 16, 27. „Pulcherrimum vero est bruscum, multoque excellentius etiamnum moluscum. Tuber utrumque arboris eius: bruscum intortius, crispum, moluscum simplicius sparsum.“ Comm. p. 360.

Γομφίασις, *molarium dentium vitium*. Diosc. 2, 63. p. 191. comm. p. 441.

Γράμμα, *Scripulus*, comm. p. 415. Galen. de pond. et mens. p. 466. ed. Basil. Ἡ δὲ δράχμη ἔχει γράμματα γ', τὸ δὲ γράμμα ὀβολοῦς β'.

Δαδίων, *facula*, comm. p. 381.

Δαλός, *titio*. Diosc. 1, 32. p. 46. Δαλὸς διάπυρον ξύλον, Eustath. ad Od. 5, 488. Ξύλον κεκαυμένον, Hesych. Lucian. Timon, c. 2. p. 72. Οὕτω δαλὸν τινα ἐπανατείνασθαι δοκεῖς αὐτοῖς, ὥς πῦρ μὲν ἢ καπνὸν ἀπ' αὐτοῦ μὴ δεδιέναι.

Δαφνίτις comm. p. 349.

Διάθεις, *affectus, affectio*. Diosc. 1, 3. p. 13. περὶ ἰοβόλ. praef. p. 49. εὐπόρ. 1. p. 106. 2. p. 308. comm. pag. 669.

Διακόπτω, περὶ δηλητ. p. 16. *Interpello, praecido*, (morbum.) ut Lucian. de gymnas. c. 19. p. 173. διακόπτειν τοῦ λόγου τὸ μῆκος. Cf. Budaei comment. de lingua graec. p. 1247.

Διαστροφαι τῆς ὑστέρας comm. p. 365.

Διαφορεῖσθαι. Diosc. 5, 11. p. 697. c. 17. p. 704. *Sudore diffluere*. Ita et Galen. de salubr. 2. p. 161.

Δοκιμή, *probatio, argumentum*. Diosc. 2, 183. p. 677. Paull. Aegiu. 6. p. 206. et alibi.

Δορκάς comm. p. 446. 447.

Δροσόμελι comm. p. 453.

Δρυπετής. Diosc. 1, 49. p. 53. *Maturrimus fructus*.

Hesych. ἀπὸ δένδρου πεπτωκός. Iul. Poll. 6, 45. Schol. Aristoph. Lysistr. v. 564.

Δρώπαξ, εὐπόρ. 1, p. 221. 2, p. 249. Erat emplastrum e pice, colophonia, asphalto, euphorbio, pipere, opoponace et aliis id genus firmiter adhaerentibus et rodentibus, quibus pro depilatoriis, ψιλώθροις, utebantur. Paull. Aegin. 7. p. 295. Martial. epigr. 10, 65. „Laevis dropace tu quotidiano, hirsutis ego cruribus genisque.“

Δυνάμεις Diosc. 3, 93. p. 442. περὶ ἰσβολῶν. p. 77. et saepius: sunt *compositiones medicamentorum*. Galen. de compos. med. sec. gen. 3. p. 593. ἡ τετραφάρμακος δύναμις, et de comp. med. sec. loc. 4. p. 716. ἔγχρισται δυνάμεις ὕγραί.

Ἐγκάρδιον φοίνικος comm. p. 411.

Ἐκβολιον Diosc. 4, 181. p. 675. et Hipp. de morb. mul. 1. p. 723. et διεκβολιον ib. p. 751. Est medicamentum fetum eiiciens.

Ἐκδόρια Diosc. 3, 63. p. 409. Ea, quae cutim erodunt ac excoriant.

Ἐκφύσεις τῶν φύλλων Diosc. 4, 101. p. 594. sunt foliorum pinnatifidorum laciniae parallelae vel pinnatorum foliola. Sed alio loco c. 83. p. 677. ἐκφύσεις τῆς ῥίζης sunt ramusculi radice.

Ἐλειός, ὃς ῥωμαίοισι καλεῖται γληρίς· εὐπόρ. 1, 57. p. 121. et 2, 71. p. 285. Iam Aristoteli dictum animal (hist. anim. 8, 19.), quod cum muribus agrestibus comparat. (de facult. alim. 3. p. 666.) Hesychius perverse eundem putat cum sciuro. Est *Glis esculentus*, *Siebenschläfer* nostratum, *le loir* Gallorum.

Ἐλκυσμα dicebatur Graecis scoria argenti, quoniam e catinis ope uncinorum trahitur. Diosc. 5, 101. p. 764. n. 51.

Ἐλυμος comm. p. 458.

Ἐξιονθίζω, εὐπόρ. 1. p. 145. Hesych. τριγὰ ἐκδίδωμι· ἔστι γὰρ ἰονθος ῥίζα τριγῶν ἢ ὑπερέχον.

Ἐξιπόω, *exprimo*, Diosc. 5, 84. p. 739.

Ἐξισχύειν de vi, *sustinere*, *durare*, *valere*. Diosc. 5, 42. p. 720. n. 37.

Ἐπιγραφή, *levis vulneratio*, comm. p. 439. Nostrates etiam dicunt *zeichnen*, Catullus (25.) *conscribillare nates*.

Ἐπικάματα τῶν ὀφθαλμῶν. εὐπόρ. 1, 34. p. 109. Galen. isag. p. 396. Ἐπίκαυμά ἐστιν, ὅταν ἐξ ἐπιπολῆς ἢ ἐπιδερμὶς ἐπικαυθεῖσα ἐλκωθῇ, ἢ καὶ βραχὺ βαθυτέρα γένηται, ἐπιφορᾶς μεγάλης ἐγγινομένη. Aët. tetrab. 2, 3. c. 25.



Ἐπίκνυμα est nigri in oculo exasperatio, ut speciem cineris prae se ferat.

Ἐπίκρσις comm. p. 439.

Ἐπιφυλλίς Diosc. 4, 142. p. 622. Hesych. βοτρώδιον μικρόν, ἐπὶ τέλει βλαστάνον. *Pampinus racemarius*. LXX sic ἡβήν interpretantur.

Ἐρμωδάκτυλος Paulli et seriorum — Iris tuberosa, comm. p. 613.

Ἐρυσίσκηπτρον comm. p. 344.

Ἐτεροπάθεια Diosc. 2, 183. p. 294. ἅπαξ λεγόμενον. *Aterius partis vexatio* Marc. Vergil. vel *Revocatio metastatica morbi ad cutim seu ad partes minus nobiles*.

Εὐδιάγωγος Diosc. 4, 61. p. 550. *Qui hilariter conversatur*. Διαγωγή est vitae ratio et conversatio. Est etiam oblectamentum vitae. Strabo 17, p. 487. Aristot. ethic. 10, 6. p. 168. ed. Pac.

Εὐόλισθος γυνή. εὐπόρ. 2, 93. p. 198. ὁ τάχα ὀλισθαίνεται. *Lubricus*. Sic et in Alex. Aphrodis. problem. 1. κόπρος εὐόλισθος καὶ μαλακή.

Ζεῖα comm. p. 455. 456.

Ζύθον, ζῦθος comm. p. 454. 455.

Ζυμίζω Diosc. 2, 98. p. 226. *Fermentum redoleo*.

Ἡλεκτρον comm. p. 390.

Ἡρυξ comm. p. 347.

Θειλοπεδεύω Diosc. 5, 9. p. 693. c. 82. p. 737. *In solo, soli in cratibus ad torrendum expono*. Εἴλη ἐστὶν ἡλίου θερμοασία Eustath. ad Il. 1, 4. Θειλόπεδον· τόπος, ἐν ᾧ ξηραίνεται ἡ σταφυλή· εἴρηται δὲ ἀπὸ τοῦ θέρεσθαι ἐν τῷ ἡλίῳ καὶ τῷ πέδῳ. Etym. magn. p. 449.

Θλάσπι comm. p. 474.

Θυλακίτις comm. p. 347.

Ἰγδη Diosc. 5, 104. p. 772. ἡ θύεια Hesych. Etym. magn. Phrynich. p. 164. et Iul. Poll. 10, 103. παρὰ τὸ μίσγειν τὰ θύη, abiecto μ.

Ἰπνός Diosc. 5, 103. p. 771. Hesych. Ἰπνός, κάμινος, φοῦρνος, φανός, κλίβανος, μαγειρεῖον. Saepe hae voces secum confunduntur. Proprie esse ἰπνόν caminum figulinum, patet ex Hippocr. epid. 4. p. 523. Ὁ ἀπὸ τοῦ κερამείου ἰπνοῦ καταπεσών. Lucian. Prometh. c. 2. Αὐτοὶ δὲ Ἀθηναῖοι τοὺς χυτράας καὶ ἰπνοποιούς, καὶ πάντας ὅσοι πηλουργοὶ, Προμηθέας ἀπεκάλουν. Iis caminis balnearia calefiebant. Κάμινος vero est fornax pistri-  
narum et ad liquanda metalla apta. Κλίβανος aut κρήβανος

Diosc. 1, 96. p. 99. est proprie furnus ad torrenda frumenta idoneus. Galen. de fac. simpl. med. 11. p. 294. μετ' ἄρτου καλῶς ὠπτημένου κλιβανίτου. Imman. Moschopul. περὶ σχεδῶν. p. 13. ed. Rob. Steph. Κλίβανος, σκιεύς τι σιδηροῦν, ἐφ' ᾧ τοὺς ἄρτους ὅπτουσι, πῦρ ὑποκαύσαντες καὶ πυρακτώσαντες αὐτόν. Μαγειρεῖον est *culina*. Aristot. hist. anim. 9, 30.

Ἰτρία, *crustula*. Diosc. 4, 64. p. 553. Duo ἰτρίων genera apud Galen. de facult. alim. 1. p. 492. ῥυήματα praestantiora, viliora λάγανα. E similagine et melle ita parabantur, ut fractu facilia essent. Hinc Galen. expos. voc. Hippocr. p. 474. Τὸ ἰτρίον ἐρείκιον ὀνομάζεται, διότι εὐθραυστον. Hesych. ἰτρία, κλάσματα, ἢ καπυρῳδή πλάσματα.

Καιρῶν χῶρα comm. p. 352.

Καλαμὶς Diosc. 1, 89. p. 93. unico, ni fallor, eo loco *dentiscalpium* signat. Alioquin acus est ex arundine parata, qua cincinnos ac velamenta capitis mulierculae firmabant. Hesych. κοσμάριόν τι περὶ τοὺς πλοκάμους.

Κάμινος, v. Ἰπνός.

Κάρδαμον comm. p. 474.

Καταβιβάζω Diosc. 4, 42. p. 537. *Descendere cogo*. Plutarch. Themist. c. 4. Καταβιβάζων τὴν πόλιν πρὸς τὴν θάλασσαν, ναυβάτας (τοὺς Ἀθηναίους) καὶ θαλαττίους ἐποίησε. Similis sensus nostri loci est. Si quid enim ita decoquitur, ut duae tertiae partes absumantur, decoctum dicitur ad tertiam partem καταβιβασθέν.

Κατάγραφος Diosc. 3, 163. p. 499. dicitur *punctis distinctus*. Melius *striatus* vocatur fructus; qui significatus etiam in Lucian. tyrann. c. 28. p. 211. Flagellis enim mulctatus tyrannus conspicitur πελιδνός (lividus) καὶ κατάγραφος (vibicibus notatus.) comm. p. 567.

Κατακνάω, (unde κατακνησθεὶς Diosc. 2, 149. p. 265.) *Incido, scarifico*. Namque Lucianus in Ocypode, 91. p. 29. Κατακνήσω σου τὸν πόδα, ὥς ταῖς τομαῖσι πλείστον αἱμά σου κενῶ. Itaque non defricare, deradere, ut Bu-daeus vult.

Κατάποσις Diosc. 3, 84. p. 433. περὶ δηλητ. c. 25. p. 34. *Gula*.

Κέγχρος comm. p. 458.

Κεράτιον comm. p. 415.

Κιβώριον comm. p. 459.

Κλίβανος vid. Ἰπνός.

Κοκκύμηλα comm. p. 419.

Κολλοκασία comm. p. 459.

**Κομανικός λίθος**. *εὐπόρ.* 2, 25. p. 237. Comanam, urbem Cappadociae in convalle Antitauri sitam, e Strabone lib. 12. p. 17. noscimus. Qui autem lapis fuerit, non liquet: forte coticula quaedam. Comensis lapis viridis, ad coquendos cibos utilis, longe alienus est. (Plin. 36, 44.)

**Κονίσσαλος** comm. p. 364.

**Κοπίσκος** comm. p. 379.

**Κοπτάρια** Diosc. 4, 187. p. 681. sunt *offulae*, quas iam pharmacopolae *morsulos* vocant. **Κοπτάρια βηχικά** Galenus describit. (De compos. med. sec. loca, 7. p. 58. s.). Medicamentum purgans, κατ' ἐξοχὴν κοπτάριον dictum, Oribasius (syn. lib. 3. f. 76<sup>b</sup>.) drachmarum duarum pondere habet. Medicamenta globulorum forma, *pilulae* nostratibus, *καταπότια*, Alexandro Tralliano etiam (lib. 5. p. 263.) et Actuario (meth. med. 5, 9. col. 276.) *κοκκία* vocantur.

**Κοπτὸν** idem fere est. Diosc. 2, 125. p. 245. Galen. de loc. aff. 7. p. 397.

**Κορύμβος** manifesto Diosc. 4, 73. p. 567. bacca seu fructus *στρύγγου*. Galen. meth. med. 14. p. 994. τὸ σπέρμα *πηγάνου* σὺν αὐτοῖς τοῖς κορύμβοις. Capsulae sunt. De hederæ racemis autem in orbem circumactis, ut Plinius ait, *κορύμβων* nomen usitatissimum est.

**Κουβαρίδες** comm. p. 438.

**Κρανοκολάπτῃς** comm. p. 425.

**Κρίνον** comm. p. 456.

**Κριός** comm. p. 458.

**Κύημα** comm. p. 464.

**Κώνος** comm. p. 381.

**Λαβιδόω**. *εὐπόρ.* 2, 53. p. 117. Prehendo *λαβίδι*: *λαβίς* autem *forcipem* significare, patet e LXX, qui Ies. 6, 6. *בִּיהָרָה* sic verterunt.

**Λαζούριος λίθος** seniorum: Diosc. p. 773. n. 68.

**Λακιδούσθαι** περὶ δηλητ. p. 12. Activum *dilacero*, ergo passivum *dilacerationis sensu affici*.

**Λάμπη** Diosc. 5, 87. p. 750. n. 12. Est spuma vini acescentis, nostratibus *Kahn*, Gallis *chancissure*, Italis *muffa*, Anglis *mould*.

**Λεληθότως** Diosc. 4, 90. p. 587. *Obscure, obsolete*. **Λεληθότως κοῖλον**. Sic adhibetur et *λανθανόντως* ab Anacreonte od. 28, 16.

**Λιβάς** Diosc. 3, 116. p. 462. Hesych. *λιβάς*, *πηγή*, *σταγών*. Suid. *ἐνυδρος τόπος*. Strab. lib. 8. p. 268. *φρέατα καὶ ὑπόνομοι λιβάδες*. Videtur igitur esse et *scaturigo* et *locus inundatus*. Optime vero Pseudo-Democritus

(Georon. 2, 6.) Λιβάδας δὲ καλεῖσθαι τὰ ἀπὸ τῶν ἰμβρίων ὑδάτων διηθούμενα καὶ κατὰ γῆς ἐν στεγνοῖς καὶ σκιεροῖς τόποις συνεστηκότα, καθάπερ ἐν ἀγγείοις, μὴ φλεβῶν ἀπορροίας οὔσας· ὅθεν οὐδὲ διαμένειν τὰς λιβάδας, ἀλλὰ πάνυ συντόμως ἐκλείπιν, ἐὰν μὴ σφόδρα μεγάλας εἶναι συμβῇ.

Λόπιμον comm. p. 408.

Λυγισμός. Diosc. 4, 105. p. 598. Hesych. ἀνάκλασις τῶν μελῶν. Esse autem potius ἀνάκαμψιν legendum, cum a λύγω, vitice flexili, et λυγίζω, flecto, torqueo derivanda sit vox, bene monet Saracenus ad h. l. Ergo est *contorsio membrorum*. Eustath. οἱ κωμωδούμενοι ἐν φαύλοις ὀρχήσεσι λυγισμοί.

Μαγειρεῖον vid. ἱπνός.

Μάδος, ψίλωθρον, depilatorium, quo coriarii utuntur. εὐπόρ. 1, 179. p. 189. μαδᾶν, glabrescere. μαδίζειν, glabrum reddere, depilare.

Μάκερ comm. p. 392.

Μάντις, ὁμοιος ἀκρίδι Ἰνδικῇ. εὐπόρ. 1, 158. p. 175. μάντις καλαμαία Theocr. id. 10, 18. Est *Mantis religiosa* L., locustarum genus, de qua exstant Poirleti (Journal de phys. 25. p. 334.) et Roeselii (Insecten - Belust. vol. 2. tab. 1. 2.) egregiae observationes.

Μεγάλιον comm. p. 370.

Μελανσπέρμον, εὐπόρ. 2, 93. p. 298. est secundum Plin. 20, 71. cognomen μελανθίου Diosc. 3, 83.

Μενθήσιον comm. p. 370.

Μεσοδάκτυλα Diosc. 4, 185. p. 680. Fastidit hanc vocem Phrynichus p. 194. ed. Lobeck.

Μετασύγκρισις comm. p. 340. 366.

Μετώπιον comm. p. 370.

Μίλφος. εὐπόρ. 1, 48. p. 115. Defluvium pilorum e palpebris. Μίλφωσις dicitur Galeno de compos. sec. loc. 4. p. 733. Io. Actuar. de dignosc. affect. 2, 7. Μίλφωσις ἢ μαδάρωσις ἐστὶν ἀπόπτωσις τῶν τοῦ βλεφάρου τριχῶν. At non confundenda μίλτωσις Aët. tetrab. 2, 3. c. 2., quando tarsi rubescunt μίλτου, rubricae modo.

Μίσχος, petiolus, εὐπόρ. 2, 98. p. 291. Eius loco saepe Diosc. μόσχον ponit, e. g. 2, 210. p. 330. 4, 42. p. 537. Alibi vero, 4, 184. p. 678. recte μόσχον habet prolem, sobolem. Ita et potest 2, 212. p. 332. verti, quanquam petioli sint in interpretatione. Cf. comm. p. 487.

Μυρτιδανόν comm. p. 413.

Μυσκέλεδρα. εὐπόρ. 2, 111. p. 310. Μυσκέλεδρα He-



sych. Inl. Poll. 5, 91. Esse depravatum e μυσκέρδα, Alberti ad Hesych. p. 634. *Muscerda*.

Μυττωτόν Diosc. 2, 181. p. 292. n. 78.

Νάσκαφθον comm. p. 361.

Νῆρις comm. p. 347.

Νόστιμος Diosc. 2, 123. p. 242. 3, 87. p. 438. proprie quod rediverum est. νόστιμον ἡμᾶρ Od. 1, 9. Deinde, quod in redivu est, ut Plinius iun. (ep. 4, 6.) loquitur, itaque quaestuosus, fructuosus, utilis, quemadmodum in locis Dioscoridis. Hinc Luciani (de mercede conductis, c. 39.) τὸ νοστιμώτατον καὶ ἐγκαρπώτατον τῆς ἡλικίας intelligitur. Et Theophrasti (causs. plant. 4, 13.) νοστιμώτερα σπέρματα καὶ πρὸς τὴν σίτησιν βελτίω.

Ὄβολός comm. p. 415.

Ὄγκοι comm. p. 340.

Ὀλυρα comm. p. 455. 456.

Ὅπος saepe in eupor. est Ferulae succus: unde ὀποῦ φύλλον vel ὀπόφυλλον est folium Ferulae. p. 213. 214. 235. 242. 253. 268.

Ὀύραχος (l. οὔραχος) *caudula*. Diosc. 1, 176. p. 671.

Παιδέρωζ comm. p. 499. 500.

Παραμήρια. *interna femora*. Diosc. 1, 130. p. 123.

Πάτος comm. p. 364.

Πετρολάπαθον· εὐπόρ. 2, 47. p. 259. Ignota Rumi-  
cis species, hoc unico loco occurrens. An *R. Acetosa*?  
An *R. scutatus*?

Πιλήματα Diosc. 1, 68. p. 73. *Pulvilli e lana carpta*, quos nostrorum hominum genus e linamentis carptis aptius facit: *plumaceaux* Gallis dicti. Galen. de compos. medic. sec. loc. 2. p. 504. *πιλήματα μαλακῶν ἐρίων*. Vocatur et p. 506. *στρόφιον ἐρίου* et *πτύγμα* et *ἀνστρέμμα ἐρίου*.

Πῖνον, cerevisiae genus, comm. p. 455.

Πλάδος Diosc. 1, 21. p. 37. *πλάδος στομάχου καὶ ἀτο-  
νία*. Est forte *γαστρομαλακία* recentiorum, de qua Au-  
tenriethius eximie scripsit.

Πνευματώδης Diosc. 2, 127. p. 246. et φυσώδης di-  
stinguuntur, quanquam vulgo *flatuosus* utraque vox red-  
datur. Galenus (de diffic. respir. 3. p. 952. 953.) *πνευ-  
ματώδεις* dicit et *πνευματίας*, qui ob inflata hypochondria  
anhelant. φύσαι vero in solis intestinis resident: unde il-  
lud est vitium magis diuturnum viscerum, quae hypo-  
chondria occupant cum spiritus difficultate iunctum.

Πρότυπος Diosc. 2, 26. p. 178. 4, 10. p. 513. *Pa-*

*rum prominulus simulque oppressus*, unde in crateribus corinthiacis (Athen. 5. p. 199.) τὰ πρόστυπα ζῶα καὶ τετορευμένα, quae Itali sculptores *basso rilievo* vocaturi fuissent.

Προσωπεῖα Diosc. 3, 151. p. 491. (et προσώπιον 4, 105. p. 598.) sunt larvae aut personae comicorum. Huc Dicaearchus (stat. Graec. p. 16. ed. Hudson.) de καλύμμασι κεφαλῆς apud Thebanos: δοκεῖν, ὥσπερ προσωπιδίῳ πᾶν τὸ πρόσωπον κατελῆφθαι· οἱ γὰρ ὀφθαλμοὶ διαφαίνονται μόνον.

Πτερύγια τὰ ἐν δακτύλοις Diosc. 1, 151. p. 143. „In digitis recedere ab ungue caruncula cum magno dolore consuevit: πτερύγιον Graeci appellant.“ Cels. 6, 19.

Πτίλα βλέφαρα Diosc. 1, 86. p. 91. Πτίλους vocat Galenus (meth. med. 14. p. 1017.) τοὺς ἀπολλύντας τὰς ἐκ τῶν βλεφάρων τρίχας.

Πυρῖτις comm. p. 347.

Ῥᾶξ, ῥᾶγες (ῥῶξ, ῥῶγες soloecismus) *Υνα*, nec *acinus*. Cf. Galen. de fac. alim. 2. p. 574. 575. Sed et εὐπόρ. 1, 69. p. 128. ῥᾶγες σκορόδου dicuntur alii nuclei.

Ῥήξεις τῶν ὠτῶν Diosc. 3, 58. p. 406. Non rupturae videntur, sed id quod nostrates *Reissen in den Ohren*, Galli *douleurs tranchantes* vocant. Sunt dolores lancinantes, ut plurimum rheumatici, quos Archigenes, magnus ille ὀνοματοθήρας, πόνους ὀλκίμους καὶ ἀτειροὺς appellabat. (Galen. de loc. aff. 2. p. 87.)

Ῥούσιος Diosc. 4, 131. p. 614. suspecta vox, quae mediam aut inferiorem redolet graecitatem. Cf. du Cange glossar. 2. p. 1307. Scribitur et ῥουσσαῖος. Est color rubricae. Geopon. 11, 23.

Ῥύαξ Diosc. 3, 51. p. 400. *Fluentum, rivus*. Sic Plat. Phaedon, p. 44. ed. Gryn. ὥσπερ ἐν Σικελίᾳ οἱ πρὸ τοῦ ῥύακος πηλοῦ ῥέοντες ποταμοί, καὶ αὐτὸς ὁ ῥύαξ.

Ῥυθμός Diosc. 5, 88. p. 751. n. 14. Herod. 5, 58. ὁ ῥυθμός τῶν γραμμάτων. Theocr. 26, 23. Eurip. Electra 772.

Ῥωστικός Diosc. 5, 11. p. 697. *corroborans*. Non memini, id alibi occurrere. Ῥωστικόν enim Hesychii alienum. Corroborans etiam methodus alia non fuit apud antiquos, quam, remotis caussis virium deficientium, alimentis aliquid additura. Galen. meth. med. 11. p. 750. Ῥωννῦναι τὴν δύναμιν, ὅπως ἀντισχεῖν τῷ νοσήματι δυναθῇ. De constit. artis ad Patroph. p. 301. ἡ νάθρεψις τε καὶ ῥώσις ἐστὶν ἐκ κινήσεων τε καὶ τροφῶν συμμετρῶν γιγνομένη.

Σειριᾶν Diosc. 4, 71. p. 566. εὐπόρ. 1, 9. p. 98. σειριᾶν D. 2, 161. p. 277. Derivatur utrumque a σειρίῳ, canicula.

Est nimirum *σειρίασις* morbus, in canicularibus diebus pueris maxime nudo capite solis ardorem excipientibus infestus, qui inflammatione meningum cerebrique ipsius, saepe repente enecante, constituitur. Alex. Aphrod. problem. 1, 98.

*Σεμίδαλις* comm. p. 454.

*Σήπες* Diosc. 1, 74. p. 77. *Ulceras putrida*. Hipp. epid.

3. p. 487. "Ανθρακες πολλοὶ κατὰ θέρος καὶ ἄλλα, ἃ σήψ καλέεται. Alioqui *σηπεδών* dicitur.

*Σητάνιος*, *σιτάνιος πυρός* comm. p. 454.

*Σκόλλυς*· *εὐπόρ.* 2, 93. p. 298. n. 77. *Spira crinium*.

*Σπλήνιον* comm. p. 344.

*Σπουδαῖος*, *probalus*, comm. p. 396.

*Στατική πόα*· *εὐπόρ.* 1, 116. p. 151. 2, 82. p. 293. *Statice*, septem caulibus. Plin. 26, 33. Videtur *Armeria vulgaris*. Dicitur autem nostro primo, a sistendi vi, sicut *στατικά κολλύρια* Aëtio.

*Στλεγγίς* comm. p. 363.

*Στόνυξ* Diosc. 4, 48. p. 543. Hesych *στόνυχες*, τὰ εἰς ὄξυ λήγοντα, καὶ τὰ ἄκρα τῶν ὀνύχων. Cf. comm. p. 594.

*Στύμματα* comm. p. 367.

*Στυπτικός*, *condensans*. Diosc. 2, 94. p. 218. n. 11.

*Συρμαῖζειν* comm. p. 388.

*Συστροφαὶ νεύρων* Diosc. 5, 134. p. 801. *Contorsiones tendinum ligamentorumque*. Namque et Celsus (7, 18. 8, 1.) et Iul. Pollux (2, 5.) nervos, *νεῦρα*, vocant *ligamenta articulorum*.

*Σφέκλη*, *faex*, vox mediae et inferioris graecitatis. *εὐπόρ.* 2, 137. p. 328. Du Cange glossar. p. 1670.

*Σφραγίς* vocatur *lemnia terra*. *περὶ δηλητ.* p. 4. *Terra sigillata*.

*Τεταρσωμένος* Diosc. 3, 163. p. 499. 4, 172. p. 666.

*Ταρσοῦμενα* 4, 27. p. 526. idem est, quod 4, 183. p. 677. *ἀνηπλωμένα* ὡς *πτέρυξ* vocatur. Ergo *pinnata*. Namque *ταρσός* Suid. ἡ τῶν ὀρνίθων *πτέρωσις*.

*Τήλις* comm. p. 457.

*Τίφη* comm. p. 456.

*Τράγος* comm. p. 457.

*Χαμαικέρασος*, *εὐπόρ.* 1, 154. p. 174. *Convallaria maialis*. C. Gesner. praef. p. XV.

*Χόνδρος* comm. p. 457.

# INDEX II.

## SYNONYMORUM IN COMMENTARIO EXPOSITORUM.

	pag.		pag.
Ἀβιβλαβόν	541	βαλσαμένη	560
ἄλληλω	602	βησασᾶ v. ind syr.	693
ἄζικουρού	484	βοϊδήν	637
ἄνσαναφ	629	βόλχον	375
ἄνώνιμ	523	βόρασσος	411
ἄπουσί	510	βουϊνεσάθ	584
ἄραχού	521	βουρχουμάθ	597
ἄρμαλα	516	βρεχού	460
ἄρμας	642	Γαθουονήμ	466
ἄσελλοήρη	398	γοῖδ	522
ἄσίρακος	440	Δάκαρ	349
ἄσιθόισοι	486	δαφνίτις	349
ἄσκαουκαύ	524	δουβάθ	597
ἄσόνθ	465		
ἄσοντιρί	398		
ἄσουμές	641	Ἐμβροσί	468
— λαβόν	642	ἐπαφου	582
ἄσουρίκ	469	ἐρβιαίαθουμ	483
ἄστηροτιγή	559	ἐρυσίσκηπτρον	344
ἄστηρ χιλλός (χουλόθ)	589		
ἄστιρκόν	618	Ζεραφοῦς	458
ἄστρεσμονίμ	602	ζιγά	627
ἄταδίν	397	ζίγιρ	349
ἄτιρκόν	465	ζουορινσίπετ	386
ἄτιρεβέρζια	542	Ἡρυγξ	347
ἄτιρσίπη	466		
ἄτιρτόπουρις	489	Θαμάκθ	560
ἄχοιοσίμ	595	θέσκε	478
ἄχυ	349	θεφίν	572
ἄψαφέ	527	θεψώ	627
Βαβιβωροῦ	520	θορπάθ	461
βάκχαρ	347	θορπάθ σαδέ	640



	pag.		pag.
Ἰαρον	481	Πελεθρόνιον	493
ἱεβάλ	587. 588	πεμψεμπτέ	598
ἱεγκ	546	πεπεράκιουμ	343
ἱέσκ	546	πυρίτις	347
ἰσaron	481	Ῥιπλάμ	463
Κιοτουκάπιτα	502	Σααρθά	544
κιττώ	349	σαμψώς	525
κονσεκράτριξ	342	σασᾶ	541
κουσίμεζαρ	636	σέμεθ	474
κόττανα	484	σέμεόν	541
κυνόμαχον	495	σεμουῖρα	541
κυνόξυλον		σενεόρ	495
Λαβοθολαβάθ	488	σέσιλος	428
λανάθ	578	σιθιλέα	523
λαουβέρδα	465	σιθιλεσαδέ	523
λέπιδιν	484	σίσερτος	502
λίβιουμ	386	σισιμάκα	601
λοπιμα	408	σιφοέφ	493
Μάδελκον	375	σιχάμ	520
μαδωνία	557	σοβέλ	495
μάρικα ῥάδιξ	342	σονιτέμψος	475
μειούδα	581	σουιτέμψον	
μερσούπυος	512	σοῦχος	449
μότα	408	σοφό	513
Νάρ	342	σπλήνιον	344
ναράτ	560	συμφαιφοῦ	541
νήρις	347	συρίς	478
νοῦφαρ	556	σωφοβί	563
Οἰνώ	478	Φυλλεσαδέ	402
ὀπερτρίτος	342	Χιρδάν	502
οὔαργουγούμ	602 cf. voc.	χηρόσιρις	486
syriacas.	693	χούδουα	595
οὔλοφόνον	495	χουλούμ	572
		χουρζήτα	598
		χουρμά	516
		χουφφους	485

# INDEX III.

## VOCUM EBRAICARUM ET PUNICARUM IN COMMENTARIO OBVIARUM.

	pag.		pag.
לָבֵן Lilium candidum	541	גִּדְדֵי עֵינַיִם incisio גִּדְדֵי עֵלִים	466
אֲבִיזָה Capparis, propria appetentia	483	גָּמָא Papyrus	395
אֲגֵלֹת, אֲגֵלִים Agallochum	360	דֶּחֶן Sorghum	457
אֲזֹב Hyssopus	506	דְּרֹר Stillicidium, effusio	371
אֲזֹנִים Tragium	595	דֵּבִי עֵבֶנִי Ebeni ligna	403
אֲחָה Gramen palustre	349	זֶרַע בִּשְׁתִּי Lini semen	458
אֲחֹי-דִי σχοῖνος μέλας	595	תֵּינִים vires	572
אֲסָד Rhamnus	397	תִּלְבָּנָה Galbanum	533
אֲלֵגָמִים Santali ligna	403	תִּמְאָה lac coagulatum	446
אֲסָקְרָא talmud.	440	תִּמְרָה Bitumen, asphaltum	384
אֲשֹׁר gressus, vestigium	466	תִּצִיר Gramen, Herba	465
אֲשֵׁל Tamarix orientalis	396	תִּצִיר בְּרֻכָּה Marrubium	542
בְּדֵלֶת Bdellium	374	תִּצִיר גִּזְלֵי Verbena	598
בֹּס צִינְחֻם Cynanchum erectum	610	תִּצִיר הַשְּׂמֹנִי Strychnus hortiensis	602
בֶּטֶן venter	421	תִּצִיר זִפְתָּה Herba picis	466
בִּטְנִים Pistacia	421	תִּצִיר טַפְרִין Herba unguinum	489
בִּטְנִים Oppidum	421	תִּצִיר מִוֶּה Potamogeton	618
בִּטָּר Uva immatura	411	תִּצִיר מִיֶּה Herba hys-	466
בִּקְבֹּק lagena	447		
גִּדְדֵי Coriandrum	522		

	pag.		pag.
חֲצִיר עֶרְקִין Herba nervorum	465	עֲנָקָא chald. Geranium	546
חֲצִיר קָרָה Ranunculus	484	פִּלְאִי שְׂדֵה mirabilis herba campi	402
חֲצִיר חַפְנִית Chamaeelum	559	צֶבַח Lacerta	450
חֲרָדָה stupor	502	צִרִי Mastiche	356
חֲרִי יוֹגִים Stercus columbinum, Ornithogalum umbellatum	471	צִרִי סִפֵּר Stirps resinifera lugubris	386
חֲרָפֶת שְׂדֵה Euphorbia		קָסִיָּה Cassia	349
אֲפִיֹס Apios	640	קִיקְיוֹן Ricinus communis	638
אִשְׁפִּית Iaspis	661	קִינָמוֹם Cinnamomum	350
בָּמֹן Cyminum	522	קַצִּיעוֹת Cassia	349
כֹּפֶר Lawsonia	400	קִשְׁאוֹר מְזוֹר Momordica Elaterium	636
כֹּקְכִים Coccum	593	רָאשׁ Venenum	486
כֹּחַלִּית tus	376	שׁוּמֵשׁ Mercurialis	641
זַעֲנָה Absinthium	506	שׁוּמֵשׁ לָבָן Mercurialis alba	642
זֶשׁוֹן אֶלֶף Buglossum	629	שׁוּשָׁן Lilium	368
מִירֵה myrrha	371	שִׁתְלָה Unguis odoratus	427
לָמְפָס lampas	342	שִׁטָּה Acaciae ligna	403. 405. 490
נֶעֱם iucundus	485	שִׁקְמוֹרִים Sycomorus	422
סַפִּיר Sapphirus	660	שִׁרְשׁ Radix	478
עוֹבֵר fluidus	371	שִׁשֶׁר minium	646
עֵלֶקֶת אֹרֶזָה Resina pini	390	חֹלְעֵת שִׁנִּי Coccum	593
עֶשְׂתִּילָה Vespertilio	488	חֲמָתָא Pyrethrum	560
עֶכְבֵּר mus	672		
עֶכְבֵּרִישׁ araneus			

## VOCES PAUCAE SYRIACAE.

	pag.		pag.
ܐܠܗܐ ܕܐܪܐ Filius ara- nei: melior exposi- tio ܐܠܗܐ ܕܐܪܐܘܪܐ, quam quae p. 602. traditur.		ܐܠܗܐ ܕܐܪܐ quia tarde floret, tardos fert fructus.	
ܐܠܗܐ ܕܐܪܐ βησαῖ Diosc. 3, 46. p. 395. <i>Pega- num Harmala</i> . ܐܠܗܐ cunctatus est, forte		ܐܠܗܐ Iaspis	661
		ܐܠܗܐ ܕܐܪܐ (Sesa- mum nigrum) Glau- cium luteum.	601
		ܐܠܗܐ Aloë	503
		ܐܠܗܐ Lilium	541



# INDEX IV.

## VOCUM ARABICARUM.

	pag.		pag.
أثرار Berberis	398	أيريس Radix iridis	343
أثمد Stibium	645		
أثمل Tamarix orientalis	396	بابونج Chamomilla	559, 560
أجامى Schoenus naba-		بادرنجويه Melissa	542
taeus	355	بادروج Ocimum	471
أذخر Schoenus odoratus	356	بازنجان Solanum esculen-	
أسقنقر Scincus	444	tum	604
أسقيل Scilla	483	بان Hyperanthera Mo-	
أشنة Usnea	360	ringa	637
أصلال Basiliscus	675	بخور مريم Cyclamen	478
أطوم Echinus esculen-		بدلان Ostrea	427
tus	426	بربريس Berberis	398
أطربيلال Coronopus	466	برغوثى Psyllium	602
أظفار الطيب Unguis odo-		بردى Papyrus	395
ratus	427	برقوق Περκόκκια	410
أظمان Anguis δυνάς	672	بسباسة Macis	392
أغلجين Agallochum	360	بستق Pistacia	421
أقحوان Parthenium	560	بسر Dactyli immaturi	411
أقصص Anguis fragilis	673	بشنين الحنيز Nymphaea	
الكاسنج Physalis	602	Lotus	623
ألكلية، واللوة Agallochum	360	بشنين عربى Nymphaea	
أملج Emblica	638	coerulea	623
أمير بربريس Berberis	398	بصل Cepa	483
أنجيدان Silphium	528	بصل الفار Scilla	483
أنزروق Sarcocolla	533		

	pag.		pag.
بصل القي Bulbus vomitorius	483	جند بادستر persice Castoreum.	432. [Animal ipsum arabice
بصل الزير Bulbus esculentus	483	توراج, solitarius.]	
بطم Terebinthus	381	جوز Nux	380
بطيخ Citrallus	468		
بلح Fructus palmae immaturus	410	حاشا Thymus	507
بليلج Terminalia Bellirica	638	حبه الحصرأ Fructus terebinthi	381
بمنيخ Glaucium	534	حجر البوريطوس Pyrites	451
بنات وردن Onisci aselli	439	حرب Chamaeleon	434
بننت النار Urtica urens	615	حردون Lacerta	451
بنج Hyoscyamus	601	حرف Lepidium	474
بهار Bupthalmum	561	حرملا Peganum Harmala	516
		حص Curcuma	344
تريد Turpethum Diosc. p. 615. n. 35.		حصص Lycium	357
ترفة Tuber	461	حلتيت Silphium	528
ترنجابين Sacchari spondanei species	453	حماما Amomum	351
تمتم Rhus obsoniorum	409	حمير Aselli	439
تمر Palmae species	410	حنا Lawsonia	400
تمساح Crocodilus	445	حنب الثعلب Solanum	604
تنن Thynnus	436	حنضل Colocynthis	640
توم Allium	473	حي علم الما Pistia Stratiotes	618
التين الدب Ficus lupi	421		
		خاليدونيون Chelidonium	487
ثفوح الارض Chamaecolum	559	خروب Ceratonia Siliqua	415
		خروع Ricinus communis	638
جاورسي Anguis μέγχιος	675	خصى الثعلب } Orchides	553
جران Locusta	440	خصى الكلب }	
جميز Sycomorus	422	خطافي Hirundinaria	487
جميع Fructus praestantes palmae	410	خوخ Malum persicum	417
		خيبار Cucumis	468

	pag.		pag.
خیری Cheiranthus	550	سنبل Nardus	346
دار شیشغان Aspalathus	359	سنجریق Cinnabaris	647
دار صینی Cinnamomum	350	سندروس Resina iuni-	
درة Sorgum	457	peri	387
دقر Luxuria plantarum	349	سنط Acacia	405
دم الاوین Sanguis dra-		سورنجان Iris tuberosa	613
conis	647	سوسن Lilium	368
دوم Borassus flabellifor-		سوسن الاسما Iris	343
mis	374	سولع Aloës species	503
دهمست pers. Laurus	388	شب Alumen	650
رجل الغراب Coronopus	466	شرین Cedrus	386
رحفة Pumex	650	شقیاق نعین Anemone	485
رطب Fructus palmae		شکوک Arsenicum	649
maturus	410	شوک Carduus	497
رعا Raia Torpedo	429	شیخ Absinthium	506
روند Rheum	491	شیطرح Lepidium	484
ریس الشعین Basiliscus	675	صبر Aloë	503
زبان Cremor lactis, bu-		صدف Concha	427
tyrum	446	صنوبر Pinus	380
زرقون Minium	647	صب Crocodilus	450
زرنیخ Arsenicum	649	ضبع Hyæna	448
زعرور Azarolus	413	طالیسفر Macer	392
زنجر Cinnabaris	647	طباشیر Saccharum Bam-	
زنجبیل Zingiberis	477	busae	453
زوف Hyssopus	506	طلنجبین Mel sponta-	
ساجور Cremium	349	neum	453
ساعلی Tussilago	544	عثم Elaeagnus spinosa	406
سدر Zizyphus Lotus	419	عزطنیثا Cyclamen	478
سکبینج Sagapenum	531	عصیر الدب Fructus ar-	
سکر Saccharum	453	buti	421
سلیخه Cassia	349	علک Resina	390
سلیقون Minium	647	عنبر Ambra	391
سماق Rhus	409		

	pag.		pag.
عندم Dracaena arbor	647	قنقهام <i>κάρκαμον</i>	361
عنزروت Sarcocolla	533		
عنصل Scilla	483	كاه ربا Succinum	391
عود هندي Agallochum	360	كبيكج Ranunculus	484
عوسج Lycium europaeum	397	كحمال Collyrium e stibio	645
		كرات Porrum	473
غار Laurus	388	كزبر Coriandrum	522
غافث Agrimonia Eupatorium	591	كزمازج Gallae tamaricis orientalis	396
غبر Sorbus domestica	361	كفرة Lawsonia	400. n. 2.
غنص <i>ἐγκάρδιον φοίνικος</i>	412	كمه Piscis marinus	436
		كندر Tus	376
فستق Pistacia	422	كندس <i>Στρούθιον</i>	478
فلفل Piper	476		
فوه Rubia	563	لازورد Lapis lazuli Diosc.	p. 773. n. 68.
فينة Falco ossifragus	441	لبخه Persea	424
		لبال Tus	376
قاطر Sanguis draconis	647	لذان Ladanum	402
قثا الحمار Cucumis asininus	636	لسان الثور Buglossum	629
قر Rana	484	لصيف Stibium	645
قراص Chamaemelum	598	لغظ Species oleris	484
قرظ Acacia	405	لك Lacca	361
قزع Cucurbita	468	لقينه Edulium quoddam	484
قرومعا Crocomagma	345	لماك } Stibium	645
قرومز Coccum	593	لمال }	
قريص Urtica	615	لوف Dracontium	480
قسط Cistus	401		
قسط الرومي Costus romanus	354	ماميثا Glaucium	534
قصب ذرية Calamus aromaticus	355	محبب Prunus Mahaleb	401
قطران Cedri fructus	386	مز Celtis australis	419
قطلب Arbutus Unedo	421	مشمش Prunum armeni- niacum	417
قنفذ Echinus esculentus	426	مصطكي Mastiche	381
		مقر Aloë	503



	pag.		pag.
مقل Bdelium 374. Fru-		نوفر Nuphar	556
ctus Chamaeropis	411		
ملوخ Atriplex Halimus	398	هرمس اصابع Iris tube-	
		rosa	613
نبق Fructus Zizyphi		هلج Ximenia elliptica	425
Loti	419	هيلج Terminalia Che-	
نجده Elaeagnus orien-		bula	638
talis	406	هندب شكورية Cichorium	466
نخل Palmae genus	410		
نرجيس Narcissus	348	دج Acorus	344
نردین Nardus	346	درل Lacerta	444. 449
نشغه Pumex	650	وقل Chamaerops humi-	
نطشمان Anguis dupás	675	lis	411
نعناع Mentha	511		
نفظ Naphtha	385		
نمس Mustelae species	434	يمروج Mandragora	605
نورة Bupthalmum	560	يسمين Iasminum	377

# INDEX V.

## SYSTEMATICUS.

	pag.		pag.
Acacia Catechu Willd.	405	Agrostemma Coronaria L.	541
— leucophloea Willd.	405	— Githago L.	541
— vera I. Bauh.	372. 405	Aiuga Chamaepitys	
Acanthus mollis L.	499	— Schreb.	568
— spinosus L.	499	— Iva Schreb.	559. 568
Acarna gummifera Willd.	494	Alabastrites	657
Acetabularia mediterranea Lam.	558	Alauda cristata	441
Achillea abrotanifolia L.	589	Alcedo Ispida	651
— Ageratum L.	592. 598	Alcyonium Aurantium	
— magna L.	589	— Pall.	651
— Millefolium L.	619	— cotoneum Pall.	652
— Ptarmica L.	477. 558	— Ficus Pall.	651
— tanacetifolia Allion.	589	— palmatum Pall.	652
— tomentosa L.	589	— papillosum Pall.	652
Acipenser Huso	534	Alectoria iubata Achar.	360
— Sturio	535	Alisma Plantago L.	566
Aconitum Napellus L.	608	Allium Ampeloprasum	
Acorus Calamus L.	344. 355	— L.	473. 474
Actinia senilis	430	— arenarium L.	474
Adiantum Capillus L.	632	— Cepa L.	473
Aegilops ovata L.	632	— descendens L.	474
Aëtites	661	— Dioscoridis Sibth.	517
Agaricus dryinus Pers.	489	— magicum L.	517
— eburneus Bull.	611	— Moly L.	517
— muscarius L.	611	— Scorodoprasum L.	474
— ostreatus Jacqu.	489	— subhirsutum L.	517
— pantherinus Cand.	611	Aloë arabica Lam.	503
— Prunulus Pers.	611	— socotrina Cand.	503
Agave americana L.	503	— vulgaris Cand.	503
Agrimonia Eupatorium L.	590	Aloëxylon Agallochon	
		— Lour.	361

	pag.		pag.
Alpinia Galanga Sw.	477	Anthericum graecum L.	543
Althaea cannabina L.	565	— Liliago L.	543
— officinalis L.	564	— ramosum L.	543
— pallida Kit.	564	Anthyllis cretica Lam.	403
— rosea L.	463	— Vulneraria L.	559
Alumen	649. 663	Antilope Bubalis	447
Amarantus Blitum L.	463	— Dorcas	446
Ambrosia maritima L.	545	Antipathes foenicula-	
Amiantus	659	ceum Pall.	653
Ammi copticum L.	522	Antirrhinum Asarina L.	629
— Visnaga Lam.	520	— Orontium L.	630. 631
Amomum Cardamomum		Apargia tuberosa Willd.	467
L.	352	Apatites	657
Amphibolus actinotus	661	Aphrodite aculeata	429
Amygdalus communis L.	421	Apium graveolens L.	523
— Persica L.	416	— Petroselinum L.	523. 529
Amyris gileadensis L.	357	Aplysia depilans	430
— Kafal Forsk.	372. 379	Aqua caementaria	647
— Kataf Forsk.	362	Aquilegia vulgaris L.	626
— Opobalsamum L.	357	Aranea domestica L.	444
Anacyclus aureus L.	559	— retiaria L.	443
Anagallis arvensis L.	486	Arbutus microphylla	
Anagyris foetida L.	565	Forst.	353
Anastatica hierochunti-		— Unedo L.	420
ca L.	352	Arctium Lappa L.	621
Anchusa italica Retz.	630	Argilla schistosa	662. 663
— tinctoria L.	584. 618	— smectica	663
— undulata L.	556	Aristolochia Clematitis	
Andropogon Schoenan-		L.	493
thus L.	354	— cretica L.	493
Anemone coronaria L.	485	— longa L.	493
— nemorosa L.	485	— lutea Desf.	493
— stellata Lam.	485	— pallida Kit.	493
Anethum graveolens L.	521	— rotunda L.	493
Angelica lucida L.	530	Armeria plantaginea	
Anguis Eryx	674	Willd.	572
— fragilis	673	— vulgaris Willd.	572. 688
— Scytale	674	Arnica montana L.	478. 566
Anthemis chia L.	559	— scorpioides L.	607
— Cotula L.	560	Arnopogon picroides	
— nobilis L.	559	Willd.	522
— Pyrethrum L.	525	Arsenicum	649
— rosea Sibth.	559		
— tinctoria L.	559. 560		
— valentina L.	560		

	pag.		pag.
Artemisia Abrotanum L.	505	Aster Tripolium L.	631
— Absinthium L.	503	Asterocephalus Colum-	
— arborescens L.	505. 545	baria Spr.	630
— campestris L.	545	Astragalus aduncus	
— inculta Delil.	504	Willd.	600
— iudaica L.	506	— aristatus Herit.	501
— maritima L.	504	— Arnacantha M.	
— orientalis Willd.	504	B.	502
— palmata Lam.	505	— compactus Lam.	502
— pontica L.	503. 505	— creticus Lam.	501
— santonica L.	505	— Glaux L.	633
— spicata Jacqu.	545	— hamosus L.	555
Arum Arisarum L.	481	— plamosus Willd.	502
— Colocasia L.	459. 480	— Poterium Pall.	
— crinitum Ait.	480	498.	502
— Dioscoridis Sibth.	481	— Pseudo - Tra-	
— Dracunculus L.	479	gacantha Pall.	502
— italicum Lam.	480	— pugniformis (l.	
— maculatum L.	480	magnif.) He-	
— muscivorum L. fil.	480	rit.	631
— proboscideum L.	481	— sempervirens	
— tenuifolium L.	481	Lam.	501
Arundo arenaria L.	393	— syriacus L.	600
— Donax L.	394	— tumidus Willd.	502
— Phragmites L.	394	Athamanta Cervaria L.	525
Asarum europæum L.	347	— cretensis L.	525
Asperula arvensis L.	536	— Libanotis L.	523
— cynanchica L.	581	— macedonica	
— odorata L.	563	Spr.	523
Asphaltum	660	Athanasia maritima L.	546
Asphodelus ramosus L.	482	Atractylis gummifera L.	494
Aspidium Filix mas Sw.	641	Atriplex Halimus L.	398
— Lonchitis Sw.	564	— hortensis L.	463
Asplenium Ceterach L.	558	Atropa Belladonna L.	
— Filix femina		603. 605	
Bernb.	641	Avena fatua L.	633
— Ruta muraria		Azalea pontica L.	452
L.	581. 597	Baccharis Dioscoridis L.	549
— septentriona-		Balanites aegyptiaca De-	
le Sw.	576	lil.	425
— Trichomanes		Ballota nigra L.	541
L.	632	Bambusa arundinacea	
Astacus fluviatilis	428	Schreb.	453. 646
Aster Amellus L.	625	Barbarea vulgaris R. Br.	628



	pag.		pag.
Bartsia Odontites Huds.	551	Calotropis gigantea R.	
Berberis cretica L.	404	Br.	453
Betonica Alopecurus L.	569	Calx phosphorata	657
— officinalis L.	569	Camelina sativa Crantz.	624
— stricta Ait.	569	Camforosma monspeli-	
Biserrula Pelecinus L.	555	ca L.	629
Blatta orientalis	439	Campanula Cymbalaria	
Boletus edulis Bull.	611	Sibth.	588
— Laricis Jacqu.	489	— Erinus L.	587
— luridus Schaef.	611	— hederacea L.	588
Borassus flabelliformis L.	374	— laciniata L.	582
Borax	645	— Medium L.	582
Boswellia turifera Colebr.	379	— patula L.	566
Botrychium Lunaria Sw.		— persicifolia L.	630
	583. 595	— Rapunculus L.	587
Brassica campestris L.	461	Cancer Astacus	428
— cretica Lam.	464	Cannabis sativa L.	565
— Eruca L.	469	Capparis oblongifolia	
— incana Tenor.		Forsk.	483
	464. 610	— spinosa L.	483
— oleracea L.	463	Capsicum annuum L.	547
Bryonia alba L.	641	Cardiospermum Halica-	
— dioeca L.	353. 641	cabum L.	604
Bubon Galbanum L.	533	Carduus tenuiflorus Cur-	
— gummiferum L.	533	tis.	625
— macedonicum L.	523	Carlina lanata L.	538
Buccinum Harpa	426	— vulgaris L.	496. 537
— Lapillus	426	Carthamus corymbosus	
Bunium Bulbocastanum		L.	496
L.	627	— glaucus M. B.	537
Bupleurum fruticosum		— lanatus L.	537
L.	520	— leucocaulus	
Butyrum montanum	650	Sibth.	537
		— tinctorius L.	
Cacalia albifrons L. fil.	627		582. 641
— alpina L.	626	Carum Carvi L.	521
Cachrys Libanotis L.		Castanea vesca Gaertn.	407
	518. 526	Castor Fiber	432
— maritima Spr.		Catananche coerulea L.	636
	466. 641	Caucalis grandiflora L.	486
— Morisonii Al-		— maritima Lam.	469
lion.	525	Celsia Arcturus L.	621
Calamagrostis epigeios		Celosia margaritacea L.	547
Roth.	588	Celtis australis L.	418
Calendula arvensis L.	578	Cenchrus frutescens L.	393

	pag.		pag.
<i>Centaurea benedicta</i> L.	537	<i>Cirsium eriophorum</i>	
— <i>Centaureum</i> L.	494	Scop.	497
— <i>centauroides</i>		— <i>monspeulanum</i>	
L.	494	Allion.	625
— <i>Cyanus</i> L.	601	— <i>stellatum</i> All.	499. 638
— <i>erucaefolia</i> L.	577	— <i>syriacum</i> Gaertn.	499
— <i>lanata</i> Cand.	537	(del. <i>Silybum</i> s.).	
— <i>salmantica</i> L.	577	<i>Cissus vitiginea</i> L.	352
— <i>splendens</i> L.	577	<i>Cistus creticus</i> L.	402
<i>Cephalanthera ensifolia</i>		— <i>ladaniferus</i> L.	402
Rich.	621	— <i>salvifolius</i> L.	401
— <i>rubra</i> Rich.	621	— <i>villosus</i> Lam.	401
<i>Cerastium arvense</i> L.	576	<i>Citrus medica</i> L.	417
<i>Ceratonia Siliqua</i> L.	415	<i>Cladium germanicum</i>	
<i>Ceratophyllum demersum</i> L.	624	Schrad.	596
<i>Cerbera lactaria</i> Hamilt.	393	<i>Clematis cirrosa</i> L.	641
— <i>Odollam</i> Gaertn.	392	— <i>Vitalba</i> L.	641
<i>Cercopis spumaria</i>	601	<i>Clinopodium vulgare</i> L.	538
<i>Cerinthe minor</i> L.	489	<i>Clubiona holosericea</i>	671
<i>Cervus Capreolus</i>	446	<i>Cneorum tricocon</i> L.	640
— <i>Dama</i>	446	<i>Cnidium Silaus</i> Spr.	525
<i>Chaerophyllum sativum</i>		<i>Cochlearia anglica</i> L.	572
C. Bauh.	469	— <i>Armoracia</i> L.	461
— <i>sylvestre</i> L.	624	<i>Colchicum autumnale</i> L.	612
<i>Chamaerops humilis</i> L.	411	— <i>fasciculare</i> R.	
<i>Cheiranthus Cheiri</i> L.	550	Br.	614
<i>Chelidonium maius</i> L.		<i>Coluber aegyptius</i>	430. 675
487. 534		— <i>Ammodytes</i>	430
<i>Chenopodium Botrys</i> L.	545	— <i>Berus</i>	430. 675
— <i>Scoparia</i> L.	633	— <i>Cerastes</i>	674
<i>Chermes Ilicis</i>	593	— <i>lebetinus</i>	674
<i>Chondria obtusa</i> Agardh.	617	— <i>Natrix</i>	675
<i>Chondrilla iuncea</i> L.	467	— <i>Prester</i>	675
<i>Chrysanthemum coronarium</i> L.	598	<i>Conium maculatum</i> L.	608
<i>Chrysocoma Linosyris</i> L.	597	<i>Convallaria maialis</i>	688
<i>Chrysomela Cichorii</i>	442	— <i>multiflora</i> L.	573
<i>Cicer arietinum</i> L.	458	— <i>Polygonatum</i>	
<i>Cichorium Endivia</i> L.	467	L.	573
— <i>Intybus</i> L.	467	— <i>verticillata</i> L.	613
<i>Cinnabaris</i>	646	<i>Convolvulus arvensis</i> L.	
<i>Circaea alpina</i> L.	547	578. 590	
— <i>lutetiana</i> L.	547	— <i>Cneorum</i> L.	604
<i>Cirsium Acarna</i> Cand.	497	— <i>Dorycnium</i> L.	604
		— <i>farinosus</i> L.	639
		— <i>Scammonea</i> L.	639

	pag.		pag.
<i>Convolvulus sepium</i> L.		<i>Cuprum</i>	645—649. 655
— 578.	634	<i>Curcuma longa</i> L.	344
— <i>Soldanella</i> L.	465	<i>Cuscuta Epithymum</i> L.	641
<i>Conyza candida</i> L.	621. 627	<i>Cycas circinalis</i> L.	411
— <i>squarrosa</i> L.	515. 549	<i>Cyclamen europaeum</i> L.	478
<i>Corallina officinalis</i> L.	617	<i>Cynanchum erectum</i> L.	610
<i>Cordia Myxa</i> L.	424	— <i>nigrum</i> Pers.	547
<i>Cordylocarpus laevigatus</i>		— <i>Vincetoxicum</i>	
Desf.	460	Pers.	537
— <i>muricatus</i> Desf.	460	<i>Cynara Cardunculus</i> L.	667
<i>Coriandrum sativum</i> L.	523	<i>Cynoglossum officinale</i> L.	630
<i>Coris monspeliensis</i> L.	575	<i>Cyperus rotundus</i> L.	344
<i>Cornus mascula</i> L.	419	<i>Cypripedium Calceolus</i>	
<i>Coronilla Securidaca</i> L.	555	L.	564
— <i>varia</i> L.	555	<i>Cytinus Hypocistis</i> L.	401
<i>Coronopus Ruellii</i> Da-		<i>Cytisus laniger</i> Cand.	359
lech.	545	— <i>spinosus</i> Lam.	359
<i>Corydalis bulbosa</i> Pers.	539	<i>Czackia Liliastrum</i> Andr.	543
— <i>claviculata</i> Pers.	626		
<i>Corylus Avellana</i> L.	407	<i>Daphne alpina</i> L.	634
<i>Costus arabicus</i> L.	354	— <i>Gnidium</i> L.	640
<i>Cottus Gobio</i>	435	— <i>Laureola</i> L.	635
— <i>Scorpius</i>	429	— <i>Mezereum</i> L.	535
<i>Cotyledon lutea</i> Huds.	615	— <i>oleoides</i> Schreb.	640
— <i>serrata</i> L.	615	— <i>Tartonraira</i> L.	635
— <i>Umbilicus</i> L.	615	<i>Datura Stramonium</i> L.	603
<i>Crateva oblongifolia</i> Spr.	483	<i>Daucus Carota</i> L.	520
<i>Crepis biennis</i> L.	522	— <i>Gingidium</i> L.	
— <i>Dioscoridis</i> L.	523		468. 520
— <i>tectorum</i> L.	582	— <i>guttatus</i> Sibth.	520
<i>Cressa cretica</i> L.	558. 568	<i>Delphinium Aiacis</i> L.	525
<i>Creta brigantia</i>	657	— <i>Consolida</i> L.	522
<i>Crithmum maritimum</i> L.		— <i>Staphis agria</i>	
	466. 641	L.	637
<i>Crocodylus Suchus</i>	449	— <i>tenuissimum</i>	
<i>Crocus sativus</i> L.	362	Sibth.	525
<i>Croton tinctorius</i> L.	642	<i>Dianthus carthusianorum</i>	
<i>Cucifera thebaica</i> Delil.	410	L.	570
<i>Cucubalus baccifer</i> L.	479	<i>Digitalis ambigua</i> Murr.	613
<i>Cucumis Colocynthis</i> L.	640	— <i>lutea</i> L.	566
— <i>sativus</i> L.	467	<i>Diospyros Ebenaster</i>	
<i>Cucurbita Melopepo</i> L.	468	Retz.	404
— <i>Pepo</i> L.	468	— <i>Ebenum</i> Retz.	404
<i>Cuminum Cyminum</i> L.	521	— <i>Melanoxylon</i>	
<i>Cunila thymoides</i> L.	587	Roxb.	404

	pag.		pag.
<i>Diotis candidissima</i> Desf.	546	<i>Erodium malachoides</i>	
<i>Dipsacus fullonum</i> Mill.	497	Willd.	546
— <i>sylvestris</i> Mill.	497	<i>Erucaria aleppica</i> Gärtn.	460
<i>Doronicum Pardalian-</i>		<i>Eryngium dichotomum</i>	
ches L.	607	Desf.	502
— <i>scorpioides</i> Willd.	607	— <i>maritimum</i> L.	496
<i>Dorycnium monspeli-</i>		— <i>planum</i> L.	502
se W.	604	— <i>tricuspidatum</i> L.	502
<i>Draba aizoides</i> L.	552	<i>Erythraea Centaurium</i>	
— <i>verna</i> L.	597	Pers.	494
<i>Dracaena Draco</i> L.	647	<i>Erythronium Dens canis</i>	
		L.	554. 614
<i>Ebenoxylon verum</i> Lour.	404	<i>Euphorbia antiquorum</i> L.	532
<i>Echinophora spinosa</i> L.	579	— <i>Apios</i> L.	640
— <i>tenuifolia</i> L.	518	— <i>Chamaesyce</i> L.	639
<i>Echinops lanuginosus</i>		— <i>Characias</i> L.	639
Lam.	497	— <i>Cyparissias</i> L.	639
— <i>sphaerocephalus</i> L.	496	— <i>dendroides</i> L.	639
<i>Echinus Cidaris</i>	659	— <i>helioscopia</i> L.	639
— <i>esculentus</i>	426	— <i>Lathyris</i> L.	639
<i>Echites antidysenterica</i>		— <i>mauritanica</i> L.	532
Roth.	393	— <i>Myrsinites</i> L.	639
<i>Echium altissimum</i> Iacqu.	586	— <i>officinarum</i> L.	532
— <i>creticum</i> L.	585	— <i>Paralias</i> L.	639
— <i>diffusum</i> Sibth.	585	— <i>Peplis</i> L.	639
— <i>elegans</i> Lehm.	585	— <i>Peplus</i> L.	639
— <i>italicum</i> L.	586	— <i>Pityusa</i> L.	639
— <i>rubrum</i> Iacqu.	586	— <i>platyphylla</i> L.	639
— <i>vulgare</i> L.	586	— <i>spinosa</i> L.	638
<i>Elaeagnus hortensis</i> M. B.	406	<i>Fagonia cretica</i> L.	579
— <i>orientalis</i> L.	406	<i>Falco ossifragus</i>	440
— <i>spinosa</i> L.	406	<i>Farsetia clypeata</i> R. Br.	536
<i>Emblica officinalis</i> Gärtn.	638	<i>Ferrum</i>	648. 655
<i>Empetrum album</i> L.	397	<i>Ferula Asa foetida</i> L.	530
<i>Ephedra distachya</i> L.	595	— <i>communis</i> L.	527
<i>Epilobium angustifolium</i>		— <i>Ferulago</i> L.	532
L.	624	— <i>nodiflora</i> L.	527
<i>Epimedium alpinum</i> L.	582	— <i>Opopanax</i> Spr.	518
<i>Equisetum fluviatile</i> L.	593	— <i>persica</i> Willd.	531
— <i>limosum</i> L.	593	— <i>tingitana</i> Herm.	529
<i>Erica arborea</i> L.	396	<i>Ficus Carica</i> L.	423
<i>Erigeron graveolens</i> L.	549	— <i>Sycomorus</i> L.	422
<i>Eriophorum polystachyon</i>		<i>Fistulina hepatica</i> Fries.	611
Sm.	547	<i>Forstera muscifolia</i> Willd.	
		(del. magellanica Sw.)	352



	pag.		pag.
<i>Fragaria vesca</i> L.	590	<i>Gnaphalium sanguineum</i>	
<i>Frankenia pulverulenta</i>		L.	515
L.	558	— <i>Stoechas</i> L.	598
<i>Fraxinus Ornus</i> L.	389	<i>Gratiola officinalis</i> L.	601
<i>Fucus coccineus</i> Huds.	617	<i>Gryllus migratorius</i>	440
— <i>granatus</i> Lam.	617	— <i>verrucivorus</i>	440
<i>Fumaria officinalis</i> L.	621	<i>Gymnadenia conopsea</i>	
— <i>parviflora</i> Lam.	621	Rich. 553.	554
<i>Gagates</i>	655. 656	— <i>viridis</i> Rich.	553
<i>Galactites</i>	656	<i>Gymnocarpus fruticosus</i>	
<i>Galanthus nivalis</i> L.	551	Forsk.	397
<i>Galeobdolon luteum</i> Sm.	540	<i>Gymnogramme Ceterach</i>	
<i>Galium Aparine</i> L.	535	Spr.	558
— <i>cruciatum</i> Sm.	563	<i>Gypsophila Saxifraga</i> L.	581
— <i>verum</i> L.	616	— <i>Struthium</i> L.	478
<i>Gemma prasia</i>	661	— <i>Vaccaria</i> Sm.	489
— <i>turcica</i>	658	<i>Gypsum</i>	663
<i>Gentiana asclepiadea</i> L.		<i>Hadena piniperda</i>	443
488. 492		<i>Hedera Helix</i> L.	486
— <i>lutea</i> L.	492	<i>Hedysarum Alhagi</i> L.	453
— <i>Pneumonanthe</i>		<i>Helianthemum vulgare</i>	
L.	488	Gärtn.	519
— <i>punctata</i> L.	492	<i>Heliotropium europaeum</i>	
— <i>purpurea</i> L.	492	L.	642
<i>Geranium Robertianum</i>		— (gemma)	661
L.	589	<i>Helix arbustorum</i>	428
— <i>rotundifolium</i> L.	546	— <i>fruticum</i>	428
— <i>tuberosum</i> L.	546	— <i>ianthina</i>	426
<i>Geum urbanum</i> L.	486	— <i>Pomatia</i>	428
<i>Gladiolus byzantinus</i> Mill.	583	<i>Helleborus officin.</i> Salisb.	635
— <i>communis</i> L.	583	— <i>orientalis</i> Lam.	635
— <i>imbricatus</i> L.	583	<i>Helminthia echioides</i>	
<i>Glaucium corniculatum</i>		Willd.	466
Curt.	534	<i>Hemerocallis fulva</i> L.	550
— <i>luteum</i> Scop.	601	— <i>Liliastrum</i> L.	543
— <i>phoeniceum</i>		<i>Heracleum Panaces</i> L.	518
Crantz.	534	— <i>Sphondylium</i>	
<i>Glechoma hederaceum</i> L.	629	L.	526. 625
<i>Glis esculentus</i>	681	<i>Herniaria glabra</i> L.	621. 641
<i>Globularia Alypum</i> L.	641	<i>Hibiscus Trionum</i> L.	565
<i>Glycyrrhiza glandulifera</i>		<i>Hippopotamus amphibius</i>	432
Kit.	493	<i>Hippuris vulgaris</i> L.	573
<i>Gnaphalium Leontopo-</i>		<i>Holosteum umbellatum</i> L.	576
dium L.	630	<i>Hottonia palustris</i> L.	623
— <i>orientale</i> L.	598	<i>Hyacinthus orientalis</i> L.	600

	pag.		pag.
Hyacinthus (gemma)	451	Inula Oculus Christi L.	550
Hyaena orientalis	448	— saxatilis Lam.	549
— striata	448	— viscosa Ait.	549
Hydrargyrum	646	Iris alata Lam.	343
Hyoscyamus albus L.	601	— florentina L.	343
— aureus	601	— foetidissima L.	584
— reticulatus L.	601	— germanica L.	343
— Scopolia L.	602	— iuncea Poir.	343
Hypecoum pendulum L.	522	— mauritanica Clus.	343
— procumbens L.	522. 601	— Pseudacorus L.	344
Hyperanthera Moringa		— stylosa Desf.	343
Vahl.	637	— tuberosa L.	554. 565. 614
Hypericum Androsae-		Isatis tinctoria L.	489
mum L.	567	Isis nobilis	653
577. 595		Iuglans regia L.	407
— barbatum Jacq.	567	Iuncus acutus L.	595
— ciliatum Lam.	567	— bufonius L.	576. 588
— Coris L.	568	Iuniperus communis L.	387
— crispum L.	567	— drupacea Labill.	385
— hircinum L.	595	— hispanica Lam.	379
— montanum L.	567	— lycia L.	379
— origanifolium		— macrocarpa Sib-	
Willd.	519	thorp.	385
— perforatum	567	— Oxycedrus L.	385. 386
— revolutum Vahl.	359	— phoenicea L.	379. 387
Hyphaenecoriacea Gärtn.	410	— Sabina L. α. cu-	
Hypochoeris glabra L.	523	pressifolia Ait.	386
Hypoxis fascicularis L.	614	β. tamariscifolia	
Hyssopus officinalis L.	507. 575	Ait.	386
Hystrix cristata	426	Kalmia latifolia L.	452
Iasminum fruticans L.	574	Labrus Iulis	438
— Sambac L.	371	Lacerta Basiliscus	675
Iaspis	658. 660	— nilotica	450
— variegata, fasciata	661	— Stellio	449
Iberis umbellata L.	475	Lac lunae	657
Impatiens Balsamina L.	631	Lactuca sativa L.	468
Imperatoria Ostruthium		— Scariola L.	468
L.	519	— virosa L.	468
Indigofera tinctoria L.	646	Lagoecia cuminoides L.	522
Inula Britannica L.	550. 572	Lamium maculatum L.	541
— crithmifolia Wither.	558	— purpureum L.	616
— Helenium L.	354.	— striatum Sm.	541
363. 519		Lapis Lazuli	660

	pag.		pag.
Lapis serpentinus	662	Lilium candidum L.	368. 541
Laserpitium Chironium		— chalcedonicum L.	541
— L.	518	— Martagon L.	541. 550
— gummiferum		Linaria Elatine Desf.	590
— Desf.	530	— spuria Willd.	590
— Siler L.	519.	— vulgaris Bauh.	633
	520. 636	Linyphia triangularis	671
— thapsiaeforme		Liparis Monacha	443
— Brot.	530	Lithanthrax	656. 664
Lasiocampa pini	443	Lithospermum fruticosum	
Lathyrus Aphaca L.	473	— L.	585
— latifolius L.	578	— officinale L.	563
— Nissolia L.	631	— purpureo - coeruleum L.	
— Ochrus Cand.	626		488. 556
Laurus nobilis L.	388	— tinctorium Cand.	
Lavandula Spica Willd.	542		556. 584
— Stoechas L.	508	Lolium perenne L.	592
Lavatera flava Desf.	564	Lonicera Caprifolium L.	578
Lawsonia alba Lam.	369.	— Periclymenum	
	400. 654	— L.	479. 578
— inermis L.	400	Loranthus europaeus L.	535
— spinosa L.	400	Lotus Dioscoridis Allion.	622
Lemna minor L.	614	— glaucus Ait.	622
Leontice chrysogonum L.	597	Lupinus angustifolius L.	460
— Leontopetalum		— hirsutus L.	460
— L.	538	— pilosus L.	460
Leonurus Marrubiastrum		Lychnis coronaria Des-	
— L.	640	— rouss.	541
Lepidium campestre R.		— dioeca L.	541. 587
— Br.	475	— Flos Iovis Des-	
— Draba L.	475	— rouss.	541
— Iberis L.	484	— Githago Scop.	541
— latifolium L.	484	Lycium afrum L.	397
— sativum L.	474	— europaeum L.	
Leucojum vernum L.			397. 405
	551. 614	Lycopersicon esculentum	
Ligusticum Levisticum		— Dun.	603
— L.	519	Lycopodium clavatum L.	629
— peloponnesiacum Scop.	520	Lycopus europaeus L.	588
— pyrenaicum		Lycosa palustris	671
— Gouan.	520	— ruricola	671
— simplex Allion.	526	— Tarentula	672
Ligustrum vulgare L.	400	Lysimachia Ephemerum	
Lilium bulbiferum L.	550	— L.	613

	pag.		pag.
<i>Lysimachia vulgaris</i> L.	572	<i>Meloë Proscarabæus</i>	442
<i>Lythrum Salicaria</i> L.	572	<i>Mentha arvensis</i> L.	538
<i>Lytta vesicatoria</i>	442	— <i>cervina</i> L.	570
<i>Maianthemum bifolium</i>		— <i>Pulegium</i> L.	510. 570
— <i>Cand.</i>	588	— <i>sativa</i> L.	511
<i>Malva Alcea</i> L.	565	— <i>sylvestris</i> L.	466. 511
— <i>sylvestris</i> L.	463	<i>Menyanthes trifoliata</i> L.	626
<i>Mandragora autumnalis</i>		<i>Mercurialis annua</i> L.	552. 641
— <i>Bertol.</i>	605	— <i>elliptica</i> Lam.	552
— <i>vernalis</i> Bertol.	605	— <i>tomentosa</i> L.	
<i>Mantis religiosa</i>	685		552. 626
<i>Marchantia conica</i> L.	596	<i>Mespilus Azarolus</i> Sm.	417
— <i>polymorpha</i> L.	596	— <i>germanica</i> L.	
<i>Marmor</i>	656		418. 420
<i>Marrubium acetabulosum</i>		— <i>Pyracantha</i> L.	
— <i>L.</i>	510		397. 398
— <i>Alysson</i> L.	536	— <i>tanacetifolia</i>	
— <i>catariaefolium</i>		— <i>Sm.</i>	417. 418
— <i>Desrouss.</i>	542	<i>Meum athamanticum</i>	
— <i>Pseudo - Dicta-</i>		— <i>Iacqu.</i>	344. 526
— <i>mnus</i> L.	510	— <i>Foeniculum</i> Spr.	524
— <i>vulgare</i> L.	542	— <i>Mutellina</i> Gärtu.	526
<i>Marsdenia erecta</i> R. Br.	610	<i>Michauxia campanuloi-</i>	
<i>Matricaria Chamomilla</i> L.		— <i>des Herit.</i>	582
	559. 560	<i>Micropus erectus</i> L.	630
<i>Matthiola incana</i> R. Br.	550	<i>Mimosa agrestis</i> Sieb.	372
<i>Medicago arborea</i> L.	622	<i>Minium</i>	646
— <i>maculata</i> Willd.	622	<i>Molinia varia</i> Schrank.	588
— <i>sativa</i> L.	472	<i>Molybdaena</i>	645
<i>Medusa aequorea</i>	439	<i>Momordica Elaterium</i> L.	636
— <i>amarantea</i>	439	<i>Moroxites</i>	657
— <i>phosphorica</i>	439	<i>Mullus barbatus</i>	432
— <i>proboscidalis</i>	439	<i>Murex Brandaris</i>	426
<i>Melampyrum pratense</i> L.	551	— <i>Trunculus</i>	426
<i>Melilotus coerulea</i> Desv.		<i>Muscari botryoides</i> Willd.	482
	514. 622	— <i>comosum</i> Willd.	482
— <i>leucantha</i> Cand.	514	— <i>moschatum</i> W.	482
— <i>messanensis</i>		— <i>racemosum</i> W.	482
— <i>Desv.</i>	622	<i>Mustela Boccamele</i>	434
— <i>officinalis</i> Lam.		— <i>Foina</i>	433
	514. 622	— <i>Furo</i>	433
— <i>vulgaris</i> Willd.	514	— <i>Putorius</i>	434
<i>Melissa altissima</i> Sibth.	511	— <i>vulgaris</i>	433
— <i>cretica</i> L.	511	<i>Mylabris Dioscoridis</i>	442
— <i>officinalis</i> L.	541		



	pag.		pag.
<i>Myosotis palustris</i> Wither.	488	<i>Onobrychis sativa</i> Lam.	566
<i>Myosurus minimus</i> L.	576	<i>Ononis antiquorum</i> L.	500
<i>Myriophyllum spicatum</i>		— <i>spinosa</i> L.	500
— L.	624	<i>Onopordon Acanthium</i>	
<i>Myrrhis odorata</i> Scop.		— L.	497. 499
—	521. 624	— <i>arabicum</i> L.	497
<i>Myrtus communis</i> L.	413	— <i>illyricum</i> L.	499
— <i>Pimenta</i> L.	352	<i>Onyx</i>	658
<i>Narcissus Ionquilla</i> L.	482	<i>Ophrys apifera</i> Huds.	553
— <i>poëticus</i> L.	482. 638	— <i>aranifera</i> Huds.	553
— <i>Pseudonarcis-</i>		— <i>myodes</i> Jacqu.	553
— <i>sus</i> L.	614	<i>Orchis latifolia</i> L.	553
<i>Nasturtium officinale</i> R.		— <i>maculata</i> L.	553
— Br.	465	— <i>mascula</i> L.	553. 554
<i>Natrum</i>	651	— <i>militaris</i> L.	553
<i>Nelumbium speciosum</i>		— <i>Morio</i> L.	553
— Willd.	459. 623	— <i>papilionacea</i> L.	553
<i>Neottia Nidus avis</i> Rich.	554	— <i>pyramidalis</i> L.	553
<i>Nephrolithus</i>	661	— <i>variegata</i> Jacqu.	554
<i>Nerium Oleander</i> L.	610	<i>Origanum aegyptiacum</i> L.	507
<i>Niebuhria oblongifolia</i>		— <i>creticum</i> L.	508
— Cand.	483	— <i>Dictamnus</i> L.	510
<i>Nigella arvensis</i> L.	522	— <i>heracleoticum</i>	
— <i>sativa</i> L.	527	— L.	508. 509
<i>Nuphar luteum</i> Smith.	556	— <i>Maiorana</i> L.	513
<i>Nymphaea alba</i> L.	556	— <i>Maioranoides</i> W.	513
— <i>coerulea</i> Sa-		— <i>Maru</i> L.	509. 513
— <i>vign.</i>	623	— <i>Onites</i> L.	507. 508
— <i>Lotus</i> L.	622	— <i>sipyleum</i> L.	514
— <i>lutea</i> L.	556	— <i>smyrnaeum</i> L.	
<i>Ocimum Basilicum</i> L.	470	—	507. 509
— <i>monachorum</i> L.	515	— <i>syriacum</i> L.	507
— <i>pilosum</i> Willd.	515	— <i>vulgare</i> L.	509
— <i>suave</i> Willd.	515	<i>Ornithogalum stachyoi-</i>	
— <i>urticaefolium</i>		— <i>des Ait.</i>	481. 482
— Roth.	515	— <i>umbellatum</i> L.	471
<i>Oenanthe peucedanifo-</i>		<i>Ornithopus compressus</i> L.	631
— <i>lia</i> Pollich.	547	<i>Orobanche caryophylla-</i>	
— <i>pimpinelloides</i>		— <i>cea</i> Sm.	471
— L.	547	<i>Orobis tuberosus</i> L.	599
— <i>prolifera</i> L.	548	— <i>vernus</i> L.	599
<i>Olivia Androsace</i> Bertol.	558	<i>Osyris alba</i> L.	633
<i>Oniscus Armadillo</i>	438	<i>Otanthus maritimus</i> Link.	546
<i>Onobroma glaucum</i> Spr.	537	<i>Paeonia arietina</i> Anders.	561
— <i>leucocaulon</i> Spr.	537	— <i>corallina</i> Retz.	562

	pag.		pag.
<i>Paeonia officinalis</i> L.	561	<i>Phillyrea latifolia</i> L.	400
— <i>peregrina</i> Mill.	561	<i>Phlomis fruticosa</i> L.	620
<i>Paliurus australis</i> Gaertn.	397. 398	— <i>Herba venti</i> L.	487
<i>Pancratium maritimum</i> L.	483	— <i>lunarifolia</i> Sibth.	620
<i>Panicum italicum</i> L.	458	— <i>Lychnitis</i> L.	620
— <i>miliaceum</i> L.	458	— <i>samia</i> L.	620
<i>Papaver Argemone</i> L.	485. 600	<i>Phoenix dactylifera</i> L.	409
— <i>dubium</i> L.	600	<i>Phorcynia Forskolea</i>	439
— <i>Rhoeas</i> L.	600	— <i>Mesonema</i>	439
<i>Parietaria cretica</i> L.	488	— <i>mollicina</i>	439
— <i>officinalis</i> L.	614	<i>Physalis Alkekengi</i> L.	602
<i>Paris quadrifolia</i> L.	607	— <i>somnifera</i> L.	602
<i>Parmelia parietina</i> Achar.	596	<i>Pimpinella Anisum</i> L.	521
<i>Parnassia palustris</i> L.	588	— <i>dioeca</i> L.	628
<i>Paronychia hispanica</i>		— <i>dissecta</i> Retz.	627. 628
— <i>Cand.</i>	597	— <i>Saxifraga</i> L.	580
<i>Passerina hirsuta</i> L.	568. 636	— <i>tenuis</i> Sieb.	628
— <i>polygalaefolia</i> La-		<i>Pinus Abies</i> L.	382
— <i>peyr.</i>	636. 641	— <i>brutia</i> Tenor.	383
<i>Pastinaca Anethum</i> Spr.	521	— <i>Cembra</i> L.	380
— <i>Opopanax</i> L.	518	— <i>Larix</i> L.	382
— <i>sativa</i> L.	462. 524	— <i>maritima</i> Lam.	383
<i>Patrinia Iatamansi</i> Don.	345	— <i>Picea</i> L.	368. 382
— <i>scabiosaefolia</i>		— <i>Pinaster</i> Ait.	383
— <i>Fisch.</i>	346	— <i>Pinea</i> L.	380. 382
<i>Pedicularis tuberosa</i> L.	548	<i>Piper Cubeba</i> L.	352. 414
<i>Peganum Harmala</i> L.	516	— <i>longum</i> L.	476. 665
<i>Peltigera aphthosa</i> Hoffm.	596	— <i>nigrum</i> L.	476
— <i>canina</i> Hoffm.	596	<i>Pistacia Lentiscus</i> L.	367. 381
<i>Penaea Sarcocolla</i> L.	533	— <i>Terebinthus</i> L.	381
<i>Perca fluviatilis</i>	438	— <i>vera</i> L.	421
<i>Persea Cassia</i> Spr.	348	<i>Pistia Stratiotes</i> L.	618
<i>Peucedanum alsaticum</i> L.	530	<i>Plantago albicans</i> L.	576
— <i>Cervaria</i> Lapeyr.	525	— <i>altissima</i> Jacqu.	465
— <i>nodosum</i> L.	525	— <i>asiatica</i> L.	465
— <i>officinale</i> L.	527	— <i>Bellardi</i> Allion.	576
<i>Phaca baetica</i> L.	600	— <i>Coronopus</i> L.	466
<i>Phalaena piniaria</i>	443	— <i>cretica</i> L.	630
<i>Phalaris canariensis</i> L.	563	— <i>Lagopus</i> L.	465. 631
<i>Phaseolus nanus</i> L.	472	— <i>lanceolata</i> L.	465
— <i>vulgaris</i> L.	472	— <i>macrorrhiza</i> Poir.	466
<i>Phellandrium aquaticum</i>		— <i>maior</i> L.	465
— <i>L.</i>	623	— <i>maritima</i> L.	465
— <i>Mutellina</i> L.	526	— <i>Psyllium</i> L.	602

	pag.		pag.
Plantago Serraria L.	466	Prunus Cerasus L.	414
Platanthera bifolia Rich.	553.	— insiticia L.	419
	554	— Mahaleb L.	401
Platanus orientalis L.	389	— spinosa L.	405
Pleurotoma babylonia	427	Psoralea bituminosa L.	543
— Trapezium	427	Pteronia Chamaepeuce	
Plumbago europaea L.	631	Spr.	629
Plumbum	647	Pumex	650. 653
Polemonium coeruleum		Punica Granatum L.	412
L.	574	Pyrethrum Parthenium	
Polycarpon tetraphyllum		Sm.	560
L.	597	Pyrus communis L.	417
Polygala amara L.	633	— Cydonia L.	416
— monspeliaca L.	566	— domestica Sm.	419
Polygonum aviculare L.	573	— Malus L.	416
— Bistorta L.	571. 581	Quarzum	663
— Convolvulus L.	546	Quercus Ballota Desf.	500
— Hydropiper L.		— coccifera L.	593
	477. 552	— gramuntia L.	500
— maritimum L.	573	— Ilex L.	594
— Persicaria L.	551	Raia Pastinaca	431
— viviparum L.	571	— Torpedo	429
Polypodium Dryopteris		Ranunculus aconitifol. L.	485
L.	641	— alpestris L.	485
— Filix femina L.	641	— aquatilis L.	485. 623
— vulgare L.	641	— asiaticus L.	484
Populus alba L.	389	— Ficaria L.	487. 534
— nigra L.	389. 390	— lanuginosus L.	485
Potamogeton heterophyl-		— muricatus L.	485
lus Schreb.	618	— rutaefolius L.	485
— natans L.	618	— Thora L.	607. 608
— rufescens Schrad.	618	Raphanus maritimus Sm.	461
— zosteraefolius		— Raphanistrum L.	
Schum.	618		461. 463
Potentilla nemoralis		Ren ferri	662
Nestl.	571	Reseda canescens L.	635
— reptans L.	592	— mediterranea L.	635
— subacaulis L.	540	— Phyteuma L.	574. 630
Poterium Sanguisorba L.	589	Retinasphaltum	660
— spinosum L.	498. 576	Rhamnus infectoria L.	
Prenanthes purpurea L.	526		404. 654
Primula Palinuri Petagn.	566	— Lycium Scop.	404
Prunella alba Pall.	575	— oleoides L.	397
— vulgaris L.	538. 575	— Paliurus L.	397
Prunus Armeniaca L.	416	Rheum palmatum L.	491


	pag.		pag.
Rheum Rhaponticum L.	491	Sanicula europaea L.	589
Rhodiola rosea L.	593	Santolina Chamaecypa-	
Rhododendron ponticum		rissus L.	505
L.	452	— maritima Huds.	546
Rhus Coriaria L.	408	— squarrosa Willd.	505
Ricinus communis L.	365	Saponaria ocimoides L.	587
Rosa arvensis L.	404	— officinalis L.	478. 578
— canina L.	399	— Vaccaria L.	489
— collina Jacqu.	399	Sapphirus	660
— leucantha Loisel.	399	Satureia capitata L.	511
— lutea Dalech.	404	— graeca L.	538
Rubia lucida L.	563	— Iuliana L.	538. 581
— tinctorum L.	563	— montana L.	581
Rubus caesius L.	422	— Thymbra L.	512
— fruticosus L.	399. 589	Saxifraga Cotyledon L.	
— idaeus L.	590		552. 615
— saxatilis L.	590	— granulata L.	581
Rumex Acetosa L.	462. 686	— Hirculus L.	347
— acutus L.	462. 479	Scandix australis L.	469
— aquaticus L.	571	— falcata Londs.	469
— Britannica L.	572	Schoenus Mariscus L.	596
— Hydrolapathum		Scilla bifolia L.	482
Huds. 462. 479.	571	— maritima L.	482
— Patientia L.	462	Scincus algiriensis	444
— scutatus L.	462. 686	— officinalis	444
Ruscus aculeatus L.	634	Scirpus Holoschoenus L.	596
— Hypoglossum L.	631	— lacustris L.	596
— Hypophyllum L.		— maritimus L.	596
592. 634. 635		— palustris L.	595
— racemosus L.	635	Scleranthus annuus L.	581
Ruta graveolens L.	516	Scolopendra morsitans	429
— montana L.	516	Scolopendrium Hemioni-	
Saccharum officinarum L.	453	tis Sw.	558
— Ravennae L.	547	— officinarum Sm.	543
Sal marinus	650. 652	Scolymus hispanicus L.	498
Salamandra terrestria	443	— maculatus L.	498
Salsola Tragus L.	595	Scomber Thynnus	436
Salvia Aethiopis L.	620	Scorpaena Scrofa	429
— Horminum L.	555	Scorpiurus sulcata L.	642
— officinalis L.	510	— vermiculata L.	578
— Verbenaca L.	591	Scorzonera elongata	
— viridis L.	555	Willd.	523
Salvinia natans L.	619	Scrofularia lucida L.	589
Sambucus Ebulus L.	640	— nodosa L.	578
— nigra L.	640	— peregrina L.	616



	pag.		pag.
Scutellaria Columnae Al-		Smyrniun Olusatrum L.	
lion.	570		373. 524
Sedum altissimum Poir.	568	— perfoliatum L.	524
— Cepaea L.	566	Solanum Dulcamara L.	
— reflexum L.	615		479. 547
— Rhodiola Cand.	593	— esculentum Dunal.	603
— rupestre L.	615	— insanum L.	603
— stellatum L.	615	— Melongena L.	603
Selenites	660	— miniatum Bernh.	602
Selinum Galbanum Spr.	533	— nigrum L.	602
— gummiferum Spr.	533	— sodeum L.	424. 603
— Oreoselinum Scop.	523	Solipuga araneoides	672
Sempervivum arboreum		Sonchus oleraceus L.	466
L.	614	— palustris L.	466
Senecio vulgaris L.	599. 616	— uliginosus M. B.	466
Sepia officinalis	431	Sorbus domestica L.	361
Serapias cordigera L.	554	Sorex araneus	445
— Lingua L.	554	Sorghum vulgare Pers.	457
Serratula Rhaponticum		Sparganium ramosum Sw.	583
Cand.	491	— simplex Sw.	584
Seseli ammoides L.	525	Spartium horridum Vahl.	359
— Hippomarathrum L.		— iunceum L.	637
	525. 581	— Scorpius L.	405
— tortuosum L.	520	— villosum Vahl.	359
Setaria italica P. B.	458	Sparus Dentex	438
Sida Abutilon L.	565	— Maena	435
Sideritis scordioides L.	589	— Pagrus	438
Silene inflata Sm.	574. 601	— Smaris	435
Silurus Glanis	434. 535	Sphaerococcus cartilagi-	
Silybum Marianum Gärtn.		neus Agardh.	617
	497. 637	— confervoides Ag.	617
— syriacum vid. Cir-		— musciformis Ag.	617
sium syr.		— plicatus Ag.	617
Sinapis arvensis L.	462	Spiraea Filipendula L.	548
Sison Amomum L.	521	Spiranthes aestivalis Rich.	621
— Anisum Spr.	521	— autumnalis Rich.	
Sisymbrium polyceraton			554. 621
L.	475	Spongia fasciculata Pall.	653
Sium angustifolium L.	465	— officinalis L.	653
— Bulbocastanum Spr.	627	— panicea Pall.	652
— latifolium L.	373. 465	— stuposa Ellis.	652
— Sisarum L.	461	Spongites	662
Smilax aspera L.	633	Sporocnhus aculeatus Ag.	617
Smyris	662	Stachys annua L.	536
Smyrniun Dioscor. Spr.	524	— germanica L.	542

	pag.		pag.
<i>Stachys glutinosa</i> L.	509	<i>Teucrium supinum</i> L.	540. 568
— <i>heraclea</i> Allion.	589	<i>Thalictrum minus</i> L.	616
— <i>palaestina</i> L.	542	<i>Thapsia Asclepium</i> L.	518. 637
— <i>recta</i> L.	589	— <i>gummifera</i> Spr.	530
<i>Stäbelina Chamaepeuce</i> L.	629	— <i>Silphium Vivian.</i>	530
<i>Statice Limonium</i> L.	581	— <i>villosa</i> L.	521
<i>Stellaria graminea</i> L.	551	<i>Thelygonum Cynocram-</i>	
— <i>holostea</i> L.	576	<i>be</i> L.	642
<i>Stibium</i>	645	<i>Thetis leporina</i>	430
<i>Stincus</i> vid. <i>Scincus</i> .		<i>Thlaspi Bursa</i> L.	475
<i>Stratiotes aloides</i> L.	619	<i>Thrinicia tuberosa</i> Cand.	467
<i>Streptopus distortus</i> Mx.	592	<i>Thuia articulata</i> Vahl.	360
<i>Strombus lentiginosus</i>	427	<i>Thymbra spicata</i> L.	507
<i>Styrax Benzoin</i> Dryand.	375	— <i>verticillata</i> L.	507
— <i>officinalis</i> L.	373	<i>Thymus Acinos</i> L.	514.
<i>Succisa pratensis</i> Mönch.	640		538. 587
<i>Symphytum officinale</i> L.	575	— <i>alpinus</i> L.	538
<i>Syngnathus Hippocampus</i>	426	— <i>Barrelieri</i> Spr.	511
<i>Tagetes erecta</i> L.	487	— <i>creticus</i> Brot.	511
<i>Talcum steatitis</i>	657. 661	— <i>Mastichina</i> L.	509.
<i>Tamarix articulata</i> Vahl.	396		510. 514
— <i>gallica</i> L.	396. 453	— <i>Nepeta</i> Scop.	511
— <i>orientalis</i> Forsk.	396	— <i>Serpyllum</i> L.	512
<i>Tamus communis</i> L.	479. 641	— <i>Tragoriganum</i> L.	509
<i>Tanacetum annuum</i> L.	598	— <i>vulgaris</i> L.	511. 512
— <i>vulgare</i> L.	558	— <i>Zygis</i> L.	513
<i>Taxus baccata</i> L.	389. 609	<i>Topazius fumidus</i>	661
<i>Terminalia Bellirica</i>		<i>Tophus calcareus</i>	656
Roxb.	638	<i>Tordylium officinale</i> L.	
— <i>Chebula</i> Roxb.	638		469. 521
<i>Tetragnatha extensa</i>	671	<i>Trachinus Draco</i>	429
<i>Teucrium aureum</i> Schreb.	540	<i>Tragium Columnae</i> Spr.	595
— <i>capitatum</i> L.	540	<i>Tragopogon crocifolius</i> L.	471
— <i>Chamaedrys</i> L.	540	<i>Trapa natans</i> L.	579
— <i>creticum</i> L.	544	<i>Trianthema fruticosum</i>	
— <i>flavum</i> L.	539	Vahl.	397
— <i>fruticans</i> L.	539	<i>Tribulus terrestris</i> L.	579
— <i>Marum</i> L.	363. 514	<i>Trifolium arvense</i> L.	582
— <i>montanum</i> L.	544. 568	<i>Trigonella corniculata</i> L.	
— <i>Polium</i> L.	540. 544		514. 622
— <i>Pseudhyssopus</i>		— <i>elatior</i> Sibth.	622
Schreb.	507	<i>Triticum aestivum</i> L.	454
— <i>rosmarinifolium</i>		— <i>monococcon</i> L.	456
Lam.	544	— <i>repens</i> L.	588
— <i>Scordium</i> L.	544	— <i>Spelta</i> L.	456

	pag.		pag.
<i>Triticum Zea</i> Host.	456	<i>Verbena officinalis</i> L.	598
<i>Tuber cibarium</i> Sibth.	472	— <i>supina</i> L.	599
<i>Tubularia Acetabulum</i> L.	558	<i>Veronica Anagallis</i> L.	465
<i>Tulipa Clusiana</i> Red.	554	— <i>arvensis</i> L.	536
— <i>Gesneriana</i> L.	554	— <i>Chamaedrys</i> L.	540
<i>Turmalinus</i>	451	— <i>montana</i> L.	536
<i>Turritis Löselii</i> R.Br.	599	— <i>officinalis</i> L.	539. 570
<i>Tussilago Farfara</i> L.	544	— <i>serpyllifolia</i> L.	570
— <i>Petasites</i> L.	621	— <i>spicata</i> L.	568
<i>Typha latifolia</i> L.	547	— <i>Teucrium</i> L.	539
<i>Uva Lactuca</i> L.	617	<i>Vicia angustifolia</i> Roth.	473
— <i>punctata</i> Stackh.	617	— <i>bithynica</i> L.	473
<i>Uranoscopus scaber</i>	447	— <i>hybrida</i> L.	473
<i>Urtica dioeca</i> L.	615	— <i>lutea</i> L.	473
— <i>urens</i> L.	615	— <i>sepium</i> L.	473
<i>Usnea barbata</i> Hoffm.	360	<i>Vinca maior</i> L.	573
— <i>florida</i> Hoffm.	360	— <i>minor</i> L.	573. 635
— <i>plicata</i> Hoffm.	360	<i>Viscum album</i> L.	535
<i>Utricularia vulgaris</i> L.	624	<i>Vitex Agnus</i> L.	406
<i>Uvularia amplexifolia</i> W.	592	<i>Vitis Labrusca</i> L.	642
<i>Valeriana celtica</i> L.	346	— <i>vinifera</i> L.	642
— <i>Dioscoridis</i> Haw-		<i>Wormskioldia ocellata</i>	
kins.	348. 665	Spr.	617
— <i>Hardwickii</i> Wal-		— <i>Plocamium</i> Spr.	617
lich.	346	— <i>sanguinea</i> Spr.	617
— <i>Iatamansi</i> Iones.	345	<i>Wrightia antidysenterica</i>	
— <i>officinalis</i> L.	348	R. Br.	393
— <i>Phu</i> L.	348	<i>Xanthium strumarium</i> L.	632
— <i>Saliunca</i> Allion.	346	<i>Xeranthemum annuum</i>	
— <i>sambucifolia</i> Mi-		L.	477
kan.	348	<i>Ximenia aegyptiaca</i> L.	
— <i>saxatilis</i> L.	347	(del. ellipt.)	425
— <i>tuberosa</i> L.	347	<i>Zincum</i>	644
<i>Veratrum album</i> L.	635	<i>Zingiber officinale</i> Rosc.	477
<i>Verbascum ferrugineum</i>		<i>Zizyphus Lotus</i> Lam.	
Ait.	621		418. 636
— <i>nigrum</i> L.	620	<i>Zonaria Pavonia</i> Ag.	617
— <i>plicatum</i> Sibth.	619	— <i>squamaria</i> Ag.	617
— <i>sinuatum</i> L.	619	<i>Zygnis tridactyla</i>	444
— <i>Thapsus</i> L.	619		
— <i>undulatum</i> Lam.	619		







(1/2) 29/10/18



